

妇幼健康「三基」

训练题解

江苏省妇幼保健协会 • 编

FUYOU
JIANKANG
SANJI

东南大学出版社

妇幼健康“三基” 训练题解

江苏省妇幼保健协会 编



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

妇幼健康“三基”训练题解 / 江苏省妇幼保健协会
编. — 南京:东南大学出版社,2016.5

ISBN 978-7-5641-6477-5

I. ①妇… II. ①江… III. ①妇幼保健-资格考试-
习题集 IV. ①R17-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 093270 号

妇幼健康“三基”训练题解

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼2号(邮编 210096)
印 刷 扬中市印刷有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 34.5
字 数 1000 千字
版 次 2016 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-6477-5
定 价 80.00 元

* 本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系,电话:025—83791830。

序

妇幼健康事业肩负着保护妇女劳动力和提高未来劳动者素质的双重使命,是立足现代、面向未来的事业。保护妇女儿童的健康,是卫生计生工作的重要任务,是改善民生、提高人民生活质量的重要保障,是社会主义精神文明的体现。长期以来,在各级党委和政府的关怀下,经过妇幼健康战线广大干部职工的共同努力,我省的妇幼健康事业取得了较大的进步,孕产妇和婴儿死亡率控制水平进入全国先进行列。

在新的历史时期,我省妇幼健康事业改革与发展的任务十分繁重。党的十八大提出实现中华民族伟大复兴中国梦“两个一百年”的宏伟目标,作出了推进健康中国建设和实施全面两孩政策、促进人口长期均衡发展的战略决策。省委、省政府按照党中央的战略部署,根据本省实际,提出了全面建成更高水平的小康社会,率先基本实现现代化的奋斗目标,并制订了建设现代医疗卫生体系的规划,明确了我省妇幼健康事业发展的具体目标和任务。

面对新的形势,我省妇幼健康工作在依法执业、扩大供给、改善质量以及控制孕产妇和婴儿死亡率等方面都面临一些新情况、新问题,需要妇幼健康战线广大医务人员付出更多的努力和辛劳。

为了适应广大妇幼健康医务人员基础理论、基本知识、基本技能的训练需要,帮助大家练好基本功,增强业务素质,提高医疗保健技术水平和服务质量,江苏省妇幼保健协会组织有关专家编写了这本

《妇幼健康“三基”训练题解》。该书更新和完善了以往的妇幼健康“三基”内容,吸收了近年来涌现出的妇幼健康新理论、新知识、新技术,使内容更系统、更全面,更注重培养医务人员解决问题的实际工作能力,是各级医疗机构妇幼健康医务人员“三基”训练的一本指导书,也是妇幼健康医务人员规范化培训、在职教育的参考书。相信它能成为大家的良师益友。

由于“三基”内容涉及面广,该书的编写工作又是初次尝试,存在不足在所难免。感谢参加编写工作的各位专家的辛勤劳动。希望妇幼健康同仁与编者一道努力探索,共同推进我省妇幼健康事业的发展,更好地为广大妇女儿童的健康服务。

江苏省卫生和计划生育委员会主任 **王咏红**

2016年1月18日

前 言

我省作为全国经济最发达的省份之一,妇幼健康事业一直走在全国前列。妇女儿童健康状况持续改善,全省孕产妇死亡率降至4.64/10万,婴儿死亡率降至3.30‰,达到中等发达国家平均水平。妇幼健康服务均等化水平持续提高,孕产妇和0—6岁儿童健康管理率达到95%以上,实施农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”检查等重大公共卫生项目,有效地缩小了城乡之间、地区之间妇幼健康服务公平性和可及性的差距。妇幼健康服务能力持续增强,建成省、市、县三级妇幼保健机构112家以及计划生育技术服务机构1.6万家,为提供优质服务构建了完善的机构网络。妇幼健康体制机制改革持续深化,有力地推动了政府增加财政投入,加快妇幼保健和计划生育技术服务资源整合,促进了妇幼保健机构管理模式改革、妇幼健康项目基层首诊、分级服务制度建设,妇幼健康服务内涵逐步拓展,服务数量不断增加,充分发挥了妇幼健康服务对于增强全民健康素质的基础性保障作用。

“十三五”期间,是实施全面两孩政策的关键阶段,也是深化医改、建设健康江苏和现代医疗卫生体系的攻坚阶段。在新的历史时期,我省妇幼健康事业既有难得的发展机遇和外部条件,又面临诸多新情况、新问题,特别是在扩大妇幼健康服务供给、持续改善服务质量、不断提高技术水平和服务水平以及控制孕产妇和婴儿死亡率等方面都需要我们付出更多的努力。我们必须坚持“儿童优先、母亲安

全”的服务宗旨,以妇女儿童健康需求为导向,提供更优质、更人性化的妇幼健康服务,满足新时期妇女儿童对健康的诉求和期盼,尤其要提高妊娠风险评估、高危孕产妇和高危儿的服务管理和救治水平,切实保障母婴安全,有效控制孕产妇和婴儿死亡率。

基础理论、基本知识和基本技能(简称“三基”)是医务人员为患者服务的基本功,是增强整体业务素质,提高妇幼保健和临床医疗质量的基础条件。随着医学的快速发展,各学科的新理论、新知识、新技能不断涌现,妇幼健康服务“三基”亟待更新和完善。为此,我们组织省内部分专家编写了这本《妇幼健康“三基”训练题解》,以供各地深入开展“三基”训练之用。

由于妇幼健康“三基”内容涉及面广,该书的编写工作又是初次尝试,加之我们专业水平和理论知识的局限,存在不足在所难免。希望广大医务人员在学习和使用过程中与我们一道探索,注意积累资料,以便进一步修订和完善。该书的编写时间短、任务重,感谢徐柏荣、蒋小青、王春宁、许波群等编写人员付出的辛勤劳动和汗水。

江苏省妇幼保健协会

2016年1月18日

目 录

第一章 妇女保健	1
一、判断题	1
二、单项选择题	7
三、多项选择题	88
四、答案	112
第二章 儿童保健	116
一、判断题	116
二、单项选择题	121
三、多项选择题	175
四、答案	200
第三章 助产技术	203
一、判断题	203
二、单项选择题	212
三、多项选择题	339
四、答案	374
第四章 计划生育技术	389
一、判断题	389
二、单项选择题	398
三、多项选择题	510
四、答案	539

第一章 妇女保健

一、判断题

1. 《中国妇女发展纲要(2011—2020)》提到,妇女儿童优先是国家的基本国策。()
2. 患者 55 岁,绝经 5 年,3 天前开始少量阴道出血,少于月经量。妇检:宫颈重度糜烂,颗粒状,宫体略小,活动。此时应首选的辅助检查方法是分段诊断性刮宫。()
3. 卵泡结构从外到内依次为卵泡外膜、卵泡内膜、卵泡腔、颗粒细胞、卵丘、放射冠、透明带。()
4. 女性,33 岁,因接触性出血就诊,查:宫颈中度糜烂,易出血,宫颈刮片有核异质,进一步检查最佳应为阴道镜检查。()
5. 县级母婴保健医学技术鉴定委员会成员应具有主治医师以上专业技术职务。()
6. 遗传方式遵循孟德尔法则,可以推算出子女发病风险的遗传性疾病是伴性遗传病。()
7. 月经周期内排卵前 8 小时雌激素出现峰式分泌。()
8. 出生缺陷人群监测期限为妊娠满 28 周至产后 7 天。()
9. 《中华人民共和国母婴保健法》由八届全国人大常委会第十次会议于 1994 年 10 月 27 日通过,自 1995 年 6 月 1 日起施行。()
10. 青春期以第二性征迅速发育为特点,多数女孩出现月经初潮。()
11. 婚前医学检查进行女性生殖器官检查时,应注意处女膜有无闭锁、筛状,并对处女膜是否破裂进行描述。()
12. 淋病奈瑟菌感染的扩散途径是沿生殖道黏膜上行蔓延。()
13. TBS 描述性诊断报告中 LSIL 表示高度鳞状上皮内病变。()
14. Manchester 手术适用于年龄较大、无需考虑生育功能的子宫脱垂患者。()
15. 雌激素使宫颈黏液分泌减少,性状变稠。()
16. 闭经时行卵巢功能检查,包括基础体温测定、阴道脱落细胞检查、宫颈黏液结晶检查及血甾体激素(雌激素、孕激素)测定。()
17. 低骨量及骨质疏松症是绝经后激素补充治疗的适应证。()
18. 严重的 X 连锁隐性遗传病女性携带者与正常男性婚配,应做产前诊断,判定胎儿性别,保留男胎,选择流产女胎。()
19. 青春期延迟指超过正常青春期开始平均年龄 1.5 个标准差以上尚无性成熟表现者,又称性延迟。()
20. 男女一方或双方患有性传播疾病如衣原体、淋病、梅毒、尖锐湿疣等时,最合适的避孕方法为复方短效口服避孕药。()
21. 目前急性宫颈炎最常见的病原体为淋病奈瑟菌和溶血性链球菌。()
22. 宫颈细胞学结果为 ASC-H、HSIL、AGC 者,即使阴道镜检查未发现异常,也必须取宫颈活检。()
23. 膀胱阴道瘘最常用而简单的辅助诊断方法是亚甲蓝试验。()
24. 当血清催乳素 $>1.14 \text{ nmol/L}$ ($25 \mu\text{g/L}$) 时,应行垂体 MRI 检查,明确是否存在垂体微腺瘤或腺瘤。()
25. 绝经后肾上腺雄激素和硫酸脱氢表雄酮明显上升,但肾上腺糖皮质激素与盐皮质激素在绝经前后不发生变化。()
26. 因多数 CIN I 可自然消退,不治自愈,故对 CIN I 目前不提倡治疗。()
27. 怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,所需时间计入年休假。()
28. 乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎主要传播途径为血液传播、母婴传播、性接触传播、粪-口途径。()
29. 妇女常见病筛查对象为 20~69 岁妇女,重点为 35~64 岁妇女。()
30. CIN 分为 3 级,反映了 CIN 发生的连续病理过程。()
31. WHO 规定,青春期的年龄范围从 10 岁开始到 17 岁末。()

32. 原发性痛经与生殖器官器质性病变有关。()
33. 既往有过妊娠史,而后无避孕未孕者,称为继发不孕。()
34. 盆底肌锻炼可用于轻、中度压力性尿失禁治疗和手术治疗前后的辅助治疗。()
35. 骨质疏松的发生与骨骼钙含量有关,男性骨质疏松发生较女性早且严重。()
36. 从事婚前医学检查的医疗、保健机构和人员,须经县级人民政府卫生行政部门许可。()
37. 假性性早熟指下丘脑—垂体—卵巢轴功能尚未发育和建立,仅部分激素过多所致。()
38. 男女双方或任何一方确诊为重型精神病,应建议暂缓结婚。()
39. 盆腔脓肿的首选治疗是手术治疗。()
40. 子宫内膜癌的病理分型主要为浆液性癌。()
41. 压力性尿失禁患者大多伴有阴道膨出。()
42. 多囊卵巢综合征时,血清睾酮和雄烯二酮水平降低。()
43. ICSI 技术可以用于 X-性连锁疾病的胚胎性别选择。()
44. 进入更年期后胰岛的功能下降,对葡萄糖的耐受量增强。()
45. 《中国妇女发展纲要(2011—2020 年)》中妇女常见病定期筛查率要求达到 80% 以上。提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率。()
46. 垂体微腺瘤引起的青春期中女性闭经,治疗首选的药物为达英-35。()
47. 细菌性阴道病的诊断标准之一是阴道分泌物 pH>4.5。()
48. 在维持阴道生态平衡方面,乳杆菌、雌激素及阴道 pH 起重要作用。()
49. 低危型 HPV 的持续性感染是导致 CINII、CINIII 和宫颈浸润癌的病因。()
50. 预防子宫脱垂的主要措施是推行科学接生和产后保健。()
51. 雌激素通过钙调激素如甲状旁腺素、降钙素等对骨代谢产生影响。()
52. 男性不育的因素有精液异常、性功能异常、免疫因素等。()
53. 绝经后期 HRT 中,对于已切除子宫的妇女,通常加用孕激素。()
54. 当事人对婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断鉴定意见有异议的,可以自接到鉴定意见通知书之日起 30 日内向上一级母婴保健医学鉴定委员会申请再鉴定。()
55. Turner 综合征是一种 X 染色体数目和结构异常的先天性疾病。()
56. 子宫颈炎有急性慢性两种。()
57. 子宫发育畸形包括双子宫、双角子宫、纵隔子宫、单角子宫和残角子宫。()
58. 原发性输卵管癌的治疗原则,以手术为主,辅以化疗、放疗的综合治疗。()
59. 固定宫颈的主要韧带是宫骶韧带。()
60. 垂体兴奋试验用于鉴别卵巢性与垂体性闭经。()
61. 雌激素水平下降使高密度脂蛋白上升。()
62. 绝经后妇女第二性征逐渐退化,乳房逐渐萎缩下垂。少数妇女声音变低沉或有多毛现象。()
63. 任何医疗保健机构均可根据群众需求提供婚前保健服务。()
64. 国家实行孕产妇和婴儿死亡及出生缺陷的监测、报告制度。()
65. 妇产科临床医生取得执业医师或执业助理医师资格即可从事助产技术服务。()
66. 母乳代用品产品包装标签应在显著位置标明母乳喂养的优越性。()
67. 初产妇产龄超过 35 周岁是进行产前诊断的条件之一。()
68. 我省实行住院分娩制度,但允许个体接生员为产妇进行消毒接生。()
69. 家属有要求时,医疗保健机构可以采用技术手段对胎儿进行性别鉴定。()
70. 医疗保健机构开展母婴保健技术服务只要具备相应的条件即可,不需要经过专门的许可。()
71. 产前诊断是指对胎儿进行先天性缺陷和遗传性疾病的诊断。()
72. 因妊娠各期的意外死亡和外省因病来江苏省就诊而死于江苏境内的孕产妇不列为孕产妇死亡监测的对象。()
73. 《计划生育技术服务管理条例》只有专门的计划生育服务机构才需执行。()
74. 孕妇自行提出进行产前诊断的,经治医师

认为不必要则不进行产前诊断。()

75. 从事新生儿疾病筛查工作的检验人员不需取得相应的《母婴保健技术考核合格证书》。()

76. 医疗保健机构不得向孕产妇和婴儿家庭宣传、推荐母乳代用品。()

77. 计算某地孕产妇死亡率时分母用的是当年本地区的产妇总数。()

78. 已取得《母婴保健技术考核合格证》的医务人员可以在任何医疗保健机构从事相关的母婴保健技术服务。()

79. 创建爱婴医院的唯一目的是支持和促进母乳喂养。()

80. 一般妇女生育期有 30 年以上。()

81. 血缘关系越近携带有相同等位基因的概率越高。()

82. 三级亲属的亲缘系数为 $1/16$, 包括表叔与侄子、侄女, 表舅与外甥、外甥女。()

83. 若夫妇双方之一的同胞中有常染色体显性遗传病患者, 而夫妇双方是正常的, 则子女患病危险率与一般人患病率相同, 可以生育。()

84. 正常人的智商是在 $110 \sim 85$ 之间。()

85. 染色体数目异常患者, 子代患病风险率高, 约为 $1/2$, 应做产前诊断。无条件做产前诊断者则不宜结婚。()

86. 先天性聋(哑)人不能与非遗传性后天性聋(哑)人(已明确诊断)或正常人结婚并生育。()

87. 精神分裂症患者处于发病期, 原则上待病情缓解多年后也不能结婚。()

88. 对于情感性精神障碍患者在躁狂发作或抑郁发作期应积极治疗, 建议不宜生育。()

89. 初次性交时单纯以是否出血作为判断处女唯一标志是不科学的。()

90. 经量增多及经期延长是子宫肌瘤最常见的症状。()

91. 男性生殖器检查时, 应重点检查影响婚育的生殖器发育异常以及肿块, 有无尿道下裂、包茎、隐睾等。()

92. 在婚前医学检查中发现有对婚育有影响的疾病, 原则上由主检医生负责提出医学建议, 不需转上级医疗机构会诊。()

93. 绝大多数即 85% 的婚前保健对象的结果为未发现影响婚育的疾病或异常情况。()

94. 一方或双方为重度、极重度智力低下, 不具有婚姻意识能力者禁止结婚。()

95. 对已知女方为血友病携带者, 若与正常男性婚配, 应在受孕后适时作产前诊断以判定胎儿性别, 控制生女而不生男。()

96. 婚前卫生咨询的基本步骤: 问候—询问—交谈—提供信息、讲述知识—帮助做出选择—讲解使用方法—预约随访。()

97. 定期评价婚前卫生指导是科学管理的重要标志。()

98. 细胞遗传学检查包括染色体检查和性染色体质检查, 是染色体病确诊的主要方法。()

99. 基因诊断是以 DNA 和 RNA 为诊断材料, 应用分子生物学技术, 检查基因的结构及其表达功能来诊断疾病的方法和过程。()

100. 先天愚型又称唐氏综合征, 临床上以明显智力低下和生长发育障碍、特殊面容及多发性畸形为特征, 它是最早被确定的单基因病。()

101. 唐氏综合征属于常染色体显性遗传病, 后代再发风险率高达 75%。()

102. 高度近视多数为常染色体隐性遗传, 在隐性遗传家系中, 如夫妻双方均为患者, 其子女发病率是 100%。()

103. 先天性唇腭裂是多因素遗传病, 遗传与环境有共同作用, 影响婚育。()

104. 艾滋病是一种传染性强、病死率高且不可治愈性的疾病。()

105. 婚前或孕期发现艾滋病感染者, 应尊重 HIV 病毒感染者或艾滋病病人对婚育的选择, 但要对其讲明该病的危害及对后代的影响。()

106. 当抑郁症患者治愈半年以上未发病, 可以生育, 但孕期应注意调整心态。()

107. 孕妇患尖锐湿疣, 由于受雌激素影响, 疣体可增大、增多, 甚至可发展为巨大型尖锐湿疣, 具有复发和恶性变性质。()

108. 处在肺结核活动期的男女青年不宜结婚, 应该早期、积极治疗。()

109. 潜伏梅毒未经正规治疗前应暂缓结婚。()

110. 出生时就有的疾病等于是遗传病。()

111. 遗传病不一定都有家族史, 有家族史的疾病一定都是遗传病。()

112. 先天性卵巢发育不全综合征又称 Turner 综合征, 是染色体异常引起卵巢发育不全的一种疾病, 为较常见的性染色体异常。()

113. 多基因遗传病的患者后代的患病风险远比单基因遗传病为低。()

114. X连锁隐性遗传病女性携带者与正常男性结婚,后代中女性都不发病,可以通过测胎儿性别进行选择,保留女胎。()
115. 妇女病普查率=期内(次)实查人数/期内(次)应查人数。()
116. 产前检查覆盖率=期内接受一次及以上产前检查的孕妇数/期内孕妇总数 $\times 100\%$ 。()
117. 妇女病患率=期内患病人数/期内受检查人数 $\times 100\%$ 。()
118. 妇女病治愈率=治愈例数/期内受检查人数 $\times 100\%$ 。()
119. 围生儿死亡率=(孕28足周以上死胎、死产数+生后7日内新生儿死亡数)/(孕28足周以上死胎、死产数+活产数) $\times 100\%$ 。()
120. 妇女保健的服务范围,从服务性质考虑,除身体保健外,还包括心理社会方面保健。()
121. 生育期保健应以加强三级预防为重点,提高对高危孕产妇的处理水平。()
122. 国际老年学会规定60岁以上为老年期。()
123. 母乳含丰富抗体、活性细胞和其他免疫活性物质,能增加婴儿抵抗力。()
124. 哺乳期是指产后产妇用自己乳汁喂养婴儿的时期,通常为10个月。()
125. 健全妇女防癌保健网,35岁以上妇女每5年普查一次。()
126. 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分称子宫狭部。()
127. 未产妇的子宫颈外口呈“一”字形。()
128. 黄体需经2~3周方能完成其退化全过程。()
129. 卵巢动脉自腹主动脉分出,右侧可来自右肾动脉。()
130. 孕激素有促进钠、水排泄的作用。()
131. 雌激素能促进骨中钙的沉积。()
132. 雄激素是合成孕激素的前体,且是维持女性正常生殖功能的重要激素。()
133. 按蜕膜与受精卵的部位关系,蜕膜分为底蜕膜、包蜕膜和真蜕膜3部分。()
134. 妊娠期间容易出现宫颈假性糜烂。()
135. 孕妇在妊娠后期出现踝部及小腿下半部轻度水肿,经休息后消退,属正常现象。()
136. 新生儿生理性黄疸在生后2~3日出现,5~6日达高峰,10~14日消退,不需处理。()
137. 妊娠晚期出现阴道流血的疾病有前置胎盘和胎盘早剥。()
138. 慢性宫颈炎的病理包括慢性子宫颈管黏膜炎、宫颈肥大、子宫颈息肉3种类型。()
139. 艾滋病的病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV)。()
140. 外阴上皮内瘤变可以逆转自然消失,也可发展为原位癌,再进展为浸润癌。()
141. 卵巢肿瘤蒂扭转的典型症状是突然一侧下腹剧痛,常伴恶心、呕吐甚至休克。()
142. 葡萄胎时切除子宫并不能防止恶变。()
143. 更年期无排卵性功血的治疗,在止血后以调整月经周期和减少经量为原则。()
144. 经前期紧张综合征多见于20~30岁妇女,症状出现在月经前5日,月经来潮后症状明显减轻至消失,主要症状有精神行为改变和水钠潴留症状。()
145. 分娩损伤和产褥早期体力劳动是发生子宫脱垂最主要的原因。()
146. 外阴局部白化病无自觉症状,也不癌变,无需治疗。()
147. 念珠菌阴道炎久治不愈需查尿糖及血糖,警惕有糖尿病。()
148. 发现外阴有尖锐湿疣病灶,应注意检查阴道和宫颈有无相同病灶。()
149. 骨盆出口平面后三角的尖端为骶尾关节,两侧为骶结节韧带。()
150. 根据输卵管的形态分为间质部、峡部、壶腹部及漏斗部。()
151. 子宫动脉、阴道动脉及阴部内动脉均为髂动脉前干的分支。()
152. 女性卵巢合成与分泌少量雄激素,肾上腺皮质分泌少量雌激素和孕激素。()
153. 由孕烯醇酮合成雄烯二酮,是经过 17α -羟孕酮转变而成的,是芳香化酶途径。()
154. 孕酮主要在身体外周其他组织灭活。()
155. 子宫内膜增殖期中期,约在月经周期的第8~10日。()
156. 卵泡雌激素和黄体生成激素直接控制卵巢的周期性变化。()
157. 母胎界面是由合体滋养细胞、绒毛间质、毛细血管基底膜和毛细血管内皮细胞4层组成的

薄膜。()

158. 母亲血液与胎儿血液并不直接相通,隔着绒毛毛细血管壁、绒毛间质和绒毛滋养细胞层。()

159. 绒毛膜促性腺激素有黄体生成激素相似的生物活性。()

160. 妊娠期间血液处于高凝状态,凝血因子Ⅺ、Ⅻ增加。()

161. 含胎儿血红蛋白的红细胞,对氧的亲合力较低。()

162. 位于肺动脉与主动脉弓之间的动脉导管生后闭锁成为动脉韧带。()

163. 阴道脱落细胞检查见舟状细胞极少,有外底层细胞出现,嗜酸性细胞指数 $>10\%$,致密核多,提示阴道鳞状上皮分化不成熟。()

164. 羊膜腔胎儿造影能诊断胎儿体表畸形和消化管畸形。()

165. 新生儿消化淀粉的能力较好,消化蛋白质的能力较差。()

166. 女婴生后5~7日出现少量阴道流血,持续7~10日自止。()

167. 早产儿易发生低血糖,且生理性体重下降幅度较大。()

168. 胎儿给药的方式之一是羊膜腔内注药。在分娩前24~48小时单次注入地塞米松10mg,可预防早产儿呼吸窘迫综合征。()

169. 发生在妊娠13周末之前的流产为早期流产,发生在14周至不足28周的流产为晚期流产。()

170. 妊娠剧吐伴高温 39°C 持续2日,应考虑终止妊娠。()

171. 妊娠已达36周者,确诊羊水过少,在除外胎儿畸形后,应选择终止妊娠。()

172. 胎儿在子宫内死亡后,多在2~3周自然娩出。若胎死宫内超过4周,发生DIC的机会明显增多。()

173. 妊娠肝内胆汁淤积症的主要临产表现是出现全身瘙痒,随后发生黄疸,产后迅速消退,再次妊娠复发。()

174. 新生儿头颅血肿的特点:在骨膜下,不超过骨缝,产后2~3日出现,历经3~8周才吸收消失,触之有波动感。()

175. 中期妊娠合并卵巢肿瘤,肿瘤容易发生蒂扭转。()

176. 葡萄胎分为完全性葡萄胎和部分性葡萄胎两类。()

177. 绒毛膜癌的转移部位,以肺转移最多,其他部位依次为阴道、脑、肝。()

178. 闭经时的辅助检查方法——子宫性闭经检查,包括诊断性刮宫、子宫输卵管碘油造影、子宫镜检查 and 药物撤退试验(孕激素试验和雌激素试验)。()

179. 闭经时的辅助检查方法——垂体功能检查,包括血FSH、LH、PRL放免测定,垂体兴奋试验,蝶鞍X线检查,染色体核型分析等。()

180. 更年期综合征是由于一系列性激素减少所致的症状,表现为月经紊乱、精神神经症状、泌尿生殖道改变、心血管系统变化以及骨质疏松。()

181. HELLP综合征孕妇乳酸脱氢酶升高最早出现。()

182. 胎儿巨大时,若肩径及胸径大于头径者,发生肩难产的概率较高。()

183. 患早期潜伏梅毒的孕妇对胎儿没有传染性。()

184. 胎儿染色体非整倍体异常多数没有超声可诊断的结构畸形。()

185. 复合先露在临床上以胎头与胎手最常见,不能阴道试产。()

186. 胎儿脑积水时,羊水甲胎蛋白呈高值。()

187. 妊娠期高血压疾病患者降压药物治疗后理想降压至收缩压130~140mmHg。()

188. 前不均倾位:当胎头以枕横位入盆,前顶骨先下降时,称前不均倾位。()

189. 妊娠期糖尿病:妊娠前糖代谢是正常的,妊娠期才出现或发现糖尿病称为妊娠期糖尿病。()

190. 孕产妇保健是指为孕妇、产妇提供卫生、营养、心理等方面的咨询和指导。()

191. 不完全性子官破裂:指子宫肌层全部破裂,但浆膜层完整,宫腔与腹腔不相通,胎儿及其附属物仍在宫腔内。腹部检查在子宫处有明显压痛。()

192. 初产妇见红多在分娩前48~72小时,同时常伴有宫缩。()

193. 没有定期孕期检查者,初诊时已在妊娠28周后,首次就诊就应进行75g OGTT或FPG检查。()

194. 产褥期抑郁症预后不良,再次妊娠易复发。()

195. 胎传梅毒:又称先天梅毒,可致流产、早

产、死胎或分娩先天梅毒儿。()

196. 妊娠 10 周末,胚胎初具人形。()

197. 胎儿发育指数=子宫高度(cm)-3×(月份+1)。()

198. 子痫治疗中硫酸镁血镁离子有效治疗浓度为 1.8~3.0 mmol/L,超过 3.0 mmol/L 即可出现中毒症状。()

199. 枕先露肛查胎头下降程度为“+2”,是指胎头颅骨最低点在坐骨结节平面下 2 cm。()

200. 初乳是指产后 14 天内分泌的乳汁。()

201. 妊娠期糖尿病对新生儿的影响,是容易发生新生儿高血糖。()

202. 臀位牵引术是指胎儿全部由接产者牵拉娩出,一旦胎足脱落后立即进行牵引。()

203. 骨盆内测量的操作测量时期宜在妊娠 30~37 周。()

204. 产后出血发生凝血功能障碍时,如有明显出血倾向或纤溶亢进时,应迅速应用肝素缓解病情。()

205. 妊娠期糖尿病的诊断筛查,首选的方法是 50 g OGTT。()

206. 过期妊娠的处理中,如无引产禁忌证,宫颈 Bishop 评分 ≥ 7 分者,可直接引产。()

207. 胎盘的屏障功能中,弓形虫、螺旋体不能通过胎盘屏障。()

208. 受精卵着床必须透明带消失有足够的孕酮,囊胚和子宫内膜发育同步,同时有细胞滋养层细胞。()

209. 卵巢雌激素的合成是由卵泡膜细胞与颗粒细胞在 FSH 与 LH 的共同作用下完成的。()

210. 坐骨棘和骶棘韧带宽度是判断骨盆出口平面是否狭窄的重要指示点。()

211. 胎儿的胎儿血红蛋白在妊娠最后 4~6 周逐渐下降,出生时仅占 25%。()

212. 早产临产判断的条件之一是宫颈扩张 2 cm 以上。()

213. 严重的胎儿生长受限是指胎儿的体重小于第 3 百分位,同时伴有多普勒血流的异常。()

214. 骨盆出口横径是指坐骨结节前端外侧缘之间的距离。()

215. HIV 感染的孕产妇如在产前、产时和产后正确应用抗病毒药物治疗,其新生儿 HIV 感染

率有可能显著下降。()

216. 停经 18 周,不觉胎动。产科检查:宫底高度在脐耻之间,胎方位及胎心不清。监测宫内胎儿情况首选的方法是多普勒超声检查。()

217. 初产妇,25 岁,妊娠 39 周,LOA、自然临产,胎膜未破,胎动后宫缩时胎心突然减慢,宫缩间期恢复。此时首选处理正确的是吸氧、抬高臀部、或改变体位。()

218. L/S ≤ 2 和 BPD > 8.0 cm 不是胎儿成熟指标。()

219. 胎儿超声心动图检查可以发现 99% 的先天性心脏病。()

220. 艾滋病患者 CD4 细胞计数 $< 200/\mu\text{L}$ 时易继发各种机会性感染。()

221. 某青年在婚前医学检查时发现患有淋病,医生出具暂缓结婚意见。()

222. 妇幼卫生调查表中的出生医学信息报告卡须经保密途径上报。()

223. 制定人口与计划生育实施方案的主要依据是人口发展规划。()

224. G_2P_1 ,孕 39 周,LSA。孕妇要求剖宫产,医生则建议结合产前检查结果选择分娩方式。()

225. 地中海贫血属于多基因遗传病。()

226. 为预防和早期发现产后出血,在胎儿娩出后,应正确估计出血量,及早使用缩宫素。()

227. 按照增补叶酸预防出生缺陷项目方案要求,对高危待孕妇女服用叶酸进行随访的间隔时间村医为每月随访 1 次。()

228. 婚前医学检查表保存年限一般不少于 20 年。()

229. 会阴裂伤分 3 度。()

230. 平均动脉压的计算公式是:MAP=(收缩压+舒张压)/2。()

231. 输卵管妊娠的典型临床表现是停经后腹痛和阴道出血。()

232. 凡不宜妊娠的心脏病孕妇,应该在妊娠 12 周前行人工流产终止妊娠。()

233. 绒毛穿刺产前诊断取材的时机是妊娠 16~22 周。()

234. 孕期神经管畸形的筛查,绝大部分患者的血清和羊水水中的 AFP 水平升高。()

235. 新生儿出生时,羊水胎粪污染,婴儿有活力时,应该行气管插管清理气道。()

236. 孕产妇死亡率定义为从妊娠开始到产后

42天内,因各种原因(除意外事故外)造成的孕产妇死亡,每十万例活产中孕产妇的死亡数。()

237. 宫内感染为 HIV 垂直传播的主要方式,无论剖宫产还是经阴道分娩的新生儿,受 HIV 感染的风险一样高。()

238. 产前筛查试验不是确诊试验,筛查阳性结果意味着患病风险增高,需要进一步进行确诊实验,筛查阴性结果意味着患病风险低。()

239. 软产道损伤分为 4 度,撕裂伤向下扩展,肛门外括约肌已撕裂为Ⅱ度。()

240. 产褥期感染的外源性感染的主要致病菌是需氧链球菌。()

241. 臀先露是最常见的异常胎位,多见于初产妇。()

242. 双子宫、双宫颈可以阴道试产。()

243. 臀位胎儿脐部娩出后,一般应在 2~3 分钟娩出胎头,最长不能超过 8 分钟。()

244. 四部触诊在 20 周后可区分胎头、胎背、胎臀和胎儿肢体。()

245. 经产妇,产后 2 小时,其常规观察内容包括血压、体温、脉搏、宫缩和阴道出血。()

246. 氯霉素属于 C 类药,可导致灰婴综合征,妊娠期妇女应避免应用。()

247. 产后出血率=年内产后出血人数/年内产妇总数×100%。()

248. 胎儿体内无纯动脉血,而是动静脉混合血。()

249. 约 60%的早孕妇女在停经 4 周左右出现早孕反应。()

250. 孕妇于妊娠早期初诊时,应行双合诊检查。

()

251. 产程的积极处理是为了降低剖宫产率。()

252. 初产妇临产后 4 小时胎头仍未入盆,此时应测量对角径。()

253. 轻度头盆不称可给予试产机会。()

254. 着床前期用药对胚胎影响不大,在囊胚着床后至妊娠 12 周,不宜使用 C、D、X 级药物。()

255. 孕妇膳食中硒缺乏,会引起胎儿原发性心肌炎和孕妇围产期心肌炎。()

256. 产后雌孕激素水平急剧下降,至产后 2 周时降至未孕水平。()

257. 自然流产应与异位妊娠、葡萄胎、功能性子宫出血及子宫肌瘤鉴别。()

258. 在前置胎盘的诊断中,胎盘下缘与宫颈口的关系,可因宫颈管消失、宫口扩张而改变,通常按处理前最后一次检查来决定其分类。()

259. 胎儿生长受限是多胎妊娠时胎儿最常见的并发症。()

260. 新生儿复苏时胃管应插入 22 mm。()

261. 新生儿有活力的定义是 Apgar 10 分。()

262. 肩先露时最容易发生肩难产。()

263. 30%孕妇阴道分泌物中可培养出假丝酵母菌,如临床症状明显,应给予治疗。()

264. 产后抑郁症多于产后 1 周发病,产后 4~6 周症状明显。()

二、单项选择题

1. 原《卫生部贯彻 2011—2020 年中国妇女儿童发展纲要实施方案》基本原则不包括哪个()

A. 坚持以人为本,以维护妇女儿童健康权益为目的,以需求为导向,为妇女儿童提供规范的医疗保健服务

B. 坚持儿童优先、母亲安全的宗旨

C. 坚持以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合、面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针

D. 坚持统筹协调,分类指导,努力缩小城乡之间、地区之间、人群之间的妇女儿童健康差距,促进妇幼卫生事业与经济社会协调发展

E. 坚持中西医并重,充分发挥中医药(民族医药)在妇女儿童医疗保健服务中的作用

2. 《农村妇女“两癌”检查项目管理方案》中要求宫颈癌检查的流程哪项是错误()

A. 乡镇卫生院或社区卫生服务机构(或指定的初检医疗机构)负责对受检妇女进行妇科盆腔检查、阴道/宫颈分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查和宫颈脱落细胞检查的取材、涂片、固定(或宫颈醋酸染色检查/复方碘染色检查),并填写相关个案登记表

B. 县级及以上医疗卫生机构负责进行宫颈脱落细胞巴氏检查涂片染色及 TBS 描述性报告,并

填写宫颈细胞学检查表格

C. 乡级及以上医疗卫生机构负责对宫颈细胞学检查及宫颈醋酸染色检查/复方碘染色检查结果为可疑或异常的妇女提供阴道镜检查

D. 乡镇卫生院或社区卫生服务机构(或指定的初检医疗机构)负责对可疑或确诊患者进行随访,并将随访结果记录在个案登记表内

E. 阴道镜有异常需行病理组织学检查

3. 遗传咨询的主要步骤不包括哪些 ()

A. 明确诊断

B. 确定遗传方式

C. 近亲结婚对遗传性疾病的影响

D. 对于产前不能够作出准确诊断或植入前诊断的遗传病,可在获取确诊报告后对健康胎儿作选择性生育

E. 提出医学建议

4. 婚前保健服务机构基本标准中房屋具体要求错误的是 ()

A. 不需分别设置专用的男、女婚前医学检查室

B. 设置专用综合检查室(有条件的地区)

C. 婚前卫生宣传教育室

D. 婚前卫生咨询室

E. 检验室及其他相关辅助科室(可与医院其他科室共用)

5. 《女职工劳动保护特别规定》的女职工保护内容不包括有哪些 ()

A. 用人单位应当加强女职工劳动保护,采取措施改善女职工劳动安全卫生条件,对女职工进行劳动安全卫生知识培训

B. 用人单位应当遵守女职工禁忌从事的劳动范围的规定。用人单位应当将本单位属于女职工禁忌从事的劳动范围的岗位书面告知女职工

C. 用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同

D. 女职工在孕期不能适应原劳动的,用人单位应当根据医疗机构的证明,予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动

E. 女职工生育享受 100 天产假,其中产前可以休假 15 天;难产的,增加产假 15 天;生育多胞胎的,每多生育 1 个婴儿,增加产假 15 天

6. 女职工,30 岁,月经来潮第二天,按照《女职工劳动保护特别规定》,该女职工可以从事的劳动范围有哪些 ()

A. 冷水作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级冷水作业

B. 低温作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级低温作业

C. 体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业

D. 体力劳动强度分级标准中规定的第一级、第二级体力劳动强度的作业

E. 高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业

7. 《女职工劳动保护特别规定》的监管部门不包括哪个部门 ()

A. 县级以上人民政府人力资源社会保障行政部门负责对用人单位遵守本规定的情况进行监督检查

B. 安全生产监督管理部门按照各自职责负责对用人单位遵守本规定的情况进行监督检查

C. 工会组织依法对用人单位遵守本规定的情况进行监督

D. 县、乡级妇幼保健机构依法对用人单位遵守本规定的情况进行监督

E. 妇女组织依法对用人单位遵守本规定的情况进行监督

8. 《农村妇女“两癌”检查项目管理方案》中要求乳腺癌检查流程错误的是哪一项 ()

A. 乡镇卫生院或社区卫生服务机构负责对妇女进行初筛。由专业人员对受检对象进行登记建档并填写相关个案登记表,同时进行乳腺癌健康宣教及高危人群评估

B. 乡镇卫生院或社区卫生服务机构负责对高危人群及手诊结果可疑或异常者进行彩超检查

C. 指定的县级及以上医疗卫生机构负责对超声检查结果为可疑或异常的妇女提供乳腺钼靶 X 线检查

D. 乡镇卫生院或社区卫生服务机构负责对可疑或确诊患者的检查、诊断和治疗情况进行随访,并将随访结果记录在个案登记表内

E. 指定的县级及以上医疗卫生机构负责对可疑或确诊患者的检查、诊断和治疗情况进行随访,并将随访结果记录在个案登记表内

9. 隐私保密的义务并不是绝对的,在有下列情况之一时,公开隐私既合理又合法,但除外 ()

A. 患者有可能实施危害他人或者危害社会的行为时

B. 患者有可能实施危害自身的行为时

C. 司法部门取证时

D. 患者对其疾病无自知力时

E. 高度责任性工作的患者因精神症状影响而对事物的判断和控制能力明显受损时

10. 《中华人民共和国母婴保健法》一共有多少章、多少条 ()

- A. 一共有七章、三十九条
- B. 一共有八章、四十五条
- C. 一共有七章、四十五条
- D. 一共有八章、三十九条
- E. 一共有八章、三十五条

11. 母婴保健法及实施办法所称的医疗、保健机构,是指依照以下哪项取得卫生行政部门医疗机构执业许可的各级各类医疗机构 ()

- A. 《中华人民共和国执业医师法》
- B. 《医疗机构管理条例》
- C. 《医院工作条例》
- D. 《医疗机构管理办法》
- E. 《全国医院管理办法》

12. 《中华人民共和国母婴保健法》的立法依据是什么 ()

- A. 《民法通则》
- B. 《行政法》
- C. 《宪法》
- D. 《刑法》
- E. 《中国共产党章程》

13. 母婴保健医学技术鉴定组织的组成人员,由卫生行政部门提名,哪一级人民政府聘任 ()

- A. 县级
- B. 市级
- C. 省级
- D. 国家卫生和计生委
- E. 同级

14. 关于住院分娩说法错误的是 ()

- A. 国家提倡住院分娩
- B. 没有条件住院分娩的,应当由经县级地方人民政府卫生行政部门许可并取得家庭接生员技术证书的人员接生

C. 医疗、保健机构应当按照国务院卫生行政部门制定的技术操作规范,实施消毒接生和新生儿复苏,预防产伤及产后出血等产科并发症,降低孕产妇及围产儿发病率、死亡率

D. 高危孕妇应当在医疗、保健机构住院分娩

E. 对于经济困难的农村孕产妇,提倡家庭接生,国家给予补助

15. 某青年在筹备结婚过程中,因多日劳累,患化脓性扁桃体炎。医生在为其诊察中同时发现患有淋病。患者住院四天,扁桃体炎痊愈出院,医生嘱其充分休息。按照母婴保健法,若该青年进行婚前医学检查,医生应当出具以下哪项意见 ()

- A. 不能结婚
- B. 应当暂缓结婚

C. 可以结婚,但不能生育

D. 可以结婚,治愈后可生育

E. 建议采取医学措施,尊重受检者意愿

16. 下列属于《母婴保健法》规定可以申请医学技术鉴定的是 ()

- A. 对孕妇、产妇保健服务有异议的
- B. 对婚前医学检查结果有异议的
- C. 对婚前卫生咨询有异议的
- D. 对孕产期保健服务有异议的
- E. 对医学指导意见有异议的

17. 从事婚前保健服务机构应是 ()

- A. 设区的市级以上医疗、保健机构
- B. 县级以上医疗、保健机构
- C. 省级以上医疗、保健机构
- D. 乡级以上医疗、保健机构
- E. 以上均可

18. 根据《中国妇女发展纲要》(2011—2020年),至2020年,孕产妇系统管理率达到下列哪项以上 ()

- A. 70%
- B. 80%
- C. 85%
- D. 90%
- E. 95%

19. 《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)——孕产妇健康管理服务规范》规定,乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心(站)在收到分娩医院转来的产妇分娩信息后,应于几天内到产妇家中进行产后访视,进行产褥期健康管理,加强母乳喂养和新生儿护理指导,同时进行新生儿访视 ()

- A. 1~3天
- B. 1~7天
- C. 3~7天
- D. 3~10天
- E. 30天

20. 制定人口与计划生育实施方案的主要依据是 ()

- A. 国民经济和社会发展规划
- B. 人口发展规划
- C. 计划生育管理条例
- D. 计划生育技术服务管理条例
- E. 人口与计划生育事业发展规划

21. 《母婴保健技术服务执业许可证》有效期为几年 ()

- A. 三年
- B. 五年
- C. 十年
- D. 十五年
- E. 与医疗机构执业许可证年限一样

22. 孕产期保健是指各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后多少天的妇女及胎婴儿提供全