

《最佳畅销书》



2015国家执业药师考试全真模拟试卷（全解析版）

药学综合知识与技能

本书编委会 编写

中国医药科技出版社

金牌药师

国家执业药师考试全真模拟试题卷

药学综合知识与技能

(全解析版)

本书编委会 编写



药师在线 2015优惠券 ¥20元

51YAOSHI.COM

国家执业药师资格考试



扫一扫, 学习免费公开课

1. 本优惠券仅供购买“药师在线”线上产品使用, 100元以内可以使用一张, 101-200元可以使用两张, 201-300元可以使用三张, 以此类推
2. 有效期为2015年1月1日至2015年12月31日
3. 具体使用方法, 请登录www.51yaoshi.com
4. 中国医药科技出版社有最终解释权

因为专注

所以卓越

卡号: 2015Y4816656

密码:

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

药学综合知识与技能/《药学综合知识与技能》编委会编写. —北京: 中国医药科技出版社, 2015. 8

(国家执业药师考试全真模拟试卷: 全解析版)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7718 - 6

I. ①药… II. ①药… III. ①药理学 - 药剂师 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R9 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 160559 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 8¹/₄

字数 145 千字

版次 2015 年 8 月第 1 版

印次 2015 年 8 月第 1 次印刷

印刷 北京九天众诚印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7718 - 6

定价 50.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换



出版说明

2015 年,国家执业药师资格考试大纲发生了重大变化,从考试内容、重点要求到考题类型等多方面,都更加突出知识与技能的实用性,注重理论与实践的结合,充分体现“以用定考、以用为先、以人为本、以业为重”的主导思想,保证执业药师在未来的医疗健康领域承担重要角色,从而满足公众对健康水平、医疗保健的需求,保障药学服务质量。这样的变化对提升执业药师价值、引领执业药师队伍健康发展具有重大意义。

“金牌药师·国家执业药师考试全真模拟试卷(全解析版)”系列图书由长期从事国家执业药师资格考试命题研究的专家、学者紧紧围绕 2015 年最新考试大纲及考试指南精心编撰而成。本系列图书包含五套模拟试卷,随附参考答案,并在题后附全解析,供考生参考。本系列图书具有很好的针对性及备考实用性,是参加 2015 年国家执业药师资格考试考生的必备用书。

本系列图书突出特色在于:

1. 所有试卷依据新考纲中内容比重和题型、题量的新变化,科学地组编试卷,使考生身临其境感受考试氛围。
2. 题题解析全覆盖,方便快捷为你答疑解惑。
3. 参考答案及试题解析附在每套试卷之后,体例编排清晰,方便查找与阅读。

本系列图书包括 7 个科目:

《药事管理与法规》

《药专业知识(一)》

《药专业知识(二)》

《药综合知识与技能》

《中药专业知识(一)》

《中药专业知识(二)》

《中药综合知识与技能》

本系列图书适合参加 2015 年国家执业药师资格考试的考生使用。在复习备考过程中,如果您有任何意见和建议,欢迎与我们联系,我们的邮箱是 yykj401@163.com。

在此,预祝各位考生通过自己的辛勤努力,马到功成,一举通关!

中国医药科技出版社
2015 年 7 月

目 录

模拟试卷一	1
参考答案	13
试卷全解	14
模拟试卷二	25
参考答案	38
试卷全解	39
模拟试卷三	50
参考答案	63
试卷全解	64
模拟试卷四	74
参考答案	87
试卷全解	88
模拟试卷五	102
参考答案	115
试卷全解	116

模拟试卷一

一、A 型题（最佳选择题）：题干在前，选项在后。每道题的备选项为五个。每道题的备选项中，只有一个最佳答案。

1. 随着人均寿命的提高和人民生活水平的提高，对待疾病的观念也逐渐从治疗转变为预防，通过服用营养保健品来预防疾病的人群日益增加，下列相关说法错误的是

- A. 遗传因素对健康长寿起到了决定性作用
- B. 应有针对性地挑选合适的补充剂才能发挥营养素的最佳效果
- C. 合理饮食是获取营养素最简单有效的途径
- D. 复合维生素一般适合于饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童
- E. 膳食营养剂会对健康有一定的益处，但要适度，要根据自己的身体状态选择适量补充

2. 下列有关药品质量缺陷问题及分析与处理错误的是

- A. 药品质量问题不涉及引起药品不良反应及药物过量的问题
- B. 质量控制小组人员应详细记录药品的名称、规格、批号、生产日期、有效期、外观形状等相关信息，对疑似质量问题的同批同种药品就地封存
- C. 质量控制小组应及时向科主任汇报，联系有关部门，查找供货厂商，要求

提供相关材料并对出现的问题作出解释

- D. 对确认有质量问题的药品，应及时通知相关部门或服务对象，将药品召回或者调换
- E. 药品在医院内流通的过程是：采购—入库—验收—出库—调配—使用

3. 药师在接受护士咨询时，应重点关注的內容是

- A. 药品经济学知识
- B. 药物制剂的等效性
- C. 药品的生产厂商和批号
- D. 注射剂的配制和滴注速度等
- E. 药品在人体内的药动学参数

4. 某患者输注万古霉素 0.5g 溶解至 100ml 生理盐水中，已知每毫升相当滴数为 15 滴，要求滴注时间不少于 1h，每分钟滴数最多为多少

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30
- E. 35

5. 有些药物不宜用热水送服，而有些则适宜。下列可以用热水送服的药物是

- A. 助消化药
- B. 氨茶碱
- C. 脊髓灰质炎糖丸
- D. 维生素 B₁
- E. 整肠生

6. 下列有关特殊剂型药物服药注意事项说法错误的是

- A. 胶囊剂宜用温开水送服
 - B. 包衣片不宜在口中久含
 - C. 泡腾片宜溶解于温开水中后服用
 - D. 粉剂应该溶解在水中服用
 - E. 糖浆剂宜立刻饮水送服至体内
7. 服用时应多饮水, 同时应碱化尿液以防止尿酸结石形成的药物是
- A. 阿仑膦酸钠
 - B. 氯苄西林
 - C. 氨茶碱
 - D. 苯溴马隆
 - E. 苯海拉明
8. 预配制治疗用 10% 的葡萄糖注射剂 1000ml, 现在有 50% 浓度和 5% 浓度的葡萄糖注射液, 应如何配制
- A. 用 50% 浓度的葡萄糖 121ml, 5% 浓度的葡萄糖 879ml
 - B. 用 50% 浓度的葡萄糖 122ml, 5% 浓度的葡萄糖 878ml
 - C. 用 50% 浓度的葡萄糖 131ml, 5% 浓度的葡萄糖 869ml
 - D. 用 50% 浓度的葡萄糖 132ml, 5% 浓度的葡萄糖 868ml
 - E. 用 50% 浓度的葡萄糖 111ml, 5% 浓度的葡萄糖 889ml
9. 以下所列审查处方结果中, 可判定为“不规范处方”的是
- A. 重复给药
 - B. 有配伍禁忌
 - C. 未使用药品规范名称
 - D. 用法、用量或联合用药不适宜
 - E. 无正当理由不首选国家基本药物
10. 以下是处方中常见的外文缩写, 其含义是“每晚”的是
- A. qd.
 - B. qh
 - C. qn.
 - D. qs.
 - E. po.
11. 尿酸碱度增高, 下列因素不正确的是
- A. 代谢性或呼吸性碱中毒
 - B. 感染性膀胱炎, 长期呕吐
 - C. 草酸盐和磷酸盐结石症
 - D. 应用酸性药物, 例如维生素 C 等
 - E. 应用碱性药物, 例如碳酸氢钠、乳酸钠等
12. 下列药物中, 最可能导致血清碱性磷酸酶 (ALP) 升高的药物是
- A. 异丙嗪
 - B. 阿莫西林
 - C. 苯妥英钠
 - D. 苯巴比妥
 - E. HMG - CoA 还原酶抑制剂
13. 帮助消化的处方药是
- A. 维生素 B₆
 - B. 莫沙必利
 - C. 干酵母 (酵母片)
 - D. 口服双歧三联杆菌胶囊
 - E. 胃蛋白酶
14. 以下对正常人不同部位温度的比较, 正确的是
- A. 直肠 > 腋窝 > 口腔
 - B. 口腔 > 直肠 > 腋窝
 - C. 直肠 > 口腔 > 腋窝
 - D. 腋窝 > 直肠 > 口腔
 - E. 腋窝 > 口腔 > 直肠
15. 《国家非处方药目录》收录的中枢性镇咳药是
- A. 可待因
 - B. 苯丙哌林
 - C. 喷托维林
 - D. 羧甲司坦
 - E. 氨溴索

16. 下列是属于器质性便秘原因的是
- 不良的生活习惯
 - 缺乏锻炼
 - 结肠运动功能紊乱
 - 药物不良反应
 - 饮水不足及肠蠕动过缓
17. 抗感冒药常用的组方中不包括
- 解热镇痛药
 - 中枢兴奋药
 - 抗过敏药
 - 抗菌药物
 - 鼻黏膜血管收缩药
18. 下列对轻度沙眼疗效最好的药物是
- 硫酸锌
 - 红霉素
 - 酞丁安
 - 磺胺醋酰钠
 - 复方磺胺甲噁唑
19. “助消化药不宜与抗菌药物、吸附剂同时服用”；如必须联用，应间隔的时间是
- 1 小时
 - 1.5 小时
 - 2 小时
 - 1~3 小时
 - 2~3 小时
20. 以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皲裂型足癣的处方药是
- 尿素
 - 苯甲酸
 - 特比萘芬
 - 依沙吖啶
 - 十一烯酸
21. 以下“缓泻药使用注意事项”的叙述中，不正确的是
- 妊娠期妇女慎用
 - 一般可在早晨给药
 - 儿童不宜应用缓泻药，因可造成依赖性便秘
 - 伴有阑尾炎、肠梗阻、不明原因的腹痛、腹胀者禁用
 - 尽量少用或不用缓泻药，找准病因进行针对性治疗或改变饮食习惯等
22. 利尿降压药的常见不良反应是
- 水、电解质紊乱
 - 首剂现象
 - 咳嗽
 - 体位性低血压
 - 支气管痉挛
23. 下列药物中适合治疗各类抑郁症的药物是
- 阿米替林
 - 米氮平
 - 曲唑酮
 - 氟伏沙明
 - 多塞平
24. 下列关于抗甲状腺功能亢进症药物的合理应用和药学监护不正确的是
- 妊娠期妇女宜采用最小剂量的抗甲状腺药物
 - 应用丙硫氧嘧啶一旦出现发热、粒细胞缺乏等应立即停药
 - 用药期间出现血清促甲状腺素 (TSH) 水平增高为正常反应
 - 减药阶段应定期随访基础心率、白细胞及 T_4 等
 - 减药阶段不宜太快，一般需 2~3 个月
25. 抑制前列腺双氢睾酮而用于前列腺增生症治疗的药物是
- 特拉唑嗪
 - 非那雄胺
 - 黄酮哌酯
 - 前列康

- E. 氟他胺
26. 结核病的感染途径主要为
- A. 呼吸道感染
B. 消化道感染
C. 皮肤途径
D. 泌尿生殖感染
E. 血液途径
27. 根据慢性阻塞性肺病的分级, 其治疗方案也进行了分级从 0 ~ IV 共 5 级, 治疗方案中加用 1 种或者多种长效支气管舒张剂, 加用康复治疗是几级治疗方案
- A. 0 B. I
C. II D. III
E. IV
28. WHO 推荐 12 岁以下儿童日摄入碘的安全范围是
- A. 50 ~ 120 μg B. 50 ~ 100 μg
C. 50 ~ 80 μg D. 40 ~ 60 μg
E. 20 ~ 40 μg
29. 治疗高血压的主要目的是最大限度地
- A. 降低并发肾病的危险
B. 降低并发糖尿病的危险
C. 降低心血管发病和死亡的总危险
D. 降低视网膜病变和死亡的总危险
E. 降低静脉发生病变和死亡的总危险
30. 以下药物中, 归属非促胰岛素分泌剂的降糖药是
- A. 西格列汀 B. 瑞格列奈
C. 格列齐特 D. 那格列奈
E. 甲苯磺丁脲
31. 以下列出的“WHO 公布的有关艾滋病传染途径”中, 不正确的是
- A. 吸毒 B. 性行为
C. 蚊虫叮咬 D. 母婴传播
E. 应用血液与血液制品
32. 适于小儿使用的抗菌药是
- A. 青霉素 B. 链霉素
C. 氯霉素 D. 新霉素
E. 四环素
33. 对于肝功能不全患者可使用正常剂量的药物是
- A. 青霉素 B. 氯霉素
C. 苯巴比妥 D. 洋地黄毒苷
E. 苯妥英钠
34. 关于治疗药物监测的论述错误的是
- A. 治疗药物监测的常用英文缩写是 TDM
B. 是临床药学服务的重要内容之一
C. 治疗药物监测可以实现给药个体化
D. 所有的治疗药物都必须进行监测
E. 可以了解血药浓度
35. 类风湿性关节炎治疗目标除了控制症状, 更为关键的是应用改善病情的药物, 延缓病情发展, 避免致残。下列属于改善病情的抗风湿药是
- A. 抗疟药 B. 对乙酰氨基酚
C. 阿达木单抗 D. 泼尼松
E. 雷公藤
36. 下列有关抗肿瘤药物不良反应及处理的说法, 错误的是
- A. 蒽环类抗生素引起的心脏毒性可以采用维生素、辅酶 Q 进行预防
B. 出现过敏反应需停药、抗过敏, 观察即可
C. 通常 I ~ II 度白细胞抑制不需做处理, 多可自然恢复且不影响下个疗

程的化疗

- D. 呕吐、恶心是最常见的化疗反应之一，通常晚上呕吐较白天轻
- E. 容易引起腹泻的药物有 5-氟尿嘧啶，伊立替康
37. 下列属于继发于神经系统疾病的尿失禁是
- A. 真性尿失禁
- B. 暂时性尿失禁
- C. 急迫性尿失禁
- D. 充盈性尿失禁
- E. 压力型尿失禁
38. 下列有关焦虑症的叙述错误的是
- A. 焦虑症有家族聚集性，女性焦虑症的患病率较高
- B. 大多数焦虑症起源于儿童或者青春期
- C. 社交焦虑障碍严重者可表现为回避社交，导致社交隔离
- D. 惊恐发作是焦虑症最常见的表现形式
- E. 焦虑症患者除药物治疗外，还可选择心理治疗或者电痉挛治疗
39. 冠状动脉综合征心肌治疗相关说法错误的是
- A. 再灌注心肌治疗应在起病 3~6h 内进行，最多 12h 内
- B. 溶血栓治疗药新型的选择性纤溶酶原激活剂替奈普酶仅作用于血栓部位
- C. 近期有活动性内脏出血如消化道溃疡不适宜应用溶血栓药物
- D. 介入治疗失败或者溶血栓治疗无效有手术指征者，宜争取在 6~8h 内

施行急性冠状动脉旁路搭桥手术

- E. 对未溶栓治疗的患者，应用肝素，临床需要实验室监测
40. 下列治疗老年痴呆药物可通过酸化尿液显著增加其排泄的是
- A. 碳酸氢钠
- B. 美金刚
- C. 多奈哌齐
- D. 加兰他敏
- E. 帕罗西汀

二、B 型题（配伍选择题）：一组试题（2~4 题）共用一组备选项。备选项在前，题干在后。每组备选项为五个。备选项可重复选用，也可不选用，每道题只有一个最佳答案。

（41~44 题共用备选答案）

- A. 丙硫氧嘧啶 B. 维生素 A
- C. 氯霉素 D. 维生素 D
- E. 苯巴比妥

41. 妊娠后期孕妇使用剂量过大时，可导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是
42. 摄入过量导致新生儿血钙过高、智力障碍，肾或肺小动脉狭窄及高血压的药物是
43. 分娩前应用可引起新生儿循环障碍和灰婴综合征的药物是
44. 影响胎儿甲状腺功能，导致死胎的药物是

（45~48 题共用备选答案）

- A. 右美沙芬 B. 氨溴索
- C. 苯丙哌林 D. 喷托维林
- E. 可待因

45. 呼吸道有大量痰液者宜选用
46. 咳嗽较弱者宜选用

47. 用于剧咳的非处方药宜首选
48. 夜间咳嗽宜选用

(49~52 题共用备选答案)

- A. 《实用药理学辞典》
B. 《药品红外光谱集》
C. 《药品监督管理手册》
D. 《中国药物大辞典》
E. 《新编药理学》

关于药理学文献

49. 药典委员会组织编订, 配合药典同时发行的是
50. 我国第一部药理学科学辞书是
51. 介绍中成药、化学药品, 还附有全国医药企业名录的是
52. 介绍药品名称、性状、药理及应用、用法、用量的是

(53~56 题共用备选答案)

- A. 托烷司琼注射剂
B. 头孢拉定片
C. 重组人促红素
D. 双歧三联活菌胶囊
E. 双歧三联活菌制剂
53. 应贮存在阴凉处的是
54. 应贮存在凉暗处的是
55. 应贮存在冷处的是
56. 应不宜冷冻的是

(57~60 题共用备选答案)

- A. 10~20 $\mu\text{g/ml}$ B. 4~12 $\mu\text{g/ml}$
C. 30~60 $\mu\text{g/ml}$ D. 5~150 $\mu\text{g/ml}$
E. 10~40 $\mu\text{g/ml}$
57. 可能呈现有效抗癫痫作用的苯妥英钠治疗的血浆浓度是
58. 可能呈现有效抗癫痫作用的丙戊酸钠治疗的血浆浓度是

59. 可能呈现有效抗癫痫作用的卡马西平治疗的血浆浓度是
60. 可能呈现有效抗癫痫作用的苯巴比妥治疗的血浆浓度是

(61~63 题共用备选答案)

- A. 哌替啶 B. 右美沙芬
C. 东莨菪碱 D. 吲达帕胺
E. 奥美拉唑
61. 可使驾驶员视物不清的药物是
62. 可使驾驶员出现定向力障碍的药物是
63. 可使驾驶员多尿或多汗的药物是

(64~67 题共用备选答案)

(使用抗消化性溃疡药物的注意事项)

- A. 铋剂 B. 抗酸药
C. 硫糖铝 D. 丙谷胺
E. 质子泵抑制剂
64. 因长期应用而导致腹泻或便秘的药物是
65. 禁用于孕妇、哺乳妇女及儿童的药物是
66. 长期应用影响钙吸收, 并可增加感染风险的药物是
67. 可影响食物中铁、钙、磷吸收的药物是

(68~71 题共用备选答案)

- A. 沙丁胺醇 B. 茶碱
C. 异丙托溴铵 D. 扎鲁司特
E. 色甘酸钠

为下列各类抗慢性阻塞性肺病药物选择合适的代表药

68. 白三烯受体阻断剂
69. 磷酸二酯酶抑制剂
70. 过敏介质阻释剂
71. 胆碱能受体阻断剂

(72~75 题共用备选答案)

- A. 阿卡波糖 B. 二甲双胍

C. 罗格列酮 D. 格列喹酮

E. 胰岛素

72. 老年糖尿病患者宜选用

73. 2 型儿童糖尿病患者宜选用

74. 糖尿病合并肾病宜首选

75. 1 型糖尿病患者的胰岛素分泌不足可选用

(76~78 题共用备选答案)

A. 单纯孕激素补充治疗

B. 单纯雌激素补充治疗

C. 雌孕激素间隔用药

D. 雌孕激素连续联合用药

E. 雌孕激素序贯用药

MHT 具体治疗方案

76. 已切除子宫的妇女宜选用

77. 有完整子宫、围绝经期或绝经后期仍希望有月经样出血的妇女宜选用

78. 有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女宜选用

(79~80 题共用备选答案)

A. 山莨菪碱片

B. 泛昔洛韦

C. 左氧氟沙星

D. 匹维溴铵

E. 乳酶生

79. 感染性腹泻应服用

80. 激惹性腹泻可选用

三、C 型题 (综合分析选择题): 包括一个试题背景信息和一组试题 (2~5 题)。这一组试题是基于一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开, 每道题都有其独立的备选项。题干在前, 备选项在后。每一组备选项为五个。每道题的备选项中, 只有一

个最佳答案。

(81~84 题共用题干)

患者, 女, 38 岁, 主诉: 咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日; 查体: 神清、气稍促, 心率 95 次/分, 律齐, 体温 39.1℃, 血压 110/70mmHg; 心肺听诊: 两肺呼吸音粗, 未及明显啰音; 发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断: 急性上呼吸道感染。

81. 发热的治疗药物不包括下列

A. 对乙酰氨基酚 B. 阿司匹林

C. 布洛芬 D. 贝诺酯

E. 伪麻那敏

82. 治疗咳嗽用药注意事项, 叙述不正确的是

A. 对于干性咳嗽可单用镇咳药; 对痰液较多者应以祛痰为主, 镇咳药合用祛痰剂, 以利于痰液排出和加强镇咳效果

B. 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药, 缓解支气管痉挛, 并辅助镇咳和祛痰

C. 镇咳药连续口服 1 周, 症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素

D. 右美沙芬可引起嗜睡, 驾车、高空作业或操作机器者宜慎用; 妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用

E. 青光眼、肺部淤血、心功能不全者及妊娠与哺乳期妇女应慎用喷托维林

83. 治疗咳嗽药物中, 夜间咳嗽者宜选用的是

A. 可待因 B. 氨溴索

- C. 苯丙哌林 D. 右美沙芬
E. 羧甲司坦

84. 对乙酰氨基酚成人剂量 1 次 400mg。一个体重 10kg 的 11 个月的婴儿感冒发热,按体表面积计算该患儿处方剂量约为

- A. 60mg B. 80mg
C. 100mg D. 120mg
E. 140mg

(85~87 共用题干)

据统计,妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则,以确保胎儿及乳儿的安全。

85. 妊娠期须禁用的药物是

- A. 氯化钾 B. 氯霉素
C. 洛伐他汀 D. 阿昔洛韦
E. 枸橼酸钾

86. 妊娠期和哺乳期均禁用的药物是

- A. 米非司酮 B. 水溶性维生素
C. 青霉素 D. 阿莫西林
E. 二甲双胍

87. 治疗严重先兆子痫的首选药物

- A. 缬沙坦 B. 甲基多巴
C. 卡托普利 D. 硫酸镁
E. 硝苯地平

88. 妊娠晚期需用解热镇痛药时,应选用

- A. 吲哚美辛 B. 布洛芬
C. 阿司匹林 D. 对乙酰氨基酚
E. 效能最高的解热镇痛药

89. 哺乳期妇女患泌尿道感染时宜选用下列何种药物进行治疗

- A. 环丙沙星 B. 利巴韦林

- C. 磺胺嘧啶 D. 红霉素
E. 氯苄西林

(90~92 题用题干)

患者,男,63 岁,主诉:突发性口齿不清,左肢无力 3 天;现病史:患者 3 天前上午出门于街上无明显诱因下突发口齿不清、左肢无力、行走困难,无头痛、恶心、耳聋等其他症状;头颅 CT 显示“两侧基底节区腔隙性脑梗死,脑退变”;患者有高血压病史 4~5 年,糖尿病史 2 年余。辅助其他检查后,医生诊断结果为:脑梗死、高血压和糖尿病。

90. 脑梗死是因脑部血液循环障碍所致的脑组织缺血性坏死或软化,又称缺血性脑卒中,脑卒中的药物治疗不包括

- A. 脱水治疗 B. 溶栓治疗
C. 抗凝治疗 D. 抗痉挛治疗
E. 降纤治疗

91. 关于脑梗死的治疗,错误的是

- A. 急性期在确定没有禁忌证后快速溶栓治疗
B. 恢复期以康复锻炼为目标,并进行心血管疾病的二级预防
C. 发病 1 天内应用阿替普酶静脉溶栓
D. 对于不适合溶栓且无禁忌证的急性患者尽早给予阿司匹林
E. 溶栓后 24 小时内不主张使用抗凝治疗

92. 短暂性脑缺血发作(TIA)是卒中的高危因素,TIA 的预防与治疗对预防卒中都有很大的作用。下列属于降纤药物治疗 TIA 的是

- A. 巴曲酶 B. 阿司匹林肠溶片
C. 氯吡格雷 D. 双嘧达莫

E. 华法林

(93 ~ 97 共用题干)

患者女性, 25 岁, 因面色苍白、头晕、乏力 1 年余, 加重伴心慌 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血; 贫血分为两大类: 缺铁性贫血和巨幼细胞贫血, 另外还有新生儿溶血性贫血。

93. 为减轻胃肠刺激, 贫血患者服用铁剂应该在

- A. 睡前
- B. 餐前
- C. 餐后
- D. 两餐间
- E. 餐前或两餐间

94. 下列不属于巨幼细胞贫血表现的是

- A. 共济失调
- B. 牛肉样舌
- C. 甲床苍白
- D. 腹泻
- E. 抑郁

95. 容易引起新生儿溶血性贫血的抗菌药物是

- A. 氨基糖苷类
- B. 万古霉素
- C. 氯霉素类
- D. 磺胺类及呋喃类
- E. 四环素类

96. 治疗巨幼细胞贫血可选用

- A. 葡萄糖酸亚铁
- B. 右旋糖酐铁
- C. 叶酸
- D. 琥珀酸亚铁
- E. 乳酸亚铁

97. 一巨幼细胞贫血患儿肌注维生素 B_{12} , 一次 25 ~ 50 μ g, 应抽取 0.5mg/ml 的药液

- A. 0.025 ~ 0.05ml

- B. 0.05 ~ 0.10ml

- C. 0.10 ~ 0.20ml

- D. 0.15 ~ 0.30ml

- E. 0.20 ~ 0.40ml

(98 ~ 100 题共用题干)

患者, 女, 60 岁。现病史: 近日因摔倒而致左腕骨骨折, 骨科处理; 因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度 $L_1 \sim L_4$, 椎体 T 值 - 2.7SD, BMD749 (mg/cm^2), 股骨颈 T 值 - 2.2SD, BMD602 (mg/cm^2)。医生诊断为: 绝经后骨质疏松。

98. 诱发骨质疏松症的病因不包括

- A. 膳食结构不合理, 饮食中长期缺少钙、磷或维生素 D
- B. 妇女在停经或切除卵巢后, 体内雌激素 (保持骨质强度) 的分泌减弱
- C. 妊娠及哺乳期妇女大量流失钙
- D. 长期服用药物, 大量和长期饮酒、喝咖啡、吸烟
- E. 人体组织器官的自然衰老

99. 下述治疗骨质疏松药物中, 属于骨吸收抑制剂的是

- A. 钙制剂
- B. 氟制剂
- C. 双膦酸盐
- D. 甲状旁腺素
- E. 维生素 D

100. 关于雌激素受体调节剂应用于骨质疏松症的说法错误的是

- A. 妊娠期妇女禁用
- B. 绝经期超过 2 年以上的妇女可以应用
- C. 肝、肾功能不全者可应用
- D. 患有血栓栓塞性疾病者禁用
- E. 治疗期间出现子宫出血应及时做妇科检查

四、X 型题（多项选择题）：由一个题干和备选项组成。题干在前，备选项在后。每道题的备选项为五个。每道题备选项中至少有两个正确答案。

101. 患者，女，于 2014 年 1 月初无意中发
现左乳房有一蚕豆大小的无痛肿块，
未予重视；此后肿块进行性扩大，于 6
月就诊查出乳腺癌，下列有关肿瘤的
治疗原则正确的是
- A. 选择肿瘤敏感的药物
 - B. 选用毒副作用不同的药物
 - C. 联合应用时相特异性和非特异性
药物
 - D. 要兼顾患者的个体差异
 - E. 肿瘤化疗的期望要求是高疗效、少
抗性、轻毒副作用
102. 患者，女，生长于北京，毕业后前去
上海工作，冬天手背先是疼痛，发白
呈蜡样，温热后发痒、灼痛感觉异样，
而后出现水泡、溃疡，表现出严重的
冻伤情况。下列属于《国家非处方药
目录》治疗冻伤（疮）的所用药物是
- A. 紫云膏
 - B. 氧化锌软膏
 - C. 克林霉素
 - D. 樟脑软膏
 - E. 林可霉素乳膏
103. 世界卫生组织调查指出，全球的病人
有 1/3 是死于不合理用药，而不是疾
病的本身。国内不合理用药也相当严
重，占用药患者的 12% ~ 30%，药疗
事故占医疗事故的 30%，为此药物治
疗方案的正确制定会很大程度上减少
药疗事故，下列有关说法正确的是
- A. 制定药物治疗方案时，首先确定患
者的病情和药物的适应证
 - B. 治疗药物的选择的原则是药物的安

全性、有效性，其中有效性是选择
药物的首要标准

- C. 必要时，按个体数据重新计算给药
方案
 - D. 选择药物治疗时，可参考权威的专
科诊疗指南、专家共识等，并结合
临床经验及患者的个体情况作出
决定
 - E. 给药要根据半衰期确定间隔给药
104. 在日常生活中，驾驶员常因服药而影
响其正常反应，出现不同程度的疲倦、
嗜睡、困乏和精神不振等，影响其反
应能力，容易出现危险和人身事故。
下列属于驾驶员慎用的药物是
- A. 阿米洛利
 - B. 利血平氨苯蝶啶片
 - C. 西咪替丁
 - D. 金刚烷胺
 - E. 布洛芬
105. 随着生活水平的改善，心脑血管疾病
发病率已经开始上升，降压药、抗心
律失常药和心衰等药物陆续上市；但
此类疾病老年患者居多，在用药方面，
老年患者属于特殊人群，避免作为心
血管疾病一线用药的是
- A. 奎尼丁
 - B. 可乐定
 - C. 哌唑嗪
 - D. 劳拉西泮
 - E. 地高辛
106. 患者，男，50 岁，间歇性头晕头痛 10
年，伴事物模糊，黑朦及晕厥，无胸
闷、胸痛，无恶心等不适症状，血压
最高达 160/100mmHg，间断服用“卡
托普利、利血平、硝苯地平”等降压
药物治疗，临床诊断结果为高血压 3
级，抗高血压药合并用药原则是

- A. 给药途径一致
B. 每种药物剂量不宜大
C. 治疗作用协同或至少相加
D. 合并用药的品种不宜过多
E. 不良反应相互抵消或至少不重叠或相加
107. 某一儿童, 因误饮家中有机磷农药中毒, 家长发现及时, 洗胃抢救成功, 有关洗胃后的注意事项, 说法正确的是
- A. 一般应在中毒毒物进入体内 8 小时之内洗胃
B. 强腐蚀性中毒患者禁止洗胃
C. 中毒引起惊厥未被控制前禁止洗胃
D. 口服挥发性烃类化合物的中毒患者不宜洗胃
E. 每次灌入洗胃液 300 ~ 400ml, 最多不超过 500ml
108. 浙江二院开启了用药咨询窗口, 某患者既往病史: 慢性支气管炎; 既往用药史: 注射用胸腺肽 (20mg, 皮下注射)。咨询内容, 使用胸腺肽期间, 可否接种流感疫苗? 根据药物咨询对象的不同, 可将药物咨询分为
- A. 患者用药咨询
B. 药师用药咨询
C. 医师用药咨询
D. 护士用药咨询
E. 公众用药咨询
109. 患者, 女, 50 岁, 高血脂患者长期服用调节血脂药普伐他汀等同类药品, 近日出现代谢减少或减慢, 以致出现肌肉疼痛等严重的不良反应, 其同时服用的其他药品可能是
- A. 红霉素 B. 异烟肼
C. 利福平 D. 西咪替丁
E. 伊曲康唑
110. 患者, 男, 73 岁, 冠心病史 10 年, 肥胖, 多食少动, 患病期间, 仍不改大量肉食的饮食习惯, 病重前来住院治疗。下列有关冠心病预防的说法正确的是
- A. 一级预防, 是指正常人群预防冠心病; 二级预防是指冠心病患者, 预防再次梗死和其他心血管事件
B. 一级预防, 健康人 40 岁开始要定期进行血脂、血糖、血压监测
C. 明确冠心病患者, 要坚持长期药物治疗, 控制缺血症状, 降低心肌梗死和死亡的发生
D. 40 周岁以下健康成人每 2 年监测血压 1 次
E. ABCDE 方案对于指导二级预防与帮助
111. 沟通的技巧包括
- A. 要仔细听取并分析患者表达的内容和意思, 不要轻易打断对方的谈话
B. 多使用服务用语和通俗易懂的语言, 尽量避免使用专业术语
C. 注意观察对方的表情变化, 以判断其对谈话的理解和接受程度
D. 谈话时间越长, 提供信息越多, 患者越能掌握
E. 对特殊人群要特别详细提示服用药品的办法
112. 处方中常混淆的中文药名为
- A. 克林霉素与克拉霉素
B. 止血芳酸与止血环酸
C. 乙琥胺与乙酰胺
D. 氟尿嘧啶与氟胞嘧啶

- E. 阿糖胞苷与阿糖腺苷
113. 下列对软膏剂应用的介绍正确的是
- A. 涂敷前应先将皮肤洗净
 - B. 对有破损、溃烂、渗出的部位一般不要涂敷
 - C. 若涂布部位有烧灼、出疹等反应应立即停药
 - D. 尿素软膏涂后采用封包可提高疗效
 - E. 涂敷后轻轻按摩可提高疗效
114. 对药物相互作用的正确阐述是
- A. 指两种或两种以上药物合并或先后序贯使用时, 所引起的药物作用和效价的变化
 - B. 药物相互作用可使疗效增加
 - C. 药物相互作用可使毒性增加
 - D. 发生在体外的药物相互作用称为药物的配伍禁忌
 - E. 药物相互作用只表现在药效学方面
115. 血液中淀粉酶活性增高的临床意义是
- A. 用于急性胰腺炎的诊断
 - B. 可见于急性腮腺炎、胆囊炎
 - C. 可见于消化道溃疡穿孔、肠梗阻
 - D. 可见于创伤性休克、大手术后、急性酒精中毒
 - E. 肝癌、肝硬化、糖尿病
116. 下列药品中, 可能与青霉素竞争自肾小管排泄、致使青霉素血浆浓度增大, 半衰期延长的药品是
- A. 丙磺舒
 - B. 格列喹酮
 - C. 阿司匹林
 - D. 吲哚美辛
 - E. 磺胺异噁唑
117. 感冒药使用过程中应注意
- A. 流感病毒所致感冒用抗菌药治疗无效
 - B. 含伪麻黄碱的感冒药慎用于伴有心脏病、高血压的患者
 - C. 感冒患者应足量、长疗程服用抗感冒药治疗
 - D. 肝肾功能不全者应慎用或禁用含有解热镇痛药的感冒药
 - E. 服用酚麻美敏可不影响患者高空作业或操作精密仪器等工作
118. 《国家非处方药目录》收录的治疗结膜炎的制剂有
- A. 磺胺醋酰钠滴眼液
 - B. 2% 色甘酸钠滴眼剂
 - C. 酞丁安滴眼液
 - D. 红霉素眼膏
 - E. 0.1% 阿昔洛韦滴眼液
119. 下述导致缺铁性贫血的原因中, 正确的是
- A. 妊娠妇女
 - B. 哺乳妇女
 - C. DNA 合成出现障碍
 - D. 造血因子 (叶酸和维生素 B₁₂) 缺乏
 - E. 慢性失血, 如钩虫病、痔疮、溃疡病、月经量过多等
120. 以下有关高脂血症的临床表现叙述中, 正确的是
- A. 常无任何症状和体征
 - B. 动脉粥样硬化是其确诊的定性指标
 - C. 常见脂质在真皮内沉积引起黄色瘤
 - D. 脂质在真皮内沉积引起黄色瘤的发生率并不高
 - E. 较长时间才能观察到脂质在血管内皮沉积引起的动脉粥样硬化和周围血管病变