

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命科学与工程学院

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 郑 珺 第二辑 (六一十)(七)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命科学与工程学院

中国药用植物

主 编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 郑 珺
CHINESE MEDICINAL PLANTS
第二辑(六一—七)



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式，收录我国野生及栽培的药用植物共200种（包括亚种、变种及变型），主要从植物资源利用的角度，介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等，有些种类还有附方。为了安全起见，在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物.7/叶华谷等主编. —北京: 化学工业出版社, 2015.10
ISBN 978-7-122-25113-8

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物-介绍-中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第212538号

责任编辑: 李 丽

文字编辑: 王新辉

责任校对: 王素芹

装帧设计: 百彤文化传播

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2016年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编：叶华谷 曾飞燕 叶育石 郑 珺

副主编：邹 滨 袁 艺 付 琳 刘 冰


编写人员(以姓氏笔画为序):


于 慧	王发国	付 琳	叶华谷	叶育石	全 健
刘 冰	刘 念	朱 强	吴林芳	张 征	张丽霞
张忠廉	张慧晔	陆奕婷	陆颂规	李书渊	李如良
李泽贤	李海涛	杜怡枫	杨 毅	杨科明	肖 波
郑希龙	陈 玲	陈巧明	陈玉笋	陈有卿	陈海山
易思荣	罗红霞	林汝顺	林惠蓉	林锦锋	金慧英
郑 珺	侯惠婵	夏 静	秦新生	莫结丽	袁 艺
曹洪麟	曹照忠	黄 娅	黄珊珊	童毅华	曾飞燕
曾庆钱	曾宪禹	管志斌	管燕红	翟俊文	邹 滨
倪静波					

摄 影：王 斌 邢福武 邓乔华 叶华谷 叶育石 李泽贤
刘 冰 邹 滨 袁 艺 曾飞燕 易思荣 肖 波
杨 毅

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项 (CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项 (KSCX2-YW-Z-1004)、
植物园国家标准体系建设与评估 (Y421051001)、植物园迁地保
护植物编目及信息标准化 (2009FY120200)、中国植物园联盟建
设 (KFJ-1W-NO1)、科技部基础性专项植物园迁地保护植物编
目及信息标准化 (2009FY120200) 与植物园迁地栽培植物志编撰
(2015FY210100)、广东省数字植物园重点实验室”项目资助出版。





前 言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列图书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以拉丁学名字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《广东中药志》《华南药用植物》《湖南药物志》和《广西药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

蒴莲	<i>Adenia chevalieri</i>	2
海南香花藤	<i>Aganosma schlechteriana</i>	4
飞天螭蛸	<i>Alsophila spinulosa</i>	6
穿心莲	<i>Andrographis paniculata</i>	8
牛心果	<i>Annona reticulata</i>	10
小叶五月茶	<i>Antidesma venosum</i>	12
斜方复叶耳蕨	<i>Arachniodes rhomboidea</i>	14
虎刺楸木	<i>Aralia armata</i>	16
双籽棕	<i>Arenga caudata</i>	18
硬毛白鹤藤	<i>Argyrea capitata</i>	20
蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra elatior</i>	22
小花蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra minutiflora</i>	24
华南铁角蕨	<i>Asplenium austrochinense</i>	26
短舌紫菀	<i>Aster sampsonii</i>	28
广东酒饼筋	<i>Atalantia kwangtungensis</i>	30
粗喙秋海棠	<i>Begonia crassirostris</i>	32
短茎秋海棠	<i>Begonia handelii</i>	34
毛毡草	<i>Blumea hieracifolia</i>	36
六耳铃	<i>Blumea laciniata</i>	38
鸭脚罗伞	<i>Brassaiopsis glomerulata</i>	40
齿瓣石豆兰	<i>Bulbophyllum levinei</i>	42
球柱草	<i>Bulbostylis barbata</i>	44
三品一枝花	<i>Burmannia coelestis</i>	46
细叶黄杨	<i>Buxus harlandii</i>	48
大叶鱼骨木	<i>Canthium simile</i>	50

纤枝槌果藤	Capparis membranifolia	52
大叶乌菘莓	Cayratia oligocarpa	54
爪哇木棉	Ceiba pentandra	56
银兰	Cephalanthera erecta	58
吊灯花	Ceropegia trichantha	60
弯管花	Chassalia curviflora	62
蝙蝠草	Christia vespertilionis	64
钝叶樟	Cinnamomum bejolghota	66
翅茎白粉藤	Cissus hexangularis	68
浆果苋	Cladostachys frutescens	70
红花隔距兰	Cleisostoma williamsonii	72
海南桢桐	Clerodendrum hainanense	74
咖啡	Coffea arabica	76
肉叶鞘蕊花	Coleus carnosifolius	78
掌叶线蕨	Colysis digitata	80
黄麻	Corchorus capsularis	82
芙蓉菊	Crossostephium chinense	84
日本柳杉	Cryptomeria japonica	86
蕺芝	Cudrania cochinchinensis	88
茛苳	Cyperus malaccensis	90
短叶茛苳	Cyperus malaccensis var. brevifolius	92
黄藤	Daemonorops margaritae	94
海南檀	Dalbergia hainanensis	96
细叶石斛	Dendrobium hancockii	98
全缘火麻树	Dendrocide sinuata	100
五蕊寄生	Dendrophthoe pentandra	102
异叶山蚂蝗	Desmodium heterophyllum	104
毒瓜	Diplocyclos palmatus	106
眼树莲	Dischidia chinensis	108
龙血树	Dracaena angustifolia	110

南山藤	<i>Dregea volubilis</i>	112
长叶茅膏菜	<i>Drosera indica</i>	114
抱树莲	<i>Drymoglossum piloselloides</i>	116
皱果蛇莓	<i>Duchesnea chrysantha</i>	118
长柄野扁豆	<i>Dunbaria podocarpa</i>	120
仙人球	<i>Echinopsis multiplex</i>	122
宽叶楼梯草	<i>Elatostema platyphyllum</i>	124
地胆草	<i>Elephantopus scaber</i>	126
大叶火烧兰	<i>Epipactis mairei</i>	128
鼠妇草	<i>Eragrostis atrovirens</i>	130
大画眉草	<i>Eragrostis cilianensis</i>	132
可爱花	<i>Eranthemum pulchellum</i>	134
指叶毛兰	<i>Eria pannea</i>	136
台湾枇杷	<i>Eriobotrya deflexa</i>	138
窿缘桉	<i>Eucalyptus exserta</i>	140
拟金茅	<i>Eulaliopsis binata</i>	142
岗柃	<i>Eurya groffii</i>	144
球穗千斤拔	<i>Flemingia strobilifera</i>	146
白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i>	148
天麻	<i>Gastrodia elata</i>	150
簇花粟米草	<i>Glinus oppositifolius</i>	152
圆果算盘子	<i>Glochidion sphaerogynum</i>	154
鹿角草	<i>Glossogyne bidens</i>	156
大豆	<i>Glycine max</i>	158
琼榄	<i>Gonocaryum lobbianum</i>	160
大花斑叶兰	<i>Goodyera biflora</i>	162
斑叶兰	<i>Goodyera schlechtendaliana</i>	164
毛果扁担杆	<i>Grewia eriocarpa</i>	166
毛萼玉凤花	<i>Habenaria ciliolaris</i>	168
长距玉凤花	<i>Habenaria davidii</i>	170

坡参	<i>Habenaria linguella</i>	172
延龄耳草	<i>Hedyotis paridifolia</i>	174
长节耳草	<i>Hedyotis uncinella</i>	176
叉唇角盘兰	<i>Herminium lanceum</i>	178
洋麻	<i>Hibiscus cannabinus</i>	180
护耳草	<i>Hoya fungii</i>	182
荷秋藤	<i>Hoya griffithii</i>	184
铁草鞋	<i>Hoya pottsii</i>	186
大风子	<i>Hydnocarpus anthelminthica</i>	188
水鳖	<i>Hydrocharis dubia</i>	190
八宝	<i>Hylotelephium erythrostictum</i>	192
山香	<i>Hyptis suaveolens</i>	194
腰骨藤	<i>Ichnocarpus frutescens</i>	196
宜昌木蓝	<i>Indigofera decora</i> var. <i>ichangensis</i>	198
假大青蓝	<i>Indigofera galeoides</i>	200
厚叶素馨	<i>Jasminum pentaneurum</i>	202
水莎草	<i>Juncellus serotinus</i>	204
疏毛白绒草	<i>Leucas mollissima</i> var. <i>chinensis</i>	206
大叶石龙尾	<i>Limnophila rugosa</i>	208
狭叶山胡椒	<i>Lindera angustifolia</i>	210
刺齿泥花草	<i>Lindernia ciliata</i>	212
棱萼母草	<i>Lindernia oblonga</i>	214
禾叶山麦冬	<i>Liriope graminifolia</i>	216
豺皮樟	<i>Litsea rotundifolia</i> var. <i>oblongifolia</i>	218
翅子藤	<i>Loeseneriella merrilliana</i>	220
柳叶剑蕨	<i>Loxogramme salicifolia</i>	222
丝瓜	<i>Luffa aegyptiaca</i>	224
海金沙	<i>Lygodium japonicum</i>	226
细梗香草	<i>Lysimachia capillipes</i>	228
甜果藤	<i>Mappianthus iodoides</i>	230

毛瓣鸡血藤	<i>Millettia pachyloba</i>	232
大苞水竹叶	<i>Murdannia bracteata</i>	234
葶花水竹叶	<i>Murdannia edulis</i>	236
牛鞭草	<i>Murdannia loriformis</i>	238
两广锡兰莲	<i>Naravelia pilulifera</i>	240
薄叶新耳草	<i>Neanotis hirsuta</i>	242
棒瓜	<i>Nealsomitra integrifoliola</i>	244
毛唇芋兰	<i>Nervilia fordii</i>	246
心叶瓶尔小草	<i>Ophioglossum reticulatum</i>	248
小露兜	<i>Pandanus fibrosus</i>	250
稷	<i>Panicum miliaceum</i>	252
圆果雀稗	<i>Paspalum orbiculare</i>	254
双穗雀稗	<i>Paspalum paspaloides</i>	255
龙头兰	<i>Pecteilis susannae</i>	256
石蝉草	<i>Peperomia blanda</i>	258
红丝线	<i>Peristrophe bivalvis</i>	260
碧冬茄	<i>Petunia hybrida</i>	262
显子草	<i>Phaenosperma globosa</i>	264
藨草	<i>Phalaris arundinacea</i>	266
龙骨马尾杉	<i>Phlegmariurus carinatus</i>	268
马尾杉	<i>Phlegmariurus phlegmaria</i>	270
细叶石仙桃	<i>Pholidota cantonensis</i>	272
云南石仙桃	<i>Pholidota yunnanensis</i>	274
小酸浆	<i>Physalis minima</i>	276
西南冷水花	<i>Pilea plataniflora</i>	278
菱叶	<i>Piper betle</i>	280
海南蒟	<i>Piper hainanense</i>	282
荜茇	<i>Piper longum</i>	284
光叶海桐	<i>Pittosporum glabratum</i>	286
华东瘤足蕨	<i>Plagiogyria japonica</i>	288

阔苞菊	<i>Pluchea indica</i>	290
金发草	<i>Pogonatherum paniceum</i>	292
白鼓钉	<i>Polycarpaea corymbosa</i>	294
中华抱茎蓼	<i>Polygonum amplexicaule</i> var. <i>sinense</i>	296
绵毛酸模叶蓼	<i>Polygonum lapathifolium</i> var. <i>salicifolium</i>	298
杠板归	<i>Polygonum perfoliatum</i>	300
对生耳蕨	<i>Polystichum deltodon</i>	302
桃榄	<i>Pouteria annamensis</i>	304
青龙木	<i>Pterocarpus indicus</i>	306
棠梨	<i>Pyrus calleryana</i> var. <i>koehnei</i>	308
催吐萝芙木	<i>Rauvolfia vomitoria</i>	310
火焰兰	<i>Renanthera coccinea</i>	312
蓖麻	<i>Ricinus communis</i>	314
鹅观草	<i>Roegneria kamoji</i>	316
缫丝花	<i>Rosa roxburghii</i>	318
戟叶悬钩子	<i>Rubus hastifolius</i>	320
甜叶悬钩子	<i>Rubus suavissimus</i>	322
甜根子草	<i>Saccharum spontaneum</i>	324
冠果草	<i>Sagittaria guyanensis</i> subsp. <i>lappula</i>	326
矮慈菇	<i>Sagittaria pygmaea</i>	328
五层龙	<i>Salacia chinensis</i>	330
槐叶苹	<i>Salvinia natans</i>	332
石蕨	<i>Saxiglossum angustissimum</i>	334
高秆珍珠茅	<i>Scleria terrestris</i>	336
鲫鱼藤	<i>Secamone lanceolata</i>	338
蝉翼藤	<i>Securidaca inappendiculata</i>	340
费菜	<i>Sedum aizoon</i>	342
火焰草	<i>Sedum stellariifolium</i>	344
深绿卷柏	<i>Selaginella doederleinii</i>	346
翠云草	<i>Selaginella uncinata</i>	348

皱叶狗尾草	<i>Setaria plicata</i>	350
枳叶黄花稔	<i>Sida alnifolia</i>	352
黏毛黄花稔	<i>Sida mysorensis</i>	354
红血藤	<i>Spatholobus sinensis</i>	356
戴星草	<i>Sphaeranthus africanus</i>	358
钝叶草	<i>Stenotaphrum helferii</i>	360
海南地不容	<i>Stephania hainanensis</i>	362
马钱子	<i>Strychnos nux-vomica</i>	364
丁子香	<i>Syzygium aromaticum</i>	366
四角蒲桃	<i>Syzygium tetragonum</i>	368
番杏	<i>Tetragonia tetragonioides</i>	370
千头柏	<i>Thuja orientalis</i> cv. <i>sieboldii</i>	372
光叶蝴蝶草	<i>Torenia asiatica</i>	374
弓果藤	<i>Toxicarpus wightianus</i>	376
水竹草	<i>Tradescantia zebrine</i>	378
菱	<i>Trapa bicornis</i>	380
漏斗瓶蕨	<i>Trichomanes striatum</i>	382
圆叶娃儿藤	<i>Tylophora trichophylla</i>	384
红杜仲藤	<i>Urceola quintaretii</i>	385
香草兰	<i>Vanilla planifolia</i>	386
糙叶斑鸠菊	<i>Vernonia aspera</i>	388
淡黄荚蒾	<i>Viburnum lutescens</i>	390
枫香榭寄生	<i>Viscum liquidambaricolum</i>	392
葱草	<i>Xyris pauciflora</i>	394
滇刺枣	<i>Ziziphus mauritiana</i>	396
参考文献.....		398
拉丁名索引.....		399
中文名索引.....		401



蒴 莲

Adenia chevalieri Gagnep.

【别名】云龙党、过山参

【基 原】来源于西番莲科蒴莲属蒴莲 *Adenia chevalieri* Gagnep. 的根入药。

【形态特征】藤本。叶纸质，宽卵形至卵状长圆形，长7~15 cm，宽8~12 cm，顶端短渐尖，基部圆形或短楔形，全缘，间有3裂，干时两面苍黄色，光亮，无毛；叶脉羽状，侧脉4~5对，小脉横出，明显可见，叶为3裂者，中间裂片卵形，侧裂片较窄；叶柄长4~7 cm，无毛，顶端与叶基之间具2个盘状腺体。聚伞花序有1~2朵花；花梗长达6 cm；苞片鳞片状，细小。花单性，雄花：花梗长8~10 mm；花萼管状，长9~12 mm，顶端5裂，裂片小，宽三角形，长0.5 mm；花瓣5枚，披针形，长0.6 mm，具3条脉纹，生于萼管的基部，具5个附属物；雄蕊5枚，花丝极短，花药顶端渐尖；子房退化，无胚珠，具短柄；雌花：较雄花为大，萼管长8~9 mm，裂片三角形，长与宽1~1.5 mm；花瓣5枚，披针形或椭圆形，长约5 mm，生于萼管的下部，等高或稍高于萼齿，萼管基部具5枚膜质附属物，长圆形；退化雄蕊5枚，长1 mm，基部合生；子房椭圆球形，具柄，有3个粗壮柱头。蒴果纺锤形，长8~12 cm，老熟时红色，有光泽，3瓣室背开裂，外果皮革质；种子多数，近圆形，扁平，直径近1 cm，草黄色，种皮具网状小窝点。花期1~7月；果期8~10月。

【生 境】生于山谷疏林或林缘，攀援于树上或灌丛中。

【分 布】广东、香港、海南、广西南部。

【采集加工】夏秋季采收，将根晒干。

【性味功能】味甘、微苦，性凉。滋补强壮，祛风湿，通经络。

【主治用法】治风湿痹痛，胃脘痛，子宫脱垂。用量15~30 g。



海南香花藤

Aganosma schlechteriana Lévl.

【基 原】来源于夹竹桃科香花藤属海南香花藤 *Aganosma schlechteriana* Lévl.的叶入药。

【形态特征】攀援灌木，长达7 m；枝具乳汁。叶椭圆形至长圆状椭圆形，稀卵圆形，顶端急尖至钝或渐尖，基部阔楔形，长6~14 cm，宽2.5~5.5 cm，幼时被茸毛，老时毛渐脱落；侧脉每边约10条，斜曲上升；叶柄长约1 cm。聚伞花序顶生，三歧，长4~6 cm，宽约6 cm；总花梗、花梗、苞片、花萼、花冠外面被黄色的短柔毛；花萼裂片卵圆形，比花冠筒长，长10~12 mm，宽2.5~4 mm，花萼内面基部具5枚腺体；花冠白色，花冠筒圆筒形，基部稍膨大，内面被长柔毛，长5~9 mm，宽4 mm，裂片倒卵形，顶端圆或钝，长11~14 mm，基部宽4 mm，顶端宽8 mm；雄蕊着生在花冠筒基部，花药箭头状，内藏，顶端渐尖，基部具耳，腹部与柱头黏生；子房被毛，由2枚离生心皮组成，每心皮胚珠多颗，花柱短，顶端膨大，下部收缩，柱头圆锥状；花盘杯状，比子房长，顶端5浅裂。蓇葖广叉生，初时被毛，老时毛脱落，长圆柱形，长10~30 cm，直径5~10 mm，下垂；种子长圆形，扁平，两端截平，长约2 cm，宽3~4 mm，顶端种毛白色绢质，长3.5~5 cm。花期3~7月；果期8月至翌年2月。

【生 境】生于500~1200 m山地山谷林中。

【分 布】海南、广西、贵州、云南、四川。

【采集加工】全年可采，叶鲜用。

【性味功能】消炎，止痒。

【主治用法】治皮肤病。外用鲜品煎水洗患处。