

民國文獻資料叢編

近代學報
彙刊

殷夢霞 李強 選編

國家圖書館出版社

國

殷夢霞、李強 選編

近代學報彙刊

第三十冊

國家圖書館出版社

第三十冊目錄

中西醫學報	第九卷第六號	一九二七年六月		一
中西醫學報	第九卷第七號	一九二七年七月		一一九
中西醫學報	第九卷第八號	一九二七年八月		二一九
中西醫學報	第九卷第九號	一九二七年九月		二九一
中西醫學報	第九卷第十號	一九二七年十月		三八五
中西醫學報	第九卷第十一號	一九二七年十一月		四八一

國內批准立案中西醫藥學術會出版

申報醫學報

The International Medical Journal

June 1927

Vol. IX No. 6

第十六年六月

第九卷第六號

小 論 壇	牙 齒 之 衛 生	阿 片 及 嗎 啡 中 毒 的 病 理 實 驗	痔 之 成 因 及 預 防	河 豚 毒 之 研 究	對 於 實 施 霍 亂 預 防 注 射 之 意 見	外 科 學 大 綱	硫 苦 靜 脈 注 射 之 功 用	霍 亂 治 療 要 旨
	彭菊洲	林幾	曾立羣	濟川	周楚良	丁惠康	丁錫康	俞鳳賓

The Medical Press Ltd.
121 Myburgh Road, Shanghai

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

育嬰
珍品



勒吐精代乳粉

用最純潔牛奶以特別
方法製成其性質與母
乳無異所含脂肪之成
分亦與母乳無別嬰孩
服之可得十足滋養且
極易消化諸君如愛子
女請購勒吐精代乳粉

SIEMENS CHINA CO.

Simple Roentgen-apparatus

for

Radioscopy Radiotherapy and Radiography

for Direct Current.



輕便愛克司光機

此機為敝廠最新發明者。運用靈便。裝置極易。既可診斷。骨髓。心。肺。腸胃。各症。及攝影。又能用以表面治療。各式皮膚症。減除。瘡。疥。不可不備之器械也。敝廠備有暗室。以便隨時試驗之用。倘蒙惠臨參觀。不勝歡迎之至。

分

天津 北京 濟南 重慶 南京
 平天 漢口 成都 香港 廣州

上海江西路
 二十四號 西門子電機廠啓

選購愛克司光器械須知

凡醫生。或病院。欲裝設愛克司光器械。應將以下諸端詳細指明之。

甲 所需電氣來源之情形。

乙 對於裝設此器之要求。

愛克司光裝設之價值。即全繫于此。

對於甲項。計有以下問題。

(一) 或直流電。電壓力幾何。日間或夜間發電。

(二) 或交流電。電壓力幾何。循環次數若干。日間或夜間發電。

以上一二兩條。係由公共電氣廠。供給電氣而言。

(三) 或係自備發電機。與愛克司光器械。一同購之。

乙項計有以下問題。

(一) 係欲透照。與時間治療。及時間照像。

(二) 或係欲時間。兼速治療。與透照。及時間。兼速照像。

(三) 抑或係欲時間。兼速。併兼片刻治療。與透照。及時間。兼速。併兼片刻照像。

此器之價值。按其要求而有增加。並按其所需帶附屬品之多寡。而有不同。如附帶愛克司光筒。三腳架。安裝件。

療病台。與療病附屬品。各若干也。茲請按照以上諸端。詳細註明。俾可具單開列價值。

上海西門子電機廠啓

上海西門子電機廠啓

司公限有記公房藥成集海上
J. D. CHANG & COMPANY, LTD.

Chemists & Druggists

54 NANKING ROAD

SHANGHAI

本藥房創設多年備蒙社會信仰茲因擴充營業重行改組添加公記總發行所遷至南京路拋球場口五十四號新屋內容外部大加整頓專售泰西各國原料藥品醫院醫生應用器械上等香料化粧品並設專廠製造補身家用良藥選貨精良定價低廉批發格外公道如蒙賜顧無任歡迎

集成藥房公記有限公司謹啓

總發所行

南京路拋球場口五十四號
電話中央第七百七十三號

製藥廠

英租界泗涇路十二號
電話中央七五三三號

國民必讀

醫學綱要

丁福保譯 一冊一元二角

第一類序錄爲各種醫學書序學者讀此可以識醫學各科之大略及歷代之變遷誠門徑中之門徑階梯中之階梯也序錄之後曰肺癆病新學說曰產後之攝生曰胎生學大意曰產科學大意曰育兒法大意皆普通智識中之最要者也其次曰傳染病學大意曰內科學大意曰外科學大意曰皮膚病學大意曰婦人科學大意曰齒科學大意曰內科病之救急法凡卒倒疼痛瀉血胃血腸血等急治之法悉備曰中毒之急救法凡鴉片中毒蘭中毒石炭酸中毒以及昆蟲之刺傷瘋犬之咬傷等急治之法悉備曰異物之取出法凡外物之入於呼吸器消化器以及五官者其取出之法悉備曰火傷及凍傷曰止血法曰失氣及假死皆救急法中之不可不知者曰創傷凡頭部之創傷耳之創傷顏面之創傷舌之創傷眼之創傷頸部之創傷食道之創傷胸部及臟腑之創傷救急之治法悉備以上各節在一二月內已可卒讀普通醫學智識可以得其大凡矣

中國醫學史

陳愚編 一冊一元六角

醫史爲醫學進化之軌跡善學者循軌跡而登於堂奧故醫學史爲不可不讀之書丹徒陳君也愚有鑒及此特發弘願以平日研究所得上自太古下及民國之醫學著成「中國醫學史」十二章第一章太古之醫學第二章周秦之醫學第三章兩漢之醫學第四章兩晉至隋之醫學第五章唐之醫學第六章宋之醫學第七章金元之醫學第八章明之醫學第九章清之醫學第十章民國之醫學每章述醫政醫學家疾病史與學派之變遷醫學家之著作等最爲詳悉第十一章爲中國醫事年表第十二章爲歷代太醫院職官表全書引徵繁博考核精詳爲中國空前未有之大著作

上海梅白路一百廿一號

醫學書局出版

在 美 國 製 造



乳油肝魚鰵補滋華寶





最完善之鰵魚肝油乳

美國寶華滋補鰵魚肝油乳質純味佳內含生活素Vitamin極富係由哪喊最上等鰵魚肝油中提出精華所製成製法精良色呈奶白洵非市上所售者所可比擬且夫咳嗽傷風肺病癆瘵皮膚病以及各種弱症究其原因皆由培養失宜所致倘置之不理痛苦益甚故一有以上各症宜即覓對症之藥以速其愈此乳功能益血壯顏潤肺補腦乃培養身體之無上佳品也此乳在美國製造各藥房均有出售

總發行所 上海分行 四川路五號 美國寶華公司



霍亂治療要旨

俞鳳賓

A few Principles for the Treatment of Cholera.

此稿大半已經發表。今因丁惠康兄函囑披露於中西醫學報。乃略爲修改。並加入最近之心得。如緩注法之可免劇烈反應。動物性強心劑之收效較宏。二者皆丙寅秋間實驗所得。用以獻曝。藉副丁君諄諄之盛意也。丁卯夏日。鳳賓謹識。

弁言

霍亂之流行。每有周期性。在印度每六年大流行一次。在上海及其附近諸地。每隔三四年有一次之猖獗。民國十四年夏。此症又大流行於上海諸地。經伍連德江上峯兩博士檢查華人自辦之自來水。悉某處之進口水與供給水。俱有霍亂菌。十五年夏。上海又有此症之大流行。經工部局細菌學家化驗之後。知某處自來水。沾染霍亂菌。則家中凡裝該處所供給之自來水管者。均極易傳染。因洗滌盥盆箸匙。人皆用冷水。而不用沸水。宜乎其傳染之烈。以致治療上發生無窮之累。內地河水一經沾污。則用之者。時時與病原菌相接觸。滔滔之禍。庸有涯涘。本篇之旨。在抒述治療此症之管見。於脫水之補救。血液過酸症之防免。預後之吉凶。復發及禁忌之研究。動物性之強心劑。緩注法之適應症等等。秉經驗所得。裒集

成篇。聊作研究者之參考資料云爾。

(1) 少量脫水時之治療法

凡逢霍亂症。宜先辨別其脫水之輕重。在霍亂初起之時。脫水僅屬少量。不必即用鹽水注射。余於近年試用『三油溶液』內服法。效驗頗著。其成分如下。

以太酒精 (Spt. Ether.) 三十滴

丁香油 (Ol. Caryoph.) 五滴

檜油 (Ol. Juniper.) 五滴

加耶布的油 (Ol. C. junpti.) 五滴

芳香稀硫酸 (Acid. Sulph. Arom.) 十五滴

右一次服。溫開水沖下。身體瘦小者減半服。

第一次服後。倘逢嘔吐。不可因吐而中止。靜待十五分或三十分鐘後。可服第二次。每隔三十分鐘服一次。服時有辛辣芳香之味。服後胃部覺暖。腹痛漸減。嘔吐停止。神色漸安。輕症服至三四次。即見效。較重之症。須八次以上。用此法者。可不必嚴格的禁忌食品。飢餓時。即可進以米粥藕粉等物。此方早期試用。可令霍亂症狀。一一中止。能藉之以免去注射之手術。較諸往日所常用之高嶺士十滴水。痧藥水。哥羅汀。樟腦白蘭地等藥。自有超然之功效。但在多量脫水之症。或已現癆瘵吊脚等象者。不宜全恃此劑。仍以引用鹽水注射法為宜也。

若不用三油溶液。則過錳酸鉀 (Potassium permanganate) 有消毒之功。亦可內服。每次二喱或四喱。每十五分鐘一次。可連服二小時至四小時。俟大便秘得綠黃色爲度。輕症可減少分量。此藥以基拉丁 (Keratin) 或賽羅爾包面製成丸 (Salol coated) 爲宜。此藥用過後。可連服過錳酸鈣溶液 (Sol. calcium permanganate) 每一二十兩水內。可溶二喱至六喱。使病者頻頻飲服。有消毒及防免再發之效。如有再發之表示。尙可加服也。

(2) 霍亂至何種徵象須開始注射鹽水

一、心神煩躁。皮膚呈紺色。陣痛甚劇。血壓在七十耗以下。血之比重在一〇六五以上。
二、大吐或大瀉。或吐瀉交作。口中溫度較常人爲低。直腸溫度。在法倫表一〇〇以上。
三、眼球下陷。聲音嘶啞。脈搏微細。或脈搏不現。
四、手指繃癢。俗稱癢螺。腿筋收縮。俗稱吊脚。
五、手背及臂上皮膚。摺之能起立。不即縮下。此乃彈力性缺乏。因水分漸少所致。
第五條症狀。書籍所未載。乃余近十年來。觀察上心得之一。可用作診斷之助。除有合併症。或十分肥胖者。以及老年人外。此摺皮之法。頗覺可靠也。

(3) 注射鹽水中遇見何種現象必須停止

一、在重症中。假使脫水之徵。既經注射。未見輕減。則雖顫抖惡寒。注射不宜中止。因顫抖一事。在鹽水注射中。至四磅以上。尙屬不可免之徵象。但注射之繼續與中止。還宜斟酌病者情形而定。須視病者體

質強弱。以及病勢輕重以爲衡。

二、脫水之徵象。消退以後。宜停止注射。消退後之狀態如下。

(甲) 皮膚恢復彈力性。

(乙) 指尖如常。不見癱瘓現象。

(丙) 聲音漸響。不復嘶啞。

(丁) 眼球膨突如常。不復下陷。

(戊) 血比重降至一〇五〇。

三、在注射中。大吐大瀉者。不可中止。宜注射多量鹽水。以補其缺。有時一次注射。須達二十磅以上。

四、注射中如逢呼吸困難。吸氣急迫。每因循環障礙。或肺臟腫脹所致。宜停止注射鹽水。而用硫酸阿片

平 (Atropine sulphate) 或腎上腺精 (Adrenalin) 行皮下注射。以補救之。

(4) 鹽水過多之弊

鹽水注射。貴適其宜。倘分量過多。則發生下列諸弊。一曰血液鬱滯。二曰右心室右心耳之膨脹。三曰肺臟之水腫。以及肺基之發現雜音。

(5) 至何種變化須重行注射

病者已得一次鹽水注射後。倘逾數小時或一二日後。脫水之徵象復臨。則宜重行注射。注射第二、三次者。其顫抖惡寒。往往可免。

重症有須經二次或三次注射。方可得救。惟所需之次數愈多。則豫後愈險。注射第二第三次者。可仍用生理食鹽水。或過滲性鹽水等。各方詳下。

(甲)生理食鹽水(即等滲性者)

氯化鈉 八·五

蒸餾水 一〇〇〇·〇

加熱至沸度。俟溫度適當。始可用。

(乙)過滲性鹽水(下方英國衡制)

氯化鈉 一二〇喱

氯化鉀 六喱

氯化鈣 四喱

水分 二〇喱

過濾加熱至沸度。俟溫度適當。可用。

分劑八〇喱。用此溶液。不宜過多。

(丙)糖鹽水

葡萄糖 (Dextrose) 五至七

生理食鹽水 一〇〇〇·〇

霍療治亂要旨

過濾加熱至沸度。待溫度適宜始可用。

分劑一日可用一〇〇〇哢或一〇〇〇哢以上。

(丁)樹膠食鹽水

亞拉伯樹膠

六・〇或七・〇

生理食鹽水

一〇〇・〇

法蘭絨過濾。加熱至沸度。待溫度適宜始可用。

分劑二〇哢或四〇哢。亦可用至四〇哢以上。

(6)何種預兆暗示豫後之凶

一、一次鹽水注射不夠。而須注射二次或三次者。豫後不良。

二、懷孕之婦女。患霍亂症者。胎兒往往中毒而亡。必致小產。治愈者不多。

三、婦女在行經期內。若罹霍亂。豫後不良。

四、嘔出膽汁者。其症凶。腦筋中毒者甚凶。

五、霍亂症後。即患尿中毒。或小溲不通者。有愈或不愈。(治法詳16節)

六、霍亂症後。有血液過酸症者。豫後不良。(治法詳16節)

七、小孩或老者。患霍亂。抵抗力較弱。豫後凶。吸鴉片者亦然。

八、在虛脫期 (Collapse stage) 內。即癱瘓吊脚之時。肚門內熱度達法倫表一〇二度以上者。結果凶。

九、乾霍亂。無希望。

十、注射鹽水後。熱度甚高。昏迷妄動者。未見有恢復之機會。(見洛求司氏霍亂治療法)

(7) 注射鹽水後宜進何種食品

一、三日以內。禁止食品。

二、二十四小時內。可進鹼性通尿劑。和以水分。

三、四十八小時以後。可進薏米清湯。(薏米即薏苡仁。米粒不宜咽入。祇飲其湯)

四、經過第三日。可進粥湯。或薄藕粉。

五、牛乳、雞蛋、牛肉汁均當禁止。肉汁恐礙腎臟。乳與蛋。可使霍亂菌滋生。而重行猖獗。

(8) 復發之原因

霍亂症在初愈時。最易復發。其復發之原因如下。

一、飲食不合宜。其病即復發。病者於注射鹽水後。於二三日內。不宜進飲食。祇可進水。

二、病者注射鹽水後。雖在暑天。亦易受寒。受寒則其病復發。故日夜宜有人看護。使單被時常蓋妥。

(9) 鹽水注射時之靜脈檢覓

一、貴要靜脈。貴要正中靜脈。正中靜脈。頭正中靜脈。均可引用。

二、稍肥之婦女。第一項內所述靜脈。不易覓見時。可試用腕部之橈靜脈。

三、踝部之隱靜脈。亦可應用。肘部之後尺靜脈。顯著者多。惟移動殊易。故宜留意。