

新药手册 XIN YAO SHOU CE
'98

湖南省药学会编
湖南省医药科技开发咨询服务有限公司

新药手册

第三辑



普乐林 注射液

心脑血管病的首项选择
植物提取 纯天然药物
中国药学会推荐产品

公司地址：烟台市白石路 102 号(264002)

电话：0535-6267888

烟台中策药业有限公司

zhangli

新药手册

(第三辑)

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖南省医药科技咨询服务公司编

1998年7月

前 言

我公司于九七年曾编辑了新药手册“第一辑”、“第二辑”，受到医疗单位的欢迎。为继续做好传递新药信息的工作，今年我们又编辑了“第三辑”。

本书共收集新药 99 种，其中西药 70 种，中成药 29 种。按药理作用排列，每个药品收载项目有：

药名：中文、外文名，以商品名为主，辅以通用名。

制剂：主要是指剂型、规格。

【作·】包括作用机理、作用特点、药动学数据、适应症。

【用·】包括用法、用量、疗程及两个疗程之间隔时间。

【副·】指不良反应，毒副作用。

【注·】指注意事项。

【相·】指药物相互作用。

表明生产厂家及经销公司的目的是便于有关医院购买。由于价格经常变动，因此所标价格，仅供参考。

本书在编写过程中，得到了多家厂家和公司的支持，在此深表感谢。

由于编者水平有限，错误之处，望不吝指正。

编者

1998 年 7 月于长沙

入册单位和品种

长寿堂中药提制厂	新生化 益肾灵
四川国泰制药有限责任公司	谷康泰灵注射液
杭州九源基因工程有限公司	吉派啉
无锡第一制药厂	悉能
常州第四制药有限公司	兰勃素 优克
石家庄制药集团有限公司	康胃素 维宏 固邦 ✓
英国捷利康药厂	安可来
西藏自治区藏药厂	六味能消胶囊 藏咳喘
默克一里昂制药集团公司	施力柔 优甲乐
广东康力医药有限公司	疗尔健 善素高 给尔安
	保尔佳 金尔伦 素尔松
	黛安神
先锋医药有限公司	弥心平 戴芬
大连辉瑞制药有限公司	瑞怡宁 左洛复 优立新
	大扶康
天津药业有限公司	尤卓尔
正雅制药有限公司	一休凡安 益络平
中国人民解放军四五八医院肝病研究所	促肝细胞生长颗粒剂
	欣洛维
深圳三九医药贸易有限公司	九华痔疮膏
邵阳山秀医药化工有限公司	中华烫疮奇油

广州白云山制药四会分厂
山东烟台绿叶制药有限公司
黑龙江庆安制药股份有限公司

广东名盛药业有限公司
广东迈特一兴华药品有限公司
陕西西安制药厂

沈阳协合集团公司
成都菊乐制药有限公司
湖南省制药工业公司新特药部

山西天丰药业有限责任公司
苏州立达制药有限公司

长沙九芝堂生物制药有限公司
天津长江生物药业有限公司
福建三明制药厂
湖南医疗器械药品公司
湖南医药发展康泰公司
贵州长生制药有限责任公司
珠海金沙(湖南)制药有限公司

利肝乐 益肾补骨口服液
可维加

苓暴红止咳颗粒
莪术油葡萄糖注射液
盐酸洛美沙星葡萄糖注射液
血竭胶囊

保前列
利君舒络片 利君风痛宁片
利迈先片

高聚金葡素

邦得林

司乐平 克林霉素磷酸酯注射液
盐酸去甲万古霉素
安灭菌 吉姆欣 β -七
叶皂甙钠 骨苓通痹丸

世保扶

成人钙尔奇 小儿钙尔奇
咀嚼片 成人善存片
小儿善存片 倍美力

斯奇康

峰龄胶囊

痛血康 蕲蛇酶注射液
炎迪宁

美舒咳 脑神 妇神

百仙妇炎清

疏风活络片

汕头经济特区鮑滨制药厂

汕头医药采购供应站医药推广部

山东天达药业有限公司

长春达兴药业股份有限公司

扬州制药厂

湖南吉星药业有限公司

海南际中药业科技开发公司

德国基诺药厂

武汉滨湖制药厂

浙江奥托康制药集团股份有限公司

浙江医药股份有限公司新昌制药厂

黑龙江格安特制药有限公司

兰索拉唑

苏罗同 可利美特 活性

钙泡腾片 美士灵

盖世龙

盖福润胶囊

协达利 复皆舒 颈痛灵

联环尔定

洁茵王

特乐定 维骨力

思美泰

第孚 赛孚 派孚

胎宝 阿奇霉素 金泉胃

炎胶囊 帕米麟酸二钠

塞普胶囊 硫酸西索米星

氟吗西尼 智必查

来立信

苦参总碱片

目 录

一、抗微生物感染药物

安灭菌(1) 优立新(3) 美士灵(5) 悉能(7) 硫酸西
索米星(9) 维宏(10) 阿奇霉素(10)(11) 利迈先(13)
克林霉素磷酸酯(14) 盐酸去甲万古霉素(17) 世保扶(19)
盐酸洛美沙星(21) 来立信(23) 赛孚(24) 一休凡安(26)
第孚(27) 大扶康(28) 莪术油葡萄糖(31)

二、解热镇痛及抗风湿药

戴芬(32) 塞普胶囊(33) 利君风痛宁(34) 骨苓通痹
丸(35) 炎迪宁(36) 痛血康(36) 疏风活络片(38) 颈痛
灵(38)

三、精神及神经系统药物

优克(40) 左洛复(41) 黛安神(43) 氟吗西尼(45)
脑神(46)

四、心血管系统药物

司乐平(48) 弥心平(49) 联环尔定(51) 益络平(53)
薪蛇酶注射液(54) 血竭(56) 利君舒络片(57) 苦参总
碱片(58)

五、沁尿系统药物

保前列(60) 益肾灵(61)

六、呼吸系统药物

兰勃素(63) 美舒咳(64) 藏咳喘(65) 芩暴红止咳颗粒(66)

七、消化系统药物

康胃素(67) 兰索拉唑(68) 思美泰(69) 盖世龙(70) 欣洛维(72) 疗尔健(73) 促肝细胞生长素颗粒剂(74) 利肝乐(75) 给尔安(76) 善素高(76) 六味能消胶囊(77) 金泉胃炎胶囊(78)

八、血液系统药物

吉派啉(80)

九、激素、内分泌及有关药物

优甲乐(82) 瑞怡宁(84) 倍美力(88) 盖福润(90)

十、妇科用药

洁茵王(92) 复皆舒(93) 新生化冲剂(93) 妇神(94) 益肾补骨口服液(95) 百仙妇炎清(96)

十一、免疫系统药物

斯奇康(98) 峰龄胶囊(99) 素尔松(100) 胎宝胶囊(101)

十二、抗肿瘤及辅助药物

保尔佳(103) 高聚金葡素(104) 华北吉姆欣(105) 苏罗同(106) 帕米膦酸二钠注射液(108)

十三、抗过敏药物

安可来(110)

十四、营养药物及无机盐补充剂

善存片(112) 小儿善存片(113) 可维加(113) 钙尔奇(114) 钙尔奇咀嚼片(115) 协达利(116) 活性钙泡腾片(116)

十五、解毒药

金尔伦(118)

十六、外用药

施力柔(120) 九华痔疮栓(121) 尤卓尔(122) 中华烫疮奇油(122) 派孚(124)

十七、其他

可利美特(126) 维骨力(127) β -七叶皂甙钠(128)
谷康泰灵(130) 邦得林(131) 特乐定(132) 固邦(133)
智必查(135) ✓

一 抗微生物感染药物

安灭菌(捧酸强化羟氨苄青霉素)

AUGMENTIN

【制剂】 静脉注射粉针剂 1.2g/瓶(含 1g 羟氨苄青霉素和 200mg 捧酸)

片剂 375mg/片(含 250mg 羟氨苄青霉素和 125mg 捧酸)

【作·】 本品是由羟氨苄青霉素和 β -内酰胺酶抑制剂捧酸复合而成的超广谱抗生素,其中捧酸抑制并破坏大多数的 β -内酰胺酶,从而使羟氨苄青霉素迅速而又完全地发挥其杀菌作用。可杀灭临床上许多重要的产生 β -内酰胺酶的致病菌,如:金葡菌、大肠杆菌、流感嗜血杆菌、克雷伯氏肺炎杆菌、卡他布兰汉氏球菌、奇异变形杆菌、脆弱拟杆菌等多种需氧菌和厌氧菌。

临床适用于可用抗生素治疗的各类常见细菌感染,包括:上呼吸道感染 如:鼻窦炎、扁桃体炎、中耳炎;

下呼吸道感染 如:急、慢性支气管炎、大叶性肺炎和支气管肺炎、脓胸、肺脓肿;

皮肤及软组织感染 如:疖-脓肿、蜂窝组织炎、伤口感染、腹内脓毒症。

生殖、泌尿道感染 如:膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎、脓毒性流产、产后脓毒症、盆腔感染、软下疳、淋病;

其他感染 如：骨髓炎、败血症、腹膜炎、手术后感染；
静脉注射安灭菌也可用于预防大型手术过程中引致的感染 如：肠胃手术、盆腔、头和颈部、心脏、肾、胆道及关节置换手术等。

【用·】 成人及 12 岁以上儿童：

1. 静脉注射/输注 每 8 小时 1.2g，严重感染给药频率可提高到每 6 小时 1.2g。静脉注射时，1.2g 本品用 20ml 生理盐水稀释必须在 20 分钟内使用。静脉输注时，1.2g 本品用 50—100ml 生理盐水稀释滴注 30 分钟。

2. 口服，每 8 小时 375mg。

儿童：

1. 静脉注射/输注 3 个月—12 岁：每 8 小时 30mg/kg 体重；严重感染，每 6 小时 30mg/kg 体重。

0—3 个月儿童：早产婴儿及足月新生儿每 12 小时 30mg/kg 体重，以后可提高至每隔 8 小时一次。

2. 口服：25—50mg/kg 体重/日，治疗开始时，可静注给药，然后继续口服。

【副·】 少数患者可见恶心、呕吐、腹泻等，对症治疗后可继续给药。偶见荨麻疹和麻疹样皮疹，严重时应停止使用本品，少数患者可见暂时性肝功能异常，文献报导个别患者注射部位出现静脉炎。

【注·】 1. 使用本品过程中，观察到某些患者的肝功能有些变化，尽管不能确定这些变化的临床意义，但严重肝功能障碍患者，静注本品仍应谨慎。

2. 妊娠及哺乳期不推荐使用本品，尤其在妊娠头三个月。

3. 用于外科手术预防感染的剂量,手术过程少于1小时的成年患者,在诱导麻醉时静脉给药 1.2g 可获满意结果,更长时间的手术过程需要追加 1.2g 静注(24 小时内直至 4 个剂量),手术过程已显示感染危险性增加,可给药多天,手术时已知有感染症状者,须在手术后给予一般的静脉注射或口服安灭菌治疗。

4. 肾衰竭患者的剂量可根据肌酸酐清除率作适当调整。

5. 本品治疗超过 14 天而未作检验,则不应再延续使用。

6. 青霉素过敏病人禁用。

【相·】 1. 本品不可与葡萄糖、葡聚糖、酸性碳酸盐的溶液混合;

2. 本品不可和血液制品、含蛋白质液体、静注乳化脂肪混合。

【生产厂家】 华北制药股份有限公司

【经销公司】 湖南省制药工业公司新特药部

【参考价格】 (零售价) 55.00 元/支

优立新

Unasyn

【制剂】 注射剂:舒巴坦/氨苄青霉素 750mg/支

片剂:舒他西林甲苯磺酸盐 375mg/片

【作·】 本品为氨苄青霉素和舒巴坦组成,这种最佳组合,能产生出协同的抗菌效果及扩大抗菌谱,克服了细菌由于 β -内酰胺酶而产生的耐药,显示出独特的杀菌作用,对妇科感染常见菌发挥出强大的抗菌活性,特别是厌氧菌、金葡菌、

肠球菌、临床用于敏感细菌引起的感染。典型适应症为鼻窦炎、中耳炎与会厌炎等上、下呼吸道感染；细菌性肺炎、尿道感染与肾盂肾炎；腹膜炎、胆囊炎、子宫内膜炎与盆腔蜂窝组织炎等腹腔感染；细菌性败血症；皮肤、软组织感染、骨骼与关节感染与淋病感染。

【用·】 静注或肌注：

成人 根据感染程度 1.5g—12g/日。

儿童 150mg/公斤体重/日，每8或6小时一次。新生儿每12小时一次。

手术预防感染，麻醉诱导期1.5—3.0g。如需要以后每6—8小时重复一次，直至24小时。

无合并症淋病，1.5g 单次肌注，同时口服1g 丙磺舒。

口服：成人 375—750mg/次，每日2次。

儿童 50mg/公斤体重/日，分两次服用。

无合并症淋病，顿服2.25g，加服1g 丙磺舒。

【副·】 1. 肌注部位疼痛，静脉注射后，少数病人可能患静脉炎。

2. 胃肠道反应，以恶心、呕吐与腹泻为常见。

3. 皮肤及皮肤组织，以皮疹、搔痒与其他皮肤反应为常见。

4. 造血及淋巴系统，曾有贫血、血小板减少，嗜曙红细胞增多与白细胞减少的报告，停药后可逆转。

5. 肝脏曾发现丙氨酸与天冬氨酸转氨酶数值的短暂升高。

【注·】 本品禁用于对任何青霉素有过敏既往史的患者。

【生产厂家】 辉瑞制药有限公司

【经销公司】 湖南省医药公司进出口部

湖南省医药销售公司

【参考价格】 (零售价) 52.00 元/瓶 (针剂)

115.00 元/瓶 (片剂)

美士灵(头孢米诺钠)

Meicelin, Cefminox sodium

【制剂】 粉针剂 0.5g/支, 1.0g/支

【作·】 本品为头霉素衍生物, 抗菌谱与第三代头孢菌素相近, 临床用于敏感菌引起的败血症、扁桃体炎、扁桃体周围脓肿、支气管炎、细支气管炎、支气管扩张症(感染时), 慢性吸收道疾患继发感染、肺炎、肺化脓症、肾盂肾炎、膀胱炎、胆囊炎、胆管炎、腹膜炎、盆腔腹膜炎、子宫附件炎、子宫内感染、盆腔死腔炎、子宫旁结缔组织炎。

本品具有下列特点:

1. 双重作用形成的多数球状突起, 显示很强的杀菌作用。

2. 血中半衰期为约 2.5 小时, 持续性优越, 女性生殖器、腹水等各组织内分布良好。

3. 不仅对细菌增殖期, 对稳定期初期也发挥杀菌作用。

4. 包括厌氧菌在内的抗菌谱, 且对 β 内酰胺酶稳定。

【用·】 静注或静滴

成人 通常每日 2g, 分 2 次静注或静滴。

小儿 每次 20mg/kg, 3—4 次/日。

随年龄及症状适量增减。败血症、难治性或严重感染症，成人可将一日量增至 6g，分 3—4 次给药。

【副·】 1. 偶可致过敏、皮疹、发热等，也可致休克。

2. 可致肾损害，如血尿素氮、血肌酐值上升，蛋白尿、少尿等。

3. 肌酐、血胆红素升高、黄疸。

4. 消化道症状。

5. 二重感染，维生素 K、B 缺乏症，以及全身乏力感等。

6. 静脉内大量给药，可能引起血管痛，静脉炎。

【注·】 1. 因可能引起休克，应作好急救处置的准备。

2. 饮酒可能引起颜面潮红、心悸、眩晕、头痛、恶心等，故用药期间及用药后至少 1 周避免饮酒。

3. 对本剂成份或头孢菌素类抗生素有过敏症既往史患者原则上为禁忌症。

4. 过敏体质，严重肾功能损害患者，经口摄入不足患者或非经口维持营养者，全身状态不良患者、高龄患者慎用。

5. 尚未确立妊娠用药和新生儿、早产儿用药的安全性。

6. 对临床检验值的影响：

用雅费氏反应进行肌酐检查时，表观肌酐值可能升高，直接库姆斯氏试验，可能是阳性。

7. 本品不得仅溶于注射用水(溶液不呈等张)静点。

8. 溶解后应尽快使用，室温保持应在 12 小时以内，冰箱保存应在 24 小时以内使用。

9. 为预防血管痛、静脉炎，应充分注意注射液的调制，注射部位及注射方法等并尽量缓慢注射。

【相·】 1. 与氨茶碱、磷酸吡哆醛配伍，会降低效价或

着色,故不得配伍。

2. 与呋喃硫胺、硫辛酸、氢化可的松琥珀酸钠及腺苷钴胺配伍,会经时着色,故配伍后尽快使用。

3. 与利尿剂(呋喃苯胺酸)合用有可能增强肾毒性。

4. 动物实验证实,本剂影响酒精代谢,使血中乙醛浓度上升,显示双硫醒样作用。

【生产厂家】 日本明治制药株式会社

【经销公司】 广东省汕头医药采购供应站直销

1392729511

【参考价格】 (零售价) 170.20 元/1g/支

悉能(硫酸依替米星注射液)

XI NENG, Etimicin Sulfate Injection

【制剂】 注射剂 5 万 u/1ml 10 万 u/2ml

【作·】 本品系半合成水溶性抗生素,属氨基糖甙类,是国内自行开发的国家一类新药,为近乎完美的氨基糖甙类换代产品,具有以下特点:

1. 抗菌谱广,抗菌活性强。

2. 抗交叉耐药性好,对其他各类抗生素,如庆大霉素、小诺米星、头孢唑啉等耐药菌仍有较强的抗菌作用。

3. 安全可靠,为目前氨基糖甙类药品中耳、肾毒性最低者。

4. 有抗生素后效应。

临床适用于对其敏感的大肠杆菌、克雷伯氏肺炎杆菌、沙雷氏杆菌属、枸橼酸杆菌、肠杆菌属、不动杆菌属、变形杆菌