




姚四新 魏刚才 主编

卫生、消毒和防疫手册

猪场



ZHUCHANG WEISHENG XIAODU
HE FANGYI SHOUC



化学工业出版社

姚四新 魏刚才 主编

卫生、消毒和防疫手册

猪场



ZHUCHANG WEISHENG XIAODU
HE FANGYI SHOUC



化学工业出版社

· 北京 ·

32.00元 份 宝

图书在版编目 (CIP) 数据

猪场卫生、消毒和防疫手册/姚四新, 魏刚才主编.
北京: 化学工业出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-122-22743-0

I. ①猪… II. ①姚…②魏… III. ①养猪场-消毒-
技术手册②猪病-防疫-技术手册 IV. ①S858.28-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 007145 号

责任编辑: 邵桂林
责任校对: 吴 静

文字编辑: 焦欣渝
装帧设计: 孙远博

出版发行: 化学工业出版社
(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京永鑫印刷有限责任公司

装 订: 三河市宇新装订厂

850mm×1168mm 1/32 印张 10 $\frac{1}{4}$ 字数 303 千字

2015 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 姚四新 魏刚才

副主编 秦百众 王 凯 李晓昕

编写人员(按姓名笔画排序)

王 凯 (河南省辉县市畜牧局)

齐红霞 (河南省辉县市峪河镇政府)

李天丽 (河南省济源市动物卫生监督所)

李晓昕 (河南省辉县市畜牧局)

姚四新 (河南科技学院)

秦百众 (平舆县动物卫生监督所)

路延豪 (汝州市畜牧技术推广站)

魏刚才 (河南科技学院)

编 者

2015年1月

前 言

养猪生产在畜牧业中占有重要的比重，猪肉不仅是我国人民主要的肉食品，而且养猪业也肩负着繁荣经济、富裕农民的重任。所以，我国对养猪业十分重视，国家出台了一系列稳定养猪生产的措施和扶持政策。虽然市场有较大波动，养殖效益有好有坏，但总体来说，养猪业是畜牧业中养殖效益较好和较为稳定的产业，成为人们创业致富的一个好途径。但随着养猪业的规模化、集约化程度越来越高，疾病特别是疫病的危害也越来越严重，直接影响到养猪业稳定持续发展和猪场效益提高。有效疫病控制必须树立“防重于治”“养防并重”的观念，做好隔离卫生、消毒和免疫接种等基础工作。为此，组织有关专家编写了本书。

本书全面系统地介绍了猪场隔离卫生、消毒和免疫接种的基本知识和技术，并介绍了猪场的主要疫病及防治方法，具有较强的针对性、实用性和可操作性，为控制猪场疫病提供技术支持。本书不仅适宜于猪场的经营者、饲养管理人员、技术人员等阅读，也可以作为大专院校和农村函授及培训班的辅助教材和参考书。

由于编者水平有限，书中难免会存在不当之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2015 年 1 月

第三章 猪场的消毒

第一节 消毒的种类

一、预防消毒

二、紧急消毒

三、终末消毒

目 录 CONTENTS

第一章 概述	1
第一节 猪场疫病的类型特点、现状及危害	1
一、猪场疫病的类型特点	1
二、疫病的现状	8
三、疫病的危害	11
第二节 猪场疫病的控制策略	12
一、注重饲养管理	12
二、加强生物安全	12
第二章 猪场的隔离卫生	14
第一节 完善猪场的隔离卫生设施	14
一、场址选择	14
二、规划布局	17
三、猪舍的设计	22
四、养猪场常用设备	25
第二节 加强猪场的卫生	32
一、猪场的水卫生	32
二、猪场的饲料卫生	42
三、猪场的空气卫生	63
四、猪场的灭鼠和杀虫	66
五、猪场废弃物的处理	76
第三节 猪场的驱虫	79
一、驱虫药的选择	79
二、驱虫药物使用方法	81
三、驱虫时注意事项	83
第三章 猪场的消毒	85
第一节 消毒的种类	85
一、预防消毒	85
二、紧急消毒	85
三、终末消毒	85

第二节 消毒的方法	86
一、物理消毒法	86
二、化学消毒法	101
三、生物消毒法	134
第三节 消毒程序	136
一、猪场环境消毒	136
二、人员的消毒	144
三、设备的消毒	145
四、饮水系统及饮水消毒	146
五、垫料消毒	146
六、粪便的消毒	147
七、尸体的消毒	147
八、兽医诊疗室的消毒	147
九、发生传染病时的消毒	149
第四节 消毒效果检查和评价	153
一、物理消毒法消毒效果的检测与评价	153
二、化学消毒剂消毒效果的评价	156
第五节 提高消毒效果的措施	163
一、加强隔离和卫生管理	164
二、制订和严格执行消毒计划	164
三、选择适当的消毒方法	164
四、选择适宜的消毒剂	165
五、保持清洁卫生	167
六、正确的操作	168
七、消毒后的废水处理	174
第四章 猪场的免疫接种	175
第一节 疫苗种类及常用疫苗	175
一、疫苗的种类及其特点	175
二、猪场常用的疫苗	183
第二节 疫苗的基本要求及管理	208
一、疫苗的基本要求	208
二、疫苗的运输和保存	208
三、疫苗的应用及注意事项	210

第三节 免疫接种途径	215
一、肌肉注射	215
二、皮下注射	216
三、交巢穴注射	217
四、滴鼻接种	217
五、喷雾	218
六、口服	218
第四节 免疫接种程序	218
一、免疫接种程序	218
二、影响免疫程序的因素	219
三、参考免疫程序	220
第五节 免疫效果的检测和评价	224
一、免疫效果检测的意义	224
二、免疫监测的主要方法	225
三、疫苗免疫效果的评价	226
第六节 免疫接种后的异常反应及控制措施	227
一、免疫接种的不良反应类型	228
二、动物疫苗接种后不良反应的主要表现	229
三、免疫接种发生不良反应的原因	230
四、免疫接种发生不良反应的危害	232
五、免疫接种不良反应的控制	234
第七节 提高免疫效果的措施	238
一、注重疫苗的选择和使用	238
二、增强猪体的免疫能力	239
三、正确的接种操作	242
四、注意疫苗之间的干扰作用	243
五、避免药物干扰	244
六、保持良好的环境条件	244
第五章 常见疫病的控制	245
第一节 传染病	245
一、病毒性传染病	245
二、细菌性传染病	267
第二节 寄生虫病	294

218	一、原虫病	294
218	二、蠕虫病	295
218	三、体外寄生虫病	300

附录 301

218	一、畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程	301
818	(GB 16548—2006)	301
818	二、畜禽场环境质量标准 (NY/T 388—1999)	304
818	三、畜禽养殖污染防治管理办法	308
218	四、畜禽养殖业污染防治技术规范 (HJ/T 81—2001)	311

参考文献 316

288		147
138		148
138		149
238		150
238		151
238		152
238		153
238		154
238		155
238		156
238		157
238		158
238		159
238		160
238		161
238		162
238		163
238		164
238		165
238		166
238		167
238		168
238		169
238		170
238		171
238		172
238		173
238		174
238		175
238		176
238		177
238		178
238		179
238		180
238		181
238		182
238		183
238		184
238		185
238		186
238		187
238		188
238		189
238		190

第一章 概述

第一节 猪场疫病的类型特点、现状及危害

一、猪场疫病的类型特点

由寄生虫和病原微生物引起的，并具有传染性的疾病统称为疫病。疫病可以分为传染病和寄生虫病。

(一) 传染病

由致病性细菌、病毒、霉形体、真菌等病原微生物侵袭机体引起猪发生疾病。凡是由病原微生物引起，具有一定的潜伏期和临床表现，且具有传染性的疾病称为传染病。传染病的表现虽然多种多样，但亦具有一些共同特性，即每一种传染病都有其特异的致病性微生物存在。如猪瘟是由猪瘟病毒引起的，没有猪瘟病毒就不会发生猪瘟；从传染病病猪体内排出的病原微生物，侵入另一有易感性的健康猪体内，能引起同样症状的疾病。这类使疾病从病猪传染给健康猪的现象，就是传染病与非传染病相区别的一个重要特征。当条件适宜时，在一定时间内，某一地区易感动物群中可能有许多动物被感染，致使传染病蔓延散播，形成流行；在传染发展过程中由于病原微生物的抗原刺激作用，机体发生免疫生物学的改变，产生特异性抗体和变态反应等。这种改变可以用血清学方法等特异性反应检查出来；动物耐过传染病后，在大多数情况下均能产生特异性免疫，使机体在一定时期内或终生不再感染该种传染病；大多数传染病都具有该种病特征性的综合症状和病程经过，并有一定的潜伏期。根据上述这些特性，可将传染病与其他非传染病相区别。这类疾病的特点是具有明显的传染性，往往引起大批猪只发病，甚至死亡，生产性能受到严重影响，从而造成巨大损失。

病原微生物侵入动物机体，并在一定的部位定居、生长繁殖，从

而引起机体一系列的病理反应，这个过程称为感染。病原微生物在其物种进化过程中形成了以某些动物的机体作为生长繁殖的场所，营寄生生活，并不断侵入新的寄生机体，亦即不断传播的特性。这样其物种才能保持下来，否则就会被消灭。而猪为了自卫形成了各种防御机能以对抗病原微生物的侵犯。在感染过程中，病原微生物和猪机体之间的这种矛盾运动，根据双方力量的对比和相互作用的条件不同而表现不同的形式：当病原微生物具有相当的毒力和数量，而猪机体的抵抗力相对比较弱时，猪机体在临床上出现一定的症状，这一过程就称为显性感染；如果侵入的病原微生物定居在某一部位，虽能进行一定程度的生长繁殖，但猪不呈现任何症状，亦即猪与病原体之间的斗争处于暂时的、相对的平衡状态，这种状态称为隐性感染。处于这种情况下的猪称为带菌者。健康带菌是隐性感染的结果，但隐性感染是否造成带菌现象须视具体情况而定；病原微生物进入猪机体，若猪机体的条件不适合于侵入的病原微生物生长繁殖，或猪机体能迅速动员防御力量将该侵入者消灭，从而不出现可见的病理变化和临床症状，这种状态就称为抗感染免疫。换句话说，抗感染免疫就是机体对病原微生物的不同程度的抵抗力。猪对某一病原微生物没有免疫力（亦即没有抵抗力）称为有易感性。病原微生物只有侵入有易感性的机体才能引起感染过程。

感染和抗感染免疫是病原微生物和机体斗争过程的两种截然不同的表现，但它们并不是互相孤立的，感染过程必然伴随着相应的免疫反应，二者互相交叉、互相渗透、互相制约，并随着病原微生物和机体双方力量对比的变化而相互转化，这就是决定感染发生、发展和结局的内在因素。了解感染和免疫的发生、发展的内在规律，掌握其转化的条件，对于控制和消灭传染病具有重大意义。

1. 传染病流行过程的三个基本环节

传染病的传播，必须具备三个基本环节：传染源、传播途径和易感猪群。这三个环节只有同时存在并相互联系时，才会造成传染病的发生和蔓延，缺少其中任何一个环节，传染病都不能流行和传播。如果了解传染病流行过程的基本条件、影响因素，有利于采取有效措施，减少传染病的发生。

（1）传染源（传染来源）——是指某种传染病的病原体在其中寄

居、生长、繁殖，并能排出体外的动物机体。具体来说，传染源就是受感染的动物，包括传染病病猪和带菌（毒）动物。动物受感染后，可以表现为患病和携带病原两种状态，因此传染源一般可分为两种类型。

① 患病动物 病猪是重要的传染源。不同病期的病猪，其作为传染源的意义也不相同。前驱期和症状明显期的病猪因能排出病原体且具有症状，尤其是在急性过程或者病程加剧阶段可排出大量毒力强大的病原体，因此作为传染源的作用也最大。潜伏期和恢复期的病猪是否具有传染源的作用，则随病种不同而异。病猪能排出病原体的整个时期称为传染期。不同传染病传染期长短不同，各种传染病的隔离期就是根据传染期的长短来制订的。为了控制传染源，对病猪原则上应隔离至传染期終了为止。

② 病原携带者 病原携带者是指外表无症状但携带并排出病原体的动物。病原携带者是一个统称，如已明确所带病原体的性质，也可以相应地称为带菌者、带毒者、带虫者等。病原携带者排出病原体的数量一般不及病猪，但因缺乏症状不易被发现，有时可成为十分重要的传染源，如果检疫不严，还可以随动物的运输散播到其他地区，造成新的暴发或流行。病原携带者一般分为潜伏期病原携带者、恢复期病原携带者和健康病原携带者。潜伏期病原携带者指感染后至症状出现前即能排出病原体的动物。在这一时期，大多数传染病不能起传染源的作用，但有少数传染病在潜伏期后期能够排出病原体。恢复期病原携带者指在临床症状消失后仍能排出病原体的动物。一般来说，这个时期的传染性已逐渐减少或已无传染性了，但还有不少传染病等在临床痊愈的恢复期仍能排出病原体。健康病原携带者指过去没有患过某种传染病但却能排出该种病原体的动物。

另外，还应该注意疫源地。在发生传染病的地区，不仅是病猪和带菌者散播病原体，所有可能已接触病猪的可疑猪群和该范围以内的环境、饲料、用具和猪舍等也有病原体污染。这种有传染源及其排出的病原体存在的地区称为疫源地。疫源地具有向外传播病原的条件，因此可能威胁其他地区的安全。疫源地除包括传染源（传染源仅仅是指带有病原体和排出病原体的温血动物）之外，还包括被污染的物体、房舍、牧地、活动场所，以及这个范围内怀疑有被传染的可疑动

物群和宿主等。所以，在防疫方面，对传染源要进行隔离、治疗和处理；而对疫源地除采取以上措施外，还应包括污染环境的消毒，杜绝各种传播媒介、防止易感动物感染等一系列综合措施。其目的在于阻止疫源地内传染病的蔓延和杜绝向外散播，防止新疫源地的出现，保护广大的受威胁区和安全区。

(2) 传播途径 病原体由传染源排出后，经一定的方式再侵入其他易感动物所经的途径称为传播途径。研究传染病传播途径的目的在于切断病原体继续传播的途径，防止易感动物受传染，这是防治猪传染病的重要环节之一。

① 直接接触传播 是在没有任何外界因素的参与下，病原体通过被感染的动物（传染源）与易感动物直接接触（交配、咬斗等）而引起的传播方式。仅能以直接接触而传播的传染病，其流行特点是一个接一个地发生，形成明显的链锁状。这种方式使疾病的传播受到限制，一般不易造成广泛的流行。

② 间接接触传播 必须在外界环境因素的参与下，病原体通过传播媒介使易感动物发生传染的方式，称为间接接触传播。从传染源将病原体传播给易感动物的各种外界环境因素称为传播媒介。传播媒介可能是生物（媒介者），也可能是无生命的物体（媒介物）。大多数传染病如流感、猪瘟等以间接接触为主要传播方式，同时也可以通过直接接触传播。两种方式都能传播的传染病也可称为接触性传染病。

间接接触一般经空气（飞沫、尘埃）、污染的饲料和水、污染的土壤、活的媒介物〔昆虫（如蚊、库蠓、蝇、蜚等）、野生动物、人类〕以及由于兽医体温计、注射针头和其他器械的消毒不严而传播。

(3) 易感猪群 该地区猪群中易感个体所占的百分率和易感性的高低，直接影响到传染病是否能造成流行以及疫病的严重程度。猪的易感性高低与病原体的种类和毒力强弱有关，但起决定作用的还是猪体的遗传特征、疾病流行之后的特异免疫等因素。同时，外界环境条件如气候、饲料、饲养管理卫生条件等因素也都可能直接影响到猪群的易感性和病原体的传播。

① 内在因素 不同品种或品系的猪，对传染病抵抗力存在差别，这往往是由遗传因素决定的，这也是抗病育种的结果。

② 外界因素 各种饲养管理因素包括饲料质量、猪舍卫生、粪便处理、拥挤、饥饿、断水以及隔离检疫等，都是与疫病发生有关的重要因素。

③ 特异免疫状态 在某些疾病流行时，猪群中易感性最高的个体易死亡，余下的猪或已耐过，或经过无症状传染，都获得了特异免疫力。所以在发生流行之后该地区猪群的易感性降低，疾病停止流行。此种免疫的猪所生的后代常有先天性被动免疫，在幼龄时期也具有一定的免疫力。猪免疫性并不要求猪群中的每一个成员都是有抵抗力的，如果有抵抗力的猪比例高，一旦引进病原体后出现疾病的危险性就较小，通过接触可能只出现少数散发的病例。因此，发生流行的可能性不仅取决于猪群中有抵抗力的个体数，而且也与猪群中个体间接触的频率有关。一般如果猪群中有70%~80%是有抵抗力的，就不太可能发生大规模的暴发流行。这个事实可以解释为什么通过免疫接种猪群常能获得良好的保护，尽管不是100%的易感动物都进行了免疫接种，或是应用集体免疫后不是所有动物都获得了免疫力。当新的易感动物引入猪群时，猪群免疫力的水平可能会出现变化，这些变化使猪群免疫性逐渐降低甚至引起流行。

2. 流行过程的表现形式

在猪传染病的流行过程中，根据在一定时间内发病率的高低和传播范围的大小（即流行强度），可区分为散发性、地方流行性、流行性和大流行性几种类型。散发性传染病指发病数目不多，并且只在一段较长的时期里个别地零星地散在发生。地方流行性传染病指小规模流行的猪传染病。流行性传染病指在一定时期内一定猪群出现比寻常为多的病例。大流行性传染病是一种规模非常大的传染病，流行范围可扩大至全国，甚至可涉及几个国家或整个大陆。

3. 流行过程的季节性和周期性

(1) 季节性 某些猪传染病经常发生于一定的季节，或在一定的季节出现发病率显著上升的现象，称为流行过程的季节性。出现季节性的原因，主要有下述几个方面：一是季节对病原体在外界环境中存在和散播的影响。夏季气温高，日照时间长，这对那些抵抗力较弱的病原体在外界环境中的存活是不利的。例如炎热的气候和强烈的日光曝晒，可使散播在外界环境

中的病毒很快失去活力，因此，病毒病的流行一般在夏季减缓和平息。

二是季节对活的传播媒介的影响。夏秋炎热季节，蝇、蚊、库蠓类等吸血昆虫大量滋生，活动频繁，凡是能由它们传播的疾病，都较易发生，如猪的副红细胞体病等。

三是季节对猪活动和抵抗力的影响。季节变化，主要是气温和饲料的变化，对猪抵抗力有一定影响，这种影响对于由条件性病原微生物引起的传染病尤其明显。如在寒冬或初春，容易发生某些呼吸道传染病等。寒冷季节突然的寒流容易引起传染性胃肠炎的发生。

(2) 周期性 某些传染病经过一定的间隔时期（常以数年计），还可能表现再度流行，这种现象称为传染病的周期性。在传染病流行期间，易感猪除发病死亡或淘汰以外，其余由于患病康复或隐性感染而获得免疫力，因而使流行逐渐停息。但是经过一定时间后，由于免疫力逐渐消失，或新的一代出生，或引进外来的易感猪，使猪群易感性再度增高，结果可能重新暴发流行。由于猪每年更新或流动的数目很大，传染病可以每年流行，周期性一般并不明显。

4. 传染病的发展阶段

(1) 潜伏期 由病原体侵入机体并进行繁殖时起，直到疾病的临床症状开始出现为止，这段时间称为潜伏期。不同的传染病其潜伏期的长短常常是不相同的，就是同一种传染病的潜伏期长短也有很大的变动范围。这是由于不同的动物种属、品种或个体的易感性是不一致的，病原体的种类、数量、毒力和侵入途径、侵入部位等情况也有所不同而造成的差异，但相对来说还是有一定的规律性。例如猪瘟病毒潜伏期 3~5 天，最短 2 天，最长 15 天。一般来说，急性传染病的潜伏期差异范围较小；慢性传染病以及症状不很显著的传染病其潜伏期差异较大，常不规则。同一种传染病潜伏期短的，疾病经过常较严重；反之，潜伏期长，病程亦常较轻缓。从流行病学的观点看来，处于潜伏期中的动物之所以值得注意，主要是因为它们可能是传染源。

(2) 前驱期 是疾病的征兆阶段，其特点是临床症状开始表现出来，但该病的特征性症状仍不明显。从多数传染病来说，这个时期仅可察觉出一般的症状，如体温升高、食欲减退、精神异常等。各种传染病和各个病例的前驱期长短不一，通常只有数小时至 1~2 天。

(3) 明显期(发病期) 前驱期之后,病的特征性症状逐步明显地表现出来,是疾病发展到高峰的阶段。这个阶段因为很多有代表性的特征性症状相继出现,在诊断上比较容易识别。

(4) 转归期(恢复期) 病原体和动物体这一对矛盾,在传染过程中依据一定条件,各向着其相反的方面转化。如果病原体的致病性增强,或动物体的抵抗力减退,则传染过程以动物死亡为转归。如果动物体的抵抗力得到改进和增强,则机体便逐步恢复健康,表现为临床症状逐渐消退,体内的病理变化逐渐减弱,正常的生理机能逐步恢复。机体在一定时期保留免疫学特性,在病后一定时期内还有带菌(毒)排菌(毒)现象存在,但最终病原体可被消灭。

传染病的病程长短决定于机体的抵抗力和病原体的致病力等因素,同一种传染病的病程并不是一成不变的,一个类型常易转变为另一个类型。例如急性或亚急性传染性喉气管炎可转变为慢性经过;反之,慢性亦可以转为急性。

(二) 寄生虫病

在两种生物之间,一种生物夺取另一种生物体内的营养,并造成其不同程度的危害的现象,称为“寄生生活”。这种寄生生活的动物,称为“寄生虫”。由寄生虫所引起的疾病,称为寄生虫病。被寄生虫寄生的人和动物,称为寄生虫的宿主。寄生虫病的种类很多,分布很广,常以隐蔽的方式危害畜禽的健康,不仅影响幼龄动物的生长发育,降低生产性能和产品质量,而且还可造成大批动物的死亡,给畜牧业的发展带来严重危害。

1. 寄生虫病的流行规律

猪寄生虫的传播和流行,必须具备传染源、传播途径和易感动物三个方面的条件,但还要受到自然因素和社会因素的影响和制约。

(1) 寄生虫的生活史 寄生虫的生长、发育和繁殖的全部过程称为生活史。在猪体内寄生的各种寄生虫,常常是通过猪的血液、粪、尿及其他分泌物、排泄物,将寄生虫生活史的某一个阶段(如虫体、虫卵或幼虫)带到外界环境中,再经过一定的途径侵入到另一个宿主体内寄生,不断地循环下去。

(2) 寄生虫发生和流行的条件 寄生虫发生和流行有三大条件:易感动物(各种寄生虫均有其各自的易感动物,如猪球虫病只感染于

猪)；传染源，包括病猪、带虫者、保虫宿主、延续宿主等，在其体内有成虫、幼虫或虫卵，并要有一定的毒力和数量；适宜的外界环境条件，包括温度、湿度、光线、土壤、植被、饲料、饮水、卫生条件、饲养管理、宿主的体质、年龄以及中间宿主、保虫宿主的存在等，关系都非常密切。三者缺一不可。

(3) 猪寄生虫病的感染途径 一是经口感染，这是主要途径，如球虫病、蛔虫病、绦虫病等，都是通过这条途径感染；二是经皮肤感染，感染性幼虫主动钻入宿主健康皮肤而感染，如螨虫病；三是接触感染，如外寄生虫总是通过病猪和健康猪的直接接触或通过病猪的用具、猪舍、栏具、垫草等接触而感染。

2. 外界环境因素与寄生虫的关系

寄生虫都在一定的外界环境中生存，各种环境因素必然对其产生不同的影响。有些环境条件可能适宜于某种寄生虫的生存，而另一些环境条件则可能抑制其生命活动，甚至能将其杀灭。外界环境条件及饲养管理情况，对猪的生理机能和抗病能力也有很大影响，如不合理的饲养、缺乏运动、猪舍通风换气不良、过于潮湿和拥挤、粪尿不经常清除、缺乏阳光照射等，都会降低猪的抵抗力，而有利于寄生虫的生存和传播。因此，加强饲养管理，改善环境卫生条件，对控制和消灭猪寄生虫病是十分必要的。

二、疫病的现状

(一) 病原体的多重感染

近几年来，猪病以病原体的多重感染或混合感染为主要流行形式，猪群发病往往不是以单一病原体所致疾病的形式出现，而是以两种以上的病原体相互协同作用（又称共感染）所造成的，常常导致猪群的高发病率和高死亡率，控制难度加大，危害极其严重。在多重感染中，既有病毒的混合感染，也有细菌的混合感染，还有病毒与细菌的混合感染。在病毒的混合感染中，以猪繁殖与呼吸综合征病毒、猪圆环病毒 2 型、猪伪狂犬病病毒、猪瘟病毒之间的多重感染较为严重，最常见的有猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）+猪圆环病毒 2 型（PCV2），猪繁殖与呼吸综合征病毒+猪伪狂犬病病毒（PRV），猪圆环病毒 2 型+猪伪狂犬病病毒的二重感染，此外，还有猪繁殖与呼吸综合征病毒、猪圆环病毒 2 型、猪伪狂犬病病毒之间的三重感