

衛 生 寶 鑑

四



衛 生 寶 鑑 四

羅天益 著

中華書局

叢書集成初編

衛生寶鑑四冊

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九九一年北京第一版

開本：七八七乘一〇九一毫米 三十二分之一

統一書號：ISBN 7-101-00894-1/K·367

衛生寶鑑卷十九

名方類集

元羅天益謙甫著

三原李錫齡孟熙校刊

小兒門

時氣溫疫外傷風寒

升麻葛根湯治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼

升麻

甘草

白芍藥

各十兩

葛根

十五兩

右四味剉碎每服三錢水一盞半煎八分稍熱服不以時日二三服

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澀多睡

咳嗽喘粗鼻塞清涕

人參 細辛 括萎根

茯苓 白朮 甘草

桔梗各一兩半

右七味爲末每服一錢水一小盞入薄荷三葉同煎至四分溫服如要和氣入生薑煎服不以時○一法加防風川芎各一分同煎

人參生犀散解小兒時氣壅咳嗽痰逆喘滿心忪驚悸
癲癇或癥或癲調胃進食又主一切風熱服尋常涼藥
卽瀉而減食者錢氏方

前胡

杏仁

去皮尖
炒

桔梗各五
錢

人參

甘草

炙二
錢

右爲粗末每服二錢水一煎至六分去粗溫服食後
大劑治傷風吐瀉身溫涼熱七

謂匙也應服藥多少逐方說不盡並隨時以匙加減之

錢

氏方

天麻

白附

生末一
錢半

青黛

一錢
研

蠍尾

去半錢

天竺黃

一字

烏梢蛇肉

酒浸焙末半錢

麝香

一字

硃砂

一字

右再研細和勻生蜜和成膏每服半卓角子大至一卓
子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之

五歲以上同甘露散服之

天麻防風丸治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣

痰涎不利及風溫邪熱

乾蠍

炒

白殼殼

炒各半兩

天麻

防風

人參

各一兩

硃砂

雄黃

各二錢半

麝香

一錢

甘草

二錢半

牛黃

一錢

右十味爲末蜜丸梧子大每服一丸至二丸薄荷湯化

下不以時

塗頤法治傷寒

錢氏方

麝香

研一錢

牛黃

末一字

青黛

末二字

蜈蚣

末半字

蠍尾

去毒炒末半字

薄荷

半七字

右同研勻熟棗肉劑成膏新絲上塗勻貼頤上四方可
出一指許火土炙手熱頻熨百日裏內外兒可用此塗

浴體法

錢氏方

青黛

三錢

天麻

末二錢

烏柏肉

酒浸焙末三錢

蠍尾

去毒炒

硃砂

研各半錢

白礬

三錢

麝香

一字

右七味同研勻入白礬末三錢和勻每用三錢水三碗
桃枝一握并葉五七枚同煎十沸溫熱得所浴之勿浴背上

紫霜丸治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心或大便酸臭乳食不消

代赭石

醋淬細研

赤石脂各一兩

杏仁去皮尖炒研五十粒

巴豆

去皮心出油炒研三十粒

右爲末和勻湯浸蒸餅丸如黃米大兒生三十日外可服一丸一歲至三歲可服二丸至三丸阜角子煎湯送下米飲亦得微利爲度未利再服更量虛實加減

消積丸

錢氏方

砂仁十二

十二箇

丁香九

九箇

烏梅三

三箇

巴豆

二箇去皮出油

右爲末糊丸如黍米大三歲以上三五丸以下二三丸
溫水送下無時

厚腸丸治小兒失乳以食飼之未有食腸不能克化而生
腹脹四肢瘦弱或病色無常

蕎朮

三錢炒

神麴

五分炒

大麥蘖

五分炒

橘皮

去白

半夏

湯洗

枳實

三分炒各

人參

厚朴

薑製

青皮

各二分

右爲末糊丸如麻子大每服二十九溫水送下食前服

飽食

五臟熱及肌熱

瀉青丸治肝熱生風一名瀉肝丸若班後眼有翳膜亦可

服湯使同微利爲度

錢氏方

當歸

川芎

草龍膽

羌活

山梔仁

川大黃

濕紙裹煨

防風

各等分

右爲末煉蜜丸如雞頭大每服一丸至二丸煎竹葉湯
同砂糖化下

錢氏導赤散治大人小兒小便赤澀臍下滿痛

木通

生甘草

生乾地黃

各等分

右㕮咀每服三錢水一錢竹葉少許煎至六分溫服不

以時

瀉黃散治脾熱目黃口不吮乳

一名瀉脾散
錢氏方

甘草

炙三兩

石膏

半兩

山梔仁

一兩

防風

四兩

藿香

七錢

右剉用蜜酒微炒香爲細末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服清汁無時

瀉白散治肺熱盛

一名瀉肺散
錢氏方桑白皮地骨皮各一兩

桑白皮

炒黃三兩

地骨皮

一兩

甘草

炙半兩

右爲末每服二錢水一中燶粳米百粒煎至六分食後溫服之

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱錢氏方

人參 知母

赤茯苓去皮

柴胡 甘草炙

地骨皮

半夏湯泡七次各等分

右七味爲末每服二錢水一錢生薑三片煎至六分去粗溫服食後量大小加減

生犀散治小兒骨蒸肌熱瘦憊頰赤口乾日晚潮熱夜有

盜汗五心煩熱錢氏方

生犀镑末二錢

地骨皮 赤芍藥

柴胡

乾葛各兩

甘草炙半兩

右爲粗末每服一二錢水一盞煎至七分去粗食後溫
服大小加減

雲岐子論宣風瀉白散

雲岐子云錢氏用宣風散三味俱無治風之藥惟有治風
之名合加防風一味譬如用軍先鋒辨證以大便飧泄爲
熱大便散中有結以宣風散下太過爲寒各認其寒熱而
再詳合用藥耳瀉白散三味亦無瀉肺之理合加黃連一
味爲瀉肺是也內經云肺苦氣上逆急食苦以瀉之由是
錢氏自言兼煎入臟君臣藥是包藏其法而言之也

喘促胸痺

奪命散治肺脹喘滿胸高氣急兩脇扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲嗄不鳴痰涎潮塞若不急治死在旦夕

川大黃

白牽牛

黑牽牛

各一兩半熟生半熱

大檳榔

一箇

右爲末三歲兒服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許利下涎爲度出楊氏極濟方

無價散治風熱喘促悶亂不安

辰砂

二錢半

輕粉

半錢

甘遂

一錢半熟
裹微煮焙

右爲末每服一字溫水少許滴下小油一匙抄藥在上

沈下去腳以漿水灌之立效如神

卷一百一十一
小兒急慢驚風辨

小兒急慢驚風者古無之惟曰陰陽癇所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類是也陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可誤也急驚由有熱熱卽生風又或因驚而發則目爲連劄潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起卽了了如故此急驚證也當其搐搦漸減時與鎮心治熱之劑一二服候驚勢已定須臾以藥下其痰熱利不痰熱心神安寧卽愈慢驚得於大病之餘吐瀉之後或誤取轉致

脾胃虛損風邪乘之似搐而不甚搐此名瘓癓似睡而精神慢四肢與口中氣皆冷睡中露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也

潔老人辨急慢驚風

急驚陽證小兒咳嗽痰熱積於胸膈屬少陽諸晴受病也謂熱卽生風或因聞大驚而作謂東方震卦得火氣而發搐火本不動能須風而動當用利驚丸與導赤散瀉青九地黃丸搐止服安神丸

慢驚陰證小兒吐瀉病久脾胃虛損大便下痢當去脾胃間風先以宣風散導之後用史君子九益黃散其痢卽止