

民國文獻資料叢編

近代學報  
彙刊



殷夢霞 李強 選編



國家圖書館出版社





殷夢霞、李強 選編

# 近代學報彙刊

第六十六冊

國家圖書館出版社

# 第六十六冊目錄

紹興醫藥學報星期增刊	第七十六—一〇〇號	一九二二年	.....	一
紹興醫藥學報星期增刊	第一〇一—一二五號	一九二二年	.....	二二五
紹興醫藥學報星期增刊	第一二六—一五〇號	一九二二年	.....	四三七

紹興醫藥學報社

發行

紹興醫藥學報

# 星期增刊

第七十六至一百號

# 訂 彙

紹興裘吉生編輯

## ●星刊索引

△訂購星刊者注意！

本社出版之星期增刊，已有百號，一至五十號，已再版彙訂二大本，五十一號至百號，亦已付印裝訂，不日即可竣工，惟本刊雖分門別類，無混雜之弊，然答案浩繁，不便檢查，爲此特請愛讀本刊之陳守真先生，編輯細目，詳列號數頁碼，凡查閱答案，一索即得，名曰星刊索引（一），刊印單行本，一至五十號，不日出版，每本只收印工紙費洋二角，五十一號至百號細目，名曰星刊索引（二），一俟脫稿，繼續付印，愛讀諸君，幸垂鑒焉。

## 海內外藏書家鑒

我國醫書汗牛充棟各家藏刻流通者少致日久歸於湮沒此豈先人著作時初願所及耶本社竭力搜求凡藏有各種醫藥書籍者務祈開明書目卷數版本等示知本社當出重資相求并可代爲流傳發行

紹興醫藥學報社啓



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

中華民國十年六月念六號出版

# 紹興醫藥學報星期增刊

發行所浙江紹興城中北海橋東

第七十六號  
今日計四張  
本報分發行  
各省各大書坊

**本刊價例**  
每星期一張或數張計大洋一分五厘預定全年五十五期計大洋六角如郵送加每郵費大洋五厘多定另議郵不通過之處郵費洋九五計算凡公共機關報資均收半價  
**本刊廣告例**  
百字起碼每期大洋五角連登一月八折連登一年五折不上白字照百字遞算二號字及木刻鑄版地位以字數核算封面加倍刊資亦須先惠長登大幅得以另行訂立特約

## 特別廣告

神效除痛散

夫人之疾苦惟疼痛爲最難受欲除此病必服此散無不藥到春回患者一試方知言之不謬且無論何種疼痛皆可即時立止鄙人經驗多年未可自私今特公諸病者夫乳婦姪均忌服每袋一包開水一茶杯食後一次和服五分服二次每次一包每袋大洋一角五分

◎時疫救命散

近來天時涼暖不一世人稍一不慎不拘老幼及婦女每發時疫見症咳嗽嘔吐頭疼骨痛惡寒發熱有汗(或無汗)甚則神糊語氣急鼻煽腹冷脈伏腹痛絞腸刺胸吊脚縮筋霍亂吐瀉不省人事以及山嵐瘴毒皆陰陽乖戾之氣(見紹興醫藥學報及星期增刊滬報)

等一須將此散分二次吹入鼻中小兒分四次其性利平寒熱均宜邪從口鼻吸入居其多數仍由此出內服外嗅俱有效力每瓶大人內服分兩次小兒分四次孕婦忌服此方劉吉人先生經驗多年不敢自秘特此以濟時疫之急需亦治腦寒腦熱腦漏鼻淵鼻塞鼻疔鼻茸時流穢涕等每瓶大洋二角

發行所鎮江城內五條街  
楊燧熙醫室

◎多痰者……就是癆病的初步

凡喜吃烟酒和含有刺激性的東西、其人必多痰而多嗽、初起時恒不注意、以爲多痰當作一件平常事看、可曉得多痰就是傷肺的證據、肺傷即是癆病的初步、所以多痰者速宜服除痰潤肺等藥、現在本館爲病家

◎問病者鑒

凡函向本社問病者請將詳細病狀寫明寄到「紹興城中醫藥學報社」收當即登入本刊徵求四方名家或由本社答告治法仍載本刊概不取資各處醫家自定個人收資規則與本社無涉  
紹興醫藥學報社啓

紹興醫藥學報星期增刊

第七十六號


第一頁

# 胃不消化之慘苦

## 在江西省有胃痛舊症治愈

胃不消化胃脘疼痛雖多年宿疾亦毋庸憂慮以為不治因已有治愈者作為模範也即如葛裕常君係自願將獲愈情形廣告大眾也江西新建縣署內務科主任葛君裕常先生來示云自幼身體素弱腹中起一痞塊行動疼痛有時痛不欲生之勢求醫累百盈千醫生亦不識病源均是束手無策數年以來公私交集更

新建縣內務科長



不如前竟有旦夕之憂家人四處索方未得見效幸遇友人道及如有疑難症候百藥罔效者服韋廉士大醫生紅色補丸功效頗大當向大藥房購得半打按時吞服屢見奇效二十餘載宿痼漸覺輕鬆而且飲食倍增疼痛全愈身體強健始知此丸之功實非淺鮮焉

葛裕常先生玉照

天下馳名之韋廉士大醫生紅色補丸專治由血不潔淨淡薄如水以致腦筋衰弱所起各疾凡經售西藥者均有出售或直向上海四川路九十六號韋廉士醫生藥局函購每一瓶中國大洋一元五角每六瓶大洋八元郵力在內

# 何物可食如何食之

係敝局所刊小書之名稱也其內容豐富於衛生有益如欲索要道取即須寄一明信片至以上所列地址原班送奉一本可也

楊燧熙應接通函治病規則

鄙人研究中西醫學三十餘年凡內科外科婦科幼科喉科眼科皮膚科毒門等略有心得由裘吉生君於報端創設問答一欄而外埠通函來問病者日多一日投方必效其一述明故復診斷上將病由病狀一具規則照此來函得問有缺乏今特具規則照此來函得良好完全之目的既往症有無現症何因或勞悴饑飽失常嗜酒嗜烟口腹偏好心境勞逸身體安閒苦楚肥瘦及七情中傷於何情及六淫者病有幾日所服何藥是何分量現症種種苔色二便之何脈象是何一聲明信內附郵票五分即有正確之療法奉上來信問掛號為復並註明通處空信問病概不答復倘苦學中人減收半價然必蓋有貴處教育會圖記為憑通信處鎮江城內中西醫館楊燧熙收

## 海內外藏書家鑒

中國醫書汗牛充棟各家藏刻流通者少致日久歸於湮沒此豈先人著作時初願所及耶本社竭力搜求凡藏有各種醫藥書籍者務祈開明書目卷數版本等示知本社當重資相求非可代為流傳發行者



●瓦淡鹽強酸一。○五水一○○●  
瓦愚固知硫酸鹽酸為化學工業與藥品製造上不可缺少之物然未密詳取法并苦士焉何(是取硫酸之餘渣否)其各性如何味入何經用英重量較漢秤重得若干又案中所述病名乾性脚氣與濕性衝心性三種未知據何書見證所得祈 先生不棄愚陋一一知示啓愚多矣

●問學問研究之法 張惠臣

鄉間幾位道友從來不肯討論研究暇時或賭博或吃茶或嗜烟那有看書工夫為可嘆耳余每遇看書不明白處或看症不明了處無處可問詢想進步之不易耳(下略)

●答疑義解釋之法 周鎮

看書與看症不明瞭處愚意可以摘出以別書之此證參考靜與心謀再不愜意則錄出登之紹報以求其是即令師處亦可將疑錄寄去請益必得滿意之答復

●答王君問桔梗 和縣高思潯

苦桔梗一物徽縣及含山產者每年出口約三千擔之譜價目每斤不過一錢君如欲購是物請與徽縣小西門廣和堂藥號通函接洽

●問舌症理由 前入

前月家母每於飲茶或嚥唾液後覺喉間不快初疑是藕絲或亂髮絆住咽喉後於某日飯後不快情形較前緊急經余用手術探視見舌根盡處有凸起一點遂用針子鉗取出菜滓及質極緊韌之廢皮多塊其凸點極堅固平略如板牙鉗之有聲止手術後勢雖覺鬆快而凸起之物終不能去也後來此物亦無形消去舌起此物不知是何原故此物何名尚望高明見教盼甚

●答詢一本君問小兒病之研究 汪景文

小兒為純陽之體稟陰未充肝木易動此孩稟賦堅強忽然大哭哭已陡而肢搐閉目妄叫頰紅作嘔憑症而論想必由平日感受之邪因腠理固密伏而不發留戀既久一旦有所感觸伏邪激動厥陰風陽上亢痰氣交升故見症如此

肢搐內風竄絡也閉自痰濁上蒙也妄叫邪熱擾營也頰紅虛陽上浮也作嘔痰氣上逆也症固不可謂不險然能投劑得當或可希冀萬一(愚意擬用羚羊天竺黃勾藤天麻白芍石決明旋覆花代赭石鮮蘆根山梔猴棗等以平肝熄風降逆解熱尤須審察指紋細驗舌苔以辨其邪在表在裡在氣在營酌加白虎承氣萬氏牛黃丸紫雪丹之類)十三日初醫斷為驚風進以定驚祛風之品未免失之浮泛晚間更醫謂為無熱決非驚風斷為風痰阻塞治以除痰去風止嘔之藥則又未能妥善服後夜半大解色殷紅而溏此伏熱下注大腸之象十四上午大解甚少色紫黑是實熱業已顯露該醫咬定無熱不用清劑所以十五日惡欬畢呈口張舌伸叫則首仰斯時鼻有微汗舌苔黃灰尖有紅刺陽明邪熱熏蒸厥陰風陽恣肆氣陰告匱心脾並絕縱有明手已慮桑榆難收鞭長莫及而况一味固執原方又用回春丹以佐之(此丹人皆以為治小

完全 辰丹 中華 千金丹

此三種靈藥係夏秋間必備之品能驅疫防毒專治霍亂吐瀉腹痛痢疾胃病卒倒諸痧與水土不服胃不消化諸症神效無比批發極克己經售頗有利益慈善家施送亦統照大批批發計算函詢即復 製藥發行浙紹漓若霞氏製藥廠

兒之要藥不知其性偏於辛溫投諸小兒利少弊多文屢見世俗一遇小兒感冒發熱咳嗽輒以回春丹與服非惟熱不能退甚且竄動肝風神昏癱瘓遂致不救者多矣病家不察竟為回春二字所誤殊可嘆也一宜其十六日病益加劇妄叫時多安寧時少矣是日下午又改醫言症類腦膜炎急投苦寒羚羊角等藥此醫診斷雖不甚差謬奈症勢已造極步無能為力何文謬釋病情妄加評議恐無當於高明尙請海內諸公更加研究有以指正是幸

### 治療顧問

●答胡天中君問吳笏臣君肝胃病治法

汪景文

令友貴恙 業經楊燧熙先生詳解病理 切實答復 已無餘議矣 特以胡先生猶在下問 故不揣鄙陋 就經驗所得 敬貢治法 以備明眼之采擇焉 尊問文未之見 因報社寄來星刊 為洪喬所失 今觀楊先生

答案中所列現在症狀 確係肝木犯胃 有升無降之咎 此種症煎劑往往難以奏績 請可用旋覆花 生代赭石(打) 煨瓦楞 木瓜 吳萸同炒枕白芍等藥 煎水送服將軍丹三粒 日二服 連服數日 當有效也 即平時不發 亦可間服一二粒 開水送下 (上海三馬路大舞臺對門鍊雲藥房有購每瓶一元約十二粒 每打十元蓋為該藥房所秘製究不識其何藥合成令人莫名其妙耳) 茲將此丹治愈二專 以為先生告 文戊午在梓時 (敵處黔縣) 診一黎某 其病與令友之恙相似 朝食暮吐 味酸色清 二便交阻 得吐得便 則胸腹頗暢 惟胸腕不甚痛為稍異也 纏綿床褥 已閱數月 疊經諸醫 酸苦辛溫 滋補攝納 備嘗無效 彼初以文不懸壺 未便見委 後至奄奄待斃 不得已乃轉託舍親招文赴診 竊思煎藥總不外諸醫之範圍 投之必無效力 只用旋覆

花三錢 代赭石五錢 吳萸三分同炒白芍三錢 煎汁送服將軍丹四粒 日二服 此丹文家有備存授與二瓶 僅三日而嘔止安谷 繼進調養之劑而復 敵邑又有一江姓婦 年五十餘 素來血虧肝旺 腕痛嘔吐 不時頻發 前年緣喪夫悲傷 其發益劇 直至舊春 更加雜症蜂起 或肢腫頭疼 或怔忡煩躁 遍經醫治 均不中肯 其媳之母家 乃文之隣居 歸寧時詢問治法 亦囑購將軍丹試服 服下二瓶 尙有見效 於是連服有一打之多 其病竟漸漸向愈 此皆將軍丹卓著奇績者也

●答盛子香代友問皮膚病治法 胡天中

令友婁春芳 農夫體健康 喜飲杯中物 憂發膚外瘡 工業時淋雨水氣失肌筋 初患雲斑朶 深沿風癬瘍 癢極情何受 抓破痛難當 夜作四五次 形若紫紅黃 潰出金漿色 痂成白屑光 醫士諸般治

藥餌總虛望 僕揣此證由 聊奉表  
裡方 先本火疔毒 內經曰屬陽  
乾濕二種類 脾肺兩猖狂 濕蘊微  
生植 心營熱益張 清金兼瀉土  
滲利胃苓湯 不學謬妄議 刊呈有  
道商

內服方劑

青防風二錢 飛滑石三錢 西  
生軍二錢 生粉草一錢 蒼白  
朮各二錢 赤苓皮三錢 大腹  
皮錢半(包煎) 福澤瀉三錢  
枳椇子六錢 二寶花三錢 木  
豬苓二錢 炒川連四分 夏枯  
草三錢 黃柏皮八分 焦山梔  
二錢 地膚子錢五  
右方接服二十劑 忌食椒葱韭蒜魚  
腥 嗜好要戒 愈後可飲 僕前治  
數人 與此證相仿 皆上方之效驗  
姑並詳之

外治搽藥

側柏葉五錢(炒焦) 蚯蚓泥五  
錢(韭菜田內者佳) 黃柏末

苦參 大黃末 甘草末 各  
四錢 上雄精 血餘炭 胭脂  
粉各三錢 枯礬 土硫黃 各  
四錢 外加西藥沃度仿謨 硼  
酸末 樟腦精各三錢 西藥房  
有售

右藥共研細末 用中國紅臘燭  
油溶化調勻 以舊夏布一方塊  
將藥盛入 紫緊如球 時時  
擦之 以搽到瘡愈為度

答肛門出蟲治法

▲一

常陽李振聲

閱七十一號九峰君所登肛門蟲出一  
症 確係蟻蟲無疑 此蟲形細色白  
末端彎曲 有雌雄二種 雄者體  
長分許 雌者可二三分 寄生於直  
腸或胃中 雖由食物時誤吞其卵而  
生 實因正氣虛衰 或溼熱蒸鬱而  
成 亦猶物必先腐而後蟲生之義也  
(小兒患之尤多 蓋以小兒喜食生  
物 脾胃未強故也) 既化為蟲時  
自肛門匍匐而出 令作奇癢腫痛

不得安眠 並常發腹痛 頭痛 惡  
心 嘔吐 泄瀉等症 以一月為期  
者 其發生約廿餘日一次 成蟲既  
出 幼蟲復生 常循環不已 至夜  
乃出者 因夜則人靜 養液較少  
故動則潛伏 夜則遊出也 若不早  
為之所 勢必蔓延難圖 治之之方

宜先服 珊瑚甯三五(分三次服)  
或那夫塔林五瓦(作數次一日服  
盡)以驅除之 再用 台參四錢  
白朮(東壁土炒)三錢 棟根(東引  
未出土者)五錢 烏梅(酒漬)四錢

黃柏三錢 白芍三錢 木香錢半  
蕪荑三錢等藥煎服 以善其後  
庶可除其根芽 至於衛生法 可細  
閱本刊五十三號雜錄欄 及五十四  
五十八等號顧問欄自知 是否有當  
尚乞高明教政 藉匡不逮 無任  
感激也

▲二

黃國材

據尊言之症狀 似蟻蟲也 用使君  
子去殼一兩五錢 檳榔三錢 共研

末和白糖開水調服 日三次 每次三錢 連服十日 定可斷根 若用水煎服 則不驗矣

△三

常熱張汝偉

肛門虫出 純係腸中濕熱蘊積所致 其名曰寸白虫 余幼時亦曾患此 服單味史君肉數兩而愈 山農之恙 證亦相同 可以服也

●答百三癆症並難症治法 張汝偉

七十一號星期增刊貢三先生 以乃尊之痔疾見問 偉細按情形 是素有痔血 得之傷酒 溼熱團結 蘊於大腸 下注而成者也 然則精血久瀉 脾腎亦虧 水虛則木旺 熱盛則風生 左臂之酸痛 是肝木之旺也 服風藥而鼻衄 是血中有熱也 現在之痰核 是肝家之見症 癰癤之兆也 鼻涕中時有血塊 相火旺而不能下交於腎 熱盛而風生也 右脈沉細滑數 脾中蘊積痰熱所致 左脈弦而不數 肝家之風象獨著也 舌絳 苔根膩 是濕熱之

顯著者也 體豐腴 而氣息喘促者 是肺氣亦傷也 肺與大腸相表裡 大腸之濕熱下注 而肺氣之呼吸亦阻也 鄙擬同補中益氣 助脾氣以升陽 益肺氣以化溼 合逍遙散 涵木以舒肝 解鬱以疏絡 佐以養陰泄熱之品 合成一方 乞試服之 外用薰洗之法 圍敷之方 一錄后 祈照用之 庶有效焉 煎服方

炒黨參一錢 土炒黃芪錢五 醋炒柴胡七分 綠升麻一錢 酒炒歸身錢五分 酒炒白芍錢五分 枳朮丸(包)三錢 雞內金三錢 酒炒川芎一錢 藕節炭三錢 丹皮炭三錢 地榆炭三錢 引 蓮蓬壳一個 刺蝟皮錢五分 右藥煎方服六七劑 薰洗方(此方專治痔漏) 荔枝核三錢 綠升麻二錢 五倍子三錢 刺蝟皮三錢 扒牆

草三錢 蓮蓬壳二個 右方照煎置便桶中薰洗 敷藥方(此方治頸間結核) 生南星 生半夏 等分研末醋調敷

△一

●答胡天宗君代問婦科症治法 紹興史介生

婦人之血 上為乳汁 下為月水 若氣血虛弱之體 則產後乳汁短少 或因啼哭悲怒鬱結 氣溢閉塞 亦能致乳汁不行 今吳君之女 諒係體質孱弱 又值產後舊血既去 新血未生之際 以致產後三日 乳汁未通 加以起坐傷力 致夜不成寐 手心發炎 渾身發熱 是屬腎陰已虛 心火不甯 坎離未濟之象 後服生化湯 始得轉機獲效 夫生化湯雖係產後通用之藥 但宜隨證增減 不宜固守成方耳 及服生化湯之後 身體漸弱 飲食減少 諒係此後 失於調理 或因敗血乘虛停積 流入骨節以及四肢 或因

肝腎陰虧 筋脈失養 致頭部頸骨  
 周身骨節酸痛 或抽或脹 四肢  
 腰部腦蹟尤甚 且平時眼不欲開  
 是肝陰已虛畏見陽光之故 卽久坐  
 起立 頭暈日暗 俱是肝腎陰虧之  
 象 至若指形浮腫 次日退消 是  
 脾陽已虛之證 腹之上部 似有硬  
 物 如鵝卵 時覺跳動 用手按摩  
 久之微響漸消 不久復起 恐係  
 產後惡露不盡 或因氣因風 凝結  
 成瘕 咳嗽喉有異氣 因此痰由腎  
 虛水泛 故色白多沫而有腥氣 腎  
 陰虛而陽無所附 故面部發炎 此  
 婦生平諒必抑鬱寡懽 故常有悲哭  
 之夢 產後衝任已虛而又失於調理  
 故天癸兩三月杳期勿至 或見經  
 少色紫也 舌潤不燥有液 此非舌  
 上固有之液 係是腎虛水泛也 左  
 關脈弦 是肝經陰虛厥陽侮脾之象  
 右關濡小 是脾弱之脈 寸尺軟  
 弱 是肺腎失司氣出納之權 脾肺  
 肝腎 同時爲病 症勢已屬險途

如普通消痰之方 通經之藥 大補  
 之劑 消瘕之法 此時均歸無用矣  
 嚴濟生云 惡露不盡 停留胞絡  
 生病多端 輕者爲脹爲痛爲寒爲  
 熱 甚者月水不調 閉斷不通 久  
 成血瘕 以致疝羸 今以吳君之女  
 較之 證勢彷彿相似 不佞閱七二  
 號問案 並無惡露不盡之意 祇有  
 傷力困勞之言 茲姑擬健脾胃之  
 方 服後看其進行再議

茯苓三錢 茯苓三錢 霍石斛  
 三錢 生於朮錢半 炒白芍二  
 錢 新會皮二錢 鬚穀芽四錢

丹參三錢

▲二 王蘭遠

貴友吳愛青令媛 病由產後而起  
 經今三年 飲食減少 營分日虧  
 胃少納穀 脾失健運 不能游溢散  
 精 上歸於肺 肺不布精 腎無所  
 養 肝失滋榮 血少魂游 肝陽易  
 升 故頭暈目暗等症蜂起 婦女以  
 肝爲先天 肝爲剛臟 一切溫燥之

品傷陰助陽 擬用舒肝鬱 養肝血  
 清肝火 幸其舌潤不燥 血液尙  
 未盡傷 想舌邊沿舌刺必紅 懸擬  
 溫膽出入 乞

胡君鑒政

炒生地三錢 炒川棟子錢五分  
 薑汁炒竹茹二錢 生白芍二  
 錢 青陳皮各七分 法半夏一  
 錢 炒紫苑二錢 煨天麻二錢  
 炒元胡錢五分 生甘草四分  
 蒸於朮錢五分 杭甘菊錢五  
 分 羚羊角片四分(另燉沖)

擬方請服四劑 服後或效或否 病  
 情如何變更 或服何方獲效 並望  
 胡君一一宣布增刊 俾鄙人知得失  
 焉 用敢直陳 是所盼禱

●答黃紹聲君病情 前 人

尊年五八 患糞後鮮血 已經數年  
 又增翠丸偏大 及項核漸長 夜  
 夢紛紜 陰傷及陽 陰血虧損 則  
 絡傷內溢 陽氣衰微 則木翠項核  
 初病多濕熱下聚 宜清利 久病

血去營虧 雖有濕熱 宜清溫並用  
擬黃土湯 加炮薑炭 眞珠母  
白芍 當歸 惟脉象舌色 未見詳  
示 恐隔靴搔癢 未能中的 請備  
採擇

問口鼻治法

道子進

鄙人患口臭數年 餘無他症 胃口  
如常 二便均調 曾服中西各藥  
均不中效 特此錄呈病狀 敬求  
海內名醫 速賜經驗秘方爲感

●答安徽劉天中先生患肝胃痛已月以呢回

食粥飯胸脹治法

鎮江楊燧熙

十餘年前 有吐血之疴 又患氣痛  
每交春冬甚劇 加之吐食 如飲  
水亦出 味清酸 胸疼背腫 口泛  
稀涎 大小便皆阻 發時月餘 偷  
能二便通 諸恙即失矣 年逾四旬  
有六 職業孔孟 症乃肝脾胃失和  
痰熱內阻 肝升太過 肺降胃調  
皆不足 且升騰莫制 由肝陽氣火  
偏亢 亢則害 承乃制 血少滿肝  
故制之法 剛柔貴在適當 進酸

寒鹹寒苦寒 佐填補真陰 使木平  
不侮 函云得效 而陰虛火炎 不  
易導龍歸海 以致食米飯即脹 此  
夜間之事 擬方調之 天翁先生指  
謬

杭白芍 (淡玉紅色是杭芍宜小  
片) 三錢 青蛤殼 (先煎) 三錢  
大貝二錢 川石斛 (先煎) 三  
錢 夏枯頭三錢 中生地三錢  
生軍三錢 陳海蜇頭 (泡淡)  
五錢 珍珠房 (先煎) 八錢 炒  
丹皮二錢 山藥三錢 大葶薺  
二枚

服兩劑後再酌  
天翁函 未云苔脈 如舌白無點勿  
服 脈三至勿服 七至頗宜 可請  
天翁指明 至飲食上 衛生上 尤  
須特別注意 忌黏食難化 最滯  
尤戒多食 多則有累消化 忌烟酒  
能助熱傷陰 戒惱怒思慮 除一  
切塵絆 佐以膏劑 或丸劑 拔其  
根株 亦未雨而綢繆之計 每早吃

清心雞卵二枚 忌韭菜 芥菜 葱  
蒜 薑椒 胡椒及煎炒等

●答山東單縣何承恩君問陰虛陽旺治法

前八

年甫念三 無烟酒嗜好 六七年前  
屢屢誤犯手淫 無他病 偶因不  
慎 未得陰濟 陽與陽交 受不正  
之氣 觸其污穢 乘精虛之際而入  
遂致諸症蜂起 良由水火不得其  
平 陰陽失於和洽 陰陽者 水火  
之徵兆也 勢若權衡 不可有偏  
偏則病生 偏之輕者則病輕 偏之  
重者則病重 醫者補偏救弊 而使  
之平 函云 囊部下墜 即現白濁  
洩時疼痛 隨後發出溺管熱 腎  
囊熱 舉丸熱 偏於右 右大於左  
間有陰汗 後年餘 魄門亦熱  
且肛之四面起如瘰癧 大便後約半  
小時 即作熱痛 其熱似有傳達溺  
管之狀 有時平常亦然 兼生溼汗  
前醫云有梅毒 用大黃土茯苓等  
兩月矣 諸部之熱未退 白濁見少

小便疼緩 前年完婚 又不知有

節 故今年五月忽然心煩意悶 坐

臥不安 前醫用熱地等二十三劑始

安 惟白濁較甚 各部之熱 即晚

門之熱疹 仍如故 精關不固 倘

心有搖動 即精華下溢 通函問慈

善醫院 劉吉翁 據云係妒精阻塞

精道 化為邪熱 熱極陰虛 如後

能戒色絕慾 相火潛沉 靜而不動

自有佳境 何必曰毒 吉翁用補

陰清熱 酸寒苦寒 芳香等品 服

十劑 似輕非輕 惟夜間遺精過多

復又函詢該處 據云係病精 非

好精也 實去病之理 將含熱毒之

精排出 再生純粹而無毒者云云

現遠色以來 四肢較強 腰疼亦減

洩後陰部仍作熱度 熱甚再洩即

淋 淋如膿絲少許 每日午後更衣

學丸熱至 約在戌時 總總情形

乃陰氣先傷 陽氣獨發 露則為

火 火灼使然 經以一水不能承制

五火也 肝脾胃三陰不足 心陽君

相不平 心與小腸相表裡 腎與膀

胱相表裡 小腸膀胱失司 州都失

和 有礙氣化 發為淋症熱疹 夫

淋有五 血 勞 沙 膏 濕 是

也 熱者 陰虛生內熱 疼者 不

通也 (通則不痛) 火結也 水虧

也 故經以諸瘡疹癢 皆屬心火

火能尅萬物 水能生萬物 恙乃水

不濟火 陰不潛陽 陽有升騰之勢

陰無內守之權 宜益水之源 以

鎖陽光 經以陰精上供 其人壽

否則天 此自然之理也 妄擬數法

候採擇行之 不僅治疾 且可長

生 戒怒遠色 加意葯先

(一)天然療法 有二種 一室外

一室內 (見紹興醫藥學報星期

增刊第十七號第五頁)

(二)外治藥品療法 用淡輕三水

一日嗅入鼻內三次 專去炭氣

而迎淡養輕氣 勿因觸鼻

而棄却之

(三)外治藥品療法 時疫奪命散

此和平清熱止痛之良法也 每

日嗅入鼻內二三次 每次茶豆

許 此散之內容 見紹報星刊

第二十九號 此散之成績

見紹報星刊 第三十五號

(四)內服藥品療法

鮮生地一兩 元參四錢 毛知

母三錢 淡竹茹三錢 石決明

(先煎)一兩五錢 生鼈甲八錢

(先煎) 川丹皮三錢 懷山藥

三錢 真川柏一錢五 絲瓜絡

三錢 淨連翹四錢 陳海蜃一

兩(泡洗極淡) 鹽水炒福澤瀉

一錢五分 黑山枝三錢 仙遺

糧(先煎)一兩五錢 蓮子心一

錢五分 黑脂麻八錢 大葶藶

(去芽)三枚

尊問未詳苔脉 難於訂方 恐

有礙效力 先方先服七劑 約

在一星期內 將苔脈示下 以

便診斷 如大便結燥者 或醬

色者 苔黃脈數者 或苔白有

硃砂點者 加酒炒生軍四錢

生甘草一錢

(五)食品療治 每早吃鹽水海參三

四兩 去淨腸沙 中午菜 猪

腰子湯 猪肉湯 火腿湯 鴨

子湯 螺絲頭茨菇湯 青菜淡

菜湯 海帶絲湯 忌煎炒並鷄

(鷄子最宜生吃) 亦忌鹼水

麵食 (無鹼不忌) 葱 蒜

胡椒 薑 醋 魚腥 烟酒等

每晚安睡時 用以上白湯燉

熟 和鷄子二枚 攪和兌溫水

冲熱服之 再吃獨睡丸 不可

間斷

參閱小兒治法

僕於去年起 鼻珠忽現赤色 至今

愈紅 且紅處時起小瘰 破之內係

清水 亦不覺痛 破後復生 永無

愈時 雖於精神無損 但生在面上

實不雅觀 故請高明醫士 賜以

良方 俾復舊觀 實為幸甚

●答小兒腹大治法

▲一 富陽李振聲

脾主升清 胃主降濁 若飲食不節

則中土受傷而運化之力微 以致

清氣不升 故口渴而膚燥 濁氣不

降 故氣急而腹脹 時作泄瀉 太

陰之氣下溜也 身子瘦弱 陽明之

氣不充也 推而至於五行 土敗木

必尅之 經云 厥陰氣至為脹 脹

脹即腹大之象也 又肝開發於目

中藏相火 故視物而目熱也 法

宜培土疏木 兼行氣化 或可向愈

未卜然否 尚乞 高正酌正

清半夏二錢 生於朮四錢

生白芍四錢 茯苓塊二錢

生黃芪三錢 鷄內金三錢

廣陳皮二錢 桂枝尖錢半

六二

富陽張曜嵐

七十二號星刊問小兒腹大治法 此

症確係食積成疳 遷延失法 以至

脾氣下溜耳 經云 飲食日倍 腸

胃乃傷 又云 足太陰虛則鼓脹

又曰 臍寒生脹滿 此症身弱多溺

中氣原虛 飲食停積是其標 脾

胃虛弱為之本 初起扶脾消積 自

無由成疳 及疳已成 而以疳藥治

之 苦寒敗胃 在所不免 (治疳普

通多用胡黃連蘆薈等喻氏曾有律禁

而仍未明指驗藥) 夫疳者 乾也

方書謂十六歲以前為疳 十六歲以

後為癆 是疳即癆也 蓋中焦受氣

取汁變化而赤 是為血 脾胃為

後天之本 取水穀之精以奉心化血

脾胃實司其事 脾虛則血弱 理

有固然 西人謂疳為貧血病 其說

然法 (病此者其耳壳等處用亮皆無

血色) 其所以致血之貧者 彼猶未

之詳也 茲本上述之理以究是病

如小便清長 糞淡黃如漿 渣滓雜

形 是完穀不化 脾陽衰之象也

口渴 脾不散津也 氣急 脾氣壅

遏 致肺失降令也 見物眼熱 皮

膚發燥 血虛失於榮養也 至於胃

口開 面色好二端 或係積則生虛

熱 故其胃仍能消穀 甚則現餓症