

民國文獻資料叢編

近代學報
彙刊



殷夢霞 李強 選編



國家圖書館出版社



殷夢霞、李強 選編

近代學報彙刊

第三十二冊

國家圖書館出版社

第三十二冊目錄

中西醫學報 第十卷第六號	一九二九年十二月	一
中西醫學報 第十卷第七號	一九三〇年一月	八三
中西醫學報 第十卷第八號	一九三〇年二月	一六九
中西醫學報 第十卷第九號	一九三〇年三月	二四一
中西醫學報 第十卷第十號	一九三〇年四月	三四七
中西醫學報 第十卷第十一號	一九三〇年五月	四三一
中西醫學報 第十卷第十二號	一九三〇年六月	五〇五

Deu Hua Medizinische Monatsschrift

報學醫西中

The International Medical Journal

(誌雜學醫華德名原)

Vol. X 第十卷

November, 1929

No. 5 第六號

行發局書學醫號一廿百一路格白梅海上

Distributing Dept. E. Yoh Medical Press, 121. Myburgh Road, Shanghai

出版最新 漢藥神效方

日本石原保秀原本 武進沈乾一編譯

是書爲日本石原保秀君選錄彼邦諸名醫之經驗良方。亦卽爲日本歷代諸名醫經驗良方之精華。其抉擇之謹嚴。遠非我國誇多門靡之方書可比。而處方之靈驗。尤出吾人所臆料。茲已由沈乾一君譯成漢文。以餉國人。是亦漢藥方中之一大貢獻也。

書中並有本草略解一卷。載藥五百餘種。凡普通之藥皆備矣。其解說則完全依據科學。簡而有要。足以供初學便讀之用。卷末並附有索引。皆依各藥名首一字筆畫之多寡而排列。檢查頗便。凡吾同好。皆當早日購置一編。以備參攷之需。


全書一大厚冊布面金字裝璜美麗
每部實價一元六角郵費一角四分

上海 梅白格路 醫學書局發行

EUKODAL

德國怡默克廠

總經理



上海興華公司

南京路沙遜房主

油 科 達 爾

用法

安神咳嗽每次服半片至一片

止痛每次服一片至兩片最多至四片

油科達爾

止痛鎮靜醫藥界多藉重麻醉
品然皆含有毒性亦易養成習
慣性致使用之者有欲却不能
之勢怡默克藥廠有見及此欲
矯此弊是以特發明一種新藥
定名

油科達爾

其功用與各麻醉品相等然毒
性毫無已經
內務部化驗認可批准行銷即
日日用之亦無習慣性所謂習
慣性者即如飲酒者思飲吸紙
煙者思吸是此則不然用以治
病病愈後可隨時不用故欲

鎮痛安神莫如用油科達爾

油科達爾可治咳嗽氣喘腹痛
牙痛神經痛再如乾性水胸膜
炎胃潰傷十二指腸炎心肉炎
等以能安神亦有用以戒除雅
片者

E. MERCK, DARMSTADT

CHEMISCH PHARMAZ FABRIK

Dr. R.
AND
Dr. O. WEIL

FRANKFURT AM MAIN

TELEGRAMM-ADRESSE:

(DROSERIN) FRANKFURTMAIN.
FERNSPR: HANSA 5814. ROMER 5561.
POSTSHK. FRANKFURTA. M. 44743.

BANK-KONTI:

DIREKTION DE R DISKONTO-GES.
FRANKFURT AM MAIN.
UND FRANKFURTEK BANK.

藥良名著士博而凡國德

STRONTIURAN
DROSERLN
SOMNACETIN
SPAMOPURIN
SPAMOSAN
EPILEPTICON

售出有均房藥大各海上

MACHIN FOR INTESTINAL WORMS

▲中華國產藥材

▲用化學方法製出之新藥

滅疳寧自福建沿海所產之海草鷓鴣菜中

提出之精英鷓鴣菜能除腸蟲已見本草拾遺

今去其糟粕取其有效成份屢經動物試驗效

果顯著較山道年有過無不及並無副作用及

毒害身體等流弊尤為特色

專除蛔蟲及醫治因蛔蟲所起之各症除蟲率

在百分之九十五以上對於蟯蟲鞭蟲亦有卓

效

驅除蛔蟲新藥

滅疳寧

粉液片
劑劑劑
糖劑劑

上海四川路三昌化學藥廠發行函索樣品請附郵券十分

補血強精新藥

補爾多壽

鐵質補劑為醫家藥室內不可不備之要藥然市間所售者每用無機鐵質製成敗胃害腸諸多流弊未得補劑之益先受補劑之累補爾多壽乃用有機鐵質製成易於同化吸收最合學理無倒脾敗胃等害有補血強精等功効驗卓著極宜常服並有左記複方四種可依體質選擇投藥尤為便利

含砒補爾多壽

Arsen-Blutose

含碘補爾多壽

Jod-Blutose

規那補爾多壽

China-Blutose

拐阿可路補爾多壽

Guajacol-Blutose

鐵質蛋白質化合劑

EXCELLENT TONIC
BLUTOSE



BIOTOSE "CIBA"

A highly concentrated, nutritious, digestible food containing in an improved form the constituents of the finest malt and tissue-building vitamins

最有效之維他命製劑

滋養身體

治療腳氣

拜奧吐斯

維他命類爲人類生活上最重要之物質。最近醫界之所重視者也。查吾人日常飲食物中含有斯類物質原屬甚微。往往因烹調不得宜。並此微量之維他命而失之。或因飲食物之偏重一方。致身體不能攝取應得分量之維他命。類於是發生諸種維他命缺乏症矣。如神經衰弱、症營養不良、各種腳氣、症、肌肉瘦削、症、食慾退減、過勞傷身、病後體弱、肺癆病人之衰弱等諸症是也。

效用 凡對於幼年人、青年人、成年人、老年人以及病人之諸種營養不良症。均皆有效。換言之。即爲康健人之保健品。及滋養品。是以對勞動家、運動家、事務家、病弱者、乳母、孕婦等用之。能補充其耗損之腦力、體力。及可以預防身體之疲勞徵象（如頭痛、精神不爽等）。至於完全因缺乏維他命類所致之各種腳氣症。有特效固無待贅也。

用量及用法 大人每日服二次或三次。每次兩茶匙或三茶匙（每茶匙約五格蘭姆）用微溫湯（忌太熱）牛乳或茶水稀飯等物服之。

包裝 大罐五百格蘭姆 中罐二百五十格蘭姆

中國總發行處上海英租界交通路中新華大藥行

北方發行處天津法租界亨達利洋行

福州發行處福州南台上海街萬順豐號

南方發行處廣州市太平南路五五新華公司

寧波發行處寧波東門街前四明藥局

詳細仿單承醫家
藥房索取請函示
上海新華大藥行
當即寄奉

Society of Chemical Industry in Basle, Switzerland.

製監廠藥巴汽國士瑞

Clin ELECTRARGOL

法國克靈大藥廠電銀膠

藥品爲醫生之左右手，
故用藥之先當審慎該藥之效驗如何？
然後始敢安心用之。

法國克靈廠所出之電銀膠“ELECTRARGOL”
爲近世各種傳染病之特效注射劑。

電銀膠之效驗靈安迅速，

世界各醫師恃之若左右手，

故均能安心賞用之。

但當先審慎爲克靈：CLIN：廠所出，否則不
能得如……

『君所希望之效驗矣』

法國克靈製藥廠中國及日本總經理上海法商百部洋行藥品部

International Medical Journal

Vol. 10

December 1929

No. 6

報學醫西中

錄目號六第卷十第

▲論壇

娼妓的健康檢查爲當今之急務……………馮湘汕（一一二）

▲譯著

灌腸及腸洗滌法（續）……………沈乾一（三一—四）

產褥之病理及療法（續）……………劉雲青（一五—二八）

法醫學上之处女膜……………羅榮助（二九—三二）

中外醫事年表補遺……………陳邦賢（三三—三八）

瘡痢良方……………沈仲圭（三九—四〇）

漢藥神效方序……………沈乾一（四一—四二）

修正達生篇序……………孫祖烈（四三）

新本草綱目序例……………晉陵下工（四五—四七）

▲雜俎

飲冰七日記……………馮如（四九—五三）

隨便談談……………馮湘汕（五五—五六）

▲醫報叢鈔

白濁傳染途徑談……………天德（五七—六七）

乳兒之流行感冒……………薛承堉（六九）

肺結核與肺壞疽……………薛承堉（七〇）

多 數 醫 生 治 梅 毒

愛 用 砒 扶 乃 命

(一)因其適於皮下注射。不必用靜脈注射。醫生施用時，既可節省時間。而於靜脈深藏之胖漢，或靜脈微細之童子。難於行靜脈注射者。尤爲便利。

(二)因其在心病情形之中，施行皮下注射。可免因靜脈注射而起之可能的循環阻礙。此弊乃應用砒扶乃命及別種類似品以後所或見者。

(三)因其對於神經花柳症，有特別透達之力。故奏效亦特別靈驗。砒扶乃命，盛於窄頸巨身有兩耳之瓶中。

容量分一格二格三格四格五格及九格數種。

士貴寶廠所製其他砒性藥物甚多。例如砒扶乃命，溶性砒扶乃命，新砒扶乃命等皆是。

美國紐約
士貴寶父子化學公司啓
創立於一八五八年

論壇

娼妓的健康檢查爲當今之急務

馮湘汕

致青年事業於墜落。使世界花柳病蔓延。有礙於風化與衛生的娼妓。隨現代的萬惡潮流。澎湃怒吼的。日漸增多的奔來。大有日進千里之勢。如通都大邑。繁華巨埠。秦樓楚館。到處林立。南樓北里。不可勝數。青年學子。事業前途。方在無窮進展之時。偶墜溫柔鄉中。纏綿悱惻。柳戀花迷。終致床頭金盡。召情人之白眼。名譽掃地。致告貸以無門。影響於社會人情。頗爲重大。最危險者蔓延無窮。害人最廣的花柳病。娼妓。爲發源地。廣延播傳。致治遊者。無得幸免。弱國亡種。莫此爲甚。

執是之故。國人自數年來。曾屢有廢娼之宣傳。卒以種種之障礙。雖政府之多方援助。終於一時礙難實現。而於此時娼妓不能廢除之期。對於其健康之檢查。爲急極的不可遲緩之要務。

娼妓之健康檢查。倡興於十八世紀花柳病豫防會之後。知娼妓之健康檢查。爲花柳病豫防之唯一要素。漸而各國之都市。凡有娼妓之所。無不有娼妓健康檢察醫院之設立。初業妓者須有醫師詳加一切檢察。是否有慢性傳染病與生殖器病。患病者不得營業。健康者發給以健康診斷書。警局始准其開始營業。開業後在每週間仍須至檢察院實行檢察。健康者照常營業。患病者留院治療。其於抑止花柳病

之功績。甚較佳良。

察我國娼妓檢察醫院之設立。寥若星辰。以全國之大埠計算。僅十之二三。近以東三省計。僅安東遼甯營口三地。形式上雖已成立。檢察成績。不甚佳良。精神上實等於零。以故最近警察方面與醫師會之報告。花柳病之蔓延。有增無減。

按濱江一埠。爲北滿要區。商業繁興。人烟稠密。人情之窮極奢侈。不亞於海上。娼妓不下萬人。花柳病之傳播。害烈於虎狼。全市人民。受此如虎如狼之娼妓禍害。而不知設法以敵禦之。殊堪痛惜。雖醫界同人。屢有娼妓健康檢察醫院設立之提倡。終致花界羣起反抗。當局不加以援助。遲遲至今。娼妓健康檢察醫院。未能成立。

不惟濱江如此。全國各地。莫不如此。未能成立娼妓健康檢察醫院之地。姑置不論。已經成立者。以人情對於衛生知識簡單。對於檢察上浮然了事。不能認真辦理。且受檢之娼妓。尤多數畏懼檢察。甚者達官貴客。亦有爲娼妓緩頰。希求免驗。種種障礙。所以花柳病日漸蔓延而無制止也。

花柳病豫防的責任。非吾濟醫家之義務乎。既係吾濟之任務。即應宣傳民衆。俾知娼妓之是否健康。於人民之衛生有莫大之關係。娼妓健康檢察醫院之設立。爲當今之急務。俾國中凡有娼妓之地。普設該檢察醫院。則花柳病日漸減少。期達絕跡之目的而後已。

十八年雙十節下午脫稿

譯著

灌腸及腸洗滌法 (續)

沈乾一

第三章 藥品灌腸法

藥品灌腸。於便利上大別爲左之二種。

- 一 爲對症療法而行者
- 二 爲根治療法而行者

凡藥品灌腸。一如滋養灌腸。須令藥液長時間停滯於腸管以內。故一回之注入量。以用少量爲宜。通常之一回量。以六十瓦爲適度。雖有用多量之時。亦不可過二百五十瓦。凡用大量灌腸之時。其液通常多不能長時保留於腸管內。扶助藥。宜用粘液性者。卽亞拉毗亞護謨漿。沙列布煎等是也。

主藥之用量。大都較內服之時。須稍增其量。因其一部。附着於灌腸器。不入於腸管內。且從腸粘膜所吸收者。亦較內服之時爲遜故也。

然其量過多。則起與內服同樣之中毒作用。故不可誤其適量。如莫兒比涅之劇藥。須用與內服量同量之注入。始得安全。

用於對症療法之藥品灌腸

以消散一定之症狀爲目的。而行藥品灌腸者。實地上斷不可等閑視之。如在某種情狀之下。無論患者有無劇甚之苦惱。但因嘔吐或其他之關係。而不能與以內服藥者。其時藥品灌腸。有重大之價值。通常所屢用者。爲抱水格魯拉兒灌腸。安知必林。有時亦有顯著一時性之效力。故得代抱水格魯拉兒而應用。如坐骨神經痛。脊髓癆之胃發症。膀胱發症等。其疼痛長久持續者。則用安知必林爲宜。

處方 重曹六・〇 安知必林〇・六 阿片丁幾二十滴 亞拉毗亞護謨漿六〇・〇

用於根治療法之藥品灌腸

對於一定之疾患。有以根本的治療之目的。而行藥品灌腸者。例如患者神經過敏。易起嘔吐。內用藥不能長服之時。則藥品灌腸。爲惟一之方法。故斷不可輕忽視之。於此種情狀之下。無論再行對症的者。爲非是。卽行於一時的者。亦無效。故須設一定之秩序。按時依守規則連續行之。

所用之藥品如左。

沃度加里。是由於個人之特異性。用其少量。已促嘔吐。不堪此藥物之患者頗多。然本劑有特有之效力。在某種情狀。他藥不能代用。此際除行灌腸之外。無他法也。現今解爾古氏。對於神經系統之微毒症。行水銀塗擦以外。同時併用沃度加里之灌腸。而得良好效果云。

撒里矢爾酸曹達。是爲急性關節癱瘓質斯之特效藥。患該症之際。於任何之情狀。皆不可不用本劑。然本品能起顯著之胃障礙。致患者有全不能內服者。此際不得不由灌腸法而用之。

實芟答利斯 是亦隨某種疾患及患者之狀態而爲不可缺少之要劑。惟本品往往喚起劇烈之嘔吐。因之有時萬不能內服者。於此則灌腸法爲有效矣。在尿毒症等實芟答利斯爲不可缺少者。而實芟答利斯灌腸實際上尤爲必要。行本劑之灌腸。有謂當如內服。以每二時間注入之者。第患者多不能堪。且亦無卓越之點。故一日以一回至二回爲限。尤以行於就褥前爲便利。用實芟答利斯時。又宜混用咖啡涅奇烏累欽。台沃布林等。若兼發不眠症時。可加數滴之阿片丁幾或○・○一至○・○二之莫兒比涅。

處方 實芟答利斯葉浸（○・五）五○・○ 右調勻灌腸。一日一回至二回。

處方 實芟答利斯葉浸（一・○）一二○・○ 醋酸加里液三○・○ 右調勻灌腸。每二時間一食匙。

開拉菁勃氏恆注入開拉菁於靜脈內或皮下以代灌腸。且非特僅用於腸深部之局所的出血。即其他一切之出血亦可用之。如吐血。喀血。衄血。尿道出血及其他之內出血等皆用之也。此法毫無疼痛。並不須消毒。且全無危險。如起破傷風之恐者尤無之。

氏豫行腸洗滌後。以十％之開拉菁溶液。每日一回至三回注入於直腸內。

古爾拉爾克兒 本劑亦爲灌腸品。且殊便利。最適用於敗血性疾患。（特於產褥熱）

古魯聖精及知篤爾林 二者皆爲下劑。應用之時。以左方爲宜。

處方 古魯聖精一・○ 酒精偈里設林各一二・○ 右調勻。