

第五冊

時行溫疫病案
時疫喉痧病案

全國名醫驗案類編
正編

上海大東書局印行

當代全國名醫驗案類編目錄

二集 八大傳染病案

第七卷 時行溫疫病案

溫毒發斑案.....曾月根

溫疫發斑案.....胡劍華

溫疫內陷案.....陳務齋

溫疫閉症案.....丁佑之

溫疫昏厥案.....姜德清

時疫溫毒案.....鍾翊乾

時疫溫毒案.....陳善華

溫毒發頤案.....嚴紹岐

溫毒喉癰案.....袁桂生

溫毒牙疳案.....楊孕靈

秋瘟瘧厥案.....姜德清

時行冬瘟案.....吳興南

大頭瘟案.....葉馨庭

疙瘡瘟案.....沈奉江

軟脚瘟案.....嚴紹岐

附傷風時疫案.....陳務齋

妊娠兼風燥時疫案.....陳務齋

妊娠燥疫案.....陳務齋

當代
全國名醫驗案類編

二集 八大傳染病案

第七卷 時行溫疫病案

○溫毒發斑案

曾月根住五華
周潭

【病者】張少卿，年二十二歲，粵省法政讀書，住廣東五華大田。

【病名】溫毒發斑。

【原因】感染溫毒時行而發。

【症候】面赤脣紅，一身手足壯熱，血毒外潰，神煩而躁，發出紅斑。

【診斷】六脈洪大，右甚於左，舌鮮紅，陽明血熱無疑，血爲陰，氣爲陽，陽盛則燦。

血。血熱則發斑矣。

【療法】涼血解毒。以泄絡熱。故以生地犀角之大寒爲君。以清君火。佐以芍藥丹皮之微寒。以平相火。火熄則斑黃陽毒皆淨盡矣。

【處方】鮮生地 一兩

犀角尖 二錢

赤芍藥 六錢

丹皮 二錢五分

【效果】一服熱清斑透。繼用清養法調理而全。

廉按溫毒發斑。犀角地黃湯。却是正治。故千金古方。平時不可不研究也。

○溫疫發斑案

胡劍華 住景德鎮
舉家衛

【病者】孫雲山。年三十一歲。福盛醬園櫃員。住景德鎮。

【病名】溫疫發斑。

【原因】夏歷八月。斑症流行。平素嗜酒。起居不慎。故易於傳染。

【症候】面部浮腫。四肢酥麻。惡寒發熱。脊強無汗。口渴嗜茶。腹內不安。薦骨痛甚。斑發隱隱。

【診斷】舌根淡黃。少津。脈浮而數。浮爲外越之象。數主高熱之徵。脈症合參。斷

爲陽明熱鬱發斑之候。

【療法】斑宜外達。必汗先泄而斑隨之出。故用麻杏甘石湯鼓其外出。仍慮力薄。復加防風獨活助其發汗排泄之力也。

【處方】淨麻黃

八分

防風

一錢

生甘草

六分

生石膏

八錢

獨活

八分

苦杏仁

二錢

【效果】服一劑汗出而寒熱退。二劑身癢斑出。三劑薦骨痛止。四劑全愈。

麻杏甘膏湯開表清裏。却爲透發斑疹之良劑。惟時當夏月。麻黃宜

易香薰。李氏時珍所謂夏月之用香薰。猶冬月之用麻黃也。做其法勿執其藥。是亦化而裁之之妙用歟。

○溫疫內陷症案

陳務齋

住梧州四方井街

【病者】陳梁氏。年二十五歲。廣西容縣。住鄉。體壯。農業。

【病名】溫疫內陷。

【原因】素因食物不節。消化不良。宿滯化熱。誘因溫疫流行。傳染菌毒而發。又因藥誤而內陷。

【症候】初起惡寒發熱。頭痛項強。腰脊疼脹。肢倦口渴。由午至酉起。立即仆不省人事。牙關緊閉。肢冷至肘腕。腹灼熱。氣粗喘急。脣縮而焦。齒黑而乾。目赤面青。經晝夜不醒。

【診斷】左右脈伏。舌紫而苔罩白膩。體溫達壹百零四度。此吳又可所謂體厥脈厥也。由疫毒將發。新涼外束。伏邪欲達而不能遽達。遂致脈伏不見。熱極而厥。厥深熱亦深。故前醫疊用辛散通關方法。竟一晝夜不效。病勢甚凶。危在頃刻。惟脈伏多係實症。雖見昏厥。開達得法。或可挽救於什一。

【療法】初用竹瀝合童便。重加紫雪一錢。頻頻灌下。以豁痰宣竅。清熱降火。服後神識畧醒。再用劉氏雙解散。去防朮芎歸芍等。加紅花中白牙皂磨。

犀。取。荆。薄。麻。黃。速。解。肌。表。以。辛。散。外。寒。犀。角。翹。梔。速。透。上。焦。以。清。宣。裏。
熱。硝。黃。芩。膏。蕩。滌。腸。胃。以。涼。瀉。伏。火。然。病。至。內。陷。昏。厥。必。有。有。形。之。痰。
火。瘀。熱。蒙。閉。心。與。腦。神。氣。出。入。之。清。竅。故。用。牙。皂。桔。梗。以。開。痰。紅。花。中。
白。以。滌。瘀。君。臣。佐。既。經。配。合。而。使。以。益。元。散。者。解。熱。毒。以。調。和。諸。藥。也。
一。服。後。則。肢。表。厥。減。面。脣。略。潤。診。脈。略。見。沉。弦。數。再。二。服。後。人。事。略。醒。
牙。關。緩。軟。四。肢。厥。除。惟。手。足。麻。攣。口。甚。燥。渴。體。中。發。熱。心。常。驚。悸。起。臥。
無。常。診。脈。起。而。洪。弦。數。又。用。犀。羚。鈎。藤。湯。加。人。中。白。取。其。直。清。心。肝。瀉。
火。熄。風。泄。熱。通。絡。化。痰。利。水。一。服。後。熱。退。體。和。肢。表。麻。攣。已。除。惟。咽。乾。
口。渴。煩。躁。不。眠。診。脈。弦。數。略。減。又。用。人。參。白。虎。合。犀。角。地。黃。湯。雙。清。氣。
血。兩。燔。潤。津。燥。以。救。陰。液。

【處方】防風通聖散加減方

荊芥穗 一錢

蘇薄荷 一錢

帶節麻黃 三分

生大黃 四錢

生山梔 三錢

犀角尖 二錢 磨冲

淨樸硝 三錢 冲

益元散 三錢 包煎

西紅花 二錢

人中白 二錢

生石膏 六錢 研細

青連翹 四錢

青子芩 三錢

小牙皂 一錢

津桔梗 一錢

【次方】犀羚鈎藤湯加人中白方

犀角尖 一錢 磨冲

羚羊角 二錢 先煎

鈎藤勾 五錢

人中白 三錢

牙皂角 一錢

生石膏 六錢

知母 三錢

蓮子心 四錢

川木瓜 三錢

龍膽草 二錢

淮木通 二錢

【三方】人參白虎合犀角地黃湯

西洋參 三錢

生石膏 三錢

肥知母 四錢

粉甘草 一錢

陳梗米 六錢

黑犀角 三錢

鮮生地 四錢

生赤芍 三錢

牡丹皮 錢半

煎服

【效果】五。日。牙。關。不。閉。四。肢。厥。除。人。事。已。醒。十。日。熱。退。體。和。食。量。略。進。二。十。日。

煩躁已除。食量大進。元氣回復而痊。

【廉按】凡疫病目赤面青，昏厥如尸，四肢逆冷，六脈沉伏者，此爲悶疫。悶疫者，疫毒深伏於內而不能發越於外也。漸伏漸深，入臟而死，不俟終日也。至於急救之法，先刺少商中衝曲池委中等穴，以宣泄其血毒，再灌以紫雪合玉樞丹，清透伏邪，使其外達，或可挽回。此案方法，大旨近是，惟少一刺法，則未免缺點矣。

○溫疫閉症案

丁佑之住南東門

【病者】趙大興，年四十二歲，商界，住縣城。

【病名】溫疫閉症。

【原因】疫毒內伏血分。

【症候】面色清談，四肢逆冷，嘔瀉兼作，昏憤如迷。

【診斷】六脈細數，沉伏，舌色紫赤，良由熱伏於內而不發，露於外，漸伏漸深，入

臟卽死。不俟終日。此溫疫之最烈者。

【療法】宜內外兼治。先刺曲池委中以泄營分之毒。再以紫雪清透伏邪。使其外越。

【處方】紫雪丹 五分 新汲水調下。

【效果】一劑知。二劑效。如斯大症。不十日而全。後治多人。均應手而愈。雖不敢誇驗。案然亦不敢自秘。

【屢按】仿孟英治悶疫例。却是救急之捷法。妙在先用刺法放血。使疫毒從血分排泄。然後用紫雪使穿經入臟之疫毒。從內達外而消解。故其効如神。

○溫疫昏厥案

姜德清 住平度北
七里河

【病者】官忠學。年五十歲。住平度城北花園。

【病名】溫疫昏厥。

【原因】辛酉年八月染疫。前醫疊次攻下而無效。

【症候】初起惡寒頭痛。四肢痠疼。疊經誤治。遂致舌脹滿口。不能言語。昏不識人。呼之不應。小便自遺。便閉旬餘。大小腹脹按之板硬。

【診斷】六脈洪大。齒垢紫如乾漆。脈症合參。此極重之溫疫昏厥也。醫者不明病源。發表數次。大耗其液。溫補藥多。更助其火。火熾液傷。上蒸心腦。下燦胃腸。病之所以釀成壞象也。

【療法】湯丸並進。因重用生石膏直清陽明。使其敷布。十二經退其淫熱。爲君。犀角川連黃芩連翹。泄心肺之火。爲臣。元參生地知母抑陽扶陰。泄其亢甚之火。而救欲絕之水。爲佐。丹皮赤芍梔子泄肝經之火。爲使。令其先用利便糖衣丸五粒。接服蓖麻油一兩。服後約一時許大便自下。大小便俱軟。速進湯藥兩劑。頭煎調服安宮牛黃丸兩顆。

【處方】生石膏

八兩
研細

犀角

四錢

小川連

四錢

黃

芩

四錢

青連翹 三錢

元參 一兩

鮮生地 一兩

知母 八錢

丹皮 三錢

赤芍 三錢

焦梔子 三錢

生菜豆 二兩

鮮竹葉 五錢

煎湯代水

安宮牛黃丸方

犀角末 一兩

小川連 一兩

黃芩 一兩

焦梔子 一兩

廣鬱金 一兩 生打

明雄黃 一兩

飛辰砂 一兩

珍珠 五錢

台麝香 二錢 半

眞梅片 二錢 半

共爲細末、煉蜜爲丸、赤金爲衣、每丸重三分、金銀花薄荷煎水送、
【次診】六脈和而畧大、齒垢淨盡、舌尚乾、能言語、惟昏譫未淨、除是餘熱未清、

原方減其用量、再進兩服、間用安宮牛黃丸一顆、藥湯調服。

【次方】生石膏 四兩 研細

眞犀角 二錢

小川連 二錢

黃芩 二錢

青連翹 三錢

元參 六錢

鮮生地 八錢

知母 六錢

粉丹皮 三錢

赤芍 二錢

焦山梔 三錢

生菖豆 一兩

鮮竹葉 三錢

安宮牛黃丸 一顆研細藥湯調服

【三診】六脈和平。舌苔退而微乾。時有錯語。仿增液湯意。令其連進兩劑。間用

萬氏牛黃丸一顆。藥湯調下。

【三方】仿增液湯意

生石膏 二兩研細

細生地 八錢

知母 六錢

連心麥冬 四錢

萬氏牛黃丸 一顆研細藥湯調下

萬氏牛黃丸方

西牛黃 五分

小川連 一兩

黃芩 二錢

廣鬱金 四錢

生山梔 六錢

飛辰砂 三錢

共爲細末。神糲糊丸。

【效果】八日即能起坐。旬餘胃健而愈。

廉按：病則溫疫昏厥。藥則中西並進。方則從余氏師愚吳氏鞠通兩家擇

用清矯雄健卓爾不羣真膽識兼全之驗案也

○時疫溫毒案

鍾翊乾住瑞安
鮑田

【病者】戴女年十五歲住清泰鄉

【病名】時疫溫毒

【原因】冬寒潛伏膜原至首夏外感時毒而發

【症候】身熱口渴兩足痠痛不能起立神昏譫語面青晦濁

【診斷】脈沉細似伏由病機遏不能達故陽症而見陰脈劉河間所謂畜熱內

甚脈道不利反致沉細欲絕也

【療法】泄熱解毒以兩石芩連山梔爲君銀花連翹爲臣但清涼無滌穢之功

故佐以玉樞丹芳香辟穢陳金汁以濁泄濁使以茹絡冬藤疏通脈絡

【處方】生石膏

五錢
研細

飛滑石

四錢
包煎

焦山梔

二錢

銀花

三錢

連翹

三錢

淡黃芩

錢半
酒炒

小川連

四分
酒炒

淡竹茹

三錢

絲瓜絡 三錢

金汁 一兩

鮮忍冬藤 四錢

玉樞丹 五粒 研細藥

湯調下

【效果】初方連服二劑。足痛瘥。譫語減。於原方減石膏金汁。加番瀉葉錢半。人中黃二錢。板藍根二錢。服後便溏。色黑如醬。頭面反腫。口不能開。咽微痛。又將番瀉葉加足三錢。鮮大青葉五錢。鮮生地六錢。金果欖二錢。服後再解。黑溏糞。頗多。夾有燥矢。病遂愈。

廉按 斷語引證確鑿。處方清芬靈通。妙在玉樞丹善解溫毒。惟人中黃一味。不如仍用金汁爲是。

○時疫溫毒案

陳在山 住遼陽
咸春堂

【病者】郭麟閣之子。年二十三歲。住奉天牛莊城。

【病名】時疫溫毒。

【原因】素多嗜慾。體瘦陰虛。外感時毒而發病。

【症候】咽喉驟然腫痛氣喘聲啞舌黃口渴皮膚熱頭項痛心煩譫語小水黃濇大便秘結。

【診斷】脈沉細數症與脈不相符者由素嗜烟色之人津虧血燥龍雷之火動於內溫熱之邪襲於外外交迫表裏不通故脈現似陰非陰理應舍脈從症不必爲脈理所泥也。

【療法】重用鮮生地救陰涼血爲君花粉石膏生津止渴爲臣犀角薄荷雙花解毒退熱爲佐枳殼蔓仁通暢氣分爲使加山豆根牛蒡子清咽利膈解毒散熱滑石竹葉滲利水道引熱下行。

【處方】鮮生地

八錢

生石膏

一兩

天花粉

四錢

二寶花

三錢

牛蒡子

三錢

枳殼

二錢

山豆根

二錢

薄荷葉

一錢

黑犀角

一錢

枯蔓仁

四錢

淡竹葉

錢半

【又方】鮮生地

五錢

生石膏

六錢

天花粉

二錢

二寶花

二錢