

常用中草药彩色图谱

中国科学院华南植物研究所编

第 二 册

广东人民出版社

目 录

铺地蜈蚣(石松科).....	(2)
石上柏(卷柏科).....	(4)
纤弱木贼(木贼科).....	(6)
白毛蛇(骨碎补科).....	(8)
圆羊齿(骨碎补科).....	(10)
日本乌蕨(中国蕨科).....	(12)
单叶双盖蕨(蹄盖蕨科).....	(14)
贯众(鳞毛蕨科).....	(16)
马尾松(松科)✓.....	(18)
杉(杉科).....	(20)
豺皮樟(樟科).....	(22)
毛茛(毛茛科)✓.....	(24)
天葵子(毛茛科).....	(26)
南天竹(小蘗科).....	(28)
木通(木通科).....	(30)
大血藤(大血藤科).....	(32)
木防己(防己科).....	(34)
苍白秤钩风(防己科).....	(36)
毛青藤(防己科).....	(38)
金线吊乌龟(防己科).....	(40)
海南茛(胡椒科).....	(42)
鱼腥草(三白草科).....	(44)
博落回(罂粟科).....	(46)
深山黄堇(荷包牡丹科).....	(48)
瓜子金(远志科).....	(50)

茅膏菜(茅膏菜科).....	(52)
竹节蓼(蓼科)✓.....	(54)
篇蓄(蓼科).....	(56)
荞麦(蓼科).....	(58)
虎杖(蓼科).....	(60)
毛蓼(蓼科).....	(62)
商陆(商陆科).....	(64)
土荆芥(藜科).....	(66)
落葵(落葵科).....	(68)
酢酱草(酢酱草科).....	(70)
凤仙花(凤仙花科).....	(72)
华凤仙(凤仙花科).....	(74)
紫薇(千屈菜科).....	(76)
紫茉莉(紫茉莉科).....	(78)
光叶海桐(海桐花科).....	(80)
柞木(大风子科).....	(82)
蒴莲(西番莲科).....	(84)
蛇王藤(西番莲科).....	(86)
油茶(茶科).....	(88)
猕猴桃(猕猴桃科).....	(90)
毛花杨桃(猕猴桃科).....	(92)
水东哥(水东哥科).....	(94)
岗松(桃金娘科).....	(96)
柠檬桉(桃金娘科).....	(98)
桉(桃金娘科).....	(100)

朝天罐 (野牡丹科).....	(102)	昆明鸡血藤 (蝶形花科).....	(160)
金丝桃 (金丝桃科).....	(104)	大叶千斤拔 (蝶形花科).....	(162)
田基黄 (金丝桃科).....	(106)	长穗猫尾草 (蝶形花科).....	(164)
元宝草 (金丝桃科).....	(108)	千年青 (黄杨科).....	(166)
黄麻 (楸树科).....	(110)	白桂木 (桑科).....	(168)
刺蒴麻 (楸树科).....	(112)	萆薢 (桑科).....	(170)
黄葵 (锦葵科).....	(114)	无花果 (桑科).....	(172)
箭叶秋葵 (锦葵科).....	(116)	五指毛桃 (桑科).....	(174)
木芙蓉 (锦葵科)✓.....	(118)	苎麻 (荨麻科).....	(176)
大红花 (锦葵科).....	(120)	吐烟花 (荨麻科).....	(178)
铁苋菜 (大戟科).....	(122)	葎草 (大麻科).....	(180)
红背山麻杆 (大戟科).....	(124)	毛冬青 (冬青科).....	(182)
油桐 (大戟科).....	(126)	疏花卫矛 (卫矛科).....	(184)
黑面神 (大戟科)✓.....	(128)	甜果藤 (茶茱萸科).....	(186)
飞扬草 (大戟科).....	(130)	粗壮蛇菰 (蛇菰科).....	(188)
铁海棠 (大戟科).....	(132)	铁包金 (鼠李科).....	(190)
白背叶 (大戟科).....	(134)	马甲子 (鼠李科).....	(192)
石岩枫 (大戟科).....	(136)	黄药 (鼠李科).....	(194)
山乌柏 (大戟科).....	(138)	蛇葡萄 (葡萄科).....	(196)
乌柏 (大戟科).....	(140)	乌菰莓 (葡萄科).....	(198)
小果蔷薇 (蔷薇科)✓.....	(142)	刺葡萄 (葡萄科).....	(200)
粗叶悬钩子 (蔷薇科).....	(144)	竹叶椒 (芸香科).....	(202)
亮叶猴耳环 (含羞草科)✓.....	(146)	牛筋果 (苦木科).....	(204)
云实 (苏木科).....	(148)	野鸦椿 (省沽油科).....	(206)
羊带归 (蝶形花科)✓.....	(150)	八角枫 (八角枫科).....	(208)
葫芦茶 (蝶形花科).....	(152)	喜树 (珙桐科).....	(210)
藕豆 (蝶形花科).....	(154)	刺叶槲木 (五加科)✓.....	(212)
鸡眼草 (蝶形花科).....	(156)	常春藤 (五加科).....	(214)
铁扫帚 (蝶形花科).....	(158)	白花前胡 (伞形花科)✓.....	(216)

鹅脚板 (伞形花科).....	(218)	奇蒿 (菊科)✓.....	(276)
白珠树 (杜鹃花科).....	(220)	牡蒿 (菊科).....	(278)
岭南杜鹃 (杜鹃花科).....	(222)	甜子菜 (菊科).....	(280)
黄花杜鹃 (杜鹃花科).....	(224)	艾 (菊科).....	(282)
日本紫金牛 (紫金牛科).....	(226)	路边菊 (菊科).....	(284)
虎舌红 (紫金牛科).....	(228)	六耳铃 (菊科).....	(286)
细小金牛 (紫金牛科).....	(230)	烟管头草 (菊科).....	(288)
罗伞树 (紫金牛科).....	(232)	玉芙蓉 (菊科).....	(290)
醉鱼草 (马钱科).....	(234)	鱼眼菊 (菊科).....	(292)
链珠藤 (夹竹桃科)✓.....	(236)	地胆头 (菊科).....	(294)
海南狗牙花 (夹竹桃科).....	(238)	香菇 (菊科).....	(296)
花拐藤 (夹竹桃科).....	(240)	革命菜 (菊科).....	(298)
白叶藤 (杠柳科).....	(242)	白子菜 (菊科).....	(300)
牛皮消 (萝藦科).....	(244)	白牛胆 (菊科).....	(302)
乳蚕 (萝藦科).....	(246)	六棱菊 (菊科).....	(304)
柳叶白前 (萝藦科).....	(248)	咸虾花 (菊科).....	(306)
水杨梅 (茜草科)✓.....	(250)	珍珠菜 (报春花科).....	(308)
风箱树 (茜草科).....	(252)	土党参 (桔梗科)✓.....	(310)
伏牛花 (茜草科).....	(254)	四叶参 (桔梗科).....	(312)
金草 (茜草科).....	(256)	铜锤玉带草 (半边莲科).....	(314)
黄毛耳草 (茜草科).....	(258)	白英 (茄科)✓.....	(316)
牛白藤 (茜草科).....	(260)	土烟叶 (茄科).....	(318)
香港大沙叶 (茜草科).....	(262)	菟丝子 (旋花科).....	(320)
茜草 (茜草科).....	(264)	马蹄金 (旋花科).....	(322)
白马骨 (茜草科).....	(266)	土丁桂 (旋花科).....	(324)
走马箭 (忍冬科).....	(268)	大头陈 (玄参科)✓.....	(326)
坚荚树 (忍冬科).....	(270)	泥花草 (玄参科).....	(328)
白花败酱 (败酱科).....	(272)	紫苏草 (玄参科).....	(330)
兔耳风 (菊科).....	(274)	水薄荷 (玄参科).....	(332)

野甘草 (玄参科) ✓	(334)
阴行草 (玄参科)	(336)
老鼠簕 (爵床科)	(338)
水蓑衣 (爵床科)	(340)
爵床 (爵床科)	(342)
九头狮子草 (爵床科)	(344)
大花老鸦嘴 (爵床科)	(346)
华紫珠 (马鞭草科)	(348)
山薄荷 (马鞭草科) ✓	(350)
鬼灯笼 (马鞭草科)	(352)
赧桐 (马鞭草科)	(354)
六月冻 (马鞭草科)	(356)
铁马鞭 (马鞭草科)	(358)
瘦风轮 (唇形科)	(360)
毛水珍珠菜 (唇形科)	(362)
香薷 (唇形科)	(364)
山香 (唇形科)	(366)

皱面草 (唇形科)	(368)
罗勒 (唇形科) ✓	(370)
野香薷 (唇形科)	(372)
石芥馨 (唇形科)	(374)
地蚕 (唇形科)	(376)
血见愁 (唇形科)	(378)
大叶水竹草 (鸭跖草科)	(380)
蜘蛛抱蛋 (百合科)	(382)
萱草 (百合科) ✓	(384)
春根藤 (蓼莩科)	(386)
天南星 (天南星科) ✓	(388)
大藻 (天南星科)	(390)
文珠兰 (石蒜科)	(392)
水田七 (茄薯蓣科)	(394)
金线兰 (兰科) ✓	(396)
薏苡 (禾本科) ✓	(398)
金丝草 (禾本科)	(400)

说 明

一、本册收载常用中草药200种,从植物进化的角度按科进行推列。

二、本册收载的种类仍以广东常用中草药植物为基础;对某些新发掘出来的种类,我们也及时加以收载,以便不断地扩大药物资源,为广大医务工作者和工农兵群众所利用。

三、本册的编写规格仍按第一册同样的形式。对某些相似种的讨论,仍然着重其区别点加以描述和比较,并酌情有所增加。

四、由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够,业务水平有限,本册难免还会出现一些缺点和错误,欢迎广大读者提出宝贵意见,以便修改提高。

铺地蜈蚣

别名 偷鸡草、柄命草、狗柄草、蜈蚣草、石松、猫公草、狗仔草。

形态 多年生草本；茎直立、平卧或倾斜，二歧分枝，分枝呈圆锥状，长30~80厘米，主茎硬而木质。叶小，线状钻形，稍上弯，长2~7毫米，黄绿色，螺旋排列于茎上。夏秋季于小枝顶端着生圆柱形或球形的孢子囊穗，长3~15毫米，它是由许多生有孢子囊的叶片所组成；孢子叶三角形，尾状渐尖，膜质，浅黄色，长1毫米；孢子囊着生于孢子叶的基部。

分布与生境 我国东南至西南部各省、区。多生于阳光充足的酸性土壤的荒山草坡上。

药用部分 全株。

采集加工 全年可采。鲜用或晒干。

性能 味甘淡，性凉。清热镇咳，止汗、止血。

主治 1.咳嗽痰多；2.目赤肿痛；3.急性肝炎；4.止血；5.水火烫伤；6.风湿跌打。

一般用法 每用干品2~4钱，鲜品1~2两，水煎服；外用煨存性研末撒患处，水火烫伤调茶油涂敷。



铺地蜈蚣 (石松科)

Lycopodium cernuum Linn.

石 上 柏

别 名 深绿卷柏、多德卷柏。

形 态 草本，高约35厘米；主茎直立，常在分枝处生不定根。叶为单叶，细小，通常2型；四行排列于一平面上；侧叶两行，大而阔；近平展，生在茎上的近连接，生在小枝上的复瓦状，近圆形，长4~5毫米，宽约2毫米，两边不等，顶端一边楔形，基部圆，边缘有缘毛状细齿，上部齿较疏；中叶两行贴生而指向茎、枝顶端，互相毗连，卵形或卵状长圆形，较小，顶端渐尖至芒尖，边缘有缘毛状锯齿。孢子囊穗通常成对生于小枝之顶，四棱形，直径1.5毫米；能育叶圆形至卵状三角形，顶端急尖；孢子囊2型，单生于能育叶腋内，两瓣开裂，大孢子球形，小孢子小如尘土。

分布与生境 我国东南至西南部各省、区。生于密林下或阴湿沟中的石上。

药用部分 全株。

采集加工 全年可采。洗净晒干备用。

性 能 性、味未详。抗癌。

主 治 肺癌、喉癌及其他癌症均有一定疗效。

一般用法 每用干品0.2~2两加瘦肉1~2两或红枣数个，清水8~9碗，煎6小时成一碗左右，每天内服一剂。亦可制成片剂供临床试用。

附 注 本品对肺癌、喉癌疗效较好，连服一至数月，一般无不良反应，仅个别出现头晕现象。



石 上 柏 (卷 柏 科)

Selaginella doederleinii Hieron.

纤弱木贼

别名 驳节草、笔管草、木贼草、接骨草。

形态 多年生草本，根状茎匍匐，黑褐色，各节生有不定根，地上茎直立，绿色，高40~100厘米，中空有节，节间长2~6厘米，表面有纵棱6~30条，粗糙，易逐节折断；分枝一般2~5条，小枝也可再分枝。叶退化成膜质鳞片，三角状，长1.5~3毫米，于节上轮生，基部合生成鞘状，包茎。夏秋抽孢子囊穗，穗长椭圆形，成熟时黑色，长1.3~2.5厘米，顶端短尖，内有许多圆形、密集轮生的孢子囊群。

分布与生境 我国南部。生于沟边及山涧石隙中或湿地上。

药用部分 全株。

采集加工 全年可采。洗净切段晒干备用。

性能 味甘、微苦，性凉。清肝热，利小水，散风解表。

主治 1.急性黄疸型肝炎；2.目赤肿痛、角膜云翳；3.风热感冒；4.尿路结石；5.肠炎腹泻、便血、血痢；6.血崩、白带；7.疮疡疥癣。

一般用法 每用干品0.5~1两，水煎服。

附注 本品成分含无水硅酸(SiO_2)、木贼酸等，药理上有利尿、消炎及收敛作用。



纤弱木贼 (木贼科)
Equisetum debile Roxb.

白毛蛇

别名 阴石蕨、石祈蛇。

形态 草本，高10~23厘米；根茎长而横走，密被白棕色鳞片状毛，形状似蛇。叶沿根状茎散生；叶柄长5~7.5厘米，基部有关节；叶片三角形，长8~15厘米，3~4次羽状分裂，基部羽片最大，披针状三角形，长5~8厘米，基部下向的2次小羽片最大，卵状披针形，其余各对小羽片长圆形，羽状深裂，裂片钝头，3~4对。孢子囊群于叶背沿叶缘而生，囊群盖圆形，仅基部附着。

分布与生境 我国南部。附生于溪边、山谷岩石上或阴湿大树上。

药用部分 根茎。

采集加工 全年可采。采后除去根上白毛，洗净切片晒干备用或鲜用。

性能 味微甘、苦，性寒。祛风散湿，凉血利尿。

主治 1.风湿性关节炎、慢性腰腿痛、腰肌劳损、跌打损伤；2.破伤风；3.血尿；4.小儿疳积。

一般用法 每用干品0.5~1两，水煎服。



白毛蛇 (骨碎补科)
Humata tyermanni Moore

圆羊齿

别名 肾蕨、石黄皮、天鹅抱蛋。

形态 多年生草本。根茎直立，被淡棕色、钻形鳞片，匍匐茎线状，通常生有被淡棕色鳞片、近圆形的肉质块茎。叶簇生，具长达6~14厘米的柄，叶片狭披针形，长30~70厘米，宽3~5厘米，一回羽状复叶，叶轴两侧被纤维状鳞片；羽片多数，无柄，互生，常紧挤而成覆瓦状排列，披针形，长1~2厘米，宽6~7毫米，向基部渐小而变为三角形，顶端钝圆，基部心形，常不对称，边缘有浅钝齿；叶脉羽状，向上斜出，基部一回分叉。孢子囊群成1行排列于主脉两侧，肾形；囊群盖肾形，棕褐色，无毛。

分布与生境 我国东南至西南部各省、区。生于溪边、林下或阴湿石隙中。

药用部分 球状块茎。

采集加工 全年可采。去鳞片，洗净烫过晒干备用。

性 能 味甘淡，性凉。清热利湿，止泻止咳。

主 治 1.痢疾，急性肠炎，中毒性消化不良；2.感冒发热；3.慢性咳嗽；4.瘰癧，疝气。

一般用法 每用干品3~5钱，鲜品0.5~1两，水煎服。



圖 羊 齒 (骨 碎 補 科)

Nephrolepis cordifolia (Linn.) Presl

日本乌蕨

别名 解毒蕨、土黄连、小金花草、小凤尾草、霍乱草、火伤蕨。

形态 草本，高可达1米。根茎长而横走，被鳞毛。叶疏散远生，叶片草质，轮廓为卵状披针形或三角状披针形，长10~30厘米，常3或4回羽状分裂，羽片互生，最末次裂片小，形狭长，有尖头，长4~8毫米；叶柄常与叶片等长，方形，棱角明显，并有沟状直槽，但至上部则渐平坦。孢子囊群在最末次裂片上背生，短，囊群盖线形，膜质，与中脉平行。

分布与生境 广布于我国秦岭以南各地，广东仅见于北部地区。常生路边、沟边和阴湿石上。

药用部分 全草，但以根茎较好。

采集加工 全年可采。洗净切碎晒干备用。

性能 味苦，性寒。清热解毒，去腐生肌。

主治 1.急性胃肠炎；2.高热烦躁；3.烫火伤；4.解毒；5.疗疮肿痛等。

一般用法 单方或配方用，干品根茎每次3~5钱，但作解毒剂使用时应加量。

附注 1.据介绍，本品是一种较好的解毒植物，对木薯中毒、砷中毒都有疗效。2.乌韭 [*Stenoloma chusanum* (Linn.) Ching] 与本种不同科，但外形稍相似，其叶簇生，最末次的裂片楔形，顶常截平而有齿；孢子囊群顶生。据报道性味功效和本种相近。