

增補壽世保元

太乙神鍼附後  
錦章書局出版



太醫院吏白金裕雲林龔延賢子才編

痰飲

脉雙弦者寒飲也○其脉偏弦者飲也○肺飲不弦但喘短氣○文云脉浮而細滑傷飲○脉沉而緩者懸飲內痰○其人短氣四肢歷節走痛脉沉者有宿飲○左右手關前脉浮弦大而實膈上一寸半處宜汗之○病久百味入於肺上脉伏而大者痰也眼胞及眼下如炭烟薰黑者亦痰也○久得滯脈淡飲膠固脉道阻滯○汗出熱渴口渴則渴○病名也生于脾胃然脾胃氣盛飲食易耗何痰之有或食後因之氣燭勞碌驚恐風邪致飲食之精華不能傳化而成痰飲矣有流乎經絡皮膚者有鬱于臟腑支節者游溢偏集無所不至痰氣既盛客必勝主或奪于脾之大絡也氣則倏然仆地此痰厥也升于肺者則喘急咳嗽连于心者則怔忡恍惚走于肝則眩暉不仁脇肋脹滿觸之腫則治而多癥癰在于中脘則嘔瀉而作寒熱注于胸則咽膈不利眉棱骨痛入于腸漉漉有聲散于胸背則欬膈一息疼痛或寒于手足或背渾一盪散則有聲聚則不利一身上下變化百病治當各從所因是以虛宜補之火宜降之氣宜順之鬱宜開之食宜導之風寒溫熱宜發散清燥以除之故曰治病必求其本

○一論有濕痰 热痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰 宜後方加減

二陳湯 陳皮去白一錢 半夏湯泡二錢 白茯苓去皮一錢 甘草 五分 右剉一劑生姜三片水煎溫服

一溼痰盛者身軟而重加蒼朮白朮○一熱痰加黃連黃芩痰因火盛逆上降火為先加白朮黃芩軟石膏黃連○一眩暉嘈雜者火動其痰也亦加山梔黃連黃芩○一風痰加天麻枳壳南星白附子礞石牙皂之類氣虛者加荆淮俱用姜汁○一老痰用海石半夏瓜萎香附連翹之類五倍子佐此蘇大治頑痰宜丸藥喉中有物咯不出咽不下此痰結也用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜蒌杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝姜汁礞石和丸噙服之脉濶者卒難得開必費調理數日痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滞者難治○一寒痰塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛加半夏○一食積痰加神曲麥芽山楂炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜丸藥兼血虛者用補血藥送下中佳有痰者食積也當兼亦賴所養卒不便應若攻之盡則虛矣○噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星○一血虛有痰加天門冬知母瓜萎仁者附木竹澤姜汁帶血者更加黃芩白芍桑皮血滯不行中佳有食者取竹澤加生姜汁韭汁飲三五盞必胸中煩躁不寐後愈○一氣虛有痰加入參白术牌虛者宜補中氣以運痰降下加白朮白芍神曲麥芽兼用并麻提氣內傷夾痰加參黃芩白朮之類姜汁傳迷或加竹澤尤妙○一痰在膈上功用吐法寫之不去膠固稠濁者必用吐脉浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐加防風川芎桔梗茶芽生姜薑汁之類或水當散凡吐用布勒繫肚子不通風處行之○一痰在腸胃間可下而愈

枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類。凡疫用利藥過多，脾氣易虛則疫易生而多。○一疫在脣下非白芥子不能遠。○一疫在皮裡膜外，非姜汁竹瀝不可及。在四肢非竹瀝不開。在經絡中亦用竹瀝必佐以生姜韭汁。膈間有痰或癲狂或健忘或風疾俱用竹瀝與荆。

瀝同功氣虛少食用竹瀝或寢能食用荆瀝。○一凡人身上中下有塊是疫也。問其平日好食何物吐下後方用藥。○一凡人頭面頸頰身中有結核不痛不紅不作膿者皆疾注也。宜隨處用藥消之。○一凡疫之為物無處不利為隨氣升降故也。

○一論竹瀝大治熱疫及能養血消熱有痰厥不省人事幾死者。得竹瀝灌之遂甦誠起死回生妙藥也。○用水竹早筆竹截長二尺許小者每段劈作二片大者劈作四片入井水浸一時許以導磚二塊排定將竹片架于磚上兩頭露二寸下以烈火焚之兩頭以益盛瀝每六分中加姜汁一分服之疾甚者極可加半分耳。用以竹瀝加入湯藥內服之尤妙。取荆瀝亦治熱疫亦照此法取之。

○一論疫屬溼乃津液所化因風寒溼熱之感或七情飲食所傷以致氣逆鬲變為疫飲故曰疫因火動除火為先火因氣逆順氣為要。加減二陳湯 橘紅去白一錢 製半夏半錢一錢 白茯苓去皮一錢 貝母半錢一錢 枳實炒一錢 白术去芦二分 黃芩酒炒一錢 連翹五錢 防風去芦五分

天花粉七分 香附童便水一錢

甘草

三分

右剉生姜三片水煎溫服

○一論熱疫在胸膈間不化吐咯不出寒熱氣急而悶作痛者名曰疫結。

開結化痰湯 陳皮 製半夏 白茯苓 桔梗 二錢 枳壳 二錢 貝母 二錢 瓜蔞仁 二錢 黃連姜汁炒 黃芩 桔子二錢 蘇子二錢 姜皮三錢 朴硝八分 杏仁三錢 甘草八分 右剉水煎入姜汁磨木香服。

○一論遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背。亦作寒熱喘咳煩悶或作腹塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一熱如水冷脉來沉滑。乃是溼痰流注經絡關節不利故也。

清濕化痰湯 南星去白二錢 製半夏 二錢 陳皮去白一錢 茯苓去皮三錢 美活 二錢 酒芩 二錢 蒼朮米泔浸炒 五分 白芷 二錢 白芥子三錢

甘草 八分 右剉水煎入竹瀝姜汁磨木香溫服。○骨體痛甚及有腫塊作痛者名曰疫塊。加乳香錢沒藥錢海石三錢朴硝五錢。

頭項痛加川芎五錢威靈仙錢○手臂脛痛加薄桂引南星至痛處。

○一論內傷七情痰迷心竈神不守舍空則疫生以致增寒壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫上中不通證類傷寒兼治中風疫厥氣厥不省人事者。

清熱導痰湯 人參 二錢 白朮去芦五分 茯苓去皮三錢 陳皮 二錢 半夏姜汁二錢 南星姜汁二錢 枳實炒三錢 桔梗 二錢 黃連 五分

黃芩 二錢

瓜萎仁 三錢

甘草 八分

右剉加生姜一片煎入竹瀝姜汁同服。

家傳清氣化痰丸 製造甚得法。化痰清火開膈順氣消痞除脈醒酒消食殊效。天南星四兩大半夏四兩二味先用米泔水各浸三五日以透為度洗淨切片以碗一个盛貯晒乾去姜汁。次皂汗。又次攀汁。又取硝水拌透晒乾。一用生姜汁浸一旦夕晒乾。○一

用皂角煎水去渣浸一夕晒乾○一用白礬一兩煎水浸一夕多晒乾○一用朴硝一兩煮水浸一夕多晒乾○青皮去皮

陳皮去白 枳壳去膜 趵炒 枳實炒 白术去芦 蘇子炒 白茯苓去皮 香附鹽水 瓜薑仁 白芥子炒 薤蕡子炒

乾葛 桔梗去芦 杏仁去皮 神曲炒 白豆蔻去壳 黃芩酒炒 李芽炒 山楂子去核 前胡去芦 甘草各一兩

右為細和用前浸四味藥水加竹沥一碗泡蒸餅為丸如梧子大每服五七十丸茶送下或姜湯送下

○一論健脾清火癥。煩渴能軌結痰能開疎風養血清上焦之火除胸膈之痰消頭目止眩暈

十全化痰丸 膽星四兩 陳皮去白三兩 白茯苓去皮二兩 枳實炒一兩 半夏酒炒一兩 當歸酒炒四兩 白附子火煨二兩 天麻火煨三兩 防風去芦二兩 海石煅二兩 天花粉二兩

片芩酒炒二兩 黃柏酒炒二兩 知母酒炒一兩 半夏姜藥牙皂同煮半日用四兩

生甘草用三兩 大黃九次用酒蒸五兩 白术米泔水浸炒四兩 如氣虛加人參入錢 右為極細和用神曲二兩打糊為丸如

梧桐子大每服七八十九茶水送下○一秤金一名金珠化痰丸治痰嗽如神又治痰嗽 用半夏十斤米泔水浸十日換水三次取出切作兩半晒乾用白礬五斤水一桶入鐵鍋內化開將半夏入礬水內浸二十日取出切作四片晒乾用生姜十斤另研取汁再入半夏浸二十日取出晒乾為細末。入鍋內添水煮數沸取出以布瀝去渣將淨水仍入鍋內熬成膏子和成丸每病重者用藥二錢半輕者一錢金箔十張和一大丸與病人噙化忌房事此藥神效不可輕忽

○一治癰瘡方 梨汁一鐘 生姜汁半鐘 蜜半鐘 南薄荷末三兩 右四味和勻重湯煮十餘沸任意食之降痰效如奔馬

○一論痰飲為病或狂或眩晕等症無不奏效

曰九子 中州傅明岐傳 川南星四兩 半夏十兩 白附子五兩 小川烏三兩 右俱切片春七月夏三秋八冬十日水浸一日

一換日晒夜露南星半夏放磁器內少加姜汁同浸去麻性次將前藥磨末將絹巾漉去渣澄白粉晒乾白米粥糊為丸如梧桐子大每服五六十丸姜湯辰水任下其藥放舌上不麻為度方妙

打痰仙方 魯府秘方 破砂一錢 白礬半生半培一錢 磯青研細器打下 辰蒂五分 青蒙石煅紅汁內一錢 右共研細末每用二厘薄荷澄湯調入鼻內即愈

○一人氣短有痰小便赤澁足眼作痛足脈浮大按之則澁此腎氣丸補飲也用四物送六味丸不月而康仲京先生云氣虛有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之蒙昧無窮之大枉腎氣丸即六味丸也○一婦者體肥善飲仲秋痰喘用二陳芩連益氣加桑皮杏仁盜汗氣促加知母枳壳不時發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣以安中氣而愈○一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳芩連枳壳之類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸掣縮四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦急余以為鬱怒傷肝脾氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調治喜其謹疾年餘悉愈形體康健

咳嗽

咳嗽所因浮風禦寒數熱細溼房勞潘蒼右關濡者飲食傷脾左關弦短脾極肝惡浮短肺傷法當咳嗽五臟之嗽各視本部浮熱寒沉數夏熱洪滑多痰弦濶少血形盛脉紐不足以息沉小伏匿皆是死脉唯有浮大而嗽者生。

嗽謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰咳嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本須分六氣五臟之殊而其要皆主于肺蓋肺主氣而聲出也戴云因風寒者其塞聲重惡寒者是也因火者有聲痰小而赤者是也因勞者盜汗出兼痰者多作惡熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰發肺出嗽上五者大概耳亦當明其是否也治法當分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之疾延則化之濕熱則瀉之久病便屬虛虛者氣虛則補氣血虛則補血兼營則開營滋之潤之斂之降之則治虛之法也。

一論四時感冒發熱頭痛咳嗽聲重涕唾稠黏中脘痞滿嘔吐痰水寃中快膈不致傷脾此藥大解肌熱將欲成癆痰嗽喘熱用散  
蘇飲 茶蘇葉 前胡 桔梗 枳壳去穰 乾葛 陳皮 半夏湯泡  
人參五分 右剉一劑加姜棗煎服○若天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗暮寒而聲重加麻黃一錢 杏仁一錢金  
沸草一錢以汗散之○若初感冒肺多有熱加杏仁桑皮黃芩烏梅○胸滿痰多加瓜蒌仁○氣促喘嗽加知母貝母肺寒咳嗽加  
五味乾姜○心下痞悶煩熱嘈雜謀惡心或停飲不散加姜汁炒黃連枳實乾葛陳皮倍用之○鼻衄加烏梅麥門冬白朮根○心感  
發熱加柴胡黃芩○頭疼加川芎細辛○咳嗽吐血加升麻牡丹皮生地黃○人熱咳嗽久不愈加知母貝母麥門冬○見血加阿  
膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮○吐血痰嗽加四物湯白茯苓補心湯○妊娠傷寒去半夏加香附

一論上氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽口舌乾渴

母清順湯 天麥冬二錢 麥門冬去心 一錢 知母蜜湯泡 二錢 貝母甘草湯洗 二錢 人參五分 當歸身一錢 桔芩一錢 元參一錢

山梔子一錢 天花粉一錢 桔梗一錢 薄荷七分 生甘草三分 右剉水煎服

熟麻子化痰定喘丸 橘紅五錢 青黛三錢 貝母七錢 胆星一兩 天花粉七錢 桑白皮七錢 吉仁去皮尖七錢

桔梗七錢 黃芩五錢 前胡七錢 甘草三錢 右剉細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸淡姜湯化下

一論咳嗽服前方不效者多屬氣血虛弱四肢沉困宜八物湯加黃柏知母貝母麥門冬五味承姜紫蘇陳皮等分姜棗煎服

一論咳嗽早間吐痰甚多後間喘急不寐然早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上冲以後方服之

中益氣湯方見內傷依本方加麥門冬五味子○六味地黃丸方見補益依本方加麥門冬五味子

一論傷風寒鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪

一論傷風寒咳嗽面白鼻流清涕林噴嚏此肺氣虛不能宣理以補中益氣湯主之

○中益氣湯加茯苓半夏五味而愈

○一論咳嗽吐痰失音聲音嘶此元氣虛弱而致也

○中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味子杏仁黃芩承裏仁

○一論咳嗽吐痰手足時冷此肺虛寒以補中益氣湯加炮乾姜半夏

○一論聲音不如用新槐花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中補中時時將一二粒口中咀嚼咽之使喉中當有味久久聲音自出

○一治言語不出用真蘇子二錢 詞子三個 杏仁二十個 百薑莖二兩 右為末每服二錢熱調服

○一治久咳語言不出 詞子去核一兩 杏仁去皮一兩 通草二錢 右剉每服四錢煨姜五片水煎食後溫服

○一論年老人日久咳嗽不能卧者多年不愈用豬板油四兩 蜂蜜四兩米糖四兩 右三味熬化成膏時時剝桃一起口中噙化三五日其嗽即止

○一論久年咳嗽吐痰

○杏膏陳細茶細茶末同之燒為白果肉四兩一半去紅膜搗碎核桃肉四兩家蜜半斤 右藥入內煉成膏不拘時服○一治久嗽不癒并

○虛勞喘嗽 紫苑去芦頭 款冬花各二百部五錢 右為末每服三錢生姜三片烏梅一個同煎湯調下食後臨卧各一服

○一論久嗽并連嗽四五十聲者用連皮生姜自然汁一勺加白蜜二茶匙同放茶碗內煎一滚溫服三四次即止○一切咳嗽上氣者一道士賣此药不拘新久皆效 乾姜 桂心葉色鮮者去皮用 皂角泡去皮子肥大無孔者 右三味並另搗下篩了各秤分兩和合後更搗篩一過

燒白蜜搜和又搗一千杵每服三丸如梧桐子大不限食之先後嗽發即服日進三五服忌葱蒜油膩趁食

○一論年久近日咳嗽吼喘急等症

○仲吸散 國子博士顏心吾傳 鵝管石火煅研末七次用一錢 餘根石火煅醋淬七次一錢 粉草三分 枯白礬五分 石膏煅五分 敬冬花五分

右為細末每服三分二厘秤準至夜靜食後坐片時將藥放紙上以竹箇五寸長直插喉內用力吸藥速亦不怕吸藥令盡為度以細茶一口嗽而咽之忌難煮羊鷄一切動風發物并生冷諸物唯食白煮猪肉雞子戒三七日宜用公猪肺一副加肉半斤梔子一歲一個炒成炭桑白皮不拘多少用之同炒至熟爛去薑至五更病人不要開口言語令人將湯肺喂之餘者過時再食效

○一論久嗽痰喘百藥不效并年久不瘥者或能飲酒人久嗽尤效

○消金膏 曲阜令孔桂窗傳 天門冬去心一兩 麥門冬去心一兩 貝母四兩 杏仁去皮一兩 半夏四兩 姜製 石膏煅五分 右五味切片水熬去渣取汁五碗入白粉葛末四兩蜜一斤共煎汁入罐內重湯煮一日成膏取出每日無時頻服之

○一人時嘔痰涎內熱作渴肢體倦怠勞而足熱用青氣化痰益甚余曰此腎水泛而為痰法當補腎不信另進滾痰丸一服吐瀉不止飲食不入頭暈眼開始信余用六君子湯數劑胃氣漸復却用六味丸月餘諸症悉愈

○一人咳嗽氣喘鼻塞流涕余用參蘇飲一劑以散寒邪更用補中益氣以寃肺理而愈後因勞怒仍作自用前飲益甚加黃連枳實炮姜五味二劑諸症頓退再用補中益氣加炮姜五味子數劑全愈

○一治咳噯秘方 紫冬花三錢 石黑三錢 破砂七厘 甘草三錢 右為末吹入喉內用細茶漱下即好

喘急

喘屬表虛

○滑而手足溫者生脈沉濇而四肢寒者死數者亦死為其形損故也○肺受邪則喘手太陰肺爲主外感無汗而喘屬表寒有汗而心火未發扶正氣為要已發攻邪為主大概喘急甚者不可便用苦藥火氣盛故也

○一論外邪在表無汗而喘者

○虎湯 麻黃三錢 杏仁三錢 石羔五錢 甘草一錢 細茶一錢 有痰加二陳湯 右剉一劑加生姜三片水煎服立愈

○一論在裡邪寒不便脉寒而喘者

○乙未氣湯 大黃 芒硝 厚朴 枳實 甘草 木香 桀榔

右剉加生姜三片水煎服立愈

○一論寒盛而喘者 此治寒喘不能卧人扶而坐數日一服而安

○大水煎服

○一論七情鬱上而喘者用

○磨湯 人參 桀榔 沉香 烏藥 右四味各用磨汁合一處溫服之

○二子湯 治氣喘如神效

○蘇子 白芥子 蘿蔔子 水煎服立愈

○一論腹脹氣喘坐卧不得者宜服

○九香散 況香半錢 木香二錢 枳壳炒熟

半錢 破砂七厘

蘿蔔子三錢 右剉一劑加生姜三片水煎服

○一論喘急因內傷元氣不接續而喘者宜用

補中益氣湯方見內傷

○一論陰虛火熱火炎上攻而喘者宜此

消離滋坎湯方見勞瘵一用六味丸加黃柏知母亦效

○一論虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘促短氣咳嗽而喘者

蘇子降氣湯 蘇子三錢 陳皮一錢 厚朴一錢姜汁炒 前胡二錢 肉桂二錢 半夏五錢姜汁炒 當歸三錢 甘草一錢 右剉加姜棗煎服

○一論一人痰嗽氣喘宜服

二子養親湯 白芥子研 蘿蔔子研 蘇子研 南星水泡 半夏水泡 片芩去朽 赤茯苓去皮各

陳皮去白六分枳實炒六分

甘草二分 右剉一劑加生姜三片水煎溫服○一人體肥善飲仲秋痰喘用二陳芩連益基加桑皮杏仁盜汗氣促加貝母枳壳不時發熱子以為肺脾虛寒用八味丸以補土母補中益氣湯擇補中氣 八味丸見補益

哮吼

肺大抵脉浮而滑易治微細而澁難治

大哮吼以聲響名喉中如水雞聲者是也而主子痰宜用吐法亦有虛而不可吐者治之有以紫金丹導痰小胃丹刮之而愈者有以六味地黃丸補中益氣湯兼進而愈者必須量虛實而治之也

丁金定喘湯 治哮吼有如神 麻黃三錢 桑白皮蜜火三錢 杏仁一錢 蘇子二錢 白果炒二十個 欽冬花三錢 炒黃芩一錢

半夏水泡 甘草一錢 右剉一劑白水煎食送服之

諸病原來有藥方

惟愁齁喘最難當

麻黃桑杏桑蘇子 白果冬花更又良

甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須姜

病人遇此仙方藥

服後方知定喘湯

蘇沉九寶湯 蒸蘇 薄荷 麻黃 杏仁去皮 桑白皮

大腹皮 官桂

甘草 右剉一劑用生姜三片烏梅

一个水一碗煎至八分食後服即效且住膈唯慎勞碌戒厚味節慾日間常服此順氣化痰丸夜卧時服抑火潤下丸如除煩修合

六味地黃丸加黃柏知母人參紫苑丘味子百合各二兩浮小麥粉熟蜜四兩糊為丸每服百丸空心柿餅湯送下餅隨食之

二母丸 治哮喘 知母

去皮毛

貝母

去心

百薑煎一兩

右為細末將烏梅肉蒸熟搗爛為丸如梧桐大每服三十九丸

時服

或食後服連皮姜湯送下

○一論喘氣哮吼上喘不休或是盜飲水創肺裏俗謂之喘氣病用此

秘方 小蘿草一把用猪精肉四兩入水同草煮熟食肉并湯立已其草三月生七八月有四棱莖葉尖秒有花子。

○一論凡遇天氣欲作雨者便發喘噓甚至坐卧不得飲食不進此乃肺裏中積有令寒乘天陰寒氣從背自鼻而入則肺脹作聲此病有苦至終身亦有子母相作者每發即服此方不過七八次覺瘥腥臭吐出白色是縮其根也用此方。

金丹 白砒一錢生研 枯白礬三錢另研 沉豆豉出山西者用一兩水浸去皮蒸研如泥復加二味末合勻

右摺作丸如棗豆大但覺舉發用冷茶送下七丸甚效

九丸以不喘為愈再求必多增丸數慎之小兒服一二丸

等痰小冒再方是瘦氣治哮吼經年不愈宜父父服之斷根。

○一論哮吼氣急而不息者宜用

均氣入仙湯 麻黃二錢 杏仁二錢 石羔三錢 桔梗一錢 片芩二錢 知母二錢 貝母

一錢用生桑葉半錢半錢三分爲末

生甘草一錢

右剉一劑水煎溫服

○一治上氣喘急經年咳嗽動慄久不愈遇發即服服三五丸永不再發

奪命丹

人言一錢 白礬二錢 白附子二錢 南星四錢 半夏

泡五錢 半夏泡五錢

右先用人言與白礬一處放石器內火煅紅出火黃

色為度切不可犯鐵器却和半夏南星白附子等姜汁煮

趁糊為丸泰米大朱砂爲衣每服七丸小兒三丸井水化下忌食熱物

哮吼靈松丹 方上異人傳

胆南星二兩 大半夏

二兩用白礬五錢半夏五錢同燒一夜不見白星

赤茯苓

去皮二兩

苦參

磨二兩

沉香一兩

大貝母二兩 青蒙石

五錢硝研

天竺黃二錢 珍珠

三錢用豆漿水研

白附子

孩兒茶五錢 款冬花一兩

花蕊石火燄五錢

硼砂一兩

鉛白霜

五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三十

丸臨卧時淡姜湯下外製六味地黃丸空心服百中真仙方

○一治素患哮吼之疾發則喘急痰嗽上壅不時舉發令慎勞役戒厚味節飲草脯六味丸加黃柏知母人參紫苑五味百合各二兩

浮小麥粉蜜四兩打糊為丸每服百丸空心柿餅湯下餅隨食之夜卧時服後方各一料而愈

丁金定哮丸 南星

半夏

各四兩用生姜牙皂角各三兩蜜酒各半兩入麝香同星半夏至蜜乾姜蜜泡不用用南星半夏

錦紋大黃

九錢一兩

貝母

特研枳實炒

黃連姜炒

一兩

天麻

燭蚕炒

一兩

青蒙石

用硝研如金色者五錢

黃芩

一兩

右為細末竹瀝姜汁和為丸如梧桐子大每服一丸臨卧口含化下或足如泰末大姜湯送下亦可

○一人哮吼十餘年發則上氣促咳嗽吐痰自干四肢厥冷大脉沉細此氣虛脾弱用

黃芪

二錢蜜水炒

人參二錢

白术二錢去芦

白茯苓

去皮二錢半夏二錢

杏仁三錢

五味子三分

麥門冬

二錢去心

天門冬

二錢去心

陳皮半錢

甘草八分

右剉一劑加

清上補下丸 懷生地黃  
生地黃四兩 南棗酒蒸去核二兩 懷山藥一兩 白茯苓去皮兩半 牡丹皮一兩 澤瀉半兩 遷五味子一兩

天門冬去心一兩半錢 枳椇炒一兩半錢 貝母一兩半 麥門冬去心一兩半 桔梗去根一兩半 黃連姜炒一兩半 杏仁去皮一兩半 半夏姜汁炒一兩半

水蓼仁去油一兩半 枯芩酒炒一兩半 甘草五錢 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢空心淡姜湯送下。

### 瘧疾

脈弦數滑寔皆順沉細虛浮為逆 瘧脉自弦微則為虛代散則死

瘧症皆因先傷于暑後感于風客于榮衛之間腠理不密復遇風寒閉而不出舍于腸胃之外復與榮衛並行于陽夜行于陰並則病作離則病止併于陽則熱併于陰則寒淺則日作深則間日。在氣則早。在血則晏。按本經曰瘧脉自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦短者傷食。弦滑者多痰。而緊者宜下。浮大者宜吐。弦遲者宜溫此治瘧之大法。其病熱多寒少。心煩少睡者屬心。名曰溫瘧。用柴芩湯。但寒少熱。腰疼足冷者屬腎。名曰寒瘧。用桂附二陳湯。先寒而後大熱咳嗽者屬肺。名曰輝瘧。用參蘇散。熱多寒少。筋脉拘束者屬肝。名曰風瘧。用小柴胡湯加烏薦香附。寒熱相停嘔吐痰沫者屬脾。名曰食瘧。用清脾飲。瘧愈之後陰陽兩虛。勞遺咳嗽。不善保養遂成勞瘧者能清養體節食避風如此調治無不愈矣。

○一論瘧疾無汗要有汗散邪為主大凡瘧疾初起宜服此發散出汗立愈用此方。

散邪方 川芎 白芷 麻黃 白芍 防風 荆芥 紫蘇 羌活 甘草 右剉加生姜三片葱白三根水煎露宿次早溫服。

○有汗要無汗正氣為王宜用 正氣湯 柴胡八分 前胡二錢 川芎一錢 白芷一錢 半夏二錢 麥門冬二錢

枳榔一錢 草果一錢 白茯苓二錢 青皮二錢 桂枝六分 甘草八分 右剉加姜棗煎預先熱服。

○一論瘧疾不論先寒後熱先熱後寒諸瘧通用 清脾飲 青皮二錢 厚朴姜炒 白朮一錢 半夏姜炒 柴胡八分

黃芩二錢 草果一錢 甘草八分 白茯苓三錢 右剉加生姜五片水煎溫服。

○一論諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澁或作吐瀉用

加減柴芩湯 柴胡八分 黃芩三錢 半夏姜炒 二錢 猪苓二錢 澤瀉二錢 荸朮一錢 青皮二錢 厚朴姜炒 柴胡一錢

草果一錢 乌梅二錢 甘草八分 右剉加姜棗煎服。

○一論五臟氣虛喜怒不節以致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾并治諸瘧。

四獸湯 人參一錢 白朮半錢 白茯苓去皮三錢 桔紅一錢 半夏姜炒 二錢 草果仁三錢 乌梅去核二錢 甘草二錢 分生姜二片 棗子四粒

右剉以鹽少許淹食項用厚皮紙包裹以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服一兩水一碗煎半碗溫服未發前連進數服神效。

卷之二  
論人平素不足，兼以勞役內傷，扶感寒暑，以致瘧疾。寒熱交作，肢體倦怠之力少，或瘧發經年不愈，則氣血皆虛，瘧邪深入，名曰瘧瘈，此方主之。

味補中益氣湯

黃芩一錢半

人參八分

白朮去夢

陳皮六分

當歸八分

柴胡一錢

升麻三分

製半夏八分

黃芩一錢

白芍八分

甘草五分

右剉加姜棗

空心服

○有汗加桂枝五分

倍黃芩，熟地五分

倍柴芩，渴加麥門冬

天花粉

○一治傷暑發瘧宜服

香薷散

香薷四錢

厚朴姜汁

扁豆蔻一錢

烏梅一錢

右剉水煎，臨熱入姜汁一匙，溫服

○一論熱約火盛，舌卷焦黑，算如烟色，六脉弦洪而緊，此乃陽毒而深，先以青竹指晝數重，新汲水浸之，搭于胸上，須臾再易，如此三次熱勢稍退，即服此藥。

肥虎湯

柴胡一錢半

黃芩七分

半夏七分

石斛二錢

知母一錢

黃連一錢

黃柏八分

梔子八分

粳米五十粒

石斛加姜棗煎服

○一治瘧瘈大熱煩躁宜用

地龍飲子

生地龍三錢

入生姜汁薄荷汁

生薑各少許

新汲水調和服如鹽

加龍腦少許

○一治虛弱之人，患瘧初起，感寒者也

積散依本方用加姜葱煎服，方見中寒

○一論體虛之人，患瘧寒多，久不愈者，不可用截藥，宜用

分利順元散

川烏一兩去皮

半生半熟

附子一兩去皮

半生半熟

南星二兩半

半生半熟

本香

見火五錢

右剉每服四錢，生姜十片，棗七枚，水一碗，煎七分

當發早晨連進二三服

半生半熟

能分解陰陽也

○一論諸瘧，不問寒熱，後熱或先熱，後寒或寒熱獨作，或連日并發，或間日一發，頭疼惡心，煩渴引飲，氣息喘急，口苦咽乾，諸藥不效者，宜服此截之。

吊山飲子

常山二錢

草果二錢

不知母二錢

良姜半錢

烏梅半錢

火甘草一錢

右剉一兩

劑，棗五個，未發時煎，連進二服

○一論瘧夜發者，乃陰經有邪，此散血中之風寒也，宜此

竹黃桂枝湯

麻黃一兩去節

桂枝二錢

黃芩一錢

桃仁去皮三十個

甘草三錢

右剉水煎服

桃仁散血緩用之藥

○一人瘧腹中有癖，用水磨沉香下，雄黃解毒丸，打下黑血，如泥極臭，是其驗也，方見通治

○一海外高僧傳子周少峰，治瘧疾不問，新久虛實寒熱，諸般鬼症，亦瘧瘈，瘧瘈瘧瘈，一服立愈，其效如神，用番木鳖魚，即馬錢子去壳，炒至黑色者

一兩

雄黃一錢

朱砂一錢

甘草一錢

右共為細末，每服四分，其瘧將發，預先吃飯一碗，將藥水酒調服，益被卧，即愈

○一治瘧疾，服藥轉加寒熱者，知太陽陽明少陽三陽合病也

桂枝五錢

石膏半兩

知母半兩

黃芩一兩

右剉水煎服

○一治久瘧不能食胸中鬱熱欲吐而不吐以此吐之 雄黃 甜瓜蒂 赤小豆各等分 右共爲末每服五分溫水調下以吐為度

○一論久瘧積成癥瘕癰在胸腹之間諸藥不效者宜用

保瘧飲 蒼朮米泔水 草果去皮 桔梗 青皮 陳皮 良姜各五錢

桂心

蘇葉

乾姜各三錢

川芎二錢

甘草一錢

右每服一兩水煎入益少許空心服

補中益氣湯 方見內傷依本方加常山根榔知母貝母一二劑自效已愈後去四味只用本方調理多服自然正氣盛邪氣自退矣

○一論患瘧寒熱用止截之劑反發寒熱寒熱飲食少懶神思昏倦脉或浮洪或微細此陽氣虛寒以補中益氣湯 方見內傷依本方參芪歸木各用三錢甘草一錢五分加炒乾姜炮附子各一錢一劑寒熱止數劑元氣自復

○一論經年久瘧氣血俱虛而三日五日一發者以全大補湯 方見補益依本方益邪氣在陽分淺而易治邪氣在陰分深而難治且多服為良

○一治三年久瘧不瘥用棟參乾生姜各五錢酒調服汗出立止

○一凡瘧後形體骨立發熱惡寒食少體虛補中益氣內參芪歸木各加一錢甘草一錢五分炮姜一錢一劑而寒熱止數劑而元氣復

○一婦人瘧久不已發後口乾倦甚用七味白朮散加麥門冬五味作大劑煎與恣飲再發稍可乃用補中益氣加茯苓半夏十蘇附子而愈凡截瘧余常以參芪各一兩生姜四兩煨熟煎服即止或以大劑補中益氣加煨姜尤效生姜一味亦效

○一凡父瘧多屬元氣虛寒益氣虛則寒血虛則熱胃虛則寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食戰慄泄瀉手足厥冷皆脾胃虛宜補中益氣諸症悉愈若手足厥冷加大附子

○一婦人久患瘧瘧作則經不行形虛脉大頭痛煩食大便泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹蓋由久瘧正氣已虛陰火獨旺以益氣湯治之即愈惟不時頭痛加蔓荆子而止又兼六味丸而經行

痢疾

○宜微小不宜浮滑大不宜弦急身寒則生身熱則死

○治者名之滯下是也多出感受風寒暑濕之氣及飲食不節有傷脾胃積寒結而成也其症大使君過裡急後重數至圓而不能便腹中疼痛所下或白或赤或赤白相雜或下鮮血或如豆汁或如魚膾膿血相雜或如屋漏水此為感之有輕重積之有深淺也其

濕熱滯積于血分。則赤積于氣分。則白。赤白兼下。血氣俱受邪也。雖有赤白二色。終無寒熱之分。通作濕熱治之。但分新久。更量元氣用藥。凡利初患。元氣未虛。必須下之。下後未愈。墮症調之。利稍久者不可下。胃氣敗也。利多屬熱。亦有虛與寒者。虛者宜補。寒者宜溫。年老及虛弱人不宜下。大便了而不下者。血虛也。數至圊而不便者。氣虛也。

丹溪曰。赤痢屬血。自小腸來。白痢屬氣。自大腸來。

下痢不治症

下如魚腦半生半死。○下若屋漏水者必亡。○下若塵腐色者必死。○下純黑者死。○下純紅者難治。身熱脉大者死。是亦大概言之耳。小便絕不通為胃絕。

國將軍九治利之總司也。錦紋好大黃一斤切薄片分作四處聽用。○一分用川黃連去毛一兩切片水浸汁。拌大黃同炒乾為度。○一分用吳茱萸去梗一兩用水泡成汁。拌大黃同炒乾為度。○一分用人乳湯浸拌大黃炒乾為度。○一分用童便浸大黃炒乾為度。右四分共合一處為細末。酒打米糊為丸如梧子大將一半三蒸三晒。將一分晒乾各包聽用。○如白利用吳茱萸黃連送下三十九半生半熟。○如赤白利用吳茱萸黃連煎湯送下三十九半生半熟。

○一論赤白痢疾。初起積滯不行。裡急後重。煩渴登圓而去少腹痛等症。宜先用此下之。

○自運化滯湯 當歸尾一錢 白芍一錢 黃連一錢 黃芩一錢 黄柏一錢 枳壳一錢

錢五分 柴胡炒

枳榔一錢 木香一錢

大黃三分半

滑石二錢

甘草二分

右剉水煎空心熱服

○一論下痢白多。不拘新久。或用前藥復未愈者。用此和之。

○大和中湯 當歸酒洗上

白芍土炒

白朮去芦

陳皮

黃芩炒

黃連錢有紅

木香少許

甘草

右剉水煎食前服

○一論下痢紅多。不拘新久。或用前約下後未愈者。用此調之。

○四歸調血湯 當歸二錢 川芎一錢 白芍三錢 黃連一錢

黃芩一錢 升麻五分

桃仁去皮另研一錢

右剉一劑水煎空心

服。○如白痢加吳茱萸炒一錢。黃芩黃連用酒炒。○赤白痢加白朮。茯苓。陳皮。香附各一錢。

○一治赤痢血利痛不可忍。又治血痔。其效如神。病雖垂殆。一服即愈。

○藜湯 阿膠炒 桔壳慈炒 茯苓 茯神 白芷 川芎 赤芍

生甘草 桃仁去皮 大黃 右剉一劑水一盞半。入蜜三匙。再煎溫服。

○一治素有積熱。下痢白膿。腹痛脹滿。日夜無度。漸至大便閉結。小便不通。此三焦有實無虛。服此即愈。或下痢鮮紅。或赤白相雜。皆效。

清臘解毒湯 黃連 莪芩 黃柏 柴胡 大黃 連翹 滑石 木通 車前子 海金沙 枳實

義木 右剉水煎空心服 ○一治脾泄渴屬氣虛者此

加味六君子湯 人參 白朮去芦 白茯苓去皮 黃芩各一錢 懶山藥二錢 砂仁研一錢 甘草五分 右剉一劑加蜜三枚水煎空心溫服○如腹痛加炒黑乾姜水香各五分烏梅一個

○一論下痢赤白膿血相雜腹痛裡急後重日夜無竟日久不愈不能起床不思飲食疲倦之甚或服寒涼峻利之過者宜用加減補中益氣湯方見內傷依本方去柴胡加白芍炒澤瀉木香砂仁白豆蔻地榆御米壳醋炒三分

○一論嘔經服推滌藥過多又服攻擊殺伐等他醫而不效者以致形氣極弱去無休息積久惡候出者並與救之

春臟復元湯 人參三錢 白朮去芦炒一錢半 白茯苓一錢半 甘草五分 右剉一劑北棗三枚水煎空心溫服渣再煎服謹節飲食

白豆蔻去壳研一錢

乾姜炒黑一錢

粟壳去芦炒一錢半 附子炮五

烏梅一个

木香一錢 甘草五分 右剉一劑北棗三枚水煎空心溫服渣再煎服謹節飲食

白豆蔻去壳研一錢半 附子炮五

烏梅一个

○一論嘔口痢其病有冷有熱有冷熱不調皆須先發散表裡如手心熱目赤是熱宜敗毒散加陳米煎服如手心冷及純下白痢者

是寒宜用連肉不去心為末用米飲調服三錢○敗毒散方見感冒又治疫痢發熱合境皆然者神效加白芍黃連尤效

○一治虛弱之人嘔口痢飲食不下參苓白朮散方見內傷依本方加石蓮肉石菖蒲各一兩或有氣滯加木香五錢右共為末

每服二錢桑湯調下○嘔口痢粳米湯下○休息痢砂糖湯下

○一治下痢諸藥不效者以好醑酒半盞姜汁半盞倉米湯半盞三味合一處入陳乾松菜一撮揉爛并食之胃口立開如口不開用

鐵筋撥開牙齒灌下立已○一治嘔口約食俱不受用田螺數枚連壳搗爛入麝香少許調勻填滿脣內引熱下降服藥再不吐矣

○一治嘔口痢食不下老倉米炒香熟為末准鹽火煅每米粉三四匙盞少許白滾水下

○一治下痢嘔口點眼方黃眉江傳用首胎糞磁器收入水銀養住入麝香少許點眼即能食○一治下痢嘔口胡養恆傳用雞一隻

去毛糞切片入罐內用胡椒末五錢入水同煎用子刺孔今患痢人鼻孔聞之即立時思食○一治下痢嘔口飲食不下多是胃

氣熱甚用黃連三錢人參半錢甘草五分○一方加石蓮肉各一錢右用水煎終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好

○又方以秤槌燒紅用好醋淋令病人開口吸氣吞之即效○一治痢疾發呃益元散用人參白朮黃湯調下頓服即止

○一治久痢休息不止百方不效用黃連末木香末十分之一猪胰頭去油入藥水煮爛搗為丸如梧子大每服五十丸空心米湯下

○一人年老久痢不止肌瘦如柴日夜苦楚命已垂危用人參一兩水煎服之量有微汗而甦後用十全大補湯調理而安

○一人下痢小腹急痛大便欲去不去此脾胃氣虛而不墮必用補中益氣送八味丸二劑而愈此等症候因利約致損元氣腫脹肢

體而死者不可枚舉。○一人傳食毒病腹痛下隊或用疏道之劑。兩足腫脹。食少體倦煩熱作渴。脉洪數按之微細。予以六君子。加姜桂各二錢。吳茱萸五味子各一錢。煎熟冷服之。即睡覺而諸症退。丹劑全安。此假熱而治假寒也。

○一人嘔吐不食腹痛後重。自用大黃等約一劑。腹痛甚甚者。汗發熱。舌濶脈大。子用參术各一兩。尖甘草炮乾姜各三錢。升麻一錢。水煎一服而甦。又用補中益氣湯加炮乾姜二劑而愈。○一人病後兩足浮腫。胸腹脹滿小便短少。用分利之劑。偏身腫。薦氣喘。予曰兩足浮腫脾氣下陷也。胸腹脹滿脾虛作痞也。小便短少肺不能生腎也。身腫氣喘脾不能生肺也。予用補中益氣湯加大附子而愈。半載後因飲食勞倦。兩足浮腫小便短少。仍服前藥頓愈。

○一人下血服犀角地黃湯等药。其血愈多。形體消瘦。發熱少食。裡急後重。此脾氣下陷。余用補中益氣加炮姜一劑而愈。

○一人血痢。及下血不止。以六味丸加地榆阿膠炒黃連黃芩生地黃一劑即效。

○一人患泄後重。自知醫。用芍藥湯後重益甚。飲食少思。腹寒肢冷。予以葛根湯加木香炮姜三劑而愈。

### 泄瀉

脉多沉陽子風則浮。傷于寒則沉細。傷于暑則沉緩。傷于濕則沉緩泄而腹脹脉弦者死。又云。脉緩時微小者生。浮大數者死。天泄瀉屬溫。屬氣虛。有火有痰。有食積。有寒。有脾泄。有腎泄。凡瀉水腹不痛者濕也。飲食入胃不住。完穀不化者氣虛也。腹痛瀉水如熱湯。痛一陣瀉一陣者火也。或瀉或不瀉。或多或少者痰也。腹痛甚而泄瀉。瀉後痛減者食積也。肚腹痛四肢冷者寒也。常嘔泄瀉者脾泄也。五更泄者腎泄也。宜分別而治也。大概泄瀉因食傷其脾者居多。以胃苓湯加減主之。

○一論中暑傷濕。停食矣。食脾胃不和。腹痛泄瀉作渴。小便不利。水穀不化。陰陽不分者濕也。

### 胃苓湯

主方

蒼朮

米泔

厚朴

炒姜汁

陳皮

一錢

澤瀉

一錢

白朮

去芦炒

白朮

炒半

白芍

炒半

肉桂

三分

甘草

尖三

右剉

一劑

生姜

三片

棗二枚

水煎溫服

○泄瀉稍

火加升麻防風

○有熱者

加酒炒黃連

○有寒者

加炒

乾姜

一錢

吳茱萸

五味子

各一錢

煎熟

冷服

○

升麻

酒洗

四分

右剉

加姜

蜜煎

前服

○腹痛加肉桂

○忌油膾

○

論泄瀉腹痛

瀉水如熱湯

痛一陣瀉一陣

者火也宜

○

論泄瀉飲食入胃不住

完穀不化者氣虛

也

益氣健脾湯

人參二錢

白朮

一錢五分

去芦上皮

白朮

三錢

蒼朮

一錢五分

水泔浸

乾姜炒黑

八分

柯子

錢二

肉桂

六分

升麻

四分

右剉

加姜

蜜煎

前服

○腹痛加肉桂

○忌油膾

○

論泄瀉腹痛

瀉水如熱湯

痛一陣瀉一陣

者火也宜

○

加味四苓散

白朮

五分

白朮

三錢

猪苓

半錢

猪苓

二錢

梔子

三錢

黃芩

二錢

白芍

三錢

甘草

八分

右對燈心一莖水煎空心服

○一論泄瀉或多或少或寫或不瀉者痰也宜

加味二陳湯 陳皮二錢 半夏二錢 姜半錢 蒼朮一錢 砂仁八分 山藥一錢半 木通二錢 車前子二錢 甘草八分

白茯苓三錢 去皮厚朴八分 姜半錢炒 右對一劑加生姜三片 烏梅一個 燈心十莖水煎溫服

○一論泄瀉腹痛甚而泄瀉瀉後痛減者食積也用

香砂平胃散 蒼朮一錢 陳皮二錢 白茯苓三錢 去皮 白朮一錢 半夏二錢 姜半錢 砂仁一錢 香附一錢炒 二分 神曲一錢炒 三分 火甘草八分 右對加生姜煎服

○一論劉草客痛瀉要方。傷食腹痛得瀉便減今瀉而痛不止故責之土敗木賊也 白朮三錢炒 白芍一錢炒 陳皮錢半 防風一錢 白芍二錢厚朴姜半錢

右對水煎溫服

○一論泄瀉肚腹疼痛四肢厥冷者寒也宜

附子理中湯 白朮一錢半 姜八分 乾姜八分 人參二錢 白茯苓三錢 厚朴姜半錢炒 蒼朮一錢五分 熟附子八分 火甘草八分

右對加生姜水煎服

○一論泄瀉氣弱易飽常常稀溏者此脾泄也用

扶脾散 蓮肉去心不去一兩半 陳皮一兩 白茯苓一兩 白朮一錢炒 去皮參芽一錢五分 共為末每服二錢白砂糖二錢白滾水送下補

脾助元氣令人能食止瀉

○一論滑瀉日夜無度腸胃寒不禁宜服

八柱散 人參二錢 白朮半錢 肉豆蔻錢二分 乾姜八分 乾姜半錢炒 柯子一錢 大附子八分炮去皮鹽粟壳蜜水炒 甘草分八錢

右對一劑加生姜一片烏梅一個燈心一株水煎溫服

補脾丸 痘治同前 白朮去芦十四分一兩分四錢炒 肉桂二小錢三錢炒 蓮肉去心 人參各一錢 甘草五錢 炒白芍五錢

煨木香四錢 山藥一錢 陳皮七錢 乾姜三錢 右為細末加神曲末煮粥打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心淡姜湯

送下不耑治老人弱人脾泄濕殊中。

○一論泄瀉脾腎虛弱清晨五更作瀉或全不思食或食而不化大便不寢者此腎泄也凡飯後隨即大便者蓋脾腎交濟所以有水

穀之分脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而大腸為之餐泄也治法用二神丸主之

二神丸 破故紙炒四兩 肉豆蔻生用二兩 右為末用大紅棗四十九個生姜四兩切碎同大棗用水煮熟去姜取棗肉和為丸

○一人病瀉每至五更輒即利此腎泄也用五味子散數服而愈因起居不慎泄復作年餘不瘥此命門火虛不能生脾土法當補其母火者土之母也遂用八味丸補其母瀉即止食漸進東垣云脾胃之氣盛則能食而肥虛則不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根也故用八味丸奏效只用六味丸亦可

○一論大便滑利小便閑澁或肢體漸腫喘咳唾沫為脾腎氣血俱虛

十全大補湯方見補益送下四神丸

○一論腎虛久瀉不止用六味地黃丸加五味子破故絲肉豆蔻吳茱萸方見補益大抵久瀉多由泛用消食利水之劑損其真陰元氣不能自持遂成久瀉若非補中益氣湯四神丸滋其本源後必胸痞腹脹小便淋瀝多致不起○一人患泄瀉日久不止以致元氣下陷飲食入胃不住完穀不化肌肉消削肢體沉困面目兩足腫滿上氣喘急此元氣脾胃虛之甚也宜

補中益氣湯方見內傷依本方減當歸加酒炒白芍

茯苓澤瀉山藥蓮肉木香乾姜炒黑止泄瀉之良方也

○一世瀉因內傷勞倦飲食遲而泄及脾胃素虛濕熱但遇飲食勞倦即發而肢體疲軟沉困世瀉者以益氣湯去當歸加炒白芍

茯苓蒼朮猪苓澤瀉生姜茱萸煎服

按右諸方治泄瀉有濕瀉有火瀉有痰瀉有食積瀉有土敗木敗瀉有寒瀉有脾

瀉有脾胃瀉有元氣下脫瀉有督瀉有虛寒滑脫久瀉不止者宜依病對方而用也

○一人食下即變厭食而即瀉不敢食一些食之

即瀉諸藥不效以生紅柿核綠色水濕炭火燒熟食之不三四個即止

○一秘方治泄瀉○用雞子一個將小頭破開入胡椒七粒

絲糊頂煨熟好酒送下燒酒更妙將胡椒煎吞下

○一世瀉二三日或腹疼痛生姜豆豉胡椒煎湯熱服立止

○一治暴泄不止小

便不通車前子炒為末每服二錢米飯調下其根葉亦可搗汁服此藥利水道而不動元氣

○一治泄瀉用獐猪肚一枚洗淨去

脂膜入大蒜在內以水煮爛搗成膏入油製蒼朮陳皮姜汁炒厚朴大甘草各等分為末同杵為丸如梧桐子大每服三十九空

心米湯下鹽湯亦可

○一治許州黃太守患泄瀉二三年不愈每飲燒酒三盞則止二三日以為常是藥不治名余診之六脉弦數

先服此藥以解酒毒後服理氣健脾丸加澤瀉而愈方見傷寒門

○又方宣黃連一兩生姜四兩

右為一處以慢火炒令乾姜脆

色去姜取黃連搗末每服二錢空心臍茶清下甚者不過二服而治久患脾泄

○一大便溏泄米穀不化用黃連酒炒

白芍炒

吳茱萸炒各等分

右為細末用小米飯為丸如梧桐子大每服五

人參白朮乾姜甘草水煎熱服中寒重者加附子

○一治久瀉大腸滑泄用

五倍子炒五兩為末麪糊為丸如梧桐子大每服五