


全国卫生专业技术资格考试系列丛书

人机对话版

妇产科学

标准化试题及解析

主编 张浩如 王瑞臻 陈禹华



第二军医大学出版社

Second Military Medical University Press

· 全国卫生专业技术资格考试系列丛书 ·

妇 产 科 学

标准化试题及解析

主 编：张浩如 王瑞臻 陈禹华

副 主 编：孙海玲 李方丽 徐春芳

刘美兰 郭玉华

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

妇产科学标准化试题及解析/张浩如,王瑞臻,陈禹华主编. —上海:第二军医大学出版社,2009.1

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

ISBN 978-7-81060-885-5

I. 妇… II. ①张…②王…③陈… III. ①妇科学-医药卫生人员-资格考核-解题 ②产科学-医药卫生人员-资格考核-解题 IV. R71-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第153983号

出 版 人 石进英

责任编辑 任 姐

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

妇产科学标准化试题及解析

主 编:张浩如 王瑞臻 陈禹华

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路800号 邮政编码:200433

电话/传真:021-65493093

全国各地新华书店经销

青州市新希望彩印有限公司印制

开本:787×1092 1/16 印张:19.75 字数:460千字

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

ISBN 978-7-81060-885-5/R·691

定价:42.00元

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年开始全国卫生专业初、中级技术资格实行以考代评。考试取得的资格代表了被认可具备相应专业技术职务要求的水平与能力，被单位作为聘任相应技术职务的必要依据。为适应考试的新变化，针对考生临考备战进行综合性巩固，我们组织有关专业人员编写了《全国卫生专业技术资格考试系列丛书》。

本套丛书的特点：

1. **标准性：**试题难度、题型分布、题目数量均与正式试卷一致，附有答题卡及参考答案，并对部分题目进行详细解析。
2. **全面性：**五套标准试题全面涵盖大纲规定考查的知识及能力，并突出重点、难点、要点。
3. **预测性：**每套试题均根据历年试题对命题规律进行总结和预测后精选而成，命题率高。

本书难免存在不足和疏漏之处，敬请广大读者批评指正，以便我们进一步修改和完善。

编者

2009 年 1 月

目 录

标准化试题（一）	(1)
基础知识	(1)
相关专业知识	(13)
专业知识	(25)
专业实践能力	(38)
参考答案及解析	(51)
标准化试题（二）	(65)
基础知识	(65)
相关专业知识	(77)
专业知识	(89)
专业实践能力	(102)
参考答案及解析	(115)
标准化试题（三）	(125)
基础知识	(125)
相关专业知识	(137)
专业知识	(149)
专业实践能力	(161)
参考答案及解析	(175)
标准化试题（四）	(187)
基础知识	(187)
相关专业知识	(199)
专业知识	(211)
专业实践能力	(224)
参考答案及解析	(237)
标准化试题（五）	(247)
基础知识	(247)
相关专业知识	(259)
专业知识	(271)
专业实践能力	(284)
参考答案及解析	(297)

标准化试题(一)

基础知识

答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 自输卵管伞端延伸至盆壁的韧带是
 - A. 主韧带
 - B. 阔韧带
 - C. 骨盆漏斗韧带
 - D. 子宫骶骨韧带
 - E. 圆韧带
2. 骨盆入口前后径的前端是
 - A. 耻骨联合下缘
 - B. 耻骨联合上缘中点
 - C. 耻骨联合上缘
 - D. 耻骨联合下缘中点
 - E. 耻骨联合后面中点
3. 出生 1 分钟的新生儿，心率 94 次/分，无呼吸，四肢稍屈，无喉反射，口唇青紫全身苍白。Apgar 评分为
 - A. 4 分
 - B. 5 分
 - C. 3 分
 - D. 2 分
 - E. 1 分
4. 妊娠几周后，B 型超声可作为产前诊断项目
 - A. 12 周
 - B. 16 周
 - C. 20 周
 - D. 24 周
 - E. 28 周
5. 不会经胎盘传染给胎儿的是
 - A. 甲型肝炎病毒
 - B. 乙型肝炎病毒
 - C. 丙型肝炎病毒
 - D. 丁型肝炎病毒
 - E. 戊型肝炎病毒
6. 神经管缺陷胎儿的检测，最常用的是检测羊水及母血中何种物质的含量
 - A. CA₁₂₅
 - B. CEA
 - C. AFP
 - D. E₂
 - E. PRL
7. 子宫最狭窄的部分是
 - A. 组织学内口
 - B. 解剖学内口
 - C. 子宫颈管
 - D. 子宫峡部
 - E. 子宫外口
8. 缩宫素和加压素贮存和释放部位是
 - A. 下丘脑
 - B. 肾上腺

- C. 卵巢
 - D. 神经垂体
 - E. 腺垂体
9. 对于受精卵不恰当的是
- A. 经桑葚胚发育为晚期囊胚
 - B. 在输卵管运送期间分裂成桑葚胚
 - C. 依靠输卵管蠕动和纤毛推动被送到宫腔
 - D. 最外层是滋养层
 - E. 着床在子宫内膜海绵层
10. 妊娠后半期羊水的主要来源是
- A. 羊膜的透析
 - B. 胎儿皮肤的透析
 - C. 胎儿呼吸道黏膜的透析
 - D. 胎儿尿液
 - E. 脐带表面
11. 首选诊断早孕的辅助检查方法是
- A. 黄体酮试验
 - B. 阴道脱落细胞学检查
 - C. 尿妊娠试验
 - D. 基础体温测定
 - E. 宫颈黏液涂片干燥后镜检
12. 分娩时子宫颈口扩张的机制下列哪项是不恰当的
- A. 是前羊水囊扩张的作用
 - B. 子宫颈扩张的快慢是决定产程长短的因素之一
 - C. 破膜后胎先露直接压迫子宫颈
 - D. 是子宫体肌肉缩复作用向上牵拉的结果
 - E. 初产妇的子宫颈管消失与子宫颈扩张同时进行
13. 产后子宫恢复至非孕期大小约需
- A. 3 周
 - B. 4 周
 - C. 5 周
 - D. 6 周
 - E. 7 周
14. 关于妊娠剧吐的发病机制下列叙述不恰当的是
- A. 临床表现的程度与血 HCG 水平有正相关关系
 - B. 葡萄胎患者的发病率较一般孕妇的高
 - C. 目前病因尚不明确
 - D. 精神过度紧张焦虑的孕妇发病率高
 - E. 经济状况较差的孕妇发病率相对高
15. 产妇分娩后, 出现阴道持续出血, 阴道流出约 200 ml 鲜红色血, 可自凝, 其最可能的诊断是
- A. 软产道裂伤
 - B. 子宫收缩乏力
 - C. 凝血功能障碍
 - D. 胎盘部分剥离
 - E. 阴道静脉破裂
16. 应用抗癌药物疗效最佳的是
- A. 原发性卵巢癌
 - B. 卵巢转移癌
 - C. 子宫颈癌
 - D. 子宫内膜癌
 - E. 绒毛膜癌
17. 下列哪项不是孕激素的生理作用
- A. 使子宫内膜由增生期转变为分泌期
 - B. 使宫颈黏液黏稠, 拉丝度降低
 - C. 排卵后使基础体温上升 $0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$
 - D. 对下丘脑有负反馈作用

- E. 促进钠、水潴留
18. 宫颈癌超越宫颈波及阴道未达下 1/3, 无宫旁浸润, 按 FIGO (1995) 的临床分期, 应属于
- II_B 期
 - II_A 期
 - I_B 期
 - III_A 期
 - III_B 期
19. 神经性厌食导致的闭经属于
- 垂体性闭经
 - 卵巢性闭经
 - 子宫性闭经
 - 下丘脑性闭经
 - 以上选项都不是
20. 对于性腺的发育, 下列的描述哪项是不恰当的
- 生殖嵴与中肾嵴相邻, 外侧为中肾嵴, 内侧为生殖嵴
 - 卵巢的始基是生殖嵴
 - 中肾嵴的发生早于生殖嵴
 - 中肾嵴的形成对生殖嵴的发生起诱导作用
 - 生殖嵴的形成参与中肾嵴的分化
21. 下面哪项不是副中肾管发育异常
- 输卵管发育不全
 - 先天无阴道
 - 处女膜闭锁
 - 先天无子宫
 - 先天双子宫
22. 对于先天性无阴道, 下列哪项恰当
- 多合并卵巢缺失
 - 为双侧中肾管发育异常造成
 - 诊断后应及时手术
 - 子宫发育多为正常
 - 可合并泌尿系统畸形, 应行相应的检查
23. 若男性胚胎或胎儿时期在母体内接触雄激素过少, 易致
- 女性假两性畸形
 - 男性假两性畸形
 - 真两性畸形
 - 混合性生殖腺发育不全
 - 单纯型生殖腺发育不全
24. 肾上腺生殖综合征发生于
- 女性假两性畸形
 - 男性假两性畸形
 - 真两性畸形
 - 混合性生殖腺发育不全
 - 单纯型生殖腺发育不全
25. 疑为前置胎盘, 下列哪项检查方法不当
- 内窥镜检查
 - 阴道穹窿指诊
 - B 型超声检查
 - 肛门指诊
 - 以上都不是
26. 宫内节育器的避孕机制主要是
- 阻止精子和卵子相遇
 - 影响卵巢排卵
 - 阻止受精卵着床
 - 阻止精子进入输卵管
 - 影响卵子功能
27. 卵巢为女性的性腺, 正确的是
- 在成年女性其体积为 4 cm × 3 cm × 1 cm, 重 5 ~ 6 g
 - 卵巢的大小形态自出生时就已定型

- C. 卵巢门中只有血管
D. 卵巢表面覆有腹膜
E. 卵巢动脉来自髂内动脉
28. 关于女性外生殖器官的神经分布, 正确的是
A. 阴部神经由第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ骶神经分支组成
B. 外生殖器的神经主要由交感神经和副交感神经支配
C. 切除支配子宫的神经后, 子宫仍能完成分娩活动
D. 卵巢神经丛分布于子宫、卵巢和输卵管
E. 骶前神经丛大部分在宫体旁形成骨盆神经丛
29. 正常月经周期时, 取子宫内膜活检测定卵巢有否排卵, 最好是在月经周期的
A. 第7~9天
B. 第11~12天
C. 第13~15天
D. 第17~19天
E. 第27~28天
30. 宫颈粘液涂片干燥后, 镜下可见典型羊齿状结晶, 直接受到哪种激素的影响
A. 卵泡刺激素
B. 黄体生成素
C. 催乳激素
D. 雌激素
E. 孕激素
31. 关于雌激素合成的两种细胞和两种促性腺激素是指
A. 卵泡细胞和黄体细胞; 卵泡刺激素和黄体生成素
B. 卵泡膜细胞和颗粒细胞; 卵泡刺激素和黄体生成素
C. 次级卵母细胞和颗粒细胞; 促性腺激素释放激素和卵泡刺激素
D. 卵泡膜细胞和颗粒细胞; 卵泡刺激素和垂体泌乳素
E. 卵母细胞和颗粒细胞; 卵泡刺激素和黄体生成素
32. 关于月经周期的调节, 不正确的是
A. 月经来潮前下丘脑就开始分泌 GnRH
B. 大量的 LH 与一定量的 FSH 使成熟卵泡排卵
C. 黄体可以分泌雌激素和孕激素
D. 大量雌激素和孕激素产生后黄体开始萎缩
E. 月经是因子宫内膜失去性激素支持而坏死脱落形成的
33. 正常足月妊娠脐带的一般长度为
A. 15~20 cm
B. 30~100 cm
C. 15~60 cm
D. 20~70 cm
E. 10~75 cm
34. 妊娠期孕妇泌尿系统的变化, 正确的是
A. 肾小球滤过率增加, 肾小管对葡萄糖的再吸收力也增加
B. 泌尿系统平滑肌张力降低
C. 输尿管蠕动增加
D. 夜尿量少于日尿量
E. 孕妇易患左侧肾盂肾炎
35. 关于妊娠的生理变化, 下列说法正确的是
A. 血容量增加, 在足月时达高峰
B. 白细胞增加, 在妊娠30周达高峰

- C. 由于血液稀释使纤溶酶原降低
D. 血液稀释, 红细胞沉降率降低
E. 血浆白蛋白降低, 主要是球蛋白减少为主
36. 产褥期一般为
A. 产后 4 周
B. 产后 5 周
C. 产后 6 周
D. 产后 8 周
E. 产后 12 周
37. 输卵管妊娠最常见的着床部位是
A. 伞部
B. 壶腹部
C. 间质部
D. 峡部
E. 壶腹部与峡部连接处
38. 漏斗骨盆是指
A. 骨盆入口平面狭窄
B. 耻骨弓狭小
C. 中骨盆及出口平面狭窄
D. 中骨盆后矢状径短
E. 入口后矢状径短
39. 有关盆腔检查的注意事项, 错误的是
A. 检查前排空小便
B. 取膀胱截石位
C. 对未婚者严禁放置扩阴器
D. 每检查一人, 更换一次性垫纸防止交叉感染
E. 阴道有流血者严禁盆腔检查
40. 以下哪项临床分期符合宫颈癌局限于宫颈, 仅在显微镜可见
A. I_A
B. II_A
C. II_B
D. III_A
E. IV_A
41. 子宫肌瘤临床分类标准为
A. 按临床症状严重程度分类
B. 按查体所见子宫肌瘤大小分类
C. 按子宫肌瘤的数目分类
D. 按子宫肌瘤与子宫内膜的关系分类
E. 按肌瘤与子宫肌层的关系分类
42. 关于葡萄胎正确的是
A. 属于妊娠滋养细胞肿瘤
B. 欧美国家发病率最高
C. 部分性葡萄胎的染色体核型常为 46XY, 系由空卵受精
D. 完全性葡萄胎的染色体核型常为 46XX, 均来自父系
E. 必须处理卵巢黄素化囊肿
43. 关于痛经, 下列正确的是
A. 凡经前后或行经期间有腰酸、下腹胀程度较重, 以致影响工作生活者谓之痛经
B. 原发性痛经多见于子宫发育不良者
C. 功能性痛经是指生殖器官无明显病变的经期疼痛
D. 痛经多发生在无排卵型周期
E. 痛经患者的子宫内膜中前列腺素降低
44. 以下哪一结构不是由腹膜构成
A. 子宫阔韧带
B. 卵巢系膜
C. 输卵管系膜
D. 卵巢固有韧带
E. 卵巢悬韧带
45. 女性内生殖器淋巴回流不恰当的是

- A. 输卵管淋巴汇入腰淋巴结
B. 阴道下段淋巴汇入腹股沟淋巴结
C. 阴道上段淋巴大部汇入闭孔淋巴结及髂内淋巴结
D. 宫颈淋巴汇入腹股沟深淋巴结
E. 宫体两侧淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
46. 卵泡发育的过程中, 不包括以下哪项
A. 原始卵泡
B. 窦前卵泡
C. 窦状卵泡
D. 闭锁卵泡
E. 成熟卵泡
47. 月经有关的项目恰当的是
A. 初潮时多是有排卵性月经
B. 两次月经第 1 日的间隔时间为一个月经周期
C. 月经周期的长短主要取决于分泌期的长短
D. 正常月经失血量不少于 80 ml
E. 月经血是凝固的, 至少有小血块
48. 胎头的最大径线是
A. 枕下前凶径
B. 枕额径
C. 枕颞径
D. 双顶径
E. 双额径
49. 晚期妊娠羊水代谢主要途径, 哪项恰当
A. 母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
B. 胎儿脐带对水分的吸收运输
C. 胎儿尿液排出和吞咽羊水
D. 胎肺吸收大量羊水
E. 体液经胎儿皮肤渗入羊膜腔
50. 对于胎盘功能不恰当的是
A. 在胎盘内进行物质交换的部位主要在血管合体膜
B. 通过简单扩散进行 O_2 、 CO_2 交换
C. 分子量 < 250 的物质以简单扩散通过胎盘
D. 免疫球蛋白 G 的分子量较大不能通过胎盘
E. 血浆蛋白为大分子不能通过胎盘
51. 妊娠期循环系统变化恰当的是
A. 心脏容量至妊娠末期约增加 30%
B. 心排出量自妊娠 20 周逐渐增加
C. 心排出量至妊娠 32 周达高峰
D. 妊娠晚期舒张压一般偏高
E. 妊娠晚期心率休息时每分钟增加 5 次
52. 羊水的来源与吸收恰当的是
A. 胎儿尿液是妊娠早期羊水的主要来源
B. 妊娠 18 周以后主要是母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
C. 胎儿的消化道是吸收羊水的重要途径
D. 脐带华通胶不吸收羊水
E. 妊娠中期以后, 羊水渗透压逐渐增高
53. 围绝经期妇女尿中促性腺激素排出量倾向于
A. 不变
B. 增多
C. 减少
D. 变化无常
E. 以上都不是
54. 卵巢黏液性囊腺瘤来源于卵巢表面的生发上皮, 以下哪项恰当
A. 向输卵管上皮分化

- B. 向宫颈黏膜分化
C. 恶性变
D. 发生逆转现象
E. 向子宫内膜的黏膜分化
55. 头先露时胎心在何处听诊最清楚
A. 脐下
B. 脐上
C. 脐周
D. 剑突下
E. 耻骨联合处
56. 下面那项不是女性生殖器官的邻近器官
A. 尿道
B. 膀胱
C. 输尿管
D. 直肠
E. 肾脏
57. 在以下哪个阶段卵巢皮质内开始有大量密集成群的原始卵泡出现
A. 新生儿期
B. 儿童期
C. 青春期
D. 更年期
E. 老年期
58. 不是孕激素生理作用的是
A. 使基础体温升高 $0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$
B. 加强输卵管肌节律性收缩的振幅
C. 对下丘脑和垂体有负反馈作用
D. 能抑制宫颈黏膜分泌黏液
E. 使阴道上皮细胞脱落加快
59. 多囊卵巢综合征患者的多毛现象与哪种激素水平的升高有关
A. 孕激素
B. 雄激素
C. 黄体生成激素 (LH)
D. 催乳激素 (PRL)
E. 前列腺素 (PG)
60. 胎盘的结构由哪两部分组成
A. 胎儿平滑绒毛膜与母体包蜕膜
B. 胎儿平滑绒毛膜与母体基蜕膜
C. 胎儿丛密绒毛膜与母体基蜕膜和羊膜
D. 胎儿丛密绒毛膜与母体包蜕膜
E. 胎儿丛密绒毛膜与母体壁蜕膜
61. 从妊娠第几周始称为胎儿
A. 10
B. 9
C. 8
D. 12
E. 16
62. 妊娠足月胎盘的大体结构不恰当的是
A. 呈圆形或椭圆形
B. 重 $450 \sim 650 \text{ g}$
C. 中间厚,边缘薄,有胎儿面和母体面
D. 胎儿面有羊膜覆盖,脐带附着于中央附近
E. 母体面被绒毛膜隔形成若干浅沟分成母体叶
63. 枕前位分娩机制恰当的是
A. 胎头进入骨盆入口时呈俯屈状态
B. 下降动作贯穿在整个分娩过程之中
C. 下降动作呈连续性
D. 俯屈动作完成后,胎头以枕额径通过产道
E. 胎头颅骨最低点达骨盆最大平面时出现内旋转动作
64. 早产概念恰当的是

- A. 妊娠 20 足周至不满 37 足周间终止者
B. 妊娠 24 足周至不满 36 足周间终止者
C. 妊娠 28 足周至不满 36 足周间终止者
D. 妊娠 28 足周至不满 37 足周间终止者
E. 妊娠 28 足周至不满 38 足周间终止者
65. 胎儿生长受限恰当的是
A. 孕 28 周后胎儿体重 $<1\,500\text{ g}$
B. 低于同孕龄平均体重的 3 个标准差
C. 低于同孕龄体重的第 5 百分位数
D. 其围生儿死亡率为正常儿的 4~6 倍
E. 生后远期影响不大
66. 妊娠滋养细胞肿瘤恰当的是
A. 侵蚀性葡萄胎可发生在流产后
B. 绒毛膜癌可发生在葡萄胎之后
C. 前次妊娠为异位妊娠, 不发生绒毛膜癌
D. 绒毛膜癌最早出现的是脑转移
E. 绝经后再不发生绒毛膜癌
67. 子宫内膜癌的高发年龄为
A. 45~50 岁
B. 50~60 岁
C. 58~61 岁
D. 60~65 岁
E. 70 岁
68. 关于放置宫内节育器的出血, 哪项不恰当
A. 多发生于放置 IUD 后 1 年内
B. IUD 机械性压迫
C. 多表现为经量增多, 经期延长
D. 可用吲哚美辛 (消炎痛)
E. 应立即取出节育器
69. 关于月经周期, 下列哪项错误
A. 两次月经第 1 日的间隔时间称为月经周期
B. 上次月经干净至本次月经来潮的间隔时间为月经周期
C. 月经周期一般为 28~30 天
D. 月经提前或延后 3 日属正常范围
E. 月经出血的第 1 日为周期的开始
70. 闭经患者雌、孕激素序贯试验阳性, 垂体兴奋试验阳性, 说明病变部位在
A. 子宫
B. 卵巢
C. 垂体
D. 下丘脑
E. 大脑皮层
71. 胎儿畸形引起羊水过少最多见的是
A. 无脑儿
B. 脊柱裂
C. 腭裂
D. 胎儿泌尿系统畸形
E. 先天性心脏病
72. 关于胎盘的气体交换功能, 哪项是错误的
A. 母体的血氧浓度远远高于胎盘中氧浓度
B. 脐静脉和脐动脉中 PO_2 几乎相等
C. 母血中的 PO_2 较胎儿脐动脉 PO_2 明显高
D. CO_2 通过绒毛间隙比 O_2 快 20 倍左右
E. 胎盘的气体交换功能相当于胎儿的肺脏

73. 不是子宫韧带的是

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 骨盆漏斗韧带
- D. 主韧带
- E. 宫骶韧带

74. 关于假骨盆的描述, 错误的是

- A. 位于骨盆平面以上
- B. 为腹腔的一部分
- C. 其前方为腹壁下部
- D. 两侧为髂骨翼
- E. 与产道有直接关系

75. 患者出现闭经、泌乳, 必须测定下列哪一种激素

- A. LH
- B. HPL
- C. HCG
- D. PRL
- E. FSH

76. 细菌性阴道病的诊断标准, 哪项不正确

- A. 阴道分泌物均质、稀薄
- B. 阴道 pH 值 >4.5
- C. 线索细胞阳性
- D. 阴道黏膜炎症改变显著
- E. 加入 10% KOH 于阴道分泌物中产生腥臭味

77. 女性一生中哪阶段最易发生骨折

- A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

78. 子宫肉瘤的病理类型, 下列哪项最为

多见

- A. 平滑肌肉瘤
- B. 低度恶性子宫内膜间质肉瘤
- C. 高度恶性子宫内膜间质肉瘤
- D. 恶性苗勒氏管混合瘤
- E. 子宫淋巴瘤

79. 有关药物流产, 下列哪项是错误的

- A. 目前最常用的药物是米非司酮
- B. 米非司酮与前列腺素配伍协同作用
- C. 米非司酮具有轻度的抗雌激素特性
- D. 米非司酮可与孕激素受体结合
- E. 米索前列醇有促排胎作用

80. 引起梅毒的病原体是

- A. 苍白密螺旋体
- B. HPV
- C. HIV
- D. HSV
- E. CMV

81. 35 岁, 经产妇, 阵发性腹痛 4 小时, 现宫缩 30 秒, 间隔 3 ~ 4 分钟, 中等强度, 急诊室检查胎心率 135 次/分, 先露为头, 宫口开大 4 cm, 胎囊明显膨出, 目前最佳的处理是

- A. 灌肠以减少污染
- B. 破膜后住院
- C. 急诊室留观
- D. 急送产房消毒后破膜接生
- E. 立即住院待产

82. 23 岁妇女, 停经 48 天, 阴道流血 10 天, 同月经量, 晨起突然下腹痉挛性疼痛伴流血增多, 检查宫口可通过 1 指, 最可能的诊断是

- A. 先兆流产

- B. 输卵管妊娠
C. 痛经
D. 难免流产
E. 过期流产
83. 女性, 25 岁, 初产妇, 孕 36 周, 孕期检查正常, 2 周来皮肤黄, 食欲好, 皮肤瘙痒, 检查血胆红素 3 mg/dl, ALT 正常, 血胆酸明显升高, 血压 120/80 mmHg, 下列哪项可能性大
A. 妊娠高血压综合征
B. 急性传染性肝炎
C. 妊娠期胆汁淤积症
D. 原发性妊娠急性脂肪肝
E. 药物性肝炎
84. 产妇王女士, 产后 2 周出现弛张热, 下腹疼痛并且压痛明显, 下肢肿胀疼痛, 皮肤紧张发白。最可能的诊断是
A. 子宫肌炎
B. 血栓性静脉炎
C. 急性盆腔结缔组织炎
D. 急性盆腔腹膜炎
E. 产后关节炎
85. 产妇, 32 岁, 剖宫产一男活婴, 产后 1 周, 寒战, 高热, 左下肢持续性疼痛 1 天, 恶露量多、头晕、乏力, 体温 39.5℃, 脉搏 120 次/分, 血压 110/70 mmHg。此患者最可能的诊断是
A. 子宫肌炎
B. 盆腔结缔组织炎
C. 血栓性静脉炎
D. 盆腔腹膜炎
E. 败血症
86. 女, 45 岁, 葡萄胎刮宫术后, 预防性切除子宫。病理检查子宫肌层内有水泡状组织, 镜下见增生的滋养细胞及绒毛结构, 哪项诊断恰当
A. 侵蚀性葡萄胎
B. 葡萄胎
C. 绒癌
D. 子宫肌腺瘤
E. 子宫内膜炎
87. 42 岁女性, 末次妊娠人流后 8 年, 现停经 3 月, 阴道流血 3 天。子宫增大, 但小于停经月份, 血 HCG > 100 KU/L。最可能的诊断是
A. 先兆流产
B. 宫外孕
C. 葡萄胎
D. 侵蚀性葡萄胎
E. 绒癌
88. 19 岁, 未婚少女, 主诉剧烈痛经, 于月经来潮时需服强镇痛药并卧床, 平时月经周期规律, 基础体温呈双相型曲线。肛查除子宫稍小外余未见异常。最可能的诊断是
A. 子宫内膜炎、子宫肌炎
B. 子宫腺肌病
C. 子宫肌瘤
D. 原发性痛经
E. 输卵管炎
89. 28 岁妇女, 患不孕症, 经期腹痛 5 年, 经前 1~2 天开始下腹痛, 经后渐消失。查: 子宫大小正常、后倾、不活动、压痛; 双侧附件呈结节状增厚、有压痛, 可触及 6 cm 大小之囊性肿块。根据上述症状、体征, 考虑下述何种诊断
A. 慢性盆腔炎
B. 结核性盆腔炎
C. 子宫内膜异位症

- D. 双侧输卵管卵巢囊肿
E. 卵巢癌
90. 18岁,女性,身高较高大,有发育不良子宫及输卵管,乳房发育差,阴毛、腋毛稀少,查染色体46,XY。可能的诊断是
A. 女性假两性畸形
B. 男性假两性畸形
C. 真两性畸形
D. 混合性生殖腺发育不全
E. 单纯型生殖腺发育不全
91. 女性,16岁,无月经来潮,有周期性下腹痛病史,疑诊处女膜闭锁。作何种检查可确诊
A. 处女膜检查
B. B型超声检查
C. 穿刺检查
D. 肛诊检查
E. 双合诊检查
92. 63岁妇女,孕5产3,主诉阴道掉出物6个月,伴小便困难。查:外阴经产型,子宫萎缩,宫颈外口及部分子宫脱出阴道口外,阴道前壁膨出和阴道后壁轻度膨出。诊断为
A. 子宫脱垂Ⅰ°重型
B. 子宫脱垂Ⅱ°轻型伴阴道前后壁脱垂
C. 子宫脱垂Ⅲ°伴阴道前后壁脱垂
D. 子宫脱垂Ⅱ°重型伴阴道前后壁脱垂
E. 宫颈延长伴阴道前后壁脱垂
93. 孕妇,妊娠11周。因发热,腹痛,腹泻2天来院就诊。诊断:急性胃炎。需用抗生素治疗。关于孕妇用药下列说法,不正确的是
A. 任何途径给孕妇药物都会通过胎盘达到胎儿体内
B. 分子小的药物能很快通过胎盘
C. 有些小分子量的药物与血浆蛋白结合后分子量变大,而减慢通过胎盘速度
D. 脂溶性高的药物也容易通过胎盘
E. 药物在胎儿血液中的代谢及排泄与孕妇相同
94. 29岁,已婚,放环2年,停经48天,少量阴道出血3天,突然右下腹剧烈撕裂样疼痛,检查:血压80/40 mmHg,右下腹压痛,反跳痛明显。但肌紧张不明显,妇科检查:后穹窿饱满,宫颈举痛(+),宫口闭,子宫正常大小,呈漂浮感,双附件触诊不满意,本病例最可能的诊断是
A. 急性阑尾炎
B. 黄体破裂
C. 卵巢囊肿蒂扭转
D. 输卵管妊娠破裂
E. 先兆流产
95. 初产妇,骨盆、胎心正常,宫口开全,产力好,S+3,胎儿手靠近左顶骨,其诊断是
A. 横位
B. 手先露
C. 顶先露
D. 复合先露
E. 头先露
96. 30岁经产妇,1年前因中央型前置胎盘行子宫体部剖宫产,现妊娠34周,1小时前突感剧烈腹痛,头晕,大汗淋漓,胎动停止,检查:胎心音消失,胎体漂浮感,左下腹可扪及妊娠4个月子宫大小硬块,移动性浊音(+),最可能的诊断是
A. 先兆子宫破裂
B. 腹腔妊娠

- C. 子宫破裂
D. 胎盘早剥
E. 子宫不完全破裂
97. 女性, 58 岁, 因左附件肿块伴腹腔积液入院, 患者 9 年前曾因右卵巢颗粒细胞瘤行手术治疗, 以下哪项病史与诊断和进一步处理无关
A. 9 年前术中情况及手术范围
B. 9 年前术后肿瘤病理及分级
C. 是否已绝经
D. 是否有放疗史
E. 是否有化疗史
98. 25 岁已婚妇女, 停经 60 日, 阴道少量流血 2 日, 色鲜红, 伴轻度下腹阵发性疼痛。检查宫口闭, 子宫大如孕 2 个月, 既往孕 2 个月流产 1 次。本例应诊断为
A. 先兆流产
B. 难免流产
C. 不全流产
D. 稽留流产
E. 习惯性流产
99. 女性, 22 岁, 人流术后半年, 阴道不规则流血 2 个月, 近半月开始厌食、恶心、肝区痛, 肝脏超声见多个异常回声, 血 HCG 增高, 诊断为绒癌肝转移, 其分期为
A. I 期
B. II 期
C. III 期
D. IV 期
E. 其他
100. 患女, 35 岁, 婚后 5 年未孕, 2 年来经量增多, 伴经期下腹痛加重, 妇科检查: 后穹窿可及黄豆大小数个触痛结节, 子宫后位, 略大, 质中等, 活动差, 子宫右侧可及 $5\text{ cm} \times 6\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ 包块, 质韧, 不活动, 压痛, 此患者最可能的诊断是
A. 子宫浆膜下肌瘤
B. 子宫腺肌症
C. 子宫内膜异位症, 伴右卵巢巧克力囊肿
D. 右侧卵巢畸胎瘤
E. 结核性盆腔包块