

經方實驗錄

第一集卷首



曹穎甫先生醫案

門人姜佐景編按

經方實驗錄

第一集

穎甫題



經方實驗錄第一集總目錄

卷首

共二十八篇

上卷

共三十五案

中卷

共四十案

下卷

共二十五案

附錄

共一十四篇

經方實驗錄第二集卷首

# 經方實驗錄第一集卷首目錄

曹穎甫先生序.....一

章次公先生序.....八

邵餐芝先生序.....九

葉橘泉先生序.....一

熊世琳先生序.....一五

殷子正先生序.....一六

楊志一先生序.....二二

尹逸夫先生序.....二四

張洽河先生序.....二六

吳凝軒先生序.....二八

姚世琛先生序·····	三一
中華國醫學會題辭·····	三八
朝鮮桂山醫學研究所題辭·····	三八
張懷霖先生題辭·····	三九
范靈昭先生題辭·····	三九
楊醫亞先生題辭·····	四〇
宋永祥先生題辭·····	四〇
汪劍嵩先生題辭·····	四〇
本書讀者評語之一斑·····	四一
張仲景事狀考 章太炎撰·····	四九
醫聖張仲景贊 曹穎甫撰·····	五四
曹穎甫先生小傳 姜佐景撰·····	五五

曹穎甫先生近影·····	五九
曹穎甫先生方牋·····	六〇
中醫中藥治愈盲腸炎之鐵證·····	六六
編按者自序·····	六七
凡例·····	六八
致謝·····	七三



經方實驗錄序

予自髫年即喜讀張隱庵傷寒論注  
先君子見而慰之以為讀書之暇倘得取  
通醫理是亦濟世之一術也年十六會  
先君子病洞泄之中醫共用苓連子餘  
劑病益不支汗凝若膏雷冷若在  
魂恍而欲死狀探之而若階上一夕之驚  
去死生善惡幾矣最後趙而云白先生  
來投以三劑附子理中加吳萸丁香之屬

甫進一劑汗欲射溫止神定果進  
之病乃告痊雲泉之書曰今年七歲在  
辰為濕土司天又當長夏之令果日陰雨  
天人交困證多宜濕時醫不讀傷  
寒太陰篇何足為論活人方法或予  
自謂此法然必知仲景方治果是脫  
人於險也願示于治舉子業輟而弗理  
光緒中赴試金陵途中卧病偕行  
其晚知醫方日以藥香佩蘭進之

汗出而熱不除抵金陵病益殆適先  
表伯陳葆厚先生來同寓診予脈  
曰病當速愈但累經發汗津液  
已耗因向藥肆中購荷葉露三大  
瓶及皂方梨十餘枚曰渴即飲之  
飢即啖之予從之言半日而熱抵  
暮投藥及煎熟之葱及米炭棗子  
睡方醒聞藥香在伯令侍者進一甌  
自觉滿身沾漬中夜衣被俱濕

羅伯予易衣被問方則曰杖  
白布湯也予正是金體舒暢呼  
於二碗安眠達旦亦復病夫之  
放態矣予正是益信行方然以  
家君子形此予擬取科名未暇  
於癘疔自甲辰於南心孤羅科  
舉家君子亦於是年棄養於此  
流覽傷心金匱全文予年已三  
十有八矣嗣是以來慨然與救  
世之志

先生端實起於家庭用六劑附子

汗中則自先為邪太安人病河溼胎

用皂莢丸則自為氏病但小名眠時

偶痰胎用十棗湯則自為氏病痰飲

胎用甘竹粉蜜湯則自家婢病枕

厥胎用大黃牡丹湯則自若華也

潘氏病腸癰胎莫不隨時取效

在如鄉者然則仲景之書豈金元四

家所能窺見第一哉所謂仁人之

一言以利溥也予年已五十始來上  
海其間用經方取效者十常九  
於性疎懶耽吟誦於活人方法瑣  
乏情遜略不措意故存稿絕少即  
偶于錄存後乃從遊者携去甲戌  
年姜生佐景來擬拾方案佐  
以解說名之曰經方實驗錄其  
載之中惠先生成集行將刊布

尚且以序於予，笑謂姜生曰：此  
書一出，生於予傷心，全匿崇微  
有先矣。爰本平素趨重，終方  
顏末，拉襍書之，丙子立秋，十日江  
陰曹家達序於上海厲齋。



章序

成之從曹師遊也於今十七年矣師以經方治病幾於數見不鮮成之心好之故每遇重證往往以師爲法卽當時有曹派醫生之目予亦弗之辯也蓋觀師方治往往如己所欲出故於師之驗案亦若不甚珍惜竊謂取法其意足矣安用此瑣瑣者爲若必彙而錄之仲景原書固自在也姜君佐景自近三年中始遊師門下乃輯師驗案及己所效用之經方解說而詳述之名曰經方實驗錄其意適與成之相反此何說歟成之所以不錄驗案而但師其意者爲一身之學術計也今姜君廣搜驗案使天下人知經方之有實用者爲全國之學術計也然則獨善其身何如兼善天下之爲廣博哉然後歎予向日之所見爲拘墟不免對姜君而益滋慚慙也

丙子重九日同學章成之序



邵序

復古不已終必達於本凡事盡然今夫長沙之術體實而用玄事有徵  
驗乃時師倒植轉尊葉吳新學無識猥邵歐美盜憎主人雜然同辭夏  
璜楚玉視同糞土此所謂以二缶鍾惑也可不大哀乎予自辛未先人  
患痰飲輾轉誤治以至不起恨市醫害道始閉戶單精博究傷寒大論  
發憤寢饋搜購注疏殆遍旁及諸家醫案密粟比勘稍稍出所學爲人  
診病時獲奇效嘗治壯夫痰厥半夏重用至二兩治小兒吐衄赭石重  
用至二兩四錢又治小兒頭面如焚而下利不止用金匱麥門冬湯治  
婦人血瘀脈伏如狂用傷寒論桃核承氣湯治婦人崩漏師內經茹蘆  
烏鰂丸意用張氏固衝湯出入損益陽明燥結兼結胸則任大承氣合  
大陷胸湯痰飲則用苓桂朮甘湯苓甘五味薑辛半夏湯小青龍加石  
膏湯瘧則用白虎湯加半夏婦人病後脈弱則用真武湯加薯蕷其茯  
苓半夏皆重至二兩石膏薯蕷皆重至四兩附子重至五錢服後瞑眩