

# 江氏傷科方書

清 江考卿 著

上海科学技术出版社

R274  
28

### 內容提要

本書著者江考卿，清道光時人，以精于医治跌打損傷有名；于臨証之余，將實踐所得的經驗，試驗有效的方治，寫成是書，語訛踏實，不尚空論。

全書首敍傷科不治之証，次述受伤治法，后录通用、祕傳諸方。其受伤治法中所載三十六个大穴的內服方藥，頗為后人所取法；其中穴名、部位与現行者多有出入，蓋亦有所傳授，其通用、祕傳諸方，及方后受伤部位、証狀等引薦，間或出奇制勝，然大都切合实用。茲據三三医書本校印，以供伤科医师临床治疗上的参考。

### 江氏伤科方书

清·江考卿 著

\*

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市书刊出版业营业登记证093号

大众文化印刷厂印刷 新华书店上海发行所总經售

\*

开本787×1092 版1/32 印张5/8 字数13,000

1958年12月新1版 1959年4月新1版第3次印刷

印数9,001—19,000

统一書号：14119·691

定价：(十)0.09元

## 目 錄

|        |    |
|--------|----|
| 斷死證秘訣  | 1  |
| 秘受不治法  | 1  |
| 受傷治法   | 1  |
| 通用方    | 6  |
| 秘傳方    | 9  |
| 附錄驗方四則 | 16 |

# 江氏傷科方書

## 斷死證秘訣

金傷身損眼皮青，定主身亡難救命；若是氣喘與呃噯，且在一七內中亡。人中畫滿唇又青，三日須知命必傾；神仙留下真秘訣，不說凡人不知音。

## 秘受不治法

凡矢柱骨折，不治。凡兩目損傷，不治。凡口開氣出不收，不治。凡口如魚口，不治。凡傷食喉，不治。凡打破頭鼻，流黃白水，不治。凡脊骨折斷，不治。凡心胞緊痛，紅色高腫，不治。凡心口青色，不治。凡小腹陰陽不分，不治。凡小腹傷吐糞，不治。凡跌打大小腹痛，不治。凡腎子傷入小腹，不治。凡孕婦傷，犯胎，不治。凡女人傷乳，不治。凡男人兩乳堂傷，不治。凡腰傷自笑，不治。凡兩臂墮下，盡力叫喚，汗出如油者，不治。凡人手骨出一脛可治，兩股齊出，不可治。

## 受傷治法

凡腦受傷，使人輕輕扶正。皮未破，用二十六號黑龍散；已破，用二十五號桃花散填破口，避風禁口，自愈。

凡頂門受傷，用二十四號止血散，搽服俱用此藥。

凡氣喉受傷，令人扶頭托湊喉管，不使出氣，用銀針連好。外用十八號貼膏，內服上部藥方。

凡肩甲骨出，用椅圈將軟衣墊好，令傷人坐圈中，使一人捉定，以絹縛之。外用十八號貼膏，內服上部藥方。

凡肩膀骨折，必先使骨平正，用十八號貼膏，以油紙扎好，

內服六號接骨丹。凡金井骨在脇下，若損傷，不宜夾縛，扶平，用二十六號黑龍散。

凡兩脇骨折，如金井骨治法。

凡肩臂脫出，令人抵住，以抱着手臂輕輕送入故位。內服六號接骨丹，外貼十八號膏。

凡人膝蓋乃另生者，跌出不治。跌破者用箋箍，以帶縛定，外用二十四號止血散。

凡傷破腹，大腸跌出，被風吹其腸乾，不能收口，用麻油操上，使腸潤澤。用一人托腸，一人默含冷水噴澆傷人身上，其人必然一驚，托腸人即隨驚送入，再用銀針連好。先敷二十四號止血散，後用十八號膏貼。傷破目難看見，用好酒一杯，令傷者飲下，即使入喫傷，如若有酒氣，其腸已破，難以救治。

凡人骨跌出，內外折肉中，用二十號寶麻藥一服。再將肉破開，取骨整，換用二十四號止血散、十八號貼膏；外以筭箸包好，內服六號接骨丹。

凡打傷跌腫，肉中之骨不知碎而不碎，醫人以手輕輕摸腫處，若有聲者，其骨已破，先用二十號寶麻藥一服，然後割開；如血來不止，用二十四號止血散，又用二十號寶麻藥一服，再取骨出。若骨碎甚，即以別骨填接；外貼十八號膏藥，內服六號接骨丹。

凡平直處跌打骨傷，皮不破，先用二十六號黑龍散敷好，再用板夾縛平正。如曲折之處，只宜敷藥，不宜挾縛，免愈後不能伸屈。

凡服跌打藥，要忌冷水冷物，其藥必要熱服。

凡跌打傷重，必先用二十七號藥水洗過，然後敷藥，輕傷不必如此。

凡跌打血來不止，用二十五號桃花散或二十四號止血散；再不止，用三七、山羊血，外用桃花散圈上。

凡骨未碎有輕傷者，外用十八號貼膏，內服上中下三部之藥，照傷何部，即用何部藥方。

凡山谷鄉村無藥舖之處，若遇跌打，暫用糯米、水、酒、薑、葱同搗，包熨，不使血凝，內服老酒，再治可也。

凡跌打藥宜磁瓶收貯，不使出氣。

凡人週身一百另八穴，小穴七十二處，大穴三十六處。打中小穴，重亦無妨，打中大穴，雖輕亦死。今將三十六個大穴道明受傷治法。

頭頂心名爲元宮穴；打中者二日死。輕者耳聾頭眩，六十四日死。先用加減湯加羌活一錢、蒼耳子一錢五分；次用奪命丹二三服；再加藥酒常服。

前胸名華蓋穴；打中者人事不省，血迷心竅，三日而死。先用加減湯加枳實一錢、良薑一錢；次用七厘散二分；後用奪命丹二三服。

後背心名肺底穴；打中者兩鼻出血，九日而死。先用加減湯加百部八分、桑皮一錢；次用七厘散二分；後用奪命丹二三服；再用紫金丹。

右乳上一寸三分，名上氣穴；打中者發寒熱，三十二日而死。先用加減湯加沉香五分、肉桂一錢五分；次用七厘散二分；後用奪命丹二三服。

左乳下一分，名中氣穴；打中者十二日而死。先用加減湯加青皮一錢、乳香一錢；次用七厘散二分；後用奪命丹二三服。

左乳下一寸四分，名下氣穴；打中者七日而死。先用加減湯加枳實一錢五分、石菖蒲一錢；次用七厘散二分；後用奪命丹二三服。

右乳上一寸三分，名上血海；打中者口中吐血，十六日死。先用加減湯加鬱金一錢二分、沉香一錢；次用七厘散二分；再

用奪命丹二三服。

右乳下一分，名正血穴；打中者口中吐血，十八日死。先用加減湯加鬱金一錢五分、寄奴一錢五分；次用七厘散二分；再用奪命丹一二服。

右乳下一寸四分，名下血海；打中者三十六日吐血而死。先用加減湯加五靈脂一錢二分、蒲黃一錢，炒黑；次用七厘散二分；再用奪命丹二三服。

心中名黑虎偷心穴；打中者立刻眼目昏花，人事不省，舉回氣絕，速宜治之。先用加減湯加官桂一錢、丁香六分；次用七厘散二分；再用奪命丹二三分；再用紫金丹三四服。

心下一分，名霍肺穴；又下半分，名肺底穴；打中者劈面一把，即醒，然後用藥。先用加減湯加桂枝一錢二分、貝母一錢；次用七厘散二分；再用奪命丹二三服；又服加減湯，後用紫金丹。

心下一寸三分，偏左一分，名翻肚穴；打中者比日而死。先用加減湯加紅花一錢五分、木香一錢；次用七厘散二分；仍用加減湯二三服；再用奪命丹二三服；又用紫金丹三四服，或吊藥一敷。

臍下一寸五分，名氣海穴；打中者二十八日而死。先用加減湯加杏仁一錢、玄胡索一錢；次用七厘散二分；再用奪命丹二三服。

臍下三寸，名丹田穴；打中者十九日而死。先用加減湯加木通一錢五分、三稜一錢五分；次用七厘散三分。

臍下四寸五分，名分水穴；打中者二便不通，十三日而死。先用加減湯加三稜一錢五分、莪朮一錢、生軍三錢；次用七厘散二分；再用紫金丹二三服。

臍下六寸，名關元穴；打中者五日而死。先用加減湯加車前子一錢、青皮一錢；次用七厘散二三分；再用奪命丹二三服。

左邊脇臍毛中，名氣海穴；打中者六個月而死。先用加減湯加五加皮一錢、羌活一錢；次用七厘散二三分；再用奪命丹三四服。

右邊脇臍毛中，名血海穴；打中者五個月死。先用加減湯加柴胡一錢二分、當歸一錢；次用七厘散二分；再用奪命丹二三服；或用藥酒常服。

左邊脇梢軟骨，名章門穴；打中者一百五十四日死。先用加減湯加歸尾一錢、蘇木一錢；次用紫金丹三四服。

右邊脇梢軟骨，名地門穴；打中者六十日而死。先用加減湯加丹皮一錢、紅花一錢五分；次用奪命丹二三服，仍服加減湯。

下一分，名血囊穴；打中者四十日而死。先用加減湯加蒲黃一錢、堇菜子一錢；次用奪命丹二三服；再服藥酒。

兩耳下半分空處，名聽耳穴；打中者二十四日死。先用加減湯加川芎一錢、細辛五分；次用奪命丹一二服；再服藥酒。

背心第七個節兩邊下一分，名石骨穴；打中者吐痰吐血，十個月而死。先用加減湯加杜仲一錢、骨碎補一錢；次服奪命丹三四服。

下一寸一分，名後氣穴；打中者一季而死。先用加減湯加補骨脂一錢、烏藥一錢；次用紫金丹三服；再用藥酒。

兩腰眼中左邊，名腎經穴；打中者三日大哭而死。先用加減湯加桃仁一錢五分、紅花一錢；次用奪命丹二三服。

右邊名命門穴；打中者日畢而死。先用加減湯加桃仁一錢五分、前胡一錢；次用奪命丹三服。

尾梢盡下一分，名海底穴；打中者七日而死。先用加減湯加生軍一錢、朴硝一錢；次用奪命丹二三服；再用紫金丹三四服。

兩腿中同名鶴頂穴；打中者一季而死。先用加減湯加牛

膝一錢、苡仁一錢；次用紫金丹二三服。

左右脚底中，同名湧泉穴；打中者十四個月死。先用加減湯加牛膝一錢、宣木瓜一錢；次用奪命丹二三服。

以上三十六大穴，指明受傷治法。然用藥雖無大異，不過加減湯及七厘散、奪命、紫金等藥；惟加減方中所加二味零藥，不可錯誤，切宜緊記！

大凡人於既跌之後，或相打受傷之後，感冒經風，發寒發熱，頭身皆痛，先用解肌湯或小柴胡湯治之；然後再服跌打之藥。

### 通 用 方

**解肌湯** 廣皮一錢 防風一錢 葛根一錢 木通一錢  
羌活一錢二分 荆芥一錢五分 前胡一錢 桔梗一錢 蘇葉  
一錢五分 加葱白三根、薑三片，水煎服。

**小柴胡湯** 柴胡一錢 桔梗八分 連翹一錢二分 花粉  
一錢五分 葛根一錢、黃芩一錢 廣皮一錢 木通一錢五分  
加燈心十根、砂仁末五分，水煎服。

**十三味加減湯** 五加皮一錢五分 枳殼一錢 劉寄奴一  
錢 肉桂一錢 杜仲一錢 五靈脂一錢 蒲黃一錢 歸尾一  
錢五分 廣皮一錢二分 紅花八分 玄胡索一錢 香附一錢  
五分 青皮一錢 加砂仁五分，用陳酒煎服。

**金瘡藥方** 生南星五錢 生半夏五錢，共研細末，搽之。

**吊藥方** 嵌治接骨入骱，打傷骨頭，止痛去傷。

赤芍二錢 蕩香五分 乳香二錢 沒藥二錢：各研細  
末，臨用糯米飯燒酒調塗。

**七厘散** 嵌治跌打血迷心竅，人事不省，服之瘀血可行。  
若瀉不止，用冷粥卽止。

硼砂八錢 硃砂四錢 血竭八錢 土狗六錢 地鱉八錢

歸尾五錢 紅花五錢 蘇木四錢 加皮四錢 枳實五錢  
木香五錢 大黃六錢 巴霜三錢 蒲黃三錢 青皮三錢 廣  
皮四錢 烏藥三錢 靈脂五錢 三稜五錢 義朮五錢 寸香  
一錢 肉桂三錢 猴骨三錢 以上共研細末，重者二分半，輕  
者一分，再輕七釐，陳酒下。

**飛龍奪命丹** 峩治跌打接骨，皆可服之。

當歸五錢 赤芍二錢 三稜四錢 寸香二錢 土狗三錢  
土鱉八錢 義朮四錢 青皮三錢 蒲黃二錢 碎補三錢  
加皮八錢 廣皮二錢 硼砂八錢 然銅八錢 木香六錢 烏  
藥三錢 珠砂二錢 胡索四錢 桂心三錢 香附四錢 寄奴  
三錢 桂枝三錢 血竭八錢 羌活三錢 前胡三錢 貝母二  
錢 葛根三錢 秦艽三錢 桃仁五錢 蘇木四錢 杜仲二錢  
猴骨二錢 蕙菜子二錢 古錢四個，醋酒浸 共研細末，重  
服三分，輕分半，再輕一分，酒下。

**地鱉紫金丹** 峩治遠近跌打內傷，面黃肌瘦，四肢無力，  
并腰痛，皆服之。

青皮三錢 黃芩三錢 赤芍三錢 烏藥三錢 紅花三錢  
赤芍三錢 血竭八錢 珠砂二錢 然銅八錢 土狗五錢  
土鱉三錢 猴骨三錢 虎骨八錢 牛膝三錢 靈仙三錢 靈  
脂五錢 木香二錢 寸香三錢 香附四錢 肉桂三錢 枳殼  
二錢 丹皮四錢 桃仁五錢 貝母三錢 寄奴三錢 廣皮三  
錢 蘇木三錢 遠志二錢 歸尾五錢 桂枝三錢 木通三錢  
三稜四錢 義朮四錢 秦艽三錢 加皮五錢 繢斷三錢  
杜仲三錢 骨脂四錢 碎補三錢 羌活三錢 葛根三錢 蒲  
黃四錢 澤鴻三錢 松節五錢 枸杞三錢 蕙菜子三錢 硼  
砂八錢 共研細末，重服三分，輕二分，再輕一分，酒下。

**萬應回生膏** 峩治遠近跌打，接骨，風氣週身，大穴受傷，  
貼即效。

生地五錢 熟地五錢 當歸二錢五分 川烏二錢五分  
草烏五錢 紅花五錢 靈仙二錢五分 寄奴二錢五分 杜仲一錢五分 木瓜一錢五分 牛膝二錢五分 胡索三錢 桂枝二錢五分 防風二錢五分 骨脂二錢五分 荆芥二錢五分 獨活二錢 赤芍一錢五分 碎補五錢 香附三錢 桃仁三十粒 升麻三錢 丹皮二錢五分 蘇木二錢五分 青皮二錢五分 烏藥二錢五分 墓子二錢五分 松節二錢五分 秦艽二錢五分 繢斷二錢五分 元參二錢 麻黃二錢 蒲黃二錢五分 虎骨五錢 猴骨三錢、共研細末，將麻油一斤、血餘四兩煎好，共熬成膏。臨用加膏上末藥：寸香七分 丁香一錢 血竭一錢 木香一錢 桂心一錢 乳香一錢 没藥一錢 香附一錢 東母一錢 蘇合油一錢

勞傷藥酒方 紅花二錢 黃芩五錢 烏藥五錢 白茯五錢 生地五錢 當歸六錢 加皮五錢 骨脂三錢 杜仲五錢 牛膝五錢 枳殼三錢 桃仁四錢 遠志五錢 繢斷三錢 麥冬五錢 秦艽五錢 丹皮五錢 柏節五錢 桂枝三錢 香附三錢 澤瀉五錢 玄胡索五錢 虎骨八錢 柏杞子六錢 白胡根三兩 胡桃肉四兩 大棗頭三兩 女人加益母草 油髮灰 阿膠各四錢 以上等藥，共置入好酒中，隨飲。

勞傷丸藥方 生地 熟地 加皮 當歸 丹皮 黃芩 杜仲 黃芪 麥冬 天冬 遠志 川牛膝 補骨脂 柏子仁 白茯苓各等分 以上共研細末，白蜜和丸，白湯送下。

體仁子曰：“跌打損傷之症皆從血論。損有重輕之不同，傷有淺深之各異，豈能一概而治乎？蓋皮未破，多用串皮破血之劑；皮已破，多用通利兼補之方；此乃跌打中之大要也，學者用心詳焉！”今將秘方開例於後。

## 秘傳方

**君臣散(第一)** 肉桂童便浸，一兩 紅花酒洗，五錢 歸尾五錢 生地五錢 甘草梢五錢 赤芍五錢 烏藥五錢 牛膝五錢 玄胡索五錢 杜仲三錢 桃仁去油，五錢 碎補去毛，五錢 繢斷二錢 花粉二錢 川芎三錢 羌活二錢 牡丹皮五錢 加皮二錢 防風二錢 共研細末，臨用加薑末少許。

**紫金散(第二)** 紫金皮 酒浸一宿，瓦上焙乾，爲末用。

**黑神散(第三)** 黃金子 麻油拌，炒黑爲末。

**桃花散(第四)** 乳香炙 沒藥炙 血竭炙 各等分，共研細末。

**玉龍散(第五)** 人中白 醋炙七次，研末。

**乳香散(第六)** 乳香炙 沒藥炙 碎補去毛 當歸酒浸  
硼砂煅 血竭 土鱉去頭足，醋炙 各等分，酒淬，瓦焙爲末。

**一粒金丹(第七)** 半夏二錢（上四字一本作“半兩錢”三字），醋炙 土鱉炙，兩半 瓜蔞仁去油（此下一本有“每一錢者”四字），三錢 共研細末，以飯丸粟米大，上部一錢，下部一錢五分，酒下。

**八仙丹(第八)** 乳香二錢 沒藥二錢 巴霜二錢 碎補二錢 半夏二錢 歸尾酒洗，五錢 硼砂三錢 大黃五錢 血竭三錢 自然銅醋炒，三錢 無名異醋炙，二錢 以上共研細末，每服八厘，酒下。

**川芎散(第九)** 上部頭傷痛用。川芎一錢 白芷一錢 防風一錢 赤芍一錢 生地一錢 當歸一錢二分 羌活一錢二分 花粉一錢二分 陳皮一錢 桔梗一錢 黃金子一錢二分 加薑三片，水酒煎服。

**桂枝湯(第十)** 上部手臂傷痛用。桂枝 枳殼 陳皮

紅花 香附 生地 防風 當歸 赤芍 獨活 玄胡索 各等分，加童便煎服。

蔓荆散(第十一) 上部眼目傷用。白芍一錢 生地一錢二分 紅花一錢二分 白朮一錢二分 川芎一錢二分 當歸一錢二分 蔓荆子一錢 水酒煎服。

杜仲散(第十二) 中部腰痛傷用。肉桂一錢 烏藥一錢 杜仲一錢二分 赤芍一錢 當歸一錢 丹皮一錢 桃仁一錢 繢斷一錢 玄胡索一錢 童便煎服。

杏仁湯(第十三) 中部肚痛傷用。甘草三錢 歸尾一錢 生軍三錢 杏仁去皮三錢 桃仁去皮三錢 童便煎服。

桔梗湯(第十四) 下部二便閉用。紅花 蘇木 芒硝各五錢 煥大軍七錢 桔梗二錢 桃仁二十五粒 猪苓 澤瀉各三錢 加薑三片、童便一盞、酒半斤，煎服。

車前散(第十五) 下部二便閉用。當歸 枳殼 赤芍 車前子 木通 桔梗 大黃 芒硝 以上各等分，童便水酒煎服。

海桐散(第十六) 手足傷亦可用。獨活 牛膝 秦艽 桂心 生地 陳皮 赤芍 繢斷 當歸 防風 丹皮 加皮 薑黃 海桐皮 以上各等分，童便水酒煎服。

麝香膏(第十七) 紅花五錢 歸尾一兩 蘇木三錢 加皮五錢 肉桂五錢 地黃五錢 白芷五錢 紫金皮五錢 防風五錢 荆芥五錢 牛膝五錢 繢斷五錢 靈仙三錢 獨活五錢 麻黃五錢 黃柏五錢 丹皮五錢 桃仁五錢 苦參五錢 血餘五錢 大黃一兩 以上用麻油斤半，將上等藥浸下，夏二日，冬四日為度，用銅鍋熬至枯色，入薑少許，再熬，去渣，又熬，入片黃霜三味，又熬數沸，取起收拾聽用。用時加麝香、乳香、沒藥三味藥末於膏上。

象皮膏(第十八) 凡跌打骨斷皮破皆用。大黃一兩

川歸一兩 肉桂三錢 生地一兩 紅花三錢 川連三錢 甘草五錢 荆芥三錢 白芨五錢 白斂五錢 以上肉桂、白芨、白斂、黃連共研細末，餘藥油浸，照前熬法成膏收用。用時加膏上末藥土鱉、血竭、龍骨、象皮、螵蛸、珍珠、乳香、沒藥八味，再貼。

**藥酒方(第十九)** 凡打傷跌損可用。當歸 生地 烏藥 三七 肉桂 乳香 沒藥 牛膝 丹皮 紅花 玄胡索 防風 獨活 杜仲 加皮 落得打 川芎 虎骨 乾薑 薑黃 紫荆皮 海桐皮 各五錢，米酒浸煮，早晚服。

**八釐寶麻藥(第二十)** 川烏 草烏 蟠酥 半夏 南星 黃麻花 開楊花 共等分，研末，苧葉汁拌末，晒乾，再研末收好。每服八厘，酒下。

**楊花散(第二十一)** 開楊花二錢 南星二錢 草烏一錢 半夏二錢 共研末，用麻黃根、草麻根、草麻葉三味絞汁，拌上末藥，再研末。開割肉用者，搽上。

**續筋骨(第二十二)** 土鱉 血竭 龍骨 共等分，研細末，唾調塗。

**又方(第二十三)** 旋覆花 取汁調塗。

**止血散(第二十四)** 血見愁 馬蘭頭 川三七 旱蓮草 共研細末，取好便用。

**桃花散(第二十五)** 陳年石灰一斤，用牛胆浸七次，取出，同大黃炒如桃花色，去大黃用。

**黑龍散(第二十六)** 川山甲 丁皮六兩 川芎二兩 枇杷葉去毛，五錢、百草霜五錢 當歸二兩 共研細末用。

**洗傷藥方(第二十七)** 艾 葱 桂枝 荆芥 歸尾 槐花 蒼朮 防風 玄胡索 以上各五錢，水酒童便煎服。

**陰江湯(第二十八)** 婦人損傷用。阿膠 沒藥 油髮灰 水酒煎服。

血竭湯(第二十九) 跌打血從口出用。 髮灰 茅根  
血竭 茼菜根 水酒童便煎服。

跌打既好，筋不伸方(第三十) 黃荆子一兩 繢斷八錢  
海桐皮八錢 虎骨八錢 雞骨八錢 大骨八錢 秦艽七錢  
獨活七錢 共研細末，每服一錢五分，合下寬筋湯服。

寬筋湯(第三十一) 肉桂 牛膝 薑黃 黃芪 川芎  
地黃 獨活 繢斷 白茯苓 海桐皮 /各等分，用水酒煎，空  
心服。

人參散(第三十二) 凡接骨之後，無力不能行動用。  
人參 白朮 肉桂 繢斷 黃芪 當歸 烏藥 各等分，用  
水煎服。

桂枝湯(第三十三) 凡治一切跌打通用。 陳皮 茵薑  
枳殼 丹皮 香附 生地 桂枝 歸尾 桃仁 乳香 沒  
藥 川芎 牛膝 薑香葉 水煎服。

薑黃湯(第三十四) 凡一切跌打通用。 桃仁 蘭葉  
丹皮 薑黃 蘇木 當歸 陳皮 牛膝 川芎 生地 肉桂  
乳香 沒藥 水酒童便煎服。

消風散(第三十五) 凡跌打損傷，牙關緊閉。 赤芍一  
錢二分 川芎一錢二分 當歸五分 升麻一錢 羌活一錢  
陳皮一錢二分 半夏一錢二分 防風七分 南星五分 甘草  
三分 老薑三片 煎服。

麻黃湯(第三十六) 凡破傷風發寒用 肉桂三分 乾薑  
五分 半夏一錢二分 厚朴七分 桔梗七分 枳殼七分 麻  
黃去節二錢 蘇木五分 川芎七分 陳皮薑汁製，一錢 煎  
濃，熱服。

升麻湯(第三十七) 凡損傷頭用。 白朮 附子 升麻  
麻黃 紅花 川芎 乾薑 肉桂 甘草 各等分用，加老  
薑三片、葱頭三節，水煎服。

杏仁湯(第三十八) 肉桂 麻黃 桑皮 杏仁 桔梗  
細茶 甘草 各等分，加燈心煎服。

治破風(第三十九) 蒼草一兩 水酒煎服。

金瘡方(第四十) 上三七三錢 水粉炒黃，五分 片香  
製三兩 共研細末用。

又方(第四十一) 舊氈帽邊三兩 燒灰存性，用香油調  
驗。

刑杖方(第四十二) 歌云：既救諸傷又救刑，乳香沒藥合  
無名；土鱉再加真猴骨，然銅宜以醋來烹。六味一同研細末，  
煉蜜合成打彈丸；臨用須飲三杯酒，那怕黃昏打到明！ 乳香  
沒藥 土鱉 無名異 猴骨 自然銅

又方(第四十三) 治刑杖。 白芷三錢 赤芍三錢 乳  
香炙一兩 沒藥炙一兩 黃金子一兩 陳年尿坑瓦，童便酒  
煅，一兩，共研細末，未杖之前，酒調服之。若既杖傷甚，只宜  
用下藥。

紅花散(第四十四) 治刑杖。 酒醉土鱉 醋煅舌錢  
炙乳香 炙沒藥 蘇木節 巴霜 各等分，研末，一板一厘，  
水酒調服。

刑傷夾拶方(第四十五) 大黃四兩 半夏二兩 白芷二  
兩 官桂四兩 甘草二兩 共研末，酒調敷傷處，內服上桃花  
散。

治足骨挾碎(第四十六) 土鱉二個 生蟹一個 共搗敷  
患處，內服六號乳香散。

治打足拐(第四十七) 牛膝二錢 土鱉二錢 共搗，敷  
患處。

被人咬傷方(第四十八) 栗子一撮，口中嚼碎，敷患處。

抓破臉皮方(第四十九) 用薑汁調輕粉一錢，敷患處。

打傷接氣方(第五十) 參鬚一錢 珠砂三錢 乳香一錢

川烏一錢 北細辛三錢 寸香一分 共研細末，每服五七厘，童便下。

開關吹鼻散(第五十一) 細辛二錢 牙皂二錢 山柰一錢 良薑二錢 寸香一分 共研細末，吹鼻即甦。

撤開吹喉散(第五十二) 治牙關緊閉。 牙皂二錢 細辛二錢 巴霜二錢 共研末，入喉即甦。

撤開灌下方(第五十三) 蟬退三錢 珠砂一錢一分 共研末，酒或童便下。

急救灌轉方(第五十四) 乳香去油，四錢 沒藥去油，四錢 名異煅，四錢 枳殼麪炒，三錢 寸香二分 木鱉便炒，三錢 土鱉火煅，四錢 土狗麪炒，四錢 川銅醋煅，四錢 血竭五錢 開楊花酒蒸去心，五錢 共研細末，重服七厘，或酒或童便下。

欲吐痰方(第五十五) 胆礬三分 銅綠三分 以上共研細末，用神仙醋調服，即吐痰。

雞鳴散(第五十六) 治跌打，瘀血攻心脉欲死，服。 生地二錢 大黃三錢 杏仁去衣，一錢 當歸酒洗，一錢五分 用生水酒煎服。

腦頭引 藿本 川芎 白芷 白芍 蘇葉 升麻 木香 羌活

咽喉引 玄胡 碎補 乾薑 防風 桔梗 薄荷 桔梗 連翹

胸前引 枳殼 厚朴 乾薑 鐘金 陳皮 烏藥 木香 甘草

腰上引 杜仲 小茴 蕤絲 木香 故紙 柏子 玄胡 加皮

手上引 桂枝 當歸 透骨草 甘草 羌活 防風 神仙劍(即千年健，十指全傷用)