



全国高职高专教育“十一五”规划教材

高等数学与实验

主编 刘 红



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

要内容内

全国高职高专教育“十一五”规划教材

高等数学与实验

主 编 刘 红

副主编 黄毅蓉 潘传中

李季卿 张 静

ISBN 978-7-04-024343-0

2008.8

教材 J1-013

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第11921号

高等教育出版社

00-24343-00

内容提要

本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材,是按照教育部颁发的“高职高专人才培养目标”和“关于加强高职高专教育教材建设的若干意见”等文件精神,并配合高等职业教育基础课程改革建设项目的实施,在分析高职高专大众化教育现状的基础上编写的一本面向工程类专业的数学教材。

本书遵循“以应用为目的,以必需、够用为度”的原则,以“案例驱动,学习型任务引入”的方式编写,教学目标和学习任务明确。教学内容彰显规格教育、与工科专业需求的深度融合等特点。充分把握科学性原则,但不强调其学科的系统性。重视知识的应用和数学思想,而淡化理论的推导和证明,着力培养学生的知识应用能力和逻辑思维能力。

本书内容符合高职高专工程类专业对数学知识的教学要求。包括函数、极限与连续、导数与微分、导数的应用、积分及其应用、常微分方程、级数、线性代数、积分变换、概率与数理统计和数学实验等部分。

本书可作为高职高专工程类各专业的数学教材,也可作为相关科技人员的参考书以及培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

高等数学与实验/刘红主编. —北京:高等教育出版社, 2008.8

ISBN 978 - 7 - 04 - 024342 - 0

I. 高… II. 刘… III. 高等数学 - 高等学校:技术学校 - 教材 IV. O13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 116321 号

策划编辑 邓雁城 责任编辑 李陶 封面设计 于涛 责任绘图 尹文军
版式设计 陆瑞红 责任校对 胡晓琪 责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京新丰印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 1092 1/16	版 次	2008 年 8 月第 1 版
印 张	19.75	印 次	2008 年 8 月第 1 次印刷
字 数	480 000	定 价	26.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24342-00

前 言

本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材,是按照教育部颁发的“高职高专人才培养目标”和“关于加强高职高专教育教材建设的若干意见”等文件精神,并配合高等职业教育基础课程改革建设项目的实施,在分析高职高专大众化教育现状的基础上编写的一本面向工程类专业的数学教材。

本教材根据高职高专院校对技术应用型人才的实际要求,以高技能人才培养为核心的高职高专院校课程定位,突出“以学生为中心”而非“以学科为中心”、“以教师为中心”的基本理念,按照“基础理论教学以突出应用为目的,以必需、够用为度”的原则,落实“打好基础,突出应用,强化能力,适当延伸”的原则。为实现教材服务于专业,构建了“大平台,分层次,活模块,多接口”的教材体系,有利于不同专业需要进行取舍,更好地对学生进行因材施教。

本教材在教学内容上彰显规格教育与工科专业需求深度融合等特点,充分把握了科学性原则,但不强调其学科的系统性。本教材重视知识的应用和数学思想,而淡化理论的推导和证明,着重在培养学生的知识应用能力和逻辑思维能力。

本教材还体现了公共基础课程的基础性地位和工具性作用。在利用计算机进行数学实验时,充分体现重视学生的实际操作,而淡化理论的系统介绍的理念,增加利用计算机学习数学、应用数学的训练,通过数学实验,学会使用数学软件,实现由“学数学”到“用数学”的转变,为将来使用高等数学进行计算、学习专业课和以后进一步学习现代科学技术打下基础;同时激发学生学习兴趣和学习动机,使学生在知识、能力、素质各方面得到全面提升。

本教材体例格式依据“行动导向教学法”进行创新,以“案例驱动,学习型任务引入”的方式编写,教学目标和学习任务明确,教学内容的选取既考虑应用型人才培养的特点,又兼顾学生的可持续发展,同时又遵循学生的认知规律,每节从案例分析到学习型任务引入,知识的再现,到引例回应,最后是任务考核,达到了使学生在在学习过程中“好学”,教师在教学过程中“好用”的目的。

本教材全部内容按照 150 学时的教学时间进行编写,但考虑到学生中学学习过前三章的大部分内容,可根据各校的实际课时进行选择、调整;150 学时中包含 8 学时的数学实验学时,数学实验使用的是应用非常广泛的 MATLAB 软件,各校可根据计算机房的实际情况,最后集中安排数学实验,也可穿插在教学中进行。

II 前 言

本教材汇集了成都航空职业技术学院、四川工程职业技术学院、四川工商职业技术学院、四川水利职业技术学院、成都农科职业技术学院、达州职业技术学院等院校的精品课程资源,编写教师大部分是具有教学研究、教改思想和实践经验的精品课程项目主持人或示范院校骨干教师。本教材由刘红最终统稿、定稿,并担任主编,副主编为黄毅蓉、潘传中、李季卿、张静,参编人员有李有慧、杜瑜、赵春、王小林、易林、沈波、王静。所有插图角本由陈立宏绘制。

本教材由四川工程职业技术学院的李以渝教授担任主审,他提出了许多宝贵意见和建议,高等教育出版社的编辑也对本书的出版给予了大力支持,在此一并致谢!

限于我们的水平,加之高职高专公共基础课程改革已由“转型期”进入“攻坚期”,高职高专公共基础课程还无明确的课程标准,书中若有不妥之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

二〇〇八年六月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581896/58581879

传 真：(010)82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118

出版物数码防伪说明：

本图书采用出版物数码防伪系统，用户购书后刮开封底防伪密码涂层，将16位防伪密码发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪，同时您将有机会参加鼓励使用正版图书的抽奖活动，赢取各类奖项，详情请查询中国扫黄打非网(<http://www.shdf.gov.cn>)。

反盗版短信举报：编辑短信“JB,图书名称,出版社,购买地点”发送至106695881280

数码防伪客服电话：(010)58582300/58582301

网络题库使用说明：

1. 进入“中国组卷网”(<http://www.zujuan.com.cn>)，输入本书封底提供的防伪码“明码”部分(需输入50本)，获取积分，即可免费从网上下载题库至本地机。使用时间为一个学年。

2. 高等数学网络题库拥有约8000道题目，内容涵盖微积分、线性代数、概率统计、线性规划、离散数学等高职高专数学类课程，包括选择、填空、判断、计算、分析、应用、证明等多种题目类型。题库系统设置了模板快速组卷、自定义组卷、个人大纲、个人题库、特色上传等功能。

电子邮箱：caokun@hep.com.cn

咨询电话：(010)58582365

目 录

第一章 函数、极限与连续	1	第三节 微分	29
第一节 函数	1	一、微分的定义	30
一、函数的概念	1	二、微分的几何意义	31
二、函数的几种简单性态	2	三、微分的运算	31
三、初等函数	3	四、微分在近似计算上的应用	33
习题 1-1	4	习题 2-3	35
第二节 极限及其运算	4	本章小结	36
一、极限与极限的思想	5	自我检测题	36
二、求极限的方法	8	第二章习题参考答案	37
习题 1-2	11	第三章 导数的应用	40
第三节 函数的连续性	12	第一节 微分中值定理 洛必达法则	40
一、函数连续性的概念	12	一、微分中值定理	40
二、函数的间断点	13	二、洛必达法则	41
三、闭区间上连续函数的性质	14	习题 3-1	44
习题 1-3	15	第二节 函数性态的讨论	45
本章小结	15	一、函数的单调区间与极值的判别	45
自我检测题	16	二、曲线的凹凸性与拐点的判别	48
第一章习题参考答案	17	三、最大值、最小值问题	50
第二章 导数与微分	18	习题 3-2	51
第一节 导数的概念	18	第三节 曲率与曲率半径	52
一、导数概念的引入	18	一、弧微分	52
二、导数的定义	20	二、曲率及其计算公式	53
三、函数的连续性与可导性的关系	21	三、曲率圆和曲率半径	54
习题 2-1	22	习题 3-3	55
第二节 导数的运算	23	本章小结	56
一、常见几个基本初等函数的导数	23	自我检测题	56
二、导数的四则运算法则	25	第三章习题参考答案	57
三、复合函数与隐函数的导数	26	第四章 不定积分	59
四、高阶导数	28	第一节 不定积分的概念	59
习题 2-2	29	一、原函数的概念	59

II 目 录

二、不定积分	59	习题 6-1	104
三、不定积分的几何意义	60	第二节 一阶微分方程	104
四、不定积分的基本性质及基本公式	60	一、可分离变量的微分方程	105
习题 4-1	62	二、一阶线性微分方程	106
第二节 不定积分的计算	62	习题 6-2	109
一、直接积分法	63	第三节 二阶常系数线性微分方程	109
二、换元积分法	64	一、二阶常系数线性微分方程解的 结构	110
习题 4-2	69	二、二阶常系数线性齐次微分方程的 解法	110
本章小结	70	三、二阶常系数线性非齐次微分方程的 解法	112
自我检测题	71	习题 6-3	116
第四章习题参考答案	72	本章小结	116
第五章 定积分及其应用	75	自我检测题	117
第一节 定积分的概念	75	第六章习题参考答案	117
一、累积问题	75	第七章 多元函数微积分	120
二、定积分的定义	77	第一节 空间解析几何简介	120
三、定积分的几何意义及性质	78	一、空间直角坐标系	120
习题 5-1	82	二、空间曲面	122
第二节 微积分基本定理及应用	82	习题 7-1	124
一、变上限积分函数	83	第二节 多元函数的概念	124
二、微积分基本定理	83	一、多元函数的定义	124
三、定积分算法	84	二、二元函数的几何意义	126
习题 5-2	86	三、二元函数的极限	126
第三节 广义积分	86	四、二元函数的连续性	127
一、无穷区间的广义积分	87	习题 7-2	128
二、无界函数的广义积分	88	第三节 偏导数	129
习题 5-3	89	一、偏导数的概念	129
第四节 定积分的应用	90	二、高阶偏导数	131
一、定积分的微元法	90	习题 7-3	133
二、微元法的应用	91	第四节 全微分	133
习题 5-4	97	一、全微分的定义	134
本章小结	98	二、全微分在近似计算中的应用	135
自我检测题	99	习题 7-4	136
第五章习题参考答案	99	第五节 多元复合函数的求导法则	136
第六章 常微分方程	101	一、多元复合函数的求导法则	136
第一节 常微分方程的概念	101		
一、常微分方程的概念	101		
二、微分方程应用举例	102		

二、隐函数的求导法则	138	二、数项级数收敛的必要条件与性质	191
习题 7-5	139	三、正项级数及其审敛法	192
第六节 多元函数的极值	139	四、交错级数及其审敛法	193
一、二元函数极值的概念	139	五、绝对收敛与条件收敛	194
二、二元函数极值的判别法	140	习题 9-1	195
习题 7-6	142	第二节 幂级数	195
第七节 二重积分	142	一、函数项级数的概念	196
一、二重积分的概念和性质	143	二、幂级数及其收敛半径与收敛区间	196
二、直角坐标计算二重积分	145	三、幂级数的运算及和函数	198
习题 7-7	148	四、泰勒定理	199
本章小结	149	五、幂级数的应用举例	200
自我检测题	150	习题 9-2	204
第七章习题参考答案	151	第三节 傅里叶级数	204
第八章 线性代数基础	155	一、三角级数及三角函数系的正交性	204
第一节 行列式	155	二、周期为 2π 的函数展开成傅里叶	
一、行列式的基本概念	155	级数	205
二、行列式的性质	158	三、周期为 $2l$ 的函数展开为傅里叶	
三、克拉默法则	160	级数	208
习题 8-1	162	习题 9-3	210
第二节 矩阵	163	本章小结	210
一、矩阵的概念	164	自我检测题	212
二、矩阵的线性运算	166	第九章习题参考答案	212
三、逆矩阵	170	第十章 积分变换	215
习题 8-2	174	第一节 拉氏变换	215
第三节 矩阵的初等变换与一般线性		一、拉氏变换的概念	215
方程组的求解	175	二、两个重要函数	216
一、矩阵的初等变换与秩	175	习题 10-1	218
二、利用初等变换法求逆矩阵	176	第二节 拉氏变换的性质	218
三、利用矩阵的初等变换求线性		拉氏变换的性质	219
方程组	177	习题 10-2	221
习题 8-3	182	第三节 拉氏逆变换的性质	221
本章小结	184	习题 10-3	223
自我检测题	184	第四节 拉氏变换的应用	223
第八章习题参考答案	187	习题 10-4	225
第九章 级数	190	本章小结	225
第一节 数项级数	190	自我检测题	225
一、数项级数的概念	190	第十章习题参考答案	226

IV 目 录

第十一章 概率与数理统计基础	228
第一节 概率初步	228
一、随机事件	229
二、概率的定义及基本性质	229
三、概率公式	230
四、事件的独立性及伯努利概型	231
习题 11-1	233
第二节 随机变量	234
一、随机变量与分布函数	234
二、离散型随机变量及其分布	235
三、连续型随机变量及其分布	237
习题 11-2	242
第三节 随机变量的数字特征	243
一、数学期望	243
二、方差	246
习题 11-3	248
第四节 数理统计基础	249
一、数理统计中的几个概念	249
二、数据分析与处理初步	253
习题 11-4	255
第五节 参数估计	255
一、参数的点估计	255
二、参数的区间估计	257
习题 11-5	260
第六节 假设检验	261

一、假设检验的基本概念	261
二、一个正态总体参数的假设检验	263
习题 11-6	266
本章小结	266
自我检测题	266
第十一章习题参考答案	267
第十二章 数学实验	270
第一节 基础实验	270
一、MATLAB 初步认识	270
二、数据的可视化初步(绘图)	274
第二节 微积分运算实验	277
MATLAB 的符号运算功能	277
第三节 线性代数运算实验	283
一、矩阵的基本运算	284
二、矩阵应用——解线性方程组	286
第四节 工程应用实验	289
一、MATLAB 的级数运算和积分变换运算	290
二、MATLAB 的概率统计运算	292
附录	299
附录一 泊松分布表	299
附录二 标准正态分布表	302
附录三 χ^2 分布表	303
附录四 t 分布表	305

第一章

函数、极限与连续

极限是学习微积分的重要理论基础,微积分是研究函数关系的一门学科,只有对函数的概念、图像及性质有了全面深入的了解和认识,才能学好微积分.本章将在已学函数的基础上,着重讨论函数的极限,并介绍函数的连续性.

第一节 函 数

引例 测得某地区的气温随高度的升高而变化的情况是:高度每增加 1 km,气温将下降 6°C ,现测得地面(假定高度为 0 km)的温度是 10°C ,假设某高度的气温是 -2°C ,问这个高度是多少?

分析 本例是关于自然现象中气温与高度的关系问题,当一个量变化时,会直接或间接地引起周围其他一个或几个量同时变化.这种几个量之间的相互联系或相互影响的关系,揭示了客观世界中事物变化的内在规律,这种规律用数学进行描述,就是我们说的函数关系.

本节学习任务

1. 掌握函数的定义及四大性质——单调性、奇偶性、周期性、有界性;
2. 认识复合函数,能正确地分析复合函数的复合过程;
3. 了解基本初等函数及其表达式;
4. 认识初等函数,能建立简单实际问题中变量的函数关系.

一、函数的概念

定义 1 设 x, y 是两个变量, D 是一个给定的实数集,如果对于 D 内的每一个数 x ,按照某个对应法则 f ,变量 y 都有唯一确定的数值和它对应,则称 y 是 x 的函数,记作 $y=f(x)$. 式中 x 称为自变量, y 称为因变量,数集 D 称为函数的定义域,当 x 取遍 D 中的一切实数时,与它对应的函数值的集合 M 称为函数 $y=f(x)$ 的值域.

函数的定义域和对应关系称为函数的两个要素.

确定函数定义域时,对于实际问题,根据问题的实际意义确定,对于函数的表达式,由使式子有意义的自变量的取值范围确定.

例 1 求函数 $y = \frac{1}{1-x^2} + \sqrt{x+2}$ 的定义域.

解 要使函数有意义,应满足

$$\begin{cases} 1-x^2 \neq 0 \\ x+2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq \pm 1 \\ x \geq -2 \end{cases}$$

所以,函数的定义域为 $[-2, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$.

例 2 某圆柱形容器的容积为 V , 试将它的表面积表示成底半径的函数, 并确定它的定义域.

解 设圆柱的底半径为 r , 高为 h , 表面积为 S .

因为 $V = \pi r^2 h$, 得 $h = \frac{V}{\pi r^2}$, 根据圆柱表面积公式有 $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$, 所以

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}, \text{ 其定义域为 } (0, +\infty).$$

上式表示表面积是底半径的函数; 但反过来, 要求通过本例中的体积 V 和表面积 S 来表示底半径 r , 这是已知一个函数求其反函数.

定义 2 给定函数 $y = f(x)$, $x \in D$ (定义域), $y \in W$ (值域). 对于任一 $y \in W$, 在 D 中都有唯一的 x 与之对应, 则由关系式 $y = f(x)$ 确定的另一函数 $x = \varphi(y)$ 称为函数 $y = f(x)$ 的反函数.

习惯上, 我们总是用 x 表示自变量, y 表示函数, 因此 $y = f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$ 通常写成 $y = \varphi(x)$, 而函数 $y = f(x)$ 和 $y = \varphi(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称.

二、函数的几种简单性态

1. 函数的奇偶性

定义 3 设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称, 如果对于任一 $x \in D$, 都有 $f(-x) = f(x)$ 成立, 则称 $f(x)$ 为偶函数. 如果对于任一 $x \in D$, 都有 $f(-x) = -f(x)$ 成立, 则称 $f(x)$ 为奇函数.

偶函数的图像关于 y 轴对称, 奇函数图像关于原点对称.

2. 函数的单调性

定义 4 若函数 $f(x)$ 对区间 (a, b) 内的任意两点 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内是单调增加的, 区间 (a, b) 称为单调递增区间; 如果对区间 (a, b) 内的任意两点 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内是单调减少的, 区间 (a, b) 称为单调递减区间.

3. 函数的有界性

定义 5 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义. 如果存在正数 M , 使得对于任一 $x \in I$, 都有 $|f(x)| \leq M$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 I 内是有界的. 如果这样的正数不存在, 就称函数 $f(x)$ 在区间 I 内是无界的.

4. 函数的周期性

定义 6 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在一个正数 T , 使得对于一切 $x \in D$, 有 $x \pm T \in D$,

且 $f(x) = f(x + T)$ 都成立, 则称 $f(x)$ 为周期函数, T 称为函数 $f(x)$ 的周期. 通常, 周期函数的周期是指最小正周期. 例如我们以前学过的三角函数就是周期函数.

三、初等函数

1. 基本初等函数

以下五种函数统称为基本初等函数:

幂函数 $y = x^\mu$ (μ 是常数);

指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$);

对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$), 当 $a = e$ 时记为 $y = \ln x$;

三角函数 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x, y = \sec x, y = \csc x$;

反三角函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x$.

那么函数 $y = \sin x^2$ 是不是基本初等函数? 很显然, 它不是基本初等函数. 但是, 它可看成是由两个基本初等函数 $y = \sin u, u = x^2$ 构成的, 这种函数叫复合函数.

2. 复合函数

定义 7 设有函数 $y = f(u), u = \varphi(x)$, 当 $x \in D$ 时, $u = \varphi(x)$ 的部分或全部 u 值, 落在函数 $y = f(u)$ 的定义域中, 此时 y 通过变量 u 也是变量 x 的函数, 我们称此函数为由函数 $y = f(u), u = \varphi(x)$ 复合而成的函数, 简称复合函数, 记为 $y = f[\varphi(x)]$, 其中 u 称为中间变量.

例 3 将函数 y 表示成 x 的复合函数:

$$(1) y = \ln u, u = \cos x \quad (2) y = e^u, u = \sin v, v = x^2 + 1$$

解 (1) $y = \ln u = \ln \cos x$, 即 $y = \ln \cos x$

$$(2) y = e^u = e^{\sin v} = e^{\sin(x^2+1)}, \text{ 即 } y = e^{\sin(x^2+1)}$$

例 4 求下列函数的复合过程

$$(1) y = \left(\arccos \frac{1}{x} \right)^3 \quad (2) y = e^{\ln x^2}$$

解 (1) $y = \left(\arccos \frac{1}{x} \right)^3$ 是由 $y = u^3, u = \arccos v, v = \frac{1}{x}$ 这三个函数复合而成的.

(2) $y = e^{\ln x^2}$ 是由 $y = e^u, u = \ln v, v = x^2$ 这三个函数复合而成的.

注意 并非任意两个函数都可以复合成一个函数. 例如, $y = \arcsin u, u = 2 + x^2$ 就不能复合成一个函数, 为什么? 思考一下.

3. 初等函数

由基本初等函数和常数经过有限次四则运算或有限次复合而成的, 并能用一个式子表示的函数, 叫做初等函数.

例如, 函数 $y = e^{\ln x^2}, y = \frac{1+x}{2x-3}, y = \arcsin x^2 + x, y = x \cos x$ 等都是初等函数.

注意 分段函数不一定是初等函数, 例如, 分段函数 $y = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ x+1 & x < 0 \end{cases}$ 就不是初等函数,

而分段函数 $y = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$ 却是初等函数. 为什么? 请思考.

引例回应

在引例中, 高度每增加 1 km, 气温将下降 6°C , 故其高度与气温的关系为: $y = -6x + a$, 其中 x 为高度(单位 km), y 为气温(单位 $^\circ\text{C}$), a 为地区常值. 由地面(假定高度为 0)温度是 10°C , 即 $x = 0, y = 10$, 则 $a = 10$.

即其高度与气温的关系为 $y = -6x + 10$.

现某高度的气温是 -2°C , 则这个高度是 $x = 2$, 即高度为 2 km.

任务考核

1. 要使函数 $y = \sqrt{\ln(x+1)}$ 有意义, 必须满足(), 所以且其定义域为().

2. 函数 $y = \tan[\arcsin(1-x)]$ 的是由 $y = ()$, $u = ()$, $v = ()$ 这三个函数复合而成.

习题 1-1

1. 求下列函数的定义域:

$$(1) y = \sqrt{\lg(1-x)}$$

$$(2) y = \frac{\sqrt{x+3}}{x-2}$$

$$(3) y = \sqrt{\frac{x+2}{x-1}}$$

$$(4) y = \ln(x^2 + 2x)$$

$$(5) y = \sqrt{x+1} + \frac{1}{x^2-4}$$

$$(6) y = \frac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}$$

2. 分析下列函数的复合过程:

$$(1) y = e^{\sin^2 x}$$

$$(2) y = \ln \sin x$$

$$(3) y = 2 \arctan \sin \sqrt{1+x^2}$$

$$(4) y = e^{\ln \sqrt{1+x}}$$

$$(5) y = \frac{1}{\sqrt{\ln(x-2)}}$$

$$(6) y = (\sin 2x)^3$$

3. 应用题:

某人有大米 10 吨要出售. 当购买量在 5 吨以内时, 定价为 2 000 元/吨; 当购买量大于 5 吨时, 超出部分定价为 1 800 元/吨. 试将销售总收入表示为销量的函数.

第二节 极限及其运算

引例 1 我们观察下面几个数列, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 的变化趋势:

$$(1) \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, x_n = \frac{n}{n+1}, \dots;$$

$$(2) 1, 2, 4, 8, \dots, x_n = 2^n, \dots$$

引例 2 我们观察下列函数当自变量 x 改变时函数值的变化:

(3) 当自变量 $x \rightarrow \infty$ 时函数 $y = \frac{1}{x}$ 的变化趋势;

(4) 当 $x \rightarrow 2$ 时函数 $y = x^2$ 的变化趋势.

分析 从图 1-1 可看出,对于数列(1)当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 的数值无限接近一个常数 1;从图 1-2 看出,数列(2)则没有这个性质,当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 的数值却无限增大;观察图 1-3,函数(3)当自变量 $x \rightarrow \infty$ 时,它的数值无限趋近于 0;观察图 1-4,函数(4)当自变量 $x \rightarrow 2$ 时,它的数值无限趋近于 4. 对于(1)(3)(4)这三种情况,我们引入极限的概念.




图 1-1




图 1-2




图 1-3




图 1-4

本节学习任务

1. 认识极限的概念,会求函数的极限;
2. 认识无穷小、无穷大的定义及性质,能进行无穷小的比较.

一、极限与极限的思想

极限是微积分最重要的基本概念之一.微积分的许多概念都是用极限表述的,一些重要的性质和运算法则也是通过极限方法推导出来的,因此,掌握极限的概念、性质和计算方法是学习好微积分的前提和基础.

1. 数列的极限

定义 1 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时,数列 $\{x_n\}$ 无限接近于一个确定的常数 A ,则称常数 A 是数列 $\{x_n\}$ 的极限,或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A .

记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 或 $x_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$

若数列的极限不存在,则称数列发散.

例 1 求下列数列的极限:

$$(1) x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \quad (2) x_n = 2$$

$$(3) x_n = 2 + (-1)^n \frac{1}{n} \quad (4) x_n = 2^n$$

解 通过观察可以看出,它们的极限分别是:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} 2 = 2$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[2 + (-1)^n \frac{1}{n}\right] = 2$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \text{ 极限不存在}$$

一般的,我们可得到下述结论:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} C = C$$

数列是一种特殊形式的函数,我们把数列极限的定义推广,就可得到函数极限的定义.

2. 函数的极限

(1) 自变量 $x \rightarrow \infty$ 时函数的极限

定义 2 设函数 $y=f(x)$ 有定义,如果当自变量 x 的绝对值无限增大时,函数 $f(x)$ 无限接近某个常数 A ,则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限.

记作 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 或 $f(x) \rightarrow A$ (当 $x \rightarrow \infty$)

这里,自变量的绝对值无限增大包含两种基本情形,即 x 从某个值开始取正值无限增大(记作 $x \rightarrow +\infty$)和 x 从某个值开始取负值时其绝对值无限增大(记作 $x \rightarrow -\infty$).有时只需考察 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时函数的变化趋势,对此我们有下面定义.

定义 3 如果当 $x \rightarrow +\infty$ (或 $x \rightarrow -\infty$) 时,函数 $f(x)$ 的值无限接近某个确定的常数 A ,则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ (或 $x \rightarrow -\infty$) 时的极限.记作

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A \quad (\text{当 } x \rightarrow +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A, \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A \quad (\text{当 } x \rightarrow -\infty).$$

由定义可知,当自变量 $x \rightarrow \infty$ 时函数 $f(x)$ 的极限存在的充要条件为,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 都存在且相等,

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$.

例 2 由函数 $y = \arctan x$ 图像判断下列极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$$

解 如图 1-5 所示, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$,

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x$ 虽然都

存在,但不相等,所以, $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$ 极限不存在.

(2) 自变量 $x \rightarrow x_0$ 时函数的极限

定义 4 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内(x_0 点可除外)有定义,如果当 x 无限趋近于 x_0 时,对应的函数 $y=f(x)$ 的值无限接近于一个常数 A ,则称常数 A 为函数 $y=f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时函数的极限,记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \text{ 或 } f(x) \rightarrow A \text{ (当 } x \rightarrow x_0 \text{)}$$

说明 (1) 在定义 4 中自变量 $x \rightarrow x_0$, 表示 x 既从 x_0 的左侧无限趋近于 x_0 (记为 $x \rightarrow x_0 - 0$ 或 $x \rightarrow x_0^-$),同时也从 x_0 的右侧无限趋近于 x_0 (记为 $x \rightarrow x_0 + 0$ 或 $x \rightarrow x_0^+$).




图 1-5

(2) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 点是否有极限与其在 x_0 点有无定义无关.

在实际问题中, 有时我们只需要考虑 x 从 x_0 的左侧或右侧无限趋近于 x_0 时函数 $f(x)$ 的变化趋势, 对此我们有以下定义.

定义 5 如果当 $x \rightarrow x_0^-$ (或 $x \rightarrow x_0^+$) 时函数 $y = f(x)$ 的值无限接近于一个常数 A , 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0^-$ (或 $x \rightarrow x_0^+$) 时函数的左极限 (或右极限), 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$, 或 $f(x_0^-) = A$ 以及 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$, 或 $f(x_0^+) = A$

由定义 5 可知, 函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限存在的充要条件为: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 都存在且都等于 A , 即 $f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$.

例 3 讨论函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 当 $x \rightarrow 1$ 时的极限.

解 因为 $x \rightarrow 1$, 即 $x \neq 1$, 所以, 有 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

这个例子说明, 函数在 $x = x_0$ 处是否有极限与函数在 x_0 点是否有定义是无关的.

例 4 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \geq 1 \\ x - 1 & x < 1 \end{cases}$ 当 $x \rightarrow 1$ 时的极限, 并作出它的图像.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 1) = 0$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

故 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在 (如图 1-6).

3. 无穷小

定义 6 如果当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ (或 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$), 则称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小.

注意 (1) 说一个函数是无穷小, 必须指明自变量 x 的变化趋势, 如函数 x^2 当 $x \rightarrow 0$ 时是无穷小, 但当 $x \rightarrow 1$ 时, x^2 就不是无穷小;

(2) 除了常量“0”是无穷小量外, 其他任何常量都不是无穷小.

无穷小的性质

性质 1 有限个无穷小的代数和仍为无穷小;

性质 2 有界函数与无穷小的乘积为无穷小;

性质 3 有限个无穷小的乘积是无穷小.

4. 无穷大

定义 7 如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时函数 $f(x)$ 的绝对值无限增大, 则称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷大.

如果函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时是无穷大, 则它的极限是不存在的, 但为了便于描述函




图 1-6