

人机对话版

RENJIDUIHUABAN

2008

卫生专业职称考试冲关捷径

WEISHENGZHUANYEZHICHENGKAOSHI
CHONGGUANJIEJING

口腔科学 全真模拟试卷

卫生专业技术资格考试专家委员会/策划编写

紧扣大纲 题库权威

模拟实考 过关必备

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

卫生专业职称考试冲关捷径

口腔科学全真模拟试卷

KOUQIANG KEXUE QUANZHEN MONI SHIJUAN

主 编 楼北雁 罗 云 王 敏

副主编 章捍东 杜 熹 王 永

参 编 (以姓氏笔画为序)

马敏先	王华容	刘文钊	孙 俊
孙 娟	苏 勤	杨 禾	杨 燃
李继遥	但红良	肖俐娟	张德辉
周 敏	周 瑜	赵立国	姜 华
宣 鸣	曾 昕	董 强	程 然
程 磊	廖 健		

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

口腔科学全真模拟试卷/楼北雁,罗云,王敏主编. —北京:人民军医出版社,2008.1
(卫生专业职称考试冲关捷径)

ISBN 978-7-5091-1423-0

I. 口… II. ①楼…②罗…③王… III. 口腔科学—医药卫生人员—资格考核—习题
IV. R78-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 183923 号

策划编辑:郭伟疆 王琳 崔玲和 张利峰 文字编辑:张利峰 责任审读:张之生

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8700

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:21.25 字数:693千字

版、印次:2008年1月第1版第1次印刷

印数:0001~4500

定价:58.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

前 言

为了满足卫生专业技术人员晋升中级资格应试的需要,人民军医出版社组织具有丰富试题编写经验的各学科专家以全真模拟试卷的形式编写了《卫生专业职称考试冲关捷径》丛书。本试卷的特点是紧密围绕指导用书、考试大纲和临床实践需要,目的是使应试者提高业务能力和应试成绩,顺利通过中级职称考试。我们相信,只要应试者认真复习、掌握试卷所涉及的内容,踏踏实实做模拟试卷,就一定能够顺利通过考试。

本丛书依照最新考试大纲,以全真模拟试题形式将考纲中所有知识点与各学科的系统知识结合起来,经过精心编排,模拟真实的考试环境。为考生提供了将考纲重点、知识难点、解题要点、正确答案相结合的高效率复习模式。力争通过试题将考点融会贯通,为准备晋升的医师提供复习、应试的捷径。特别提醒:复习和做模拟题时,千万不要把主要精力放在背记试题和答案上。

在编写本模拟试卷的过程中,编者得到了多方的支持与帮助,在此表示诚挚的谢意。由于参与编写的人员较多,编写时间仓促,难免有错误或疏漏之处,殷切希望广大读者批评指正,以便及时纠正和改进。

对于本套丛书存在的不足和错误,请将您的意见发送到读者反馈信箱info@pmmp.com.cn,以便在修订时改正。最后,衷心祝愿大家顺利通过考试!

编 者
2008 年 1 月

目 录

口腔医学专业全真模拟试卷一	(1)	专业知识	(150)
基础知识	(1)	专业实践能力	(157)
相关专业知识	(8)	答案	(167)
专业知识	(16)	口腔颌面外科学专业全真模拟	
专业实践能力	(24)	试卷二	(169)
答案	(33)	基础知识	(169)
口腔医学专业全真模拟试卷二 ..	(35)	相关专业知识	(176)
基础知识	(35)	专业知识	(184)
相关专业知识	(42)	专业实践能力	(191)
专业知识	(49)	答案	(201)
专业实践能力	(57)	口腔修复学专业全真模拟试卷一	
答案	(65)		(203)
口腔内科学专业全真模拟试卷一		基础知识	(203)
.....	(67)	相关专业知识	(210)
基础知识	(67)	专业知识	(217)
相关专业知识	(74)	专业实践能力	(225)
专业知识	(82)	答案	(235)
专业实践能力	(90)	口腔修复学专业全真模拟试卷二	
答案	(99)		(237)
口腔内科学专业全真模拟试卷二		基础知识	(237)
.....	(101)	相关专业知识	(243)
基础知识	(101)	专业知识	(251)
相关专业知识	(108)	专业实践能力	(259)
专业知识	(116)	答案	(269)
专业实践能力	(123)	口腔正畸学专业全真模拟试卷一	
答案	(133)		(271)
口腔颌面外科学专业全真模拟		基础知识	(271)
试卷一	(135)	相关专业知识	(277)
基础知识	(135)	专业知识	(285)
相关专业知识	(142)	专业实践能力	(292)

答案	(301)	相关专业知识	(309)
口腔正畸学专业全真模拟试卷二		专业知识	(317)
.....	(303)	专业实践能力	(324)
基础知识	(303)	答案	(333)

口腔医学专业全真模拟试卷一

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 舌隆突的位置处于
 - 切牙的舌面
 - 上颌第一磨牙的舌面
 - 位于前牙舌面颈 1/3 处
 - 切牙和尖牙颈部舌侧的隆起
 - 牙釉质的长形隆起
- 以下关于“根管口”的解释哪个是正确的
 - 根管末端的开口处
 - 髓腔的开口处
 - 髓腔中根分叉的位置
 - 髓室和根管交界的部分
 - 根管最细的地方
- 对牙体长轴应解释为
 - 通过牙体中心的一条轴
 - 通过牙冠与牙根中心的一条假想轴
 - 通过牙冠中心的一条假想轴
 - 通过牙根中心的一条假想轴
 - 贯穿冠、根的一条假想轴
- “外形高点”是指
 - 牙冠邻面相接触点
 - 牙冠最突出的点
 - 牙冠各面最高的点
 - 牙冠颊面最突出的部分
 - 牙体轴面最突出的部分
- 下述下颌第一双尖牙殆面形态中哪一点是正确的
 - 殆面呈方形
 - 远中窝大于近中窝
 - 颊尖最大,近中舌尖次之,远中舌尖最小
 - 颊尖顶偏向远中
 - 殆面上有一远中舌沟
- 覆盖的定义是指
 - 正中殆时,上下前牙发生重叠的关系
 - 正中殆时,上颌牙盖过下颌牙唇颊面的水平距离
 - 正中殆时,上颌牙盖过下颌牙唇颊面的垂直距离
 - 前伸殆位时,下前牙缘超过上前牙切缘的水平距离
 - 下颌前伸时,上下前牙切缘相对时下颌运动的距离
- 正常覆殆为上切牙切缘盖过下切牙唇面的垂直距离
 - 3mm
 - 4mm
 - 5mm
 - 殆颈 1/3
 - 切 1/3
- 下颌处于休息状态时,上下牙弓自然分开成一楔形间隙称
 - 颌间隙
 - 息止殆间隙
 - 殆高度
 - 颌间距离
 - 垂直距离
- 咀嚼运动的意义有下面几点,除了
 - 促进发育和消化功能
 - 粉碎食物,增强味觉
 - 自洁作用
 - 满足食欲
 - 进食的惟一方法
- 下面关于纵殆曲线的描述哪个是正确的
 - 牙列侧面观,连接前牙切缘和后牙颊尖的曲线
 - 纵殆曲线不分段,前后都一样
 - 上颌的纵殆曲线是“Spee”曲线
 - 下颌的纵殆曲线称补偿曲线
 - “Spee”曲线和补偿曲线在形态上不协调
- 咀嚼效率是指
 - 上下颌牙在单位时间内将定量食物咀嚼的

- 程度
- B. 在一定时间内将一定量的食物嚼碎的能力
- C. 嚼碎一定量食物所需的时间
- D. 在一定时间内嚼碎食物的数量
- E. 将一定食物嚼碎的能力
12. 下面有关切道和切道斜度的表述哪一项是错误的
- A. 切道斜度是指切道与水平面的角度
- B. 切道斜度是切道与殆平面的角度
- C. 切道斜度与覆殆、覆盖的大小没有关系
- D. 覆盖增大,切道斜度变小
- E. 覆殆增大,切道斜度增大
13. 下列有关颊孔的描述,哪项是错误的
- A. 位于下颌体外面
- B. 位于相当于下颌第二前磨牙的下方或第一、二前磨牙的下方
- C. 位于下颌骨上下缘中点略偏下
- D. 距正中线约 2.5~3cm
- E. 有颊神经、血管通过
14. 腮腺导管口位于
- A. 平对上颌第一磨牙牙冠的颊黏膜上
- B. 平对上颌第二磨牙牙冠的颊黏膜上
- C. 平对上颌第三磨牙牙冠的颊黏膜上
- D. 平对上颌第二双尖牙牙冠的颊黏膜上
- E. 平对上颌第一双尖牙牙冠的颊黏膜上
15. 口角的正常位置约相当于
- A. 侧切牙与尖牙之间
- B. 尖牙与第一双尖牙之间
- C. 第二双尖牙与第一磨牙之间
- D. 第二双尖牙与第一双尖牙之间
- E. 第二磨牙与第一磨牙之间
16. 颊系带为
- A. 唇颊黏膜移行于牙槽黏膜的皱襞
- B. 口腔前庭沟上相当于磨牙区的扁形黏膜皱襞
- C. 口腔的前庭沟上相当于上下尖牙或前磨牙区的扁形黏膜皱襞
- D. 上颌结节后内方与磨牙后垫后方的黏膜皱襞
- E. 前庭沟中线上的黏膜皱襞
17. 下列哪一结构不属于颌下三角内容
- A. 颌下腺
- B. 颌外动脉
- C. 面前静脉
- D. 舌神经
- E. 舌下腺
18. 下列舌盲孔有关的描述,哪项是错误的
- A. 位于舌背
- B. 位于界沟尖端
- C. 位于舌下面
- D. 位于舌体与舌根的交界处
- E. 是胚胎甲状舌管的遗迹
19. 下列有关面神经的描述,哪项是对的
- A. 为运动性神经
- B. 支配咬肌
- C. 为感觉性神经
- D. 支配面部表情肌
- E. 自破裂孔出颅
20. 下颌髁状突的功能面为
- A. 髁状突顶部的横嵴
- B. 髁状突前斜面
- C. 髁状突后斜面
- D. 髁状突内斜面
- E. 髁状突外斜面
21. 牙釉质最厚的部位是
- A. 牙颈部
- B. 窝沟处
- C. 牙尖部
- D. 无釉柱牙釉质
- E. 釉板处
22. 釉丛的高度为
- A. 釉质的全厚
- B. 釉质厚度的 1/5~1/4
- C. 釉梭高度的 1/2
- D. 釉板高度的 1/4
- E. 施雷格板高度的 1/5
23. 釉牙本质界弧形的凹面
- A. 与釉质生长线平行
- B. 朝向牙本质
- C. 朝向釉质
- D. 与施雷格板平行
- E. 与釉板长轴平行
24. 牙髓中不含以下哪种细胞
- A. 成纤维细胞
- B. 成釉细胞
- C. 成牙本质细胞
- D. 未分化间充质细胞
- E. 巨噬细胞
25. 牙髓纤维主要是
- A. 胶原纤维
- B. 弹性纤维
- C. 嗜银纤维
- D. 胶原纤维和弹力纤维

- E. 胶原纤维和嗜银纤维
26. 下列哪项属于釉牙骨质界的连接形式
- 约 30% 牙骨质少许覆盖在釉质上
 - 约 70% 釉质和牙骨质端端相连
 - 约 10% 釉质和牙骨质并不相连
 - 全部为釉质和牙骨质端端相连
 - 约 30% 釉质少许覆盖在牙骨质上
27. 唾液腺的排泄管
- 与闰管相延续
 - 又称纹管
 - 穿行于小叶间结缔组织中
 - 管壁由单层柱状上皮所组成
 - 为最细小的终末分支部分
28. 属于纯黏液腺的小涎腺是
- 唇腺
 - 颊腺
 - 味腺
 - 磨牙后腺
 - 腮腺
29. 关于牙齿发育, 以下哪项是错误的
- 牙胚由牙板及邻近的外胚间充质发育而来
 - 帽状期成釉器细胞分化为 3 层
 - 多根牙的形成是由上皮隔的发育所决定的
 - 最早形成的牙体组织为釉基质
 - 牙胚是在成釉器的帽状期形成的
30. 牙体硬组织的形成始于
- 帽状期的晚期
 - 帽状期的早期
 - 钟状期的晚期
 - 钟状期的早期
 - 牙板形成期
31. 可进一步分化形成成牙本质细胞的结构是
- 成釉器
 - 牙囊
 - 牙板
 - 牙乳头
 - 前庭板
32. 牙乳头可分化形成
- 成牙骨质细胞
 - 成骨细胞
 - 成牙本质细胞
 - 穿通纤维
 - 成釉细胞
33. 初级口腔卫生保健的概念主要是全社区成员平等享有
- 全面口腔卫生保健
 - 全面口腔保健服务
 - 全面口腔医疗保险
 - 最基本的口腔保健
 - 最基本的口腔医疗服务
34. 在初级口腔预防保健中, 口腔自我保健方法中没有
- 刷牙
 - 漱口
 - 牙周洁治
 - 牙龈按摩
 - 牙间清洁
35. 在基本的牙膏成分组成中没有
- 摩擦剂
 - 洁净剂
 - 甜味剂
 - 凝固剂
 - 湿润剂
36. 口腔健康调查的样本含量小就会
- 抽样误差小
 - 调查成本大
 - 浪费人力物力
 - 调查时间长
 - 抽样误差大
37. 描述性口腔流行病学最常用的方法
- 病例对照研究
 - 横断面调查
 - 数据分析
 - 问卷调查
 - 实验室分析
38. 防止检查者之间的偏性主要是采取
- 修改调查表
 - 标准一致性检验
 - 认真核对调查数据
 - 挑选受检者
 - 使用统一器械
39. 在致龋的食物糖中致龋性最强的是
- 果糖
 - 蔗糖
 - 麦芽糖
 - 乳糖
 - 淀粉
40. 使用牙线可最有效清除
- 牙唇舌侧菌斑
 - 窝沟部位菌斑
 - 牙邻面菌斑
 - 光滑面菌斑

E. 龈缘部菌斑

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(41~44 题共用题干)

某社区口腔健康调查资料显示,牙周疾病患病状况不容乐观,牙防所计划开展如下口腔保健措施

41. 对于有轻度牙龈出血的人群,提倡

- A. 牙周洁治
- B. 使用牙签
- C. 深部刮治
- D. 有效刷牙
- E. 牙龈按摩

42. 对于 CPI 记分为 2 的人群,采取

- A. 有效刷牙
- B. 牙周洁治
- C. 使用牙间清洁器
- D. 龈下刮治
- E. 龋齿充填

43. 对于 CPI 记分为 4 的人群,进行

- A. 全口牙周 X 线摄片
- B. 去除菌斑
- C. 复杂牙周治疗
- D. 清除软垢
- E. 口服消炎药

44. 对全社区的各类人群计划开展

- A. 计划爱牙周活动
- B. 口腔健康教育与促进
- C. 黑板报展览
- D. 政治思想教育
- E. 计划爱牙月活动

(45~47 题共用题干)

在牙防所局部用氟预防龋齿研讨会上,专业人员就各种措施和方法进行探讨,对含氟牙膏的应用

45. 含氟牙膏的儿童用量

- A. 和成人一样
- B. 不能使用
- C. 黄豆粒大小的量
- D. 农村用量要小
- E. 城市用量要大

46. 学龄前儿童用含氟牙膏刷牙应该

- A. 用含氟化钠的牙膏

B. 用量要多些

C. 用单氟磷酸钠(MFP)的牙膏更好

D. 监督指导下刷牙

F. 不要用水漱口

47. 使用含氟牙膏的同时要

- A. 每天早晚刷牙
- B. 定期更换牙膏
- C. 只刷唇侧面
- D. 只在晚间应用
- E. 无龋可以不用

(48~50 题共用题干)

牙防所在某学校儿童中验证一种含氟牙膏的防龋效果,对于研究方案的几个问题经讨论后确定下来

48. 由于学校学生是以班级为单位学习和活动,因此,实验分组按自然排列的顺序

- A. 随机分组
- B. 机械分组
- C. 分层分组
- D. 按班分组
- E. 混合分组

49. 实验周期预计 2.5 年,采用龋齿指数标准为

- A. DMFT
- B. dmft
- C. DMFS
- D. dmfs
- E. DEFT

50. 受试对象所用的学生年级

- A. 学前班
- B. 3 年级
- C. 4 年级
- D. 5 年级
- E. 6 年级

(51~54 题共用题干)

全国牙防组口腔健康调查技术组专家对某省调查人员进行了调查前培训,纠正了些容易影响调查质量的不足之处

51. 根据 WHO 龋病诊断标准,下面有一项不能诊断为龋

- A. 病损底部发软
- B. 牙釉质有潜在的损害
- C. 牙釉质上硬的白斑
- D. 窝沟壁或底软化
- E. 着色区软化凹陷

52. 口腔检查不应该计为龋齿的牙是

- A. 已充填无龋
- B. 已充填有龋
- C. 龋失牙
- D. 桥基牙
- E. 有龋残冠

53. 经标准一致性检验不合格的检查者不能参加口腔检查,合格者的 kappa 值应在

- A. 0.1 以上
- B. 0.2 以上
- C. 0.3 以上
- D. 0.4 以上
- E. 0.5 以上

54. 牙周 CPI 指数只需检查 6 颗指数牙的年龄应在

- A. 30 岁以下
- B. 20 岁以下
- C. 18 岁以下
- D. 15 岁以下
- E. 12 岁以下

(55~59 题共用题干)

社区口腔健康咨询中群众提出了不少问题,许多认识是不正确的,牙防所口腔保健人员进行了认真分析,决定采取多种方式进行宣传教育活动

55. 针对“氟化物有害健康”的错误认识,应广泛宣传

- A. 氟化物无益健康
- B. 氟化物无益口腔健康
- C. 氟化物过多有害口腔健康
- D. 氟化物过少有损口腔健康
- E. 除氟害兴氟利

56. 针对“人老要掉牙”的错误认识,应讲清道理,提出

- A. 人老就要掉牙
- B. 人老牙也要老
- C. 人老掉牙及时义齿修复
- D. 健康牙齿可以伴人终生
- E. 牙齿丧失可以种植牙

57. 针对“牙不痛不用看牙医”的错误认识,应提倡

- A. 不用看牙医
- B. 定期口腔检查
- C. 每 2 年看 1 次
- D. 牙痛时再看牙医
- E. 牙龈出血看牙医

58. 针对“产妇不能刷牙”的错误认识应提倡

- A. 饭后漱口
- B. 不用牙签
- C. 早晚刷牙
- D. 不用牙线
- E. 饭后漱口,早晚刷牙

59. 针对“乳牙早晚要换掉不用治的错误认识,应教育儿童家长

- A. 龋洞不用补
- B. 及时看牙医
- C. 牙痛不要哭
- D. 自己决定
- E. 牙痛影响进食

(60~63 题共用题干)

某地级市位于沿海低氟区,有人口 25 万,20 年来龋齿患病水平呈上升趋势,市卫生行政部门计划开展社区口腔预防保健工作,要求专业技术人员做出具体规划和工作步骤。为此,项目技术指导组提出了切实可行的方案如下

60. 首先为收集资料要进行

- A. 起草口腔保健计划
- B. 口腔流行病学调查
- C. 选择口腔预防项目
- D. 研讨质量监控指标
- E. 口腔保健培训班

61. 保证收集资料的质量要做到

- A. 收集目的明确
- B. 收集方法适当
- C. 所需项目简明
- D. 资料标准统一
- E. 以上都是

62. 经过资料分析提出了针对学龄儿童口腔预防措施是

- A. 保健牙刷刷牙
- B. 牙周洁治
- C. 窝沟封闭
- D. 窝沟封闭和含氟牙膏
- E. 含氟牙膏和氟水漱口

63. 经过资料分析提出了针对学龄前儿童的口腔预防措施是

- A. 氟片和刷牙
- B. 氟泡沫
- C. 控制食糖量
- D. 氟离子导入
- E. 龋齿充填

(64~67 题共用题干)

某工厂职工口腔健康调查资料显示,牙周疾病患病状况不容乐观,厂医院口腔科计划开展如下保健措施

64. 对于有轻度牙龈出血的职工,提倡
- A. 药物漱口
 - B. 使用牙签
 - C. 使用牙线
 - D. 有效刷牙
 - E. 牙龈按摩
65. 对于 CPITN 记分为 2 的职工,采取
- A. 有效刷牙
 - B. 牙周洁治
 - C. 使用牙间清洁剂
 - D. 龈下刮治
 - E. 口腔健康教育
66. 对于 CPITN 记分为 4 的职工,进行
- A. 全口牙周 X 线照片
 - B. 去除菌斑
 - C. 复杂牙周治疗
 - D. 结扎固定牙齿
 - E. 口服消炎药
67. 对全厂职工开展
- A. 爱牙周活动
 - B. 口腔健康教育与促进
 - C. 健康的牙齿伴终生活动
 - D. 健齿强身运动
 - E. 爱牙日活动

(68~71 题共用题干)

在口腔预防保健培训班上,就龋病病因的讨论中,大家对细菌、饮食和宿主等因素相互作用进行了探讨

68. 致龋菌中最主要的是
- A. 乳酸杆菌
 - B. 黏性放线菌
 - C. 内氏放线菌
 - D. 变形链球菌
 - E. 血链球菌
69. 菌斑 pH 变化的最主要作用是
- A. 形成 Stephan 曲线
 - B. 使牙釉质脱矿
 - C. 细菌更容易凝聚
 - D. 菌斑成熟度增加
 - E. 唾液缓冲能力降低
70. 唾液与龋病的关系主要是

- A. 冲刷作用
- B. 为菌斑提供基质
- C. 缓冲和再矿化
- D. 免疫作用
- E. 促进菌斑生长

71. 食物致龋作用主要表现在

- A. 口感和味道
- B. 加工方式和包装形式
- C. 是否易消化
- D. 口腔产酸力和滞留时间
- E. 食物的精细程度

(72~74 题共用题干)

全身用氟预防龋齿研讨会上,专业人员就各种措施和方法进行探讨,首先讨论的是饮水加氟

72. 饮水加氟是在哪国最先提出并实施的

- A. 美国
- B. 中国
- C. 瑞典
- D. 英国
- E. 澳大利亚

73. 要取得最佳防龋效果,饮用加氟水应从

- A. 孕妇开始
- B. 出生开始
- C. 幼儿园开始
- D. 小学开始
- E. 中学开始

74. 从牙面分析,最佳防龋效果在

- A. 唇面
- B. 舌面
- C. 颊面
- D. 殆面
- E. 光滑面

(75~76 题共用题干)

全身用氟预防龋齿研讨会上,专业人员就各种措施和方法进行探讨,而后讨论的是学校饮水加氟

75. 学校饮水加氟的氟浓度应为饮水加氟的

- A. 2.5 倍
- B. 3.5 倍
- C. 4.5 倍
- D. 5.5 倍
- E. 6.5 倍

76. 学校饮水加氟可以不必考虑

- A. 当地是否饮水加氟
- B. 是否会产生氟牙症

- C. 当地是否后高氟区
- D. 当地是否有氟污染
- E. 以上都不必考虑

(77~80 题共用题干)

社区口腔健康咨询中群众提出了不少问题,口腔预防保健人员进行了认真分析,准备进行宣传教育活动

77. 在中小学中提倡

- A. 努力学习健康知识
- B. 爱护牙齿从小做起
- C. 德智体全面发展
- D. 培养良好卫生习惯
- E. 定期口腔检查

78. 在老年人中提倡

- A. 叩齿
- B. 刷牙
- C. 健康的牙齿伴终生
- D. 人老牙越好
- E. 义齿恢复口腔功能

79. 重视残疾人口腔保健,根据我国国情应该

- A. 国家建立残疾人口腔保健网络
- B. 全社会资助建设口腔医院
- C. 以家庭口腔保健和护理为主
- D. 口腔医院免费提供保健
- E. 医院优惠残疾人就诊

80. 应该以社区为单位,积极开展

- A. 初级口腔预防保健
- B. 牙病治疗
- C. 义齿修复
- D. 拔补镶一条龙服务
- E. 检查并预约患者

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(81~83 题共用备选答案)

- A. 上颌第一双尖牙
- B. 上颌第二双尖牙
- C. 上颌第一磨牙
- D. 下颌第一磨牙
- E. 下颌第一双尖牙

81. 哪个牙有 1 个颊沟

82. 哪个牙有 2 个颊沟

83. 哪个牙有近中舌沟

(84~86 题共用备选答案)

- A. 上颌尖牙
- B. 下颌双尖牙
- C. 上颌双尖牙
- D. 上颌磨牙
- E. 下颌磨牙

84. 与上颌窦关系最密切的是哪一组牙

85. 离下颌管最近的是哪一组牙

86. 对面容影响最大的是哪一组牙

(87~89 题共用备选答案)

- A. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在下颌第一恒磨牙颊沟的远中
- B. 下颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在上颌第一恒磨牙颊沟的远中
- C. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖正对着下颌第一恒磨牙的颊沟
- D. 下颌第一恒磨牙的近中颊尖正对着上颌第一恒磨牙的颊沟
- E. 上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在下颌第一恒磨牙颊沟的近中

87. 中性𪙇

88. 近中错𪙇

89. 远中错𪙇

(90~92 题共用备选答案)

- A. 双侧滑动——双侧转动——双侧滑动
- B. 双侧转动——双侧滑动——双侧转动
- C. 一侧滑动——一侧转动
- D. 双侧转动——双侧滑动
- E. 双侧滑动——双侧转动

90. 下颌做最大开颌运动时髁状突的运动

91. 下颌侧方运动时髁状突的运动

92. 下颌向前运动时髁状突的运动

(93~94 题共用备选答案)

- A. 唇红
- B. 唇红缘
- C. 唇弓
- D. 唇峰
- E. 唇珠

93. 上下唇的游离缘皮肤向黏膜的移行处为

94. 皮肤与唇红的交界处称为

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

95. 关于拔除牙的检查及拔牙创的处理,下列正确的是

- A. 检查拔除牙根是否完整
- B. 牙龈有无撕裂
- C. 过高牙槽间隔应待其自行吸收
- D. 拔牙窝内残留物可保留
- E. 牙槽窝压迫复位

96. 拔除断根应在下列哪些情况进行

- A. 拔除断根专用的诊椅
- B. 清楚的视野
- C. 良好的照明
- D. 合适的器械
- E. 良好的止血

97. 口腔癌致病因素包括

- A. 光辐射
- B. 吸烟
- C. 饮酒

D. 喝咖啡

E. 嚼槟榔

98. 氯己定(洗必泰)在口腔预防保健的临床应用中的特点是

- A. 作用时间短
- B. 作用时间长
- C. 长期用着色
- D. 使用效果差
- E. 效果易衰减

99. 龋病二级预防的内容包括

- A. 定期口腔检查
- B. X线辅助诊断
- C. 窝沟封闭
- D. 早期诊断
- E. 早期预防

100. 以下关于金属烤瓷冠中合金与瓷粉的要求中正确的是

- A. 良好的生物相容性
- B. 瓷粉的热膨胀系数略大于合金
- C. 两者不可产生化学结合
- D. 合金熔点大于瓷粉
- E. 有良好的强度

相关专业知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下面关于口腔健康教育不正确的认识是

- A. 是争取社会支持的方法
- B. 是口腔公共卫生的基础
- C. 是传递科学信息的途径
- D. 是一种商业广告的宣传
- E. 是提高健康意识的手段

2. 根据历史文献记载,最早使用牙刷的国家是

- A. 美国
- B. 日本
- C. 中国
- D. 法国

E. 古埃及

3. 下面有一项对保健牙刷的描述不正确

- A. 牙刷头小
- B. 刷毛顶圆
- C. 牙刷毛软
- D. 牙刷头大
- E. 毛束适宜

4. 下面哪项牙刷保管的方法不对

- A. 保持刷头干燥
- B. 用后清水冲净
- C. 专人专用
- D. 及时更换旧牙刷
- E. 牙刷煮沸消毒

5. 口腔科主要的感染途径是

- A. 空气
- B. 尿液

- C. 漱口水
D. 血液和唾液
E. 皮肤接触
6. 食物致龋或不致龋表现为进入口腔约30min内,菌斑pH
A. 不变
B. 上升
C. 下降
D. 先升后降
E. 先降后升
7. 将含氟凝胶放在托盘里置于口腔内一次的时间是
A. 1min
B. 2min
C. 3min
D. 4min
E. 8min
8. 乳牙窝沟封闭临床操作的酸蚀时间是
A. 20s
B. 40s
C. 60s
D. 80s
E. 100s
9. 运用牙菌斑显示剂的目的在于
A. 牙齿美容的需要
B. 评价牙面清洁的手段
C. 检查早期龋的手段
D. 清除软垢的方法
E. 一种口腔卫生习惯
10. 人类建骀过程是从
A. 恒切牙萌出时开始直到第三磨牙萌出才完成
B. 乳牙萌出时开始直到第三磨牙萌出才完成
C. 乳牙萌出时开始直到第二乳磨牙萌出才完成
D. 恒牙萌出时开始直到18岁才完成
E. 乳牙萌出时开始直到18岁才完成
11. 上颌后牙牙长轴向近远中倾斜程度是
A. 依次减小最后几乎和中线近乎平行
B. 双尖牙向近中倾斜,磨牙向远中倾斜
C. 倾斜程度大约相似
D. 双尖牙和第一磨牙向近中倾斜,第二、三磨牙向远中倾斜
E. 双尖牙和第一磨牙向近中倾斜程度依次减小,最后几乎和中线平行,第二、第三磨牙向远中倾斜
12. 骀平面的构成是由
A. 上颌所有后牙的颊尖相连构成
B. 下颌所有后牙的颊尖相连构成
C. 切点到下颌双侧第一磨牙相连
D. 由上中切牙近中切角到两侧上颌第一磨牙近中颊尖顶三点相连
E. 由上颌中切牙切缘和尖牙牙尖顶及双尖牙颊尖相连
13. 下颌处于休息状态时,上下牙弓自然分开成一楔形间隙称
A. 颌间隙
B. 息止殆间隙
C. 殆高度
D. 颌间距离
E. 垂直距离
14. 下颌做侧方咀嚼时,工作侧上下后牙的接触关系为
A. 上牙舌尖的颊斜面与下牙颊尖的舌斜面接触
B. 上牙舌尖的舌斜面与下牙颊尖的颊斜面接触
C. 上牙颊尖的舌斜面与下牙颊尖的颊斜面接触
D. 上牙颊尖的舌斜面与下牙颊尖的舌斜面接触
E. 上牙舌尖的颊斜面与下牙舌尖的舌斜面接触
15. 咀嚼效率是指
A. 嚼碎一定量食物所需的时间
B. 在一定时间内嚼碎食物的数量
C. 在一定时间内将食物嚼碎的能力
D. 将一定量食物嚼碎的能力
E. 在一定时间内将一定量食物嚼碎的能力
16. 当长期侧方运动受限,临床上患者的牙齿磨损会出现
A. 上颌颊尖和下颌舌尖磨损过多
B. 上颌舌尖和下颌颊尖磨损过多
C. 下前牙切缘较后牙牙尖磨损过多
D. 一侧磨损较重
E. 横殆曲线的曲度加大
17. 一位总义齿患者,在调骀时发现,下颌前伸至上下颌前牙切缘相对时,左右侧上下颌第二磨牙有接触,左右侧下颌第一磨牙与上颌第二双尖牙也有接触,可以描述为
A. 前伸殆三点接触殆平衡
B. 前伸殆多点接触殆平衡
C. 前伸殆完善接触殆平衡
D. 前伸殆不平衡
E. 以上都不是
18. 牙冠的“发育沟”是指
A. 牙齿生长发育时,两生长叶相连所形成的浅沟
B. 牙齿发育时所形成的沟

- C. 钙化不全的缺陷部分
D. 牙冠唇面上的浅沟
E. 牙冠上细长凹陷的部分
19. 三角嵴是由
A. 位于唇面的, 两个牙尖上的斜面相交而成
B. 位于唇面的, 一个牙尖的两个斜面相交而成
C. 牙冠的两个轴面相交而成
D. 牙冠的三个面相交而成
E. 由牙尖顶伸向牙颈部的纵行隆起构成
20. 对点隙的解释哪一个是正确的
A. 不是龋病的好发部位
B. 牙冠上不规则的凹陷部位
C. 副沟相交而成凹陷部位
D. 3个或3个以上发育沟相交处的凹陷
E. 钙化不良而形成的凹陷
21. 下述上颌第一双尖牙的双根率哪个正确
A. 80%
B. 60%
C. 50%
D. 95%
E. 87%
22. 恒牙中发育最早的是
A. 第一磨牙
B. 中切牙
C. 侧切牙
D. 尖牙
E. 第一双尖牙
23. 上前牙牙根唇面宽于舌面的生理意义是
A. 与牙冠较宽的唇面相延续
B. 抵抗意外碰撞的外力
C. 抵抗向前的力
D. 与牙槽嵴形态相适应
E. 补偿牙弓较大的外径
24. 较易发生先天缺失的恒牙是
A. 上下第一磨牙
B. 上下第二磨牙
C. 上下中切牙
D. 上下侧切牙
E. 上下尖牙
25. 中切牙近中接触区比远中接触区距切角
A. 较近
B. 较远
C. 相等距
D. 随磨耗面改变
E. 无一定关系
26. 上颌第二磨牙最小的牙尖是
A. 远中颊尖
B. 远中尖
C. 近中颊尖
D. 近中舌尖
E. 远中舌尖
27. 下述上颌第一磨牙牙根的名称中哪一组正确
A. 近中颊根、近中舌根、远中根
B. 近中根、远中颊根、远中舌根
C. 近中根、远中根
D. 近中颊根、远中颊根、舌根
E. 近中舌根、远中舌根、颊根
28. 下述年轻上颌恒切牙髓室形态特征哪个是正确的
A. 近切嵴处近远中径最大
B. 近颈缘处近远中径最大
C. 近远中径等于唇舌径
D. 唇舌径大于近远中径
E. 唇舌径大于切龈径
29. 最先萌出的恒牙是哪个牙
A. 上颌中切牙
B. 上颌侧切牙
C. 上颌第一磨牙
D. 下颌第一磨牙
E. 下颌中切牙
30. 上颌第一恒磨牙唇面外形似以下哪种形状
A. 三角形
B. 长方形
C. 斜方形
D. 方圆形
E. 梯形
31. 1岁半男婴, 口内检查发现, 上下颌乳中切牙和乳侧切牙均已萌出, 按照一般乳牙萌出顺序在其口内萌出的下一颗牙为
A. 上颌乳尖牙
B. 下颌乳尖牙
C. 上颌第一乳磨牙
D. 下颌第一乳磨牙
E. 下颌第二乳磨牙
32. 患者, 男, 50岁, 左上中切牙有深楔状缺损, 可探及露髓孔, 探无感觉, X线检查发现根尖有大面积阴影。在进行根管治疗时, 有关开髓部位的选择哪一种说法是正确的
A. 由于楔状缺损部位已经通髓腔, 可从楔状缺损处制备进入髓腔的洞型

- B. 由于切牙的舌面窝髓壁薄,可以从舌面窝向牙颈部方向钻入
- C. 由于切牙的髓腔形态与切牙的外形基本一致,可以从切端开始向牙根方向钻入
- D. 只要能进入髓腔的任何一部位都可以
- E. 以上都不是
33. 医师用拔牙钳先后拔除上颌中切牙和侧切牙时,发现他在同样施用旋转的方式,而且拔牙钳安放位置正确。施力的大小和速度基本一致情况下,侧切牙牙根尖 1/3 折断在牙槽窝内,分析其原因最有可能的是
- A. 侧切牙的牙根比中切牙的牙根更易折断
- B. 侧切牙牙根尖 1/3 常有弯曲,施用旋转力拔除时较易折断
- C. 拔除侧切牙时,旋转力施用不够
- D. 与拔除中切牙和侧切牙的先后顺序有关
- E. 以上都不是
34. 30 岁女性患者,因右下中切牙龋坏发展成根尖炎后,经过一次根管充填治疗,但患者的症状时有反复,叩痛不能完全消除已有近 2 个月,这种情况下,可能的原因是
- A. 观察时间不够长
- B. 下颌中切牙,有可能有唇舌侧两根管,可能遗留 1 个根管未治疗
- C. 应用药物性充填材料充填根管
- D. 只有拔除了患牙,才能去除根尖病变
- E. 以上都不是
35. 唾液的哪种作用可促进龋的发生
- A. 黏滞度高
- B. 溶菌酶含量高
- C. 流量和流速高
- D. 缓冲能力高
- E. 再矿化能力高
36. 牙齿一般不易患龋的部位在
- A. 邻接面
- B. 边缘嵴
- C. 颊侧沟
- D. 舌侧窝
- E. 深窝沟
37. 宿主龋齿非易感性表现在
- A. 糖的摄入量多
- B. 氟的摄入量多
- C. 口腔菌斑量多
- D. 牙齿窝沟点隙多
- E. 漱口次数少
38. 小学生应重点保护的牙是
- A. 乳切牙
- B. 乳磨牙
- C. 恒切牙
- D. 第一恒磨牙
- E. 第二恒磨牙
39. 诊室里应用氟凝胶后,医师要叮嘱患者
- A. 半小时内不进食,不漱口
- B. 回去漱口以清除口内残余氟
- C. 每天早晚应用含氟牙膏
- D. 要少吃甜食,多吃蔬菜
- E. 3 个月后再做第二次
40. 学龄儿童最适宜的防龋措施是
- A. 学校氟水漱口
- B. 含氟牙膏刷牙
- C. A + B
- D. 窝沟封闭
- E. B + D
- 二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
- (41~42 题共用题干)
- 患者因深龋一次垫底银汞充填后 1 周出现自发痛,冷热痛持续,不能咬物
41. 其原因最可能为
- A. 备洞时刺激牙髓
- B. 充填时未垫底
- C. 流电作用
- D. 诊断错误
- E. 充填材料刺激
42. 该患牙处理应为
- A. 观察
- B. 去旧充填物,氧化锌丁香油糊剂安抚
- C. 去旧充填物,改其他材料充填
- D. 牙髓治疗
- E. 去旧充填物,重新垫底,银汞充填
- (43~44 题共用题干)
- 患者因中龋一次银汞充填后冷热刺激痛,无自发痛。查:充填物完好,叩(-),冷热测正常牙面时无痛,但测充填体处痛
43. 最可能的原因是
- A. 备洞时刺激牙髓