

常用中草药彩色图谱

CHANGYONG ZHONGCAOYAO CAISE TU

徐国钧 主编



福建科学技术出版社

号 80 字登准 (图)

常用中草药彩色图谱

CHANGYONG ZHONGCAOYAO CAISE TUPU

主 编：徐国钧
副主编：王 强
编著者：王 强 曾金虎 宋兴华
 何宏贤 张洪溢
助 编：李 萍 崔宪民 梅其春
 李 军 黄 庆 张永萍
 杨国勤 马国祥 蔡金娜

福建科学技术出版社

1992年·福州

(闽) 新登字 03 号

常用中草药彩色图谱

徐国钧 主编

*

福建科学技术出版社出版

(福州得贵巷 27 号)

福建省新华书店发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 19.125 印张 4 插页 338 千字

1992 年 5 月第 1 版

1992 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—20500

ISBN 7-5335-0546-8/R·126

定价: 35 元

前 言

我国中草药种类繁多,产地广泛,资源丰富,应用历史悠久。为了正确识别和应用中草药,我们于1989年选择中草药500种,摄制原色植物形态和药材照片,配以适当文字描述,编著成《中草药彩色图谱》,由福建科学技术出版社出版,供中草药教学、生产、检验和外贸工作人员参阅。该书出版以来,得到医药界同行和读者们的热情支持,迄今第4次印刷,印数达3万册。

为了进一步普及中草药知识并接受读者和各地新华书店的建议,我们从《中草药彩色图谱》中选出较常用中草药、原料药299种的图文,编著成现在这本《常用中草药彩色图谱》。在选编过程中,我们对个别图文作了补正。因时间所限,本书难免有差误,谨请广大读者多加指正。

徐国钧教授

于中国药科大学,南京

1991年12月10日

目 录

根类

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. 人参····· (2) | 24. 白芷····· (48) |
| 2. 了哥王····· (4) | 25. 玄参····· (50) |
| 3. 三七····· (6) | 26. 地黄····· (52) |
| 4. 土木香····· (8) | 27. 地榆····· (54) |
| 5. 川木香····· (10) | 28. 西洋参····· (56) |
| 6. 川乌····· (12) | 29. 百部····· (58) |
| 7. 广防己····· (14) | 30. 当归····· (60) |
| 8. 天冬····· (16) | 31. 关白附子····· (62) |
| 9. 木防己····· (18) | 32. 防风····· (64) |
| 10. 木香····· (20) | 33. 麦冬····· (66) |
| 11. 太子参····· (22) | 34. 麦冬——湖北麦冬····· (68) |
| 12. 牛膝····· (24) | 35. 远志····· (70) |
| 13. 乌药····· (26) | 36. 赤芍——新疆芍药····· (72) |
| 14. 丹参····· (28) | 37. 苈麻根····· (74) |
| 15. 丹参——甘西鼠尾····· (30) | 38. 何首乌····· (76) |
| 16. 巴戟天····· (32) | 39. 刺五加····· (78) |
| 17. 甘草····· (34) | 40. 苦参····· (80) |
| 18. 甘遂····· (36) | 41. 郁金····· (82) |
| 19. 龙胆····· (38) | 42. 明党参····· (84) |
| 20. 北沙参····· (40) | 43. 京大戟····· (86) |
| 21. 四叶参····· (42) | 44. 南沙参····· (88) |
| 22. 白芍····· (44) | 45. 茜草····· (90) |
| 23. 白头翁····· (46) | 46. 草乌····· (92) |

- | | | | |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 47. 威灵仙 | (94) | 58. 黄芩 | (116) |
| 48. 独活 | (96) | 59. 黄芪 | (118) |
| 49. 前胡 | (98) | 60. 萝芙木 | (120) |
| 50. 秦艽 | (100) | 61. 常山 | (122) |
| 51. 桔梗 | (102) | 62. 银柴胡 | (124) |
| 52. 柴胡 | (104) | 63. 商陆 | (126) |
| 53. 党参 | (106) | 64. 葛根 | (128) |
| 54. 党参——川党参 | (108) | 65. 紫草 | (130) |
| 55. 狼毒——月腺大戟 | (110) | 66. 紫草——新疆紫草 | (132) |
| 56. 徐长卿 | (112) | 67. 紫菀 | (134) |
| 57. 粉防己 | (114) | | |

根茎类

- | | | | |
|---------------------|-------|---------------------|-------|
| 68. 土茯苓 | (136) | 82. 白及 | (164) |
| 69. 大黄 | (138) | 83. 白术 | (166) |
| 70. 山药 | (140) | 84. 白前 | (168) |
| 71. 川贝母——暗紫贝母 | (142) | 85. 半夏 | (170) |
| 72. 川贝母——太白贝母 | (144) | 86. 百合 | (172) |
| 73. 川芎 | (146) | 87. 百合——卷丹 | (174) |
| 74. 天南星 | (148) | 88. 伊贝母 | (176) |
| 75. 天麻 | (150) | 89. 伊贝母——托里贝母 | (178) |
| 76. 升麻 | (152) | 90. 延胡索 | (180) |
| 77. 水半夏 | (154) | 91. 苍术——茅苍术 | (182) |
| 78. 玉竹 | (156) | 92. 苍术——关苍术 | (184) |
| 79. 石菖蒲 | (158) | 93. 虎杖 | (186) |
| 80. 石蒜 | (160) | 94. 虎掌南星 | (188) |
| 81. 仙茅 | (162) | 95. 知母 | (190) |
| | | 96. 金荞麦 | (192) |

- | | | | |
|----------------|-------|-----------|-------|
| 97. 狗脊 | (194) | 108. 射干 | (216) |
| 98. 泽泻 | (196) | 109. 浙贝母 | (218) |
| 99. 鸢尾 | (198) | 110. 海芋 | (220) |
| 100. 骨碎补 | (200) | 111. 拳参 | (222) |
| 101. 香附 | (202) | 112. 黄连 | (224) |
| 102. 重楼——云南重楼 | (204) | 113. 黄精 | (226) |
| 103. 重楼——七叶一枝花 | (206) | 114. 菝葜 | (228) |
| 104. 鬼臼 | (208) | 115. 紫萁贯众 | (230) |
| 105. 穿山龙 | (210) | 116. 绵萆薢 | (232) |
| 106. 姜黄 | (212) | 117. 湖北贝母 | (234) |
| 107. 莪术 | (214) | 118. 藁本 | (236) |

果实类

- | | | | |
|-----------------|-------|----------|-------|
| 119. 八角茴香 | (238) | 133. 火麻仁 | (266) |
| 120. 大草蔻 | (240) | 134. 瓜蒌 | (268) |
| 121. 山茱萸 | (242) | 135. 地肤子 | (270) |
| 122. 山楂 | (244) | 136. 红豆蔻 | (272) |
| 123. 川楝子 | (246) | 137. 豆蔻 | (274) |
| 124. 女贞子 | (248) | 138. 花椒 | (276) |
| 125. 小茴香 | (250) | 139. 苍耳子 | (278) |
| 126. 马兜铃 | (252) | 140. 连翘 | (280) |
| 127. 木瓜 | (254) | 141. 吴茱萸 | (282) |
| 128. 五味子 | (256) | 142. 沙棘 | (284) |
| 129. 五味子——华中五味子 | (258) | 143. 诃子 | (286) |
| 130. 化橘红 | (260) | 144. 补骨脂 | (288) |
| 131. 牛蒡子 | (262) | 145. 青果 | (290) |
| 132. 巴豆 | (264) | 146. 罗汉果 | (292) |
| | | 147. 使君子 | (294) |

- | | | | |
|--------------------|-------|----------------|-------|
| 148. 金樱子 | (296) | 156. 预知子 | (312) |
| 149. 枳实 | (298) | 157. 蛇床子 | (314) |
| 150. 梔子 | (300) | 158. 楮实子 | (316) |
| 151. 枸杞子 | (302) | 159. 喜树果 | (318) |
| 152. 砂仁——阳春砂 | (304) | 160. 蒺藜 | (320) |
| 153. 砂仁——缩砂蜜 | (306) | 161. 路路通 | (322) |
| 154. 鸦胆子 | (308) | 162. 鹤虱 | (324) |
| 155. 益智 | (310) | 163. 覆盆子 | (326) |

种子类

- | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------|
| 164. 千金子 | (328) | 178. 草豆蔻 | (356) |
| 165. 马钱子 | (330) | 179. 牵牛子 | (358) |
| 166. 天仙子 | (332) | 180. 胖大海 | (360) |
| 167. 木鳖子 | (334) | 181. 急性子 | (362) |
| 168. 王不留行 | (336) | 182. 桃仁 | (364) |
| 169. 车前子 | (338) | 183. 莲子 | (366) |
| 170. 决明子 | (340) | 184. 娑罗子 | (368) |
| 171. 羊角拗 | (342) | 185. 菟丝子 | (370) |
| 172. 芡实 | (344) | 186. 葶苈子 | (372) |
| 173. 沙苑子 | (346) | 187. 蓖麻子 | (374) |
| 174. 青葙子 | (348) | 188. 榧子 | (376) |
| 175. 苦杏仁 | (350) | 189. 槟榔 | (378) |
| 176. 郁李仁 | (352) | 190. 酸枣仁 | (380) |
| 177. 胡芦巴 | (354) | 191. 薏苡仁 | (382) |

花类

- | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 192. 木槿花 | (384) | 194. 红花 | (388) |
| 193. 合欢花 | (386) | 195. 芫花 | (390) |

- | | | | |
|--------------------|-------|----------------|-------|
| 196. 辛夷 | (392) | 203. 菊花 | (406) |
| 197. 鸡冠花 | (394) | 204. 野菊花 | (408) |
| 198. 金银花 | (396) | 205. 啤酒花 | (410) |
| 199. 闹羊花 | (398) | 206. 旋覆花 | (412) |
| 200. 洋金花 | (400) | 207. 番红花 | (414) |
| 201. 夏枯草 | (402) | 208. 蒲黄 | (416) |
| 202. 凌霄花——凌霄 | (404) | 209. 槐米 | (418) |

叶类

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 210. 十大功劳 | (420) | 216. 罗布麻叶 | (432) |
| 211. 三尖杉 | (422) | 217. 侧柏叶 | (434) |
| 212. 石韦 | (424) | 218. 枸骨叶 | (436) |
| 213. 石南叶 | (426) | 219. 臭梧桐叶 | (438) |
| 214. 枇杷叶 | (428) | 220. 紫苏叶 | (440) |
| 215. 苦丁茶 | (430) | 221. 紫珠叶 | (442) |

木类

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 222. 苏木 | (444) | 224. 降香 | (448) |
| 223. 沉香 | (446) | 225. 檀香 | (450) |

皮类

- | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 226. 土荆皮 | (452) | 232. 苦楝皮 | (464) |
| 227. 白鲜皮 | (454) | 233. 厚朴 | (466) |
| 228. 地骨皮 | (456) | 234. 香加皮 | (468) |
| 229. 肉桂 | (458) | 235. 秦皮 | (470) |
| 230. 杜仲 | (560) | 236. 黄柏 | (472) |
| 231. 牡丹皮 | (562) | | |

茎藤类

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 237. 石斛——金钗石斛 ... (474) | 243. 络石藤 (486) |
| 238. 石斛——铁皮石斛 ... (476) | 244. 鬼箭羽 (488) |
| 239. 西河柳 (478) | 245. 桑寄生 (490) |
| 240. 肉苁蓉 (480) | 246. 通草 (492) |
| 241. 鸡血藤 (482) | 247. 锁阳 (494) |
| 242. 钩藤 (484) | 248. 槲寄生 (496) |

全草类


- | | |
|------------------------|------------------------|
| 249. 大蓟 (498) | 267. 绞股蓝 (534) |
| 250. 千里光 (500) | 268. 青蒿 (536) |
| 251. 广金钱草 (502) | 269. 茵陈 (538) |
| 252. 广藿香 (504) | 270. 虎耳草 (540) |
| 253. 小蓟 (506) | 271. 败酱草 (542) |
| 254. 马鞭草 (508) | 272. 委陵菜 (544) |
| 255. 长春花 (510) | 273. 垂盆草 (546) |
| 256. 水飞蓟 (512) | 274. 肿节风 (548) |
| 257. 龙葵 (514) | 275. 鱼腥草 (550) |
| 258. 白英 (516) | 276. 细辛 (552) |
| 259. 白花蛇舌草 (518) | 277. 穿心莲 (554) |
| 260. 白屈菜 (520) | 278. 鸭跖草 (556) |
| 261. 仙鹤草 (522) | 279. 益母草 (558) |
| 262. 半边莲 (524) | 280. 雪莲花 (560) |
| 263. 半枝莲 (526) | 281. 麻黄 (562) |
| 264. 红旱莲 (528) | 282. 淫羊藿 (564) |
| 265. 鸡矢藤 (530) | 283. 淡竹叶 (566) |
| 266. 陆英 (532) | 284. 绵毛马兜铃 (568) |

285. 矮地茶 (570) 289. 薄荷 (578)
286. 鼠曲草 (572) 290. 瞿麦 (580)
287. 豨薟草 (574) 291. 藿香 (582)
288. 墨旱莲 (576)

其它类

292. 马勃 (584) 296. 茯苓 (592)
293. 冬虫夏草 (586) 297. 海金沙 (594)
294. 灵芝 (588) 298. 猪苓 (596)
295. 青黛 (590) 299. 紫芝 (598)

类



(日)ニクニク

Parax ginseng C. A. Mey. 朝鲜... 茎直立，单一。掌状复叶幼生... 一年生为1片三出复叶，二年生有1片五出复叶，以后每... 4~6年生有2~5片五出复叶，叶渐长。掌状复叶... 生，花小，紫青色。果扁球形，熟时鲜红色。花期6~7月，果期... 7~9月。

生于深山阔叶林下。主产吉林、辽宁、黑龙江、安徽、... 栽培2~3年后，于秋季采收(因急)常带雨下。野生... 干根法蒸熟，切片晒干，用沸水浸软，用竹片刮去... 野生人参根经晒干，除去山参。

生侧参主根圆锥形或纺锤形，长8~9cm，直径1~... 2cm。上端有残茎(芦头)，具残叶茎痕(气痕)1~6个，下部分出... 2~4支根，长8~12cm。表面黄棕色，有不规则纵皱纹及... 效，主根常以细密皱纹或环纹，根有较长皮孔。根具特异香气，味... 甜，苦。

化学成分 根含多种人参皂甙(ginsenosides)，如人参皂甙... Rb1, Rb2, Rb3, Rb4, Rb5, Rb6, Rb7, Rb8, Rb9, Rb10, Rb11, Rb12, Rb13, Rb14, Rb15, Rb16, Rb17, Rb18, Rb19, Rb20, Rb21, Rb22, Rb23, Rb24, Rb25, Rb26, Rb27, Rb28, Rb29, Rb30, Rb31, Rb32, Rb33, Rb34, Rb35, Rb36, Rb37, Rb38, Rb39, Rb40, Rb41, Rb42, Rb43, Rb44, Rb45, Rb46, Rb47, Rb48, Rb49, Rb50, Rb51, Rb52, Rb53, Rb54, Rb55, Rb56, Rb57, Rb58, Rb59, Rb60, Rb61, Rb62, Rb63, Rb64, Rb65, Rb66, Rb67, Rb68, Rb69, Rb70, Rb71, Rb72, Rb73, Rb74, Rb75, Rb76, Rb77, Rb78, Rb79, Rb80, Rb81, Rb82, Rb83, Rb84, Rb85, Rb86, Rb87, Rb88, Rb89, Rb90, Rb91, Rb92, Rb93, Rb94, Rb95, Rb96, Rb97, Rb98, Rb99, Rb100... 性味 性温，味甘，微苦。... 功效主治 大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用... 于体虚疲弱，肢冷畏寒，神疲乏力，食欲不振，心悸口渴。

根 类

1. 人 参 Radix Ginseng

(英) Ginseng

(日) ニンジン

来源 为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的根。

植物形态 多年生草本。茎直立，单一。掌状复叶轮生茎端，一年生为1片三出复叶。二年生有1片五出复叶，以后每年递增1片。4~6年生有3~5片五出复叶；叶柄长。伞形花序顶生，花小，淡黄绿色。果扁球形，熟时鲜红色。花期6~7月，果期7~9月。

生于深山阴湿林下。主产吉林、辽宁、黑龙江。多栽培。

采制 栽种5~6年后，于秋季采挖(园参)，洗净晒干，称生晒参；鲜根以针扎孔，用糖水浸后晒干，称糖参；鲜根蒸透后烘干或晒干，称红参。野生人参根经晒干，称生晒山参。

性状 生晒参主根圆锥形或纺锤形，长6~9cm，直径1~2cm，上端有根茎(芦头)，具碗状茎痕(芦碗)4~6个，下部分出2~4支根，长8~12cm。表面淡黄棕色，有不规则纵皱纹及细横纹，主根横纹细密断续成环，支根有横长皮孔。微具特异香气，味微甜、苦。

化学成分 根含多种人参皂甙(ginsenoside)，如人参皂甙 Ra₁、Ra₂、Rb₂、Rb₃、Rc、Rd、Re、Rf、Rg₁、Rg₂、Rh₁、Ro。

性味 性温，味甘、微苦。

功能主治 大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱、肢冷脉微、脾虚食少、肺虚喘咳、津伤口渴。



根短，类橘，表管尸支下出，水盆润燥，事惟炎部 谷玉引森

相麻可查，水煎 1. 人参 附身，兼是风，类委巴精，类

2. 了哥王 *Radix Wikstroemiae Indicae*

(英) Indian Stringbush Root

(日) リヨウカオウ

别名 地棉皮、山豆了、九信草。

来源 为瑞香科植物南岭茛菪花 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey. 的根。

植物形态 小灌木，高达 1m，全株光滑。茎红褐色，皮部富纤维。叶对生，纸质，长椭圆形或倒卵形，长 2~5cm，宽 8~15mm；几无柄。花黄绿色，数朵排成顶生的短总状花序；花被筒状，顶端 4 裂；雄蕊 8，2 轮；子房椭圆形，顶部被毛，柱头大，近球形。浆果卵形，长约 6mm，熟时鲜红色。花期 5~9 月，果期 6~12 月。

生于村边、路旁、山坡灌丛中。主产广东、广西、江西、福建、湖南、贵州。


采制 秋至春初采挖，洗净晒干，经多次蒸晒去毒后用。

性状 根长圆柱形，弯曲，老根常有分支，长达 40cm，直径 0.5~3cm。表面黄棕色或暗棕色，有支根痕和不规则浅纵皱纹及横裂纹，老根有横长皮孔。质坚韧，断面皮部类白色，厚 1.5~4mm，强纤维性，与木部分离，撕裂后纤维呈绵毛状。味微苦甘，而后有持久的灼热不适感。

化学成分 含南茛菪素(wikstroemin)、牛蒡甙元(arctigenin)、罗汉松脂酚(matairesinol)等。

性味 性微温，味苦、辛。

功能主治 消炎解毒，散瘀逐水。用于支气管炎、肺类、腮腺炎、淋巴结炎、风湿痛、晚期血吸虫病腹水、疮疖痈肿。



根中央中
 部，长
 且 5~8
 寸
 土质部
 分
 干燥，干
 外
 2~3.1
 黄绿色
 或，基
 部微变
 小
 厚皮人
 平部

2. 了哥王 苦，甘和，微毒 木科

藤本，茎出叶，内特各干果，果实稍甜，血虫瘿效 亦主跌打

凉性作药，微毒

3. 三七 Radix Notoginseng

(英) Sanchi

(日) サンシチ

别名 人参三七、田七、盘龙七、金不换。

来源 为五加科植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen 的根。

植物形态 多年生草本，高达 60cm。根茎短，茎直立，光滑无毛。掌状复叶，具长柄，3~4 片轮生于茎顶；小叶 3~7，椭圆形或长圆状倒卵形，边缘有细锯齿。伞形花序顶生，花序梗从茎顶中央抽出，长 20~30cm。花小，黄绿色；花萼 5 裂；花瓣、雄蕊皆为 5。核果浆果状，近肾形，熟时红色。种子 1~3，扁球形。花期 6~8 月，果期 8~10 月。

生于山坡丛林下。现多栽培于海拔 800~1000m 的山脚斜坡或土丘缓坡上。主产云南、广西、四川。

采制 种后第 3 年冬季及夏末初秋采挖。去须根，曝晒至半干，用于搓揉，再曝晒，重复数次，置麻袋中加蜡打光。

性状 根圆锥形、纺锤形或不规则块状，长 1.5~5cm，直径 1.2~2cm。表面灰黄色或棕黑色，具蜡样光泽，有不规则细纹及少数横长皮孔；上部有数个瘤状隆起的支根断痕，顶端残留根茎基。质坚实，击碎后皮部与木部常分离；横切面灰白色或黄棕色，皮部有棕色小点(树脂道)。味苦、微甜。

化学成分 含皂甙，主要为人参皂甙 Rb₁、Rg₁、Rg₂ 和少量人参皂甙 Ra、Rb₂、Rb 和 Re。此外，尚含黄酮甙、淀粉、蛋白质、油脂等。

性味 性温，味甘、微苦。

功能主治 散瘀止血，消肿定痛。用于各种内、外出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。