

卫生专业技术资格考试辅导丛书

2009

主管护师资格考试

全真模拟试卷

主 编 张利岩 刘万芳

第三版

- 全真模拟试卷
- 高效仿真试题
- 再现历年考点



军事医学科学出版社

2009 主管护师资格考试全真模拟试卷

(第三版)

主 编 张利岩 刘万芳

副主编 (以姓氏笔画为序)

史 晶 唐 伟 管晓萍

编 者 (以姓氏笔画为序)

史 晶 付淑云 刘万芳

纪慧茹 杨凯平 张向兰

张利岩 林美雄 唐 伟

管晓萍

军事医学科学出版社
· 北 京 ·

内容提要

为方便广大考生更好地熟悉主管护师资格考试内容,做好考前准备,我们依据考试大纲,针对实际考试情况,编写了五套全真模拟试卷。模拟卷(共3500道题)严格遵照大纲要求,几乎覆盖了绝大部分考核知识点。希望考生在复习好书本知识的基础上,认真做好每一道题,通过模拟卷练习,帮助自己顺利应考。

图书在版编目(CIP)数据

2009 主管护师资格考试全真模拟试卷/张利岩,刘万芳主编.—3版.

-北京:军事医学科学出版社,2008.8

ISBN 978-7-80245-180-3

I. 2… II. ①张… ②刘… III. 护理学-护士-资格考核-习题

IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 129362 号

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路 27 号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)66931051,66931049,81858195

编辑部:(010)66931127,66931039,66931038

86702759,86703183

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmssp.cn>

印装:北京市顺义兴华印刷厂

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:17.125

字数:377千字

版次:2008年10月第1版

印次:2008年10月第1次

定价:32.00元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

本版编写说明

本书第一版自面市以来,深受广大考生的欢迎。据考生反映,本书的五套模拟卷(共 3500 道题)几乎覆盖了绝大部分考核知识点,对应考非常有用。为此我们综合考生的意见和建议对本书进行修订再版,希望能继续为 2009 年的考生带来更大的帮助。

第三版做了以下修订:

1. 2007 年全国卫生专业技术资格考试委员会对护理专业考试大纲作了重大调整,从 2007 年的考题看,新增部分出考题的几率较大,针对这种情况,本版书对知识面进行重新梳理,删除了部分过时的知识点,增加了大纲要求的内容。

2. 考试委员会对考核的目标和要求也有所变化,侧重考核护理临床实践能力,反映到卷面上则是基础知识考题较细较偏,护理病理题的难度和数量都有所增加,本版在基础知识和病例题方面也作了适当修订。

3. 本版书将历年真题和练习题融合在一起,历年真题是应对考试复习参考的金标准,练习题的难度和风格接近历年真题,同时有一定的题量作保证,对指导主管护师通过考试有较大的帮助。

张利岩 刘万芳

2008 年 11 月

前 言

参加主管护师考试的考生往往借助复习护士执业资格考试的内容,而护士执业资格考试是护理学专业资格考试三个层次中最基础的考试之一,对主管护师的考试来说,往往造成复习程度低,复习知识点不够深入,考试通过率也不会很高。这说明报考主管护师资格考试的护士虽然积累了大量的临床经验,但如果没有系统地复习和梳理知识点,上了考场也不能有效发挥出自己的水平。

为方便广大考生更好地熟悉主管护师资格考试内容,作好考前准备,我们依据考试大纲,针对实际考试情况,编写了《2009年主管护师资格考试全真模拟试卷》,希望能帮助广大考生顺利通过考试。

一、主管护师资格考试作为国家级考试,考题难度范围严格遵照大纲,大纲要求的考核知识点万变不离其宗,考生必须脚踏实地地复习,切实掌握大纲要求的知识内容,应对考试自然轻松,千万不要抱侥幸心理去猜题。

二、主管护师资格考试内容涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学和健康管理、感染护理、社区护理,考试分四张卷,分别为基础知识卷、相关专业知识的知识卷、专业知识卷和专业实践能力卷,每张试卷100道题,其中专业实践能力每个专业都有各自的试卷,分别由内科、外科、妇产科和儿科组成。在本书中,考生可根据自己所报的专业选择相应的习题,快速检验自己对知识的掌握程度。

三、模拟测试对应考有非常有效果,通过大量做练习题的方式掌握知识是往年考生的经验。本书有五套模拟卷(共3500道题),严格遵照大纲要求,几乎覆盖了绝大部分考核知识点。希望考生在复习好书本知识的基础上,认真做好每一道题,在做习题的过程中,将自己认为的难点、难题做适当标注,如有时间一定要回过头复习,不要把题做过去就不管了,特别是曾经做错的题,回头多温习几遍,对应考非常有益。

四、近年考题在突出考核基本知识的同时,更重点突出了对主管护师的应用能力的考核。体现到考卷上就是病例题越来越多,这也是考生反映考题越来越难的根本所在。本书增加了病例题的比例,希望考生能够更加准确地进行备考。

由于本书涉及的知识内容广泛,虽反复修改,但由于水平和能力有限,可能会存在错误和疏漏,恳请广大考生给予指正。

张利岩 刘万芳

2008年10月

目 录

模拟试卷一	(1)
模拟试卷二	(55)
模拟试卷三	(108)
模拟试卷四	(161)
模拟试卷五	(214)

模拟试卷一

基础知识

一、在以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 急性肾炎水肿部位最早多由下列哪一部位开始

- A. 眼睑
- B. 面部
- C. 腰部
- D. 胫前区
- E. 踝部

2. 流行病的流行过程必须具备哪三个环节

- A. 病原体,环境,易感人群
- B. 病原体,环境,传染源
- C. 传染源,传播途径,易感人群
- D. 病原体,传播途径,易感人群
- E. 传染源,传播途径,环境

3. 容易引起急性肾衰的损伤是

- A. 严重挤压伤
- B. 广泛擦伤
- C. 严重撕裂伤
- D. 多处刺伤
- E. 冻伤

4. 下列哪种叙述最符合类风湿性关节炎的定义

- A. 是一种病因不明的关节炎
- B. 是一种感染后引起的自身免疫性关节炎
- C. 是一种慢性对称性多关节炎为主要表现的系统性自身免疫性疾病
- D. 是一种以手足关节病变为主要表现的系统性自身免疫性疾病
- E. 是一种以脊柱关节病变为主要表现的系统性自身免疫性疾病

5. 造成再生障碍性贫血最主要的原因是

- A. 造血原料不足
- B. 长期营养不良
- C. 脾功能亢进
- D. 骨髓造血功能衰竭
- E. 急性大量失血

6. 心室颤动首选的治疗措施是

- A. 心内注射肾上腺素
- B. 同步电复律
- C. 非同步电复律
- D. 静脉注射苯妥英钠
- E. 胺碘酮静注

7. 急性心肌梗死急性期发生的室性早搏的治疗应给予

- A. 维拉帕米静滴
- B. 心律平静滴
- C. 胺碘酮静滴
- D. 利多卡因静滴
- E. 溴苄胺

8. III度房室传导阻滞,心室率为 35 次/min 的患者,首选的治疗方法是

- A. 洋地黄
- B. 异丙肾上腺素
- C. 麻黄素
- D. 阿托品
- E. 安装人工心脏起搏器

9. 心脏瓣膜病变中,最常见的是

- A. 二尖瓣病变
- B. 三尖瓣病变
- C. 主动脉瓣病变
- D. 肺动脉瓣病变
- E. 联合瓣膜病变

10. 风心病哪类严重瓣膜损害可导致左心室射血受阻,引起左心室排血量显著降低,出现心绞痛、眩晕,甚至猝死

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 肺动脉瓣关闭不全

11. 治疗上呼吸道感染的措施,下列哪项不妥

- A. 适当休息
- B. 体温超过 39℃ 时物理降温
- C. 呼吸道隔离,防止交叉感染
- D. 多饮水
- E. 常规应用抗生素治疗

12. 慢性支气管炎急性发作期病人的主要治疗是

- A. 吸氧
B. 控制感染
C. 解痉、平喘
D. 祛痰
E. 镇咳
13. 剧烈频繁的呕吐可引起
A. 代谢性酸中毒
B. 代谢性碱中毒
C. 呼吸性酸中毒
D. 呼吸性碱中毒
E. 混合型酸中毒
14. 上消化道出血病因诊断的首选检查措施为
A. 便常规检查
B. 胃镜检查
C. 选择性动脉造影
D. X线钡餐检查
E. 吞线试验
15. 甲亢患者的饮食应给予
A. 高蛋白、高热量、高维生素
B. 高蛋白、高热量、高盐
C. 高热量、低蛋白、低盐
D. 高热量、低蛋白、高盐
E. 低热量、低蛋白、高维生素
16. 下列引起上消化道出血的疾病中,最为常见的是
A. 消化性溃疡
B. 急性胃炎
C. 食管胃底静脉曲张破裂
D. 胃癌
E. 食管癌
17. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔的疼痛特点是
A. 上腹隐痛
B. 上腹刀割样疼痛
C. 上腹烧灼样痛
D. 上腹胀裂样痛
E. 上腹阵发性绞痛
18. 最容易发生嵌顿和绞窄的疝是
A. 股疝
B. 脐疝
C. 腹股沟斜疝
D. 白线疝
E. 腹股沟直疝
19. 患者李某,大叶性肺炎,做青霉素皮试时呈阳性,值班护士的处理措施哪项不对
A. 通知医生,选用其他药物
B. 在体温单、床头卡上注明青霉素阳性标记
C. 告知病人及家属
D. 严格交班
E. 以后用青霉素之前一定要做皮试
20. 胃肠道手术,术前禁食的主要目的是
A. 避免手术困难
B. 避免手术后腹胀
C. 预防麻醉中呕吐造成窒息
D. 防止术后吻合口瘘
E. 早期恢复肠蠕动
21. 手术人员无菌技术不正确的是
A. 帽子必须完全盖住头发
B. 先穿无菌手术衣再戴无菌手套
C. 每桶苯扎溴铵溶液最多可供40人次泡手
D. 戴无菌手套时,已消毒手指不能接触手套背侧部
E. 肘部触及有菌物后可继续手术,但应注意该处不再接触无菌区
22. 高渗性脱水的常见原因
A. 急性肠梗阻
B. 感染性休克
C. 肺炎高热
D. 慢性十二指肠痿
E. 挤压综合征
23. 低渗性脱水的常见原因
A. 急性肠梗阻
B. 感染性休克
C. 肺炎高热
D. 慢性十二指肠痿
E. 挤压综合征
24. 破伤风最早累及的肌肉是
A. 膈肌
B. 面肌
C. 四肢肌
D. 颈项肌
E. 咀嚼肌
25. 急性腹膜炎病人发生休克的主要原因是
A. 剧烈腹痛
B. 毒素吸收及血容量减少
C. 呼吸循环功能不全
D. 大量呕吐失液
E. 胃肠道渗出液刺激
26. 急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是
A. 胆管狭窄

- B. 胆管扭转
C. 胆道蛔虫
D. 胆管结石
E. 胆道肿瘤
27. 易引起感染的骨折是
A. 开放性骨折
B. 闭合性骨折
C. 完全骨折
D. 不完全骨折
E. 稳定性骨折
28. 不完全骨折是
A. 粉碎性骨折
B. 斜行骨折
C. 嵌插骨折
D. 青枝骨折
E. 横行骨折
29. 终末血尿提示出血部位在
A. 前尿道
B. 后尿道
C. 肾脏
D. 输尿管
E. 膀胱
30. 脓尿镜检时每高倍视野可见脓球
A. 1个以上
B. 2个以上
C. 3个以上
D. 4个以上
E. 5个以上
31. 男性, 43岁, 因急性脑出血入院, 目前病人对任何刺激均无反应, 呼吸不规则, 大小便失禁, 两侧瞳孔扩大, 角膜反射消失, 其意识状态是
A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 昏睡
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
32. 女性, 65岁, 因外伤造成左侧胸部4~7肋骨多处骨折, 呼吸时患处可能出现
A. 呼气时外凸、吸气时正常
B. 吸气和呼气时均外凸
C. 吸气时外凸、呼气时内陷
D. 吸气和呼气时均内陷
E. 吸气时内陷、呼气时外凸
33. 留置导尿管病人的导尿管应
A. 每日更换一次
B. 隔日更换一次
C. 每周更换一次
D. 每两周更换一次
E. 每月更换一次
34. 大量不保留灌肠时, 溶液的温度一般为
A. 37~39℃
B. 38~40℃
C. 39~41℃
D. 40~42℃
E. 4℃
35. 马斯洛将人的基本需要分为五个层次, 由低到高依次为
A. 生理、爱与归属、安全、尊敬、自我实现
B. 安全、生理、爱与归属、尊敬、自我实现
C. 生理、安全、爱与归属、尊敬、自我实现
D. 安全、生理、尊敬、爱与归属、自我实现
E. 生理、安全、尊敬、爱与归属、自我实现
36. 关于护理程序的论述, 正确的概念是
A. 是一种护理工作的分工类型
B. 是一种护理工作的简化形式
C. 是一种系统地解决护理问题的方法
D. 是一种操作的程序
E. 是一种护理活动的循环过程
37. 多采用 PES 形式描述的护理诊断是
A. 对现存的健康问题的描述
B. 对可能出现的健康问题的描述
C. 对健康的护理诊断描述
D. 对潜在的健康问题的描述
E. 对与体征有关健康问题的描述
38. 整理资料的四个步骤依次是
A. 整理分类、复查、核实、比较分析
B. 整理分类、比较分析、复查、核实
C. 复查、核实、整理分类、比较分析
D. 比较分析、复查、核实、整理分类
E. 比较分析、整理分类、复查、核实
39. 急诊抢救物品准备中“五定”的内容是
A. 定人保管, 定期使用, 定期消毒、灭菌, 定数量、品种, 定期维修
B. 定人保管, 定期消毒、灭菌, 定期维修, 定期检查, 定数量、品种
C. 定数量、品种, 定点安置, 定人保管, 定期消毒、灭菌, 定期检查维修
D. 定品种, 定数量, 定点安置, 定期消毒, 定期检查维修
E. 定点安置, 定期检查, 定期消毒, 定期使用,

定期维修

40. 门诊护士在预检分诊时做到

- A. 先预检分诊, 然后挂号、诊疗
- B. 先挂号, 然后预检分诊、诊疗
- C. 先预检分诊, 然后诊疗、挂号
- D. 先挂号, 然后就治疗
- E. 先预检分诊, 然后进行治疗

41. 护士判断全麻患者完全清醒的依据是

- A. 睁眼
- B. 呻吟
- C. 咳嗽、咳痰
- D. 正确回答问题
- E. 角膜反射恢复

42. 体温上升期, 病人临床表现为

- A. 面部发红
- B. 皮肤灼热
- C. 呼吸增快
- D. 心率加快
- E. 寒战

43. 诊断败血症最主要的依据是

- A. 出现休克
- B. 皮下出现瘀点
- C. 肝脾肿大及黄疸
- D. 寒战, 高热, 呈稽留热
- E. 血培养阳性

44. 灌注鼻饲液的适宜温度为

- A. 30 ~ 33℃
- B. 32 ~ 35℃
- C. 33 ~ 36℃
- D. 36 ~ 38℃
- E. 38 ~ 40℃

45. 葡萄胎的恶变率是

- A. 5%
- B. 5% ~ 10%
- C. 10% ~ 15%
- D. 10% ~ 20%
- E. 10% ~ 25%

46. 测量前囟大小正确的方法是

- A. 二对边中点连线长度
- B. 相邻二边的长度
- C. 二对角线的长度
- D. 一侧边的长度
- E. 两侧边的长度之和除以 2

47. 腰椎穿刺的适应证不包括

- A. 协助诊断出血性脑血管疾病

B. 检查椎管有无阻塞现象

C. 协助诊断梗死性脑血管疾病

D. 向鞘内注射药物, 治疗中枢神经系统感染

E. 协助诊断脊髓内外有无占位性病变

48. 正常足月儿特点是

- A. 耳廓软
- B. 皮肤红润, 胎毛少
- C. 指甲未达指尖
- D. 足底纹少
- E. 乳晕不清

49. 小儿秋季腹泻常见的病原体是

- A. 大肠杆菌
- B. 空肠弯曲菌
- C. 柯萨奇病毒
- D. 轮状病毒
- E. 埃可病毒

50. 患者王某, 患伤寒, 需做大量不保留灌肠, 为此病人灌肠的液量及液面与肛门的距离是

- A. 1 000 ml, 不超过 50 cm
- B. 1 000 ml, 不超过 30 cm
- C. 500 ml, 不超过 20 cm
- D. 500 ml 以内, 不超过 30 cm
- E. 500 ml 以内, 不超过 4 cm

二、以下提供若干个病例, 每个病例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每题下面 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(51 ~ 54 题共用题干)

高女士, 20 岁, 高热、鼻出血 1 周。体检: 扁桃体肿大、表面脓苔覆盖, 肝脾不大。实验室检查: 外周血全血细胞减少。病人情绪烦躁, 经常在父母面前哭泣, 诉说自己“近日常做噩梦”。

51. 医疗诊断最可能是

- A. 化脓性扁桃体炎
- B. 贫血
- C. 血小板减少性紫癜
- D. 再生障碍性贫血
- E. 白血病

52. 确诊需进一步配合检查

- A. 血常规
- B. 骨髓象
- C. 血涂片
- D. 筛选试验
- E. 凝血四项

53. 出血的主要原因是

- A. 弥散性血管内凝血
- B. 血小板减少
- C. 血小板功能异常
- D. 凝血因子减少
- E. 血管损伤

54. 目前存在的主要心理问题是

- A. 焦虑
- B. 预感性悲哀
- C. 孤独
- D. 绝望
- E. 无能为力

(55~56 题共用题干)

患者,73 岁,2 小时前晚餐后突感胸骨后剧烈压榨样疼痛,伴大汗、呕吐及濒死感,急诊入院。查心率 130 次/min,律不齐,血压 165/100 mmHg,心电图示 V1~V4 导联 ST 段呈弓背向上抬高, TN: 3.5 ng/ml。

55. 患者最可能的诊断为

- A. 高血压脑病
- B. 高血压危象
- C. 急性心肌梗死
- D. 心脏神经官能症
- E. 肺梗死

56. 解除患者疼痛的药物应选用

- A. 吗啡
- B. 654-2
- C. 消炎痛
- D. 阿司匹林
- E. 布洛芬

(57~58 题共用题干)

患者吴某,肝硬化合并上消化道出血,经对症治疗后出血停止,病情好转。

57. 出血期间,患者大便呈

- A. 黄褐色
- B. 果酱色
- C. 柏油色
- D. 暗红色
- E. 鲜红色

58. 此患者需做大便潜血试验,前 3 天应禁食

- A. 白菜
- B. 牛奶
- C. 土豆
- D. 冬瓜
- E. 羊血

(59~61 题共用题干)

患者王某,继往有肝硬化病史 10 余年,近 2 月来腹胀明显,心慌、气短,呼吸困难,查体:腹部膨隆,状如蛙腹,B 超示大量腹水。

59. 王某腹水发生的主要原因是

- A. 水摄入过多
- B. 钠盐摄入过多
- C. 肾功能衰竭
- D. 心力衰竭
- E. 门静脉和血浆蛋白降低

60. 对王某的护理不正确的是

- A. 取半卧位休息
- B. 预防褥疮
- C. 食盐摄入每日不超过 2 g
- D. 每日摄水量控制在 1 500 ml 左右
- E. 准确记录 24 小时出入量

61. 如果给王某行腹腔穿刺放液,术后护理措施错误的是

- A. 观察穿刺点有无渗液
- B. 密切观察性格和意识状态的变化
- C. 如有腹水外溢,及时更换敷料
- D. 防止伤口感染
- E. 平卧休息 4 小时

(62~63 题共用题干)

患者男性,53 岁,左腹股沟肿块,站立时肿块出现,平卧后消失,有时肿块可入阴囊,无痛感。检查:左侧阴囊内梨形肿块,10 cm×8 cm 大小,可还纳,压内环腹压增加,肿物不出现,透光实验阴性。

62. 初步诊断是

- A. 可复性腹股沟斜疝
- B. 可复性腹股沟直疝
- C. 右侧睾丸鞘膜积液
- D. 难复性腹股沟斜疝
- E. 难复性腹股沟直疝

63. 疝术后腹股沟区压沙袋的目的是

- A. 防止疝复发
- B. 防止伤口裂开
- C. 防止感染
- D. 防止阴囊水肿
- E. 舒适

(64~65 题共用题干)

患者男性,69 岁,前列腺增生。

64. 前列腺增生症最主要的症状是

- A. 尿频
- B. 尿潴留
- C. 进行性排尿困难

D. 尿失禁

E. 血尿

65. 前列腺增生症对患者的主要危害是

A. 癌变

B. 尿路梗阻, 损害肾功能

C. 引起尿路感染

D. 并发膀胱结石

E. 膀胱壁憩室形成

(66~67 题共用题干)

患者男性, 前列腺术后。

66. 术后安置的气囊导尿管拔除应在

A. 24 小时内

B. 24~72 小时

C. 5~7 天

D. 10~21 天

E. 25~30 天

67. 术后, 有耻骨上造口, 应用 1:5 000 呋喃西林液冲洗膀胱, 此时应

A. 从尿道插管处注入, 由耻骨上造口处排出

B. 从耻骨上造口处注入, 由尿道插管处排出

C. 从尿道插管处注入, 仍从尿道插管处排出

D. 从耻骨上造口处注入, 仍从原处排出

E. 以上都不是

(68~69 题共用题干)

某初产妇, 35 岁, 对其进行 B 超测量骨盆结果: 入口平面前后径 11 cm, 横径 13 cm, 中盆骨横径 9.5 cm, 前后径 11.5 cm, 出口横径 8.3 cm, 后矢状径 8.5 cm。

68. 根据检查结果, 该产妇骨盆形态是

A. 均小骨盆

B. 扁平骨盆

C. 漏斗骨盆

D. 畸形骨盆

E. 正常骨盆

69. 该产妇是否可以试产, 试产的时间是

A. 不可试产

B. 可试产 1 小时

C. 可试产 1.5 小时

D. 可试产 2 小时

E. 可试产 4 小时

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(70~71 题共用备选答案)

A. 滑膜炎

B. 灶性淋巴结浸润

C. 灶性白细胞浸润

D. 类风湿结节

E. 血管炎

70. 类风湿关节炎的关节病理特征是

71. 类风湿关节炎关节外的主要病理基础是

(72~75 题共用备选答案)

A. 肺源性呼吸困难

B. 心源性呼吸困难

C. 血源性呼吸困难

D. 中毒性呼吸困难

E. 神经、精神性呼吸困难

72. 支气管哮喘出现

73. 自发性气胸出现

74. 结核性胸膜炎出现

75. 急性左心衰竭出现

(76~78 题共用备选答案)

A. 低血糖反应

B. 妊娠后期糖尿病

C. 酮症酸中毒

D. 2 型糖尿病

E. 血管神经性水肿

76. 胰岛素引起的注射局部荨麻疹为

77. 胰岛素剂量过大

78. 胰岛素剂量不足或中断可引起

(79~81 题共用备选答案)

A. 丙基硫氧嘧啶、他巴唑

B. 放射性¹³¹I 治疗

C. 甲状腺素片

D. 甲状腺次全切术

E. 复方碘溶液

79. 常用的抗甲状腺药物是

80. 甲状腺肿大不显著的病人不宜采取的治疗方法是

81. 妊娠中期甲亢禁忌应用

(82~84 题共用备选答案)

A. 低渗性脱水

B. 等渗性脱水

C. 高渗性脱水

D. 低钾血症

E. 高钾血症

82. 粘连性肠梗阻病人, 呕吐频繁, 脉搏细弱, 血压下降

83. 长期禁食,每日通过静脉补液,四肢无力,严重腹胀

84. 大面积烧伤后,血尿,尿量每小时 10~15 ml (85~86 题共用备选答案)

- A. 血栓闭塞性脉管炎坏疽期
- B. 大隐静脉曲张,深静脉通畅
- C. 血栓闭塞性脉管炎局部缺血期
- D. 血栓闭塞性脉管炎营养障碍期
- E. 大隐静脉曲张,深静脉不通

85. 有间歇性跛行的是

86. 有休息痛的是

(87~89 题共用备选答案)

- A. 多数导致慢性尿潴留
- B. 腰部放射性绞痛伴血尿
- D. 无痛性血尿
- C. 膀胱刺激征加重伴终末血尿,发热
- D. 尿流突然中断,改变体位后又能排尿

87. 肾与输尿管结石

88. 膀胱结石

89. 尿道结石

(90~92 题共用备选答案)

A. 月经期

B. 增生期

C. 分泌期

D. 月经前期

E. 月经周期

90. 两次月经第一间隔的时间

91. 月经的第 25~28 天,称为

92. 月经的第 5~14 天,称为

四、在以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

93. 传染病的基本特征包括

A. 有病原体

B. 有传染性

C. 有流行性

D. 有免疫性

E. 有自限性

94. 缺铁性贫血发病的常见因素是

A. 食物加热、煮沸过度

B. 铁的吸收障碍

C. 铁损失过多

D. 需铁量增加而摄入不足

E. 月经过多

95. 影响肺换气的主要因素有

A. 呼吸膜面积

B. 通气/血流比例

C. 呼吸膜两侧气体分压差

D. 呼吸膜厚度

E. 肺泡表面张力

96. 与脑出血不同的是,脑血栓形成具有以下临床表现特点

A. 多无意识障碍

B. 脑脊液正常

C. 三偏征

D. 多在安静状态下发病

E. 常见失语和偏瘫

97. 急性胰腺炎的病因是

A. 暴饮暴食

B. 创伤、手术

C. 梗阻因素

D. 高血脂、高血钙

E. 乙醇中毒

98. 急性腹膜炎的护理诊断有

A. 体液不足

B. 焦虑与恐惧

C. 体温过高

D. 营养失调

E. 潜在并发症

99. 属完全骨折的是

A. 裂缝骨折

B. 横行骨折

C. 青枝骨折

D. 粉碎骨折

E. 嵌插骨折

100. 护理诊断与医疗诊断描述内容的主要区别是

A. 阐述的对象不同

B. 决策者不同

C. 诊断的可变性不同

D. 描述问题的范畴不同

E. 解决问题的手段不同

答案:

1. A 2. C 3. A 4. C 5. D 6. C

7. D 8. E 9. A 10. C 11. E 12. B

13. B 14. B 15. A 16. A 17. B 18. A

19. E 20. C 21. E 22. C 23. D 24. E

25. B 26. D 27. A 28. D 29. B 30. E

31. E 32. E 33. C 34. C 35. C 36. C

37. A 38. A 39. C 40. A 41. D 42. E

43. E 44. E 45. E 46. A 47. C 48. B
 49. D 50. D 51. D 52. B 53. B 54. A
 55. C 56. A 57. C 58. E 59. E 60. D
 61. E 62. A 63. D 64. C 65. B 66. D
 67. A 68. C 69. A 70. A 71. E 72. A
 73. A 74. A 75. B 76. E 77. A 78. C
 79. A 80. D 81. B 82. A 83. D 84. E
 85. C 86. D 87. B 88. E 89. A 90. E
 91. D 92. B 93. ABCD 94. BCDE
 95. ABCD 96. ABDE 97. ABCDE
 98. ACDE 99. BDE 100. ABCDE

相关专业知 识

一、在以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 急性肾衰竭血液透析指征为
 - 血尿素氮 $> 18.6 \text{ mmol/L}$ 、肌酐 $> 409 \mu\text{mol/L}$ 、血钾 $> 5.0 \text{ mmol/L}$
 - 血尿素氮 $> 20.6 \text{ mmol/L}$ 、肌酐 $> 509 \mu\text{mol/L}$ 、血钾 $> 6.0 \text{ mmol/L}$
 - 血尿素氮 $> 21.6 \text{ mmol/L}$ 、肌酐 $> 609 \mu\text{mol/L}$ 、血钾 $> 6.0 \text{ mmol/L}$
 - 血尿素氮 $> 28.6 \text{ mmol/L}$ 、肌酐 $> 609 \mu\text{mol/L}$ 、血钾 $> 7.0 \text{ mmol/L}$
 - 血尿素氮 $> 28.6 \text{ mmol/L}$ 、肌酐 $> 709 \mu\text{mol/L}$ 、血钾 $> 6.0 \text{ mmol/L}$
- 流行性乙型脑炎的主要传染源是
 - 病人
 - 蚊虫
 - 猪
 - 鼠类
 - 病毒携带者
- 下列毒物经呼吸道吸入将会导致严重中毒的是
 - 浓硫酸
 - 汞蒸气
 - 浓氨水
 - 砷
 - 苯酚
- 人被狂犬咬伤后是否发病,影响最小的因素是
 - 伤者自身免疫
 - 咬伤部位
 - 咬伤程度
 - 伤口的处理情况
 - 伤者年龄
- 周女士,28 岁。拟诊“流行性出血热”入院,入院第 3 日出现尿量减少、心率增快、脉压增大。最重要的护理措施是
 - 定时测量血压和脉搏
 - 记录 24 小时出入液量
 - 配合医师按“量出为人,宁少勿多”的原则严格控制液体摄入量
 - 保持口腔黏膜的清洁和湿润
 - 注意观察腔道和内脏出血征象
- 心绞痛疼痛发作时典型心电图表现是
 - ST 段弓背抬高
 - ST 段压低,T 波低平或倒置
 - T 波高尖
 - P-R 间期延长
 - 出现宽大畸形的病理性 Q 波
- 心电图运动试验阳性是指心肌负荷增加后出现
 - ST 段水平或下斜型压低 $\geq 0.05 \text{ mV}$
 - ST 段水平或下斜型压低 $\geq 0.1 \text{ mV}$
 - ST 段水平或下斜型压低 $\geq 0.05 \text{ mV}$,持续 0.08 秒
 - ST 段水平或下斜型压低 $\geq 0.1 \text{ mV}$,持续 1 分钟以上
 - ST 段水平或下斜型压低 $\geq 0.05 \text{ mV}$,持续 0.16 秒
- 某病人长期咳嗽,咳痰每日量约 300 ml,如咳痰不畅时则呈弛张型发热,此时血象的变化最可能是一
 - 嗜酸性粒细胞增加
 - 中性粒细胞增加
 - 大单核细胞增加
 - 淋巴细胞增加
 - 红细胞减少
- 男性,50 岁,发热、咳嗽、胸痛、呼吸急促,可疑急性脓胸,最有确诊意义的是
 - 胸痛
 - 肋间饱满
 - 呼吸音减弱
 - 胸片大片阴影
 - 胸穿抽出脓液
- 男,45 岁,两小时来突然心悸,不伴胸痛,发热,查体,血压 120/80 mmHg,心率 140 次/min,律齐

无杂音,双肺(-),为明确诊断应首选

- A. 胸片
- B. 超声心动
- C. 血常规
- D. 心电图
- E. 核素检查

11. 急性胰腺炎最有意义的检查是

- A. 乳酸脱氢酶
- B. 尿淀粉酶
- C. 胆碱酯酶
- D. 透明质酸酶
- E. 血肌酸磷酸激酶

12. 引起原发性肝癌最常见的病因是

- A. 食物中致癌物质
- B. 亚硝胺类化学物质
- C. 寄生虫感染
- D. 乙型、丙型肝炎病毒感染
- E. 细菌感染

13. 上消化道出血特征性的表现为

- A. 呕血与黑便
- B. 失血性贫血
- C. 失血性周围循环衰竭
- D. 肠性氮质血症
- E. 网织红细胞持续升高

14. 甲状腺功能亢进患者出现下列哪项表现时,护士应警惕甲亢危象的发生

- A. 食欲亢进,大便次数增多
- B. 怕热,多汗,常有消瘦
- C. 情绪不稳,多言好动
- D. 甲状腺弥漫性、对称性肿大
- E. 高热,体温 $> 39^{\circ}\text{C}$, 心率增快 140 ~ 240 次/min

15. 肝癌引起的肝区疼痛的特点是

- A. 空腹时烧灼痛
- B. 饭后半小时刺痛
- C. 间歇性隐痛
- D. 持续性钝痛或胀痛
- E. 剧烈的绞痛

16. 以下不是丙硫氧嘧啶治疗甲亢疾病的适应证的是

- A. 症状重,甲状腺较大
- B. 年龄 < 20 岁,妊娠,年老体弱等不宜手术者
- C. 术前准备
- D. 甲状腺次全切除术后复发

E. 作为放射性 ^{131}I 的辅助治疗

17. 关于急性胰腺炎时淀粉酶变化特点的叙述错误的是

- A. 尿淀粉酶增高迟于血清淀粉酶
- B. 尿淀粉酶下降较血清淀粉酶晚
- C. 淀粉酶越高诊断的正确率越大
- D. 尿淀粉酶测定值大于 256 索氏单位时有诊断意义
- E. 淀粉酶的高低与病变轻重不一定成正比

18. 化验白细胞增加、中性比例增加,首先考虑

- A. 梗阻性疾病
- B. 出血性疾病
- C. 炎症性疾病
- D. 绞窄性疾病
- E. 穿孔性疾病

19. 腹穿抽到稀脓性有臭味的液体,提示

- A. 肝胆破裂
- B. 急性肠梗阻
- C. 胃、十二指肠出血
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性化脓性阑尾炎

20. 一般情况下,颈、胸、腹部手术后采用

- A. 半卧位
- B. 平卧位
- C. 侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 头低脚高位

21. 麻醉前禁食水最主要的目的是

- A. 便于术中操作
- B. 防止术后便秘
- C. 防止术后腹胀
- D. 防止术后尿潴留
- E. 预防术中、术后呕吐误吸

22. 有减少呼吸道分泌作用的麻醉前用药是

- A. 阿托品
- B. 苯巴比妥钠
- C. 安定(地西洋)
- D. 哌替啶
- E. 氯丙嗪

23. 留取尿常规标本

- A. 晨间第一次尿倒去留第二次尿
- B. 第一次尿
- C. 第三次尿
- D. 任何时间的尿
- E. 以上全不对

24. 关于骨折做 X 线检查下列错误的是
- 为明确诊断不可缺少
 - 对骨折处理有指导作用
 - 投照部位要包括邻近的一个关节
 - 常规正、侧位,必要时加特殊位置
 - 临床已明确的骨折可不拍 X 线片
25. 急性血源性骨髓炎 X 线片出现异常的时间要在
- 1 周后
 - 2~3 周后
 - 4 周后
 - 5~6 周后
 - 7 周以后
26. 用平车搬运病人不正确的方法是
- 下坡时病人头在平车后端
 - 中断输液
 - 进门时不可用车撞门
 - 病人向平车挪动时,要保护病人
 - 腰椎骨折病人,车上垫木板
27. 病情与呼吸异常不符的是
- 高热:呼吸浅而快
 - 脑水肿:呼吸深而慢
 - 巴比妥中毒:呼吸浅而快
 - 酸中毒:呼吸深而快
 - 胸膜炎:呼吸浅而快
28. 为鼻饲病人灌注饮食后,应嘱病人保持原卧位
- 10~15 分钟
 - 10~20 分钟
 - 20~25 分钟
 - 20~30 分钟
 - 30~40 分钟
29. 下面不可能使用冷疗法的有
- 鼻出血
 - 头皮下血肿的早期
 - 中暑病人
 - 压疮
 - 牙痛
30. 护患进行沟通的理想距离宜采用
- 亲密距离
 - 个人距离
 - 社会距离
 - 公众距离
 - 一般距离
31. 下列不属于护士收集资料方法的选项是
- 观察
 - 交谈
 - 体格检查
 - 实验室检查
 - 查阅有关资料
32. 关于护理诊断的描述,正确的选项是
- 一个病人首优的护理诊断只能有一个
 - 护士可参照马斯洛的需要层次论进行排序
 - 首优的护理诊断解决之后再解决中优问题
 - 现存的护理诊断应排在“有…危险”的护理诊断之前
 - 对于某个病人来说,护理诊断的先后次序常常是固定不变的
33. 测血压时袖带过紧可使
- 收缩压偏低
 - 收缩压偏高
 - 无影响
 - 舒张压偏高
 - 舒张压偏低
34. 病人出院后其使用过的褥子和棉被最佳处理方法是
- 日光曝晒 2 小时或紫外线灯照射消毒
 - 日光曝晒 4 小时或环氧乙烷消毒
 - 日光曝晒 6 小时或紫外线灯照射消毒
 - 日光曝晒 2 小时或环氧乙烷消毒
 - 日光曝晒 6 小时或消毒液浸泡消毒
35. 病区的环境管理中社会环境的内容是
- 安全
 - 安静
 - 建立良好的群体关系
 - 整洁
 - 舒适
36. 急诊科护士进行预检分诊时应做到
- 一问、二看、三检查、四分诊
 - 一分诊、二问、三检查、四看
 - 一看、二问、三分诊、四检查
 - 一问、二检查、三看、四分诊
 - 一检查、二看、三问、四分诊
37. 传染病区的半污染区域是
- 治疗室、库房
 - 内走廊及病区化验室
 - 浴室、洗涤间
 - 病室、厕所

- E. 配餐室、更衣室
38. 细菌对紫外线吸收最快的波长是
- A. 254 nm
B. 245 nm
C. 250 nm
D. 452 nm
E. 425 nm
39. 不易燃的化学消毒剂是
- A. 乙醚
B. 过氧乙酸
C. 乙醇
D. 环氧乙烷
E. 甲醛
40. 对病毒无效的化学消毒剂是
- A. 碘酒
B. 甲醛
C. 过氧乙酸
D. 环氧乙烷
E. 苯扎溴铵
41. 护理健康教育的学科性质是
- A. 护理学科
B. 综合学科
C. 教育学科
D. 交叉的边缘学科
E. 人文学科
42. 非语言沟通的形式不包括
- A. 身体运动
B. 表情
C. 宣传资料
D. 眼神
E. 姿势
43. 羊水栓塞是由于羊水中含有形物质进入母体血循环而引起的一系列严重症状的综合征。羊水中含有启动外源性凝血系统的组织因子,是血浆中的(),所以称为难以纠正的休克
- A. 22.3 倍
B. 34.5 倍
C. 39.2 倍
D. 44.8 倍
E. 49.7 倍
44. 患者 24 岁,白带呈黄色脓性,有尿急、尿痛、排尿困难,妇检:外阴、阴道及尿道口红肿充血,从阴道前壁压迫尿道及尿道旁腺有脓液外溢,高度怀疑
- A. 淋病
B. 尖锐湿疣
C. 外阴炎
D. 前庭大腺炎
E. 急性宫颈炎
45. 房间隔缺损的病理生理改变,叙述正确的是
- A. 右心增大
B. 肺循环血量减少
C. 肺循环血量增加
D. 右向左分流
E. 左心房增大
46. 患儿,4 岁。以胸骨下段疼痛就诊,门诊血常规检查:红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$,血红蛋白 55 g/L,白细胞 $14 \times 10^9/L$,怀疑白血病入院。对确诊最有价值的进一步检查是
- A. 全面体格检查
B. 放射线检查
C. 骨髓穿刺
D. 腰椎穿刺
E. 全血细胞计数
47. 可以确诊泌尿系感染的尿细菌培养指标是
- A. 菌落计数 $>1\,000/ml$
B. 菌落计数 $>5\,000/ml$
C. 菌落计数 >1 万/ml
D. 菌落计数 >10 万/ml
E. 菌落计数 >20 万/ml
48. 先天性甲状腺功能减低症患儿做骨骼 X 线检查,对疾病诊断有辅助作用的骨发育落后部位是
- A. 手和腕部
B. 桡骨和尺骨
C. 胫骨、腓骨
D. 股骨
E. 跖骨
49. 患儿,8 岁,发热 2 周,间断出现多形红斑,近 1 个月指、趾关节疼痛、肿胀,起初为一侧,现为双侧,化验检查白细胞 $14 \times 10^9/L$,C-反应蛋白阳性,用抗生素治疗无效。诊断考虑为
- A. 风湿热
B. 败血症
C. 儿童类风湿病
D. 白血病
E. 系统性红斑狼疮
50. 穿戴无菌手术衣及手套后,应将双手置于
- A. 头上部
B. 胸前
C. 后背
D. 两侧腋下