

增補壽世保元

太乙神鍼附錄

錦章書局出版

壽世保元 全書六冊

原編者：（清）龔廷賢

出版者

錦章書局

上海(12)太倉路135號

印刷者

集華彩印局

上海成都北路597弄2號

經售者

上海圖書發行公司

上海山東中路128號

1954年2月重印

印數 7001—9000

1955年12月第5次印刷

定價 1.70元



外科諸證

癰疽

夫癰疽瘡癰者。皆由氣血不利喜怒不時。飲食不節寒暑不調。使五臟六腑之氣怫鬱於內。以致陰陽乖錯。氣血凝滯而發也。亦有久服丹石燥熱之藥。熱毒結深而發為癰疽也。夫此疾多生於膏梁富貴之人。以其平昔所食肥膴火燄安坐不勞。嗜慾無節。以致虛邪熱毒內攻。煎熬氣血而成也。癰者壅也。大而高起屬乎陽。小附之氣所生也。其脈沈數瘡者其總名也。癰者有頭小瘡也。經云。諸痛痒瘡皆屬心火。蓋心主血而行氣。氣血凝滯。火之熱而主癰疽之類也。然所感有淺深。故所發有輕重大小之不同也。六腑積熱騰出於外肌肉之間。其發暴甚。皮腫光軟侵表光大者癰也。五臟風毒積熱攻注於肌肉。其發猛惡。初生一頭如瘡頭。白色焦枯觸之而痛應心者疽也。熱發於皮膚之間。是以浮腫根小不過二三寸者節也。天癰生於六腑。若燎原之火。外潰肌肉疽生於五臟。沈澁難療。若陶室之燧。內潰骨髓癰則易燎。惟難將息而遲瘥。疽則難療而易瘡。復夫諸瘡之中。惟背疽疔瘡最為急症。其次莫如腦疽腸癰喉癰之類。亦其急者也。至若瘰癧隱瘡瘻漏諸瘡之類。其症可緩而治也。又有外癰臍瘡風疳之類。雖云俱屬瘡類。而其輕重緩急自有不同也。天癰疽之疾。須要察其是實是虛。是冷是熱。或重或輕對症用藥。無失先後次序。凡人年四十已上。頭頂鬚頭背脊腰臍或筋骨之上。所視不見之處。稍有瘡癰。便不可輕易待之。若視之怠慢以為常疾。每見從微至顯。喪命者多矣。便且急速治之。庶幾得救贖之救火。初起則易殺。至於燎原之勢。不可撲滅矣。其理亦由是也。凡瘡未破。毒攻臍腑。一毫熱藥斷不可用。若已破潰。臍腑既腐。飲食不進。一毫冷藥亦不可用。此是先後次第之要訣也。夫瘡有五善七惡。不可不辨。若動息自寧。飲食知味。一善也。便利調匀。二善也。臍潰腫消色鮮不臭。三善也。神形精明。語聲清朗。四善也。體氣和平。五善也。如煩躁時。噦。腹痛渴甚。泄利無度。小便如淋。一惡也。臍血大泄。厥痛尤其甚惡難近。二惡也。喘促短氣。恍惚嗜卧。三惡也。未潰先黑。入陷面青。黯黑污者。四惡也。肩頸不便。四肢沈重。五惡也。不能下食。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色脫。唇鼻青黑。面目四肢浮腫。七惡也。更有氣噫痞塞。咳逆身冷。自汗無時。目眩耳聾。恍惚驚怪語言顛倒。皆是惡症。五善見三則善。七惡見四必危。五善併至則吉。而安七惡全見必危而死矣。

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深。小按便痛者病淺。按之處凹不復者無膿。按之處即復者有膿。不復者可消。若按之都牽强者未有膿也。按之半軟者有膿也。又手按上下不熱者無膿。若熱其者有膿。凡覺有膿。當破之。無膿但氣腫。若有血慎之慎之。不可針破也。用諸拔

毒之藥敷散四圍臥市軟者此為有膜審也。一邊軟亦可有膜都堅者此為惡核或有氣也都軟者此為有血血瘤也當審堅軟虛實為要若堅疽積久後若更變執偏有軟處當軟處切不可針破也。軟疽者溫燥裹衣置之若針灸刺破不可療也。

雜忌須知

一凡病時心怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌魚羘鴨肉燒酒麯食生冷瓜果醃漬等物瘡口破百日後不作渴延方可入房。  
一凡一切癰疽瘡腫毒痛將好未好之時如往有喪之家弔孝并拜望等項其瘡腫即復發切忌切忌。

用藥治法

一凡癰疽等項大瘡初起一二三日內即服飛騰神駿膏此藥治瘡初起至將潰之際俱可服服後汗出將惡毒盡皆發散腫痛立消其效若神如瘡已潰爛勿服如無神駿膏初起即服槐花酒或十全消毒散二三劑患處即用灸法灸之瘡初出至七日內皆可灸七日外不可多瘡未及灸初起即以灸審焉或以金蟾膏貼之即消至四五日腫痛未消用芙蓉膏敷之立效敷之至七八日作膿將潰未潰之時不得妄破用替針丸頻點瘡頭自然皮破出膿捨自初起至此膿將出未出之際即服真人活命飲一二劑渴下膿血其瘡潰爛用猪蹄湯洗淨以三神膏搽之內服千金內托散以托瘡毒外出間服蟬蠅丸以護膈膜一藥相兼服之勿間不計其數再看潰爛流膿不止此氣襄憊脾胃虧損肌肉不生瘡不破口用猪蹄湯洗淨將生肌散搽上外貼神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕久服自愈好後再服加減八味丸可以絕根庶幾再生若平日無瘡時皆預服之尤為防患於未然也以上治法俱要依次第而行未有不奏效者皆千古發百中之良法也。

○一論飛龍奪命丹乃外科惡毒第一方也諸瘡後

○一論癰疽發背瘻瘍鼠瘻氣瘻等症此專門之方其效捷如奔馬。

飛騰神駿膏

麻黃二斤去節杏仁四兩熱水泡去皮尖用沙井搗爛取一斤涼水同搗汁去濁渣用清汁

防風去根

地骨皮去骨淨四兩

甘草四兩

木鼈子去皮箇十兩

頭髮水洗淨溫

燈草一把

黑鉛一錢

右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用大鐵鍋一口將前藥入鍋內注清水二三桶煮

至五六分看藥水濃時約瀝起藥水另放缸注又將前渣入鍋內再入水一二桶又熬至五六分藥汁又注煎汁內如前法三次

去渣將前二次沫并作一鍋煎至乾去黑鉛頭髮燈草三味不出其味香甜確收財五年不壞遇病每服三錢好熱酒調膏臨卧

服厚被蓋出大汗為度徐徐去被不可被風吹次早用猪蹄燒以汗後恐致虛人以此補之以復元氣好酒調服隨人酒量以醉為度汗出立愈此治瘡毒初起至潰破時則後皆可服神效。  
○一論凡人初覺患癰疽發背已結未結赤熱腫痛即用吳茱萸光以濕紙覆其上立視後其紙光乾處即是結疽頭處取大蒜去皮橫切三丈錢厚安在頭上用太火炷於蒜上炙之三次換一蒜片復炙痛者火至不痛火至痛方住最要早覺早灸為上方發一

二日者十矢十愈。三四日者六七愈。五六日者三四愈。過七日則不可矣。每有十數頭一處生者。用大蒜搗成膏。作餅子。鋪瘡頭上。聚火燒之亦可。若背上初發赤腫肉有一粒黃如粟米者。即用獨蒜切片。如前法炙之。次日去痂膜。自潰矣。

○一論凡癰疽發背。一切無名腫毒初起。

葱蜜膏 生葱生蜜猪胆汁一個。傾石臼內共搗成餅貼患處。日換三四次即消。

金蟾膏 治症同前。生白蟬末五錢。加麝香一分。取活蝦蟇一個去腸肚。同搗爛如泥。四圍留頂出氣。不過一夜即愈。

○一論發背及一切片腫毒不問已成未成俱拔痛者。

槐花酒 槐花四五兩炒黃乘熱入酒一盃。煎十餘沸。去渣熱服。其毒即消。神效。

○一論癰疽發背無名腫毒疼痛。醫所不識。初起壯盛人宜。黑白牽牛各一兩。搗碎。好酒一碗。煎八分。露一宿。次日溫服。大便下膿血即愈。

○一論初起一切惡瘡毒腫疼。痛。丹瘤瘰疬。疔腫。魚口。五發癰疽。初覺一二日。便如傷寒疼痛。煩渴拘急。惡寒肢體疼痛。四肢沉重。恍惚悶亂。坐卧難安。皮膚壯熱。大便閉結。小便赤澁等症。並治妊娠勿服。

千金消毒散 連翹錢 黃芩錢 當歸尾錢 金銀花五錢 皂角刺錢 赤芍錢 天花粉錢 牡蠣錢 防風錢 大黃錢  
芒硝錢 右剉一劑。酒水各半煎服。

○一論腸癰便毒疔腫。初起即消。已腫即潰。血從大便中出。瘡潰後勿服。

加減真人活命飲

又名千金內消散

當歸尾錢

酒洗一

赤芍錢

白芷錢

木鼈子一錢

川山甲三大片

去壳粉炒

金銀花錢

乳香

錢

僵蚕錢

瓜蔞仁去壳二錢

天花粉錢

皂角刺錢

沒藥分

大黃錢

甘草節五

右剉一劑

水酒煎服。

○一論癰疽發背。腫痛如錐剝。不可忍者。發時痛止。

芙蓉膏

芙蓉葉

黃荆子各等分

為末

右二味

入石臼內

搗極爛

用雞子清調敷

患處留頂

如烟起

此方用在未潰之先

或將潰之際

一治癰疽發背已潰爛者。

三神膏

草麻子仁合

陳醋一碗

大鹽一撮

右三味置鍋中

用槐條攪成膏

先將豬蹄湯洗淨

或米泔水洗淨

用雞翎續續掃上

其

○一論諸瘡惡毒。發背癰疽。痛不可忍者。此藥能衛護內膜。驅解諸毒。自然內消。

加味蠟鍼丸

黃蠟一兩

枯白藜兩

乳香一錢

沒藥一錢

雄黃二錢

右為細末

用蠟鎔化為丸。碌砂為衣。如樟子大。每服五十九視

瘡上下。蜜水送下。

○一論癰疽瘡痛皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散外邪流行氣血排膿止痛生肌長肉之劑當用於五六日間已潰未潰而作痛者宜服之。

加味十全內托散

黃氏醫水

人參 當歸酒 川芎 白芍炒

白芷 防風 川厚朴姜 桔梗 官桂

爪葉仁 茄子 金銀花

甘草 即右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血出者及有汗出此藥之功也不問症候

猛烈未成者自散已成者即潰矣○痛甚加乳香沒藥倍當歸芍約。

○一論癰疽潰後淌大補血氣和脾胃托毒外出是為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有起死回生之功但不分經絡不載時令醫者當觸類而長之可也或見腫平痛竈遂以為安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉為他病而危劇者多矣。

收功萬全湯

黃氏蜜水炒二錢五分

人參一錢 白朮一錢去芦炒

白茯苓一錢去皮

當歸身五錢川芎分

白芍七錢酒炒

懷熟地黃一錢官桂

桂枝

白芷 陳皮 甘草

防風 五分 分

右剉一劑生姜一片水煎溫服如作渴加麥門冬五味子

○如煩躁加生地黃

麥門冬

○如有痰加薑半夏

○如泄瀉加厚朴姜炒

○如小便不利加澤瀉

○如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒

○胸膈不寬加厚朴薑炒查肉○右方治癰疽發背諸瘡毒潰爛後毒氣已盡氣虛虛弱不長肌肉不合口膿清砍作餘症宜之

○一論患癰疽發背出膿後脾胃損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沈困無力。

八仙糕

人參去芦 茯苓四兩

乾山藥四兩

艾實去壳四兩

蓮肉去心四兩

不油白朮去芦米泔浸過一宿切片微炒四兩

白糖霜片

白梗米一升水

右將藥末米粉糖霜和一處搓揉極勻師於籠內竹刀劃成小片蒸熟入鍋再焙乾任意食之可也。

斂痛止痛生肌散

宮粉火根黃

黃柏一錢

黃連一錢

乳香一錢

沒藥一錢

孩兒茶各五分

右為末擦瘡上并治下黃水熱泡等瘡

○一論癰疽發背潰爛便要此湯盥洗。

猪蹄湯

當歸一斤赤芍

白芷一錢羌活

露房蜂生甘草

鈴五分

一方加黃芩

○右細剉看瘡大小用約如瘡大加料用之先將猪

猪前蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分為兩次撥去上面油花并下面渣肉每次用藥一兩投於汁中再用大武太煎十數

沸去渣以故紙離寒湯溫徐徐薄貼瘡上死肉惡血隨洗而下洗淨布帛拭乾貼膏藥仍避風忌人口氣吹之有脚臭人并月

經見行婦人及狗大并不許入病人房內洗瘡切不可以手觸者。

○一論一切惡瘡癰疽發背等症此藥能追毒去死肉有膿無頭用此點頭自然皮破出膿。

替針丸

人言為末一錢

硝砂五分

巴豆一錢

乳香三分

沒藥三分

白雄丁香分

右為細末糊為丸如豆大用時以

溫水磨化點瘡頭上神效。

替針散

用木鼈子川烏一味磨水以雞翎蘸掃瘡上留口大

一處出膿如藥水乾再刷上不一時即穿。

一論治癰疽發背潰瘍。大毒不拘已潰未潰俱用此敷貼如腫毒未潰。週數日消如已潰將此敷周圍腫折之處其破口處

以神異膏貼之。每日換兩三次不許見風神效。

二合消毒散 文蛤(延碎炒黑色為末三兩六錢)

輕粉研三

黃柏去皮蜜火為末二兩

寒水石(煅為末一兩)

右藥合為一處用新涼水一半蜂蜜一半調

食不稀不稠如瘡毒尚未開將腫處遍敷之用棉紙覆於上但乾即以水掃之朝夕更換二次如夏月或干時再換一次亦可。若已

破將此藥敷於周圍城腫處正有膿破口處用神異膏滿貼之不必留口亦一日三換。

○一論癰疽發背潰爛又不生肌肉用此立効但此方用之不可太早。

合口收功散 血竭錢 乳香 没藥 輕粉 龍骨五分 赤石脂錢 珠砂 海螵蛸各五 右共為細末散在瘡口上即生

肌肉。

○一論癰疽發背諸瘡毒不拘已成已潰未潰者皆可用之諸毒甚者每日換兩三次中毒換一次其藥力方能勝毒諸瘡溝脹後不長肌肉不合口者神効。

神異膏 歸尾五錢 川芎錢 赤芍二錢 生地黃四錢 防風錢 羌活五錢 白芷錢 玄參錢 黃芪錢 官桂錢 桃仁四個 杏

仁九個

木鼈子十四錢 何首烏三錢 牛子錢 川山甲四錢 峯房三錢 蛇退錢 大黃錢 黃柏錢

四十九節半長一寸

右用芝麻油三斤四兩將藥入鍋內浸春五夏三秋七冬十日以桑柴文武火煎油黑色以穿山甲浮起黑為度搗濾

去渣再熬油滴水成珠陸續下黃丹十四兩柳條攢不住手成膏軟硬得所再下乳香沒藥各三錢風竭三錢降真香木三錢次冷定下射香木二錢水浸二三日去火性攤用。

○一論癰疽瘡毒後及將痊口乾渴甚或生黃及未患先渴此腎水枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故心煩燥作渴小便頻數或白濁陽痿飲食不差肌膚漸削或腿腫脚先瘦服此以生腎水降心火諸症頓止及治口舌生瘡不絕。

加減八味丸

懷生地黃半斤好酒入砂鍋內蒸半日揚膏

山藥兩桂心去皮五錢

石葵(淨肉四兩酒搗勻)

澤瀉切片蒸白茯苓去皮各五錢

遼五味子

二兩

牡丹皮五錢

右為末入石膏加蜂蜜少許丸如梧子大每服一七十丸空心鹽湯送下。

○一凡人久服加減八味丸必肥健而多子晚服此不生癰疽諸毒不患消渴等症。

○一患癰疽之人雖云有熱皆因痛而得之愈後發渴及先渴而後癰疽非八味丸不能治。

○一人病癰疽多有食後發渴而不收者治之惟八味丸最效痘安而渴者服此則渴止痘安而未渴者預服此則永止渴氣血壯盛或未疽而先發渴此不惟渴止痘亦不作。

○一人平日口乾作渴因飲酒食火燒補劑房勞凡若此類過多致令腎水枯竭不能上制心火故有此症後必有消發也宜先服八

味丸以絕其原及癰疽後服此尤有益也。

○一論癰疽發背諸瘡出膿潰爛久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾燥或寒熱往來驚怪少睡以補中益氣湯去柴胡加蒼朮荅門冬神曲五味黃柏少睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白微一錢肉桂五分如膿多或清倍加參芪歸木。

○一加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食是為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令觸類而長之可也或見腫平痛寬遠以為安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉為他病而危劇者多矣。

### 附骨疽

丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之症也又曰環跳空塗不止生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為佐作大料煎入姜汁食前飲之痛甚者恐前藥入數劑發不動少加麻黃一二劑又不動者恐疽將成急掘地坑以火煅坑通紅沃以小便令患者赤體坐於坑中以席或棉衣圍抱下體使熱氣熏蒸腠理開氣血通暢而愈。

○一論瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足少陽經分微侵足陽明經既破漫腫行步作痛或不能行。

○內托黃芩湯 柴胡 連翹 肉桂 大力子 黃芪 當歸尾 黃柏 升麻 白芷 甘草各八分 右剉一劑水酒各一盞煎至一盞食前溫服。

### 一治附骨疽

○黃連消毒丸 黃連 川芎各一 黃柏 黃芩 藥本 防己 桔梗 歸尾各五 生地黃 知母 獨活 防風 連翹各四

○黃芩 人參 甘草 陳皮 蘆木 澤瀉各二 右十九味切作一劑水煎服一老人年七十因寒濕地氣得附骨疽於左腿外側少陽胆經之分微侵足陽明經分潤六七寸長一小尺緊硬漫腫不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至骨內大痛與此藥一服即止次日堅硬腫消而愈。

○一論頑瘡惡毒年久不愈以有附骨在內先用貝母煎湯洗淨刮去腐肉用刀撥去附骨或用蟻螂腦子五六個搗爛敷上其骨即出然後用人言五厘研細末入黃銅燈盞內用好醋一小盞慢火熬乾收起過三日即生出銅綠來研極細用雞翎蘸藥掃瘡上即痛出水腐肉去淨然後用後藥。

○一治諸瘡大疼痛不辨肉色漫腫光色名曰附骨瘡又治瘡口久不合酒調服燒灰各存性

○珍珠象牙膏 楚黃賓江傳 珍珠用豆爵一塊切兩片將殊珠端在內而片合住縛定入水煮三炷香為度研細末一錢 象牙錢一錢 天花粉末一錢 官粉錢一錢 白蠟錢一錢

○香油 鐵 右共合一處入碗內重湯煮化盛成膏紙撲貼患處神效。

三生散 露蜂房 蛇蜕 亂髮等分 右三味燒灰存性研末酒調服一錢七分

腎癰

丹溪曰。腎癰者。腎居小腹之後。在下。此陰中之陰。道遠位僻。雖曰太陽多血氣。運不到。血亦罕來。中年後尤慮重。此纔有腫痛。多之脈症。但見虛弱。便與滋補血氣。可保終生。若無滋補之功。其禍多在結物之後。或半年以來。乃病。多致失手。慎之慎之。

○一論足太陽經中。左右尺脈俱緊。按之無力。尻脣生癰。堅軟腫痛大作。

內托羌活湯 羌活 黃柏酒炒各二錢 防風 藝本 歸尾鉛二錢 二黃五錢 蒼朮米泔 連翹 陳皮 甘草五分 玉桂三分

右剉一劑。酒水同煎。空心溫服。以衣覆蓋患處。使藥力常行。不可去衣。

腸癰

丹溪曰。腸癰常作濕熱。積久入風難治。

千金調腸癰。妄治必殺人。其病小腹重強。按之則痛。小便如淋。時時汗出。復益寒。身皮甲錯。肚腹緊急。如腫之狀。脈數者微有膿也。粟云。洪數已有膿。脈若連緊。煮未有膿。甚者腹脹大。轉側有水聲。或達臍生瘡。或膿自臍出。或大便膿血。急服蠅蠅丸酒下。兼進後方。

○一論腸癰便毒癰疽。初起即消。已腫即潰。血隨大便中出。且用

千金內托散方見癰疽加人活命散

○一論肚內生癰及癰疽惡毒。宜用

內消沃雪湯 當歸身 白芍 黃芪 甘草 即射干 連翹 香白芷 貝母 陳皮 皂角刺 乳香 没藥穿山甲 天花

粉 金銀花 木香 青皮

甚者加大黃。右剉酒水煎服。秘方是世所奇。投之如神。

○一論腸癰脹痛不安。或腹滿不食。小便赤。婦人產後虛熱。多有此疾。但疑惑間。便不服。服亦愈。視其右闊脈芤者是也。薏苡仁兩。牡丹皮一兩。瓜蒌仁一兩。右剉一兩水煎。一方加川芎桃仁。

○一婦人腹痛如錐刺。每痛至死。不敢著手。六脈洪數。此腸癰毒也。用穿山甲炒 白芷 貝母 瘤瘡 大黃 右剉一大劑。水煎服。打下膿血。自小便中出。即愈。後再無患。宜少食煎炒熱物。

○一治癰日久。潰爛出膿。腹內刺痛不可忍者。用鐵打一尺長三棱針。將鴟腸一條。貫針在內。將鴟針曲轉。輕輕送入糞門內。送到痛處。方是瘡癰之處。即將鴟腸扯動。針尖出。刺破其毒膿。隨針而出。用手重按痛處。膿出盡而愈。此仙傳祕法也。

囊癰

丹溪曰。囊癰者。濕熱下注。也有作膿者。此濁氣順下。將流入滲道。因陰道或虧水道不利。而然膿盡自安。不藥可也。惟在善於調攝耳。

又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊膜裂開。翠丸散出以輔皮末敷之外以紫蘇葉裹仰卧養之。

○一論癰疽入囊者。曾治數人。由濕熱入肝經處治而用龍膽草佐之。雖膿潰皮脫翠丸不死。

○一方用野紫蘇葉面青背紅是也。焙乾為末敷之。如燥者以香油調敷。囊無皮者外以青筠葉包之。其皮自生也。

### 懸瘤

○一論懸瘤。此瘡生穀道外腎之間。初發甚庠狀如松子。四十日赤腫如松治遲則破而大小便皆從此出不可治矣。

國老湯 用橫紋大甘草一兩截長三寸許。取出山洞中流水一碗不用井水河水以甘草蘸水。大武火慢煮。不可性急。須用三時久。俟水盡為度。剪去草中濶透却以無灰酒二碗煮至一碗溫服。一日一服半月消盡為度。

將軍散 大黃(炮) 茵母 白芷 甘草節 右為末酒調空心服。○虛弱加當歸一半。

○一論肝經濕熱。玉芝患癰或便毒。懸瘤囊腫腫頑或潰爛作痛。小便澁滯或翠丸散。

龍胆瀉肝湯 龍胆草(酒炒) 澤瀉(一錢) 車前子(炒) 木通 生地黃(酒炒) 當歸尾(酒) 山梔(炒) 黃芩(炒) 甘草 右挫一劑水

煎空心服。

### 瘰疬

瘰疬屬血氣痰熱必起於少陽一經。不守禁忌。延及陽明。大抵貪味之厚。蓄氣之積。曰風曰熱。皆此二端。扼引變換。須分虛實定。者易治。虛者可慮。此其胆經主決斷。有相火。且氣多血少。婦人見此。其月經如期不作。寒熱者易治。積久轉為潮熱危矣。自非斷然食淡。

神仙不治也。

○一論瘰疬者。經所謂結核是也。或有耳前後連及頤領。下連缺盆。皆為瘰疬。或在胸前。及胸之側。下連兩腋。皆為馬刀。半足少陽主之。獨形而小者為結核。續數連結者為瘰疬。形長如蛇者為馬刀也。

○一論遠項起核名曰蟠蛇。延及胸前。連腋下者。名曰伏膝。左耳根腫核者。名曰蠅袋。右耳根腫核者。名曰蜂窩。瘰。

○一論瘰疬馬刀。生耳前後。或項下。腋腋間。累累如珠者。未破已破皆治。

○一論瘰疬堅湯。當歸(錢) 白芍(錢) 黃芩(錢) 立參(六分) 天花粉(六分) 連翹(五錢) 柴胡(一錢) 黃芩(五錢) 牛子(分) 龍膽草(四

分) 桔梗(一錢) 陳皮(八分) 差活(七分) 薄荷(四分) 海昆布(八分) 甘草(四分) 右剉一劑。生薑取服。一方加甘草節。如意貝母海藻更佳。

升陽調經丸 升麻(八錢) 葛根(五錢) 珊(一錢) 連翹(五錢) 黃連(五錢) 黃芩(五錢) 生黃芩(四錢) 黃柏(酒炒) 五錢) 桔梗(五錢) 歸尾(一錢) 三苓

三錢) 蒜(酒炒) 胆草(五錢) 甘草(錢) 五錢) 右藥杵一半。另研為末。煉蜜為丸如菉豆大。每服一百二十丸。白湯下。一  
半作明片。每服五錢。水煎服。半月即痊。

○一論久患瘰疬流注以致血氣兩虛懷抱抑制飲食少或四肢患腫肉色不變或日晡發熱或潰而不癥久不愈者

益氣養榮湯

黃芩  
人參

白朮  
當歸酒

川芎  
白芍

懷生地黃

陳皮  
香附

貝母各一錢

柴胡  
地

骨皮  
桔梗

甘草各五分

右剉一劑水煎服

如有瘻加橘紅

如脇下刺痛加青皮或木香

如午後有熱或頭微汗加

炒黃柏

如膿水清倍人參黃芩當歸

如女人右鬱氣胸膈不利倍用香附貝母

○如月經不調加牡丹皮當歸

○一論瘰疬兼諸瘤皆治

抑氣內消散

當歸  
川芎

白芍炒

白朮去芦炒

青皮  
陳皮

半夏姜  
桔梗

羌活  
獨活

厚朴姜

防風  
黃

芩  
烏藥  
香附

桔梗各一錢

蘇子一兩

沉香錢

木香  
人參

粉草各五分

右剉水煎溫服十餘服即消若再發照分兩

製為末酒糊為丸如梧子大每服五十丸酒送下

○一論瘰疬未破在左為瘰疬宜

內消調經散

山東李西嶺傳

升麻  
葛根

龍胆草  
黃連

桔梗  
連翹

黃芩  
黃柏

莪术  
三棱

甘草各五分

當歸  
當歸

半夏姜  
桔梗

連翹  
黃連

紅花  
右剉一劑水煎熟服

○一論瘰疬已破宜

柴胡通經湯

柴胡  
連翹

歸尾  
甘草

黃芩  
鼠枯子

三苓  
桔梗各二錢

黃連  
紅花

右剉水煎熟服

○一論瘰疬已破者

補中勝毒湯

黃耆各一錢

人參各三錢

當歸  
生地黃

熟地黃  
白芍各三錢

陳皮各三錢

升麻  
柴胡各五分

連翹各一錢

防風各五分

甘草各五分

草伍  
右剉水煎熟服

○一治療癰并頭頂結核或腫或瘍或宜夏枯草水煎食後頓服

○一方用夏枯草一把水煎三次去渣熬成膏貼患處立消。

○一治療癰元氣無虧用此以去之若瘍既去而不收斂服前無氣養榮湯當元氣怯弱宜先補後服瘍毒已後仍服前湯疾無他疾

此方治瘰疬未成者消已消者須元氣壯者可服

必効散

南硼砂半錢

輕粉一錢

射香五分

巴豆皮五箇去心用

白檳榔一錢

斑蝥四十枚去頭足用

右研極細末

取雞子二個去黃

用清調散仍入壳內以濕紙數重糊口入飯甑蒸熟取出曝乾為末每服五分用炒生姜酒五更初調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從大便出。

○一治遠年鼠廩瘡神方

千搗綠雲膏

松香半斤  
冰糖去渣

乳香一錢  
沒藥半錢

血竭一錢  
銅綠半錢

杏仁一錢

孩兒茶分

草麻子去壳二兩

麻油兩

乳汁一盞

右為細末

合作一處

同乳汁油攬

勻搗千下

成膏用絹上藥

貼患處

○一婦人患癩瘡。久而不愈。或以為木旺之症。不宜於春預用散腫潰堅湯。脾硬甚。余以為肝經虧損用六味丸。補中益氣湯。李春而愈此症。若肝經風火自病。元氣無虧。可用散堅瀉青之劑。若肝自虧損。或水不生用六味丸。若金來耗水。須補脾土。生腎水。若行攻伐。則脾胃傷。而反致水耗土矣。

○一婦人項核腫痛。察其血虛。當先以必効散。一服去之。更以益氣養營湯。三十餘劑。補之而消。蓋此症初起。而血氣虛弱者。先用益氣養營湯。待其氣血稍充。乃用心効散。以去其毒。仍用補約無不奏効。若已成瘍者。即針補而托之。創復而核不消者。服散堅之劑。倘不應。而氣血如故。仍以必効散。養營湯。又不應。又肘大肩鵝二穴。用千搗綠雲膏。白愈。若氣血壯實。不用追餌。亦能自傷。用約以腐之者。便易於收斂耳。若血虛而用追餌。不惟無益。適以取敗。凡不慎飲食七情者。不治。

疔瘡

失疔瘡者。由四時迭更。陰陽交發。此三氣互相激怒。必成暴氣。然暴氣辛烈。大風大霧。大寒大熱。若不能避。而遇襲於皮膚。入於四體。傳注經絡。遂使腠理結滿。陰陽二氣不得宣通。遂成疔瘡。但疔毒之名有十三種。必發於手足間。生黃泡。其中或紫色。有一帶紅線。道直入者。用針於線處刺之。每血水針時。以知痛出血為妙。否則紅線入腹。攻心。必致危困。凡治疗毒。先以麪漿水飲之。吐則是不吐。則非也。大抵脈洪而數者難愈也。

○一治疗疔瘡。毒神効。

飛龍奪命丹。諸觀

○一治疗腫及無名瘡毒。搗頭白水。以穿頭搗神効。

○一治無名腫毒。疔瘡。手指無故生蛇頭指。腫痛不可忍。有紅筋入心者。蜈蚣一條。歸尾二錢。雄黃一錢。土赤芍二錢。白芷梢二錢。

右判為木頭生酒悶服神効。

○一論一切惡毒疔瘡。諸般無名腫毒。及四時傷風傷寒。增寒壯熱。無汗。初覺者。

趙府小靈丹。乳香。沒藥。輕粉。血竭。硃砂。川烏。大草烏。大細辛。巴豆霜。蟾酥。射香。右為細末。糯米糊為丸。如黃米大。雄黃為衣。每服十三丸。小兒五七丸。用恐白三根。劈開入丸。在內細嚼。封酒送下。以避蓋出汗避風。婦人有孕不可服。

○一論一切疔瘡。惡毒。腫痛。神方。

類聖散。川烏。草烏。蒼术。細辛。白芷。薄荷。防風。甘草。右為細末。蜜清調。塗患處。留頂。

○一凡患疔瘡癰疽毒。此約能令內消去毒。化為黑水。從小便出。萬無一失。不可輕視。知母 貝母 白芨 半夏 天花粉  
皂角刺 金銀花 穿山甲炒 乳香各一 右剉一劑。用無灰酒一碗。煎至半碗去渣。作一服。溫服。不得加減。再加渣搗爛。加  
秋過芙蓉葉一兩。搗爛用蜜調井花水。和敷瘡口上。如乾再用蜜水潤濕過。一宿自然消。不必用第二服藥也。忌發物。  
○一人脚面生疔。形雖如粟。其毒甚大。宜峻利之藥攻之。因其怯弱。以隔蒜灸五十餘壯。痒遂止。再灸一時。乃知痛更用膏約封貼。再  
以人參敗毒散。濃糊。天至陰之下。道遠位僻。且怯弱之人。用峻利之劑。則約力未到。胃氣先傷。虛弱禍有所不免。不如灸之為宜。

### 便毒

便毒一名騎馬癰。此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分野。其經多血。又名血癰。或先有疳瘡而發。或卒然起核疼痛而發。皆熱鬱  
血聚而成也。初發宜疎利之。即散或膿後。如常用托裏內補之藥。

○一論便毒。是厥陰經濕熱因勞倦而發。用射干三子。以生姜煎食。則服得利。二三行立效。射干開紫花者是。

### 一論便毒極効力

追毒散 當歸尾 赤芍 白芷 全蝎 金銀花 天花粉略一 白僵蚕炒六 木鼈子酌二 川山甲片 大黃錢 芒硝錢 一方加

五靈脂更妙。右剉一劑。好酒煎露一宿。五更熱服。厚蓋發汗利一二行。即愈。其硝黃待裏。要將熟方入。再二沸用之。○一方加

射干至硝。

### 一論魚口便毒方

神異方 金銀花 天花粉 木鼈子略二 甘草分 連翹 黃芩略八 山梔子分 川山甲片 大黃錢 芒硝錢 一方加

黃芩 右剉一劑。酒水煎空心服。

○一治便毒腫痛神方 徐完愚傳 大黃 全蝎 蟬退 僵蚕 穿山甲土炒 白芷梢 貝母 當歸尾略二 皂角刺錢 木香分 大

前後加入大黃再煎二沸。去渣入好生酒同服。如未散。加蜈蚣一條。同煎服。

○一治魚口瘡方 用豬胆一枚。投熟酒一碗。溫服。即內消。

○一治魚口便毒方 木鼈子去壳 巴豆去壳 墓頭草二箇 川山甲炒四 僵蚕三 五倍子十五個 右為末。黃酒調下。

○一治魚口便毒方 陳雲岳傳 僵蚕炒三十 川山甲土炒 蜈蚣二 甘草節一錢 大黃三錢 杏仁去皮尖一錢 五靈脂二錢 全

蝎一錢 皂角子炒一錢 金銀花錢 右剉一劑。酒水半煎服。

### 下疳

下疳瘡。乃男子玉莖生瘡。皆因所欲不遂。或交接不潔。以致邪毒侵瀆。發成瘡毒。日久不愈。或成便毒。或損爛陽物。多致危篤。又魚口

瘡。妒精瘡皆其類也。俗云痘瘡未已便毒瘡生也。

妬精瘡此蓋因婦人陰中先有宿精因而交接虛熱兼蒸即成此疾初發在陰如粟類拂之甚痛兩日出清膜作白孔蝕之太痛婦人有生於玉門內正似疳蝕痛不痛為異耳。

消疳敗毒方 防風六分 獨活六分 柴胡五分 連翹分 荆芥分 黃柏分 知母分 黃連分 赤芍分 蒼朮分 赤茯苓分

木通分

龍胆草九分

甘草分

右剉

一劑

燈心二十四寸

水煎空心服

如有使毒量人虛憲加大黃一二錢煎服。

○一治下疳瘡 天靈蓋(壞) 紅褐

小紅棗(蜜燒存性)

右為極細末

先用好細茶煎濃洗淨摻之。

○一治下疳痛不可忍如神 宮粉(壞)五分

冰片分

水銀三分

用錫

右為細末摻瘡上。

○一治下疳潰爛 珍珠(壞存性) 片腦分一 人手指甲

足指甲(燒成灰)

血餘(燒成灰)

右為細末摻患處。

○一薰下疳方 皮硝一 乳香 雄黃分一 孩兒茶各五分

右入小蟬內外用牛糞火煨熟撚其謂白化薰之晚上使以心口涼為度。

八寶丹 乳香 没藥 孩兒茶 紅褐子灰 海巴(壞)一 珍珠炒 象牙(壞)一

黃柏(以猪膽塗上火)二分 碎砂分 孩兒茶分 冰片分

輕粉二分

水銀分

右共為細末撒患

處○如從一邊爛起加狗骨燒灰二分○如從周圍爛起加鼈壳燒灰二分。

一方疳瘡秘方

○一疳瘡膿清不結痂不合口久不愈着用 上神效。

○一疳瘡清不結痂不合口久不愈着用 上神效。

六味地黃丸加黃柏知母麥門冬四五劑而愈。

○一治下疳瘡 摘約 陳鍾岳傳 冰片分 珍珠三箇

黃柏(以猪膽塗上火)二分

蘆薈分

輕粉分三

天靈蓋(壞白)一分

右共研

細末擦患處如有脓清油調搽。

○一治疳瘡 黃柏去皮以猪胆汁透為末摻瘡上。

○一治陰囊上生瘡 用甘草煎水溫洗却用臘茶末敷之。

○一治妬精瘡 用大田螺兩個壳壳燒過存性為末輕粉敷之。

○一治外腎生瘡 用菉豆粉一分蚯蚓屎二分水研塗乾又敷。

○一治脅脛風熱瘡瘍用紅椒去目水浸半日和生杏仁研爛擦兩手掌外腎極効。

○一治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便澁食亦減身亦微腫馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻敷上。

○一治下疳瘡白礬兩黃丹八錢熟蜜紫色右研為細末以溝渠中惡水洗過拭乾敷上。

○早間服一碗調約末四厘午間服一碗調前約末四厘晚間服一碗調約末四厘一日服三次共一分二厘十日服盡其瘡必愈其猪蹄隨用之忌動風發物牛肉燒酒最忌之神良之秘方也。

### 楊梅瘡

夫屬瘡者一名楊梅瘡因形相似乃名之。故堅實凸起又名棉花瘡血受之其形扁塌而潰又名果子瘡亦類其貌而俗呼之也。北又曰天之瘡皆一名異而寔同源如瘡當別自取者重傳染者輕蓋自致者必因淫慾大妄以致陰處起火及恣口縱味三集皆熱精竭血結遺滯諸經而成者也俗傳以母猪大羊肉雞鯉毒物發出謂毒盡殊不知在火上添油矣又有怕露出而求速效者過服敗毒散則傷五內胃氣毒益留伏以約線裹蒸致使出不得收不能收延潰不能杜絕手足心皮枯似白蠶掌風皮後筋骨疼痛風頭惡候皆獲良治而未然也凡遇此患托裏解毒湯外用千里光明湯煩煩洗浴大效。

托裏解毒湯當歸一錢川芎一錢赤芍一錢生地黃一錢連翹一錢黃芩一錢黃連酒炒一錢防風一錢荆芥穗一錢

羌活一錢

薏苡仁一錢

皂角子一錢

防己一錢

木瓜五錢

生甘草一錢

土茯苓一兩

虛弱人加人參一錢

自生者加黃柏一錢用牛膝一錢用獨活一錢宣服二十帖每帖煎三次一日服一帖。

千里光明湯青木香黃連黃柏黃芪防風荆芥苦參蒼耳子蛇床子羌活升麻麻黃甘草各五錢

腸草根凍青葉焰

右作一劑用布包水煮於無風處服此煎藥即以此湯冷洗涼了又加熱約湯煮熟煮滾微汗拭乾十日

後不必頻洗其約淹井入煎約淹再洗雞腸草一名千里光明草又名千里明俗名藤枯賣其葉稍尖而岐開花白色處處有之。

○一治楊梅瘡初起先服防風通聖散十餘劑後服此收功永無後患。

十全丹雲米弟驗雄黃朱砂乳香沒藥孩兒茶當歸白芷丁香槐角鉛一錢粉用花椒八分

未飯為丸如黍豆大每服三十九土茯苓湯下。

○一治楊梅瘡光服防風通聖散加蜜草一兩同煎服後服此服驗十九

白鮮皮一兩

皂角子一百二十個

防風二兩

細辛三錢

川烏一兩

右為細

兩草烏個當粟壳四兩

右剉十劑每劑用土茯苓一斤豬肉半兩同煎服。

○一治楊梅瘡黃左川博連翹四兩金銀花四兩牙皂二兩杏仁研斷肥珠子三十個蟬退二十箇冷飯團一斤右俱剉用酒

拌炒作十帖水煎服。

○一治楊梅瘡毒。黃仰溪傳。青藤一兩當歸尾二錢皂角刺二錢金銀花五錢五加皮二兩白鮮皮二兩右剗分作十二劑每剗用土茯苓十二兩水煎服先服通聖散。

○一治楊梅瘡良方。南塘侄驗。漢防已錢槐花鉢二錢五倍子四錢右三味為末用土茯苓半斤研爛豬肉半斤切碎共作一服用酒煮熟連渣并肉通服。

○一治楊梅瘡良方。胡雲齋傳。歸尾一兩三錢牛膝一兩三錢黃芩一兩三錢大黃三錢木瓜兩金銀花二錢皂角刺八錢蟬退錢土茯苓二錢右剗分作十帖每帖用紅棗白果皂角子各十枚葱白三根水煎臨晚服心安。

○一治天泡瘡神方。用鐵秀釘醃醋磨濃搽瘡上立已。

○一論凡人患楊梅天泡棉花等瘡致成一切難狀之疾或楊梅瘡爛見骨經年不收口者或筋骨疼痛舉發無時或遍身疙瘩不消或手足皺破出血或遍身起皮發靚村一層起一層或赤癰白癰發掌風癰或皮好骨爛口臭難當及年久膿瘡不愈一切瘡瘍惡毒皆神効。

通仙五寶湯 鍾乳粉三分大朱砂五分琥珀一厘一分冰片五厘珍珠五分右為細末用白飛麪炒三分共一錢二分分作十二帖每一日一帖用一分用土茯苓一斤水煎十二碗每清晨用半碗和服共十二碗一日俱要吃盡不可別用余湯一日一服有不盡勦而愈者有終創而愈者如病重未愈須再服料忌鵝魚牛羊發物及房勞。

○一忌楊梅風塊作痛作腫及癰疽瘰疬毒一切無名腫毒。

黑虎膏 草烏兩南星二兩半夏二兩五倍子五兩同米共炒焦大黃二兩黃柏 姜黃一兩乾生姜錢右共為細末共和匀用葱汁米醋調成膏貼塊上時常以葱醋潤之毋令乾燥其膏一日又取下如此新的復研再貼以消為度。

○一楊梅瘡創後遺鮮毒一層一層頑皮痒不可當 牛油 柏油 香油 黃蠟溫入古三味待銀硃五錢官粉錢射香粉右為末入內和匀先將火搗鮮令痒扒破擦上藥再搗再擦如神丸作一百個每早茶下十九忌葷鹽要鹽戒。

○一治楊梅瘡 雄黃二錢真輕粉錢杏仁去皮尖三十箇右研為細末入杏仁再研如泥用雄猪胆汁調擦瘡要先洗淨拭乾擦約二三日效。

○夫疥與癬也。患於皮膚之所致。風毒淨淡者為疥。心毒之深沈者為癬也。多因風寒熱得之。亦發於手足趾間遍身。則肌內癰瘍或圓或針或如芒刺走散。內藏汗而外藏有道曰乾癬。苔癬。風癬。濕癬。四者莫不均有癥者。去癬去風殺蟲是也。

○一論風瘡疥癬。應參紫白癰風。赤遊風。血風疊瘡。丹苗。及破傷風在上部者。加桔梗一錢。在下部者。加木瓜。牛膝各一錢。如濕者成患而在下。去蟬退殼盒。

○祛風敗毒散 枳實 赤芍 前胡 柴胡 各三 荆芥 薄荷 牛蒡子 獨活 蒼朮 各六 瘰瘡 連翹 各七 川芎 茅活

絡八 蟬退 甘草 各三

右剉一劑。生姜三片。水煎服。

○一薰疥如掃 銀朱錢 雄黃錢 木鼈子同 好欗香一根 艾葉錢

右五味為末。以紙捲條。陰陽互感。薰兩膀胱。以被蓋之。留頭面在外。先以布包裹二便。

○一治薰瘡疥虫瘡。花椒 雄黃 祈父

右三味共為末。將紙捲筒放被內薰之。

○一洗疥如神。防風 荆芥 馬鞭草 白芷 花椒 苦參 野菊花

右剉水煎湯洗神效。

○一治疥如神。徐金坡傳。大楓子錢

水銀渣三錢 潭腦五分

右用油核桃同搗爛。綢帛包擦疥上。

○一薰疥妙方。油桃去核。去皮。留一半。搗爛入人參末八厘撮。匀。仍合一處。放瓦上火燒烟薰之。即已。

○一治諸瘡疥癩。一掃光。又名玉繡球。大楓子肉四十

杏仁泡去皮四十個

花板去子四十九箇 白藜母用另研

水銀錢三錢 茶葉一錢另研未

樟腦二錢另研

輕粉錢一

右和。再研。聽用。光以槐柳桃楮桑木枝煎湯洗。疥瘡將前乾。重疥多小角。用柏油入鹽少許。

○乘熱和約擦上。一日搽三次。忌羊雞魚猪頭等物。

○一治乾疥瘡。香油四兩。用花椒一兩。熬至焦黑。研爛。入大楓子去壳七個。輕粉三錢。硫黃一錢。人言三分為末。入油內搽之。

○十香膏 白凡炒 輕粉 水銀 雄黃 川椒去子

樟腦各一錢 桀榔研末 杏仁四十箇去

大楓子去皮內研。右共和。用柏油八錢。俱入乳鉢內研至。不見水銀星為度。尤如彈子大。待瘡疥痊將。約丸於患處。塗過。

○一治遍身風痒生瘡疥。土蒺藜苗湯洗之。

○一治人生皮風疥瘡癩痒。藜蘆根為末。脂油調搽即愈。

○一風癬濃疮。疥癩血風諸瘡腫毒。歸尾五錢

赤芍 黃芩 黃連 黃柏錢一錢

大黃錢三錢 防風錢一錢 金銀花 茜草錢一錢

用柏油八錢。俱入乳鉢內研至。不見水銀星為度。尤如彈子大。待瘡疥痊將。約丸於患處。塗過。

○盛在內用紙蓋口。勿令泄氣。用時擦手心內。以昇聞數日。即已。或擦亦可。

癬瘡

○一風癬濃疮。疥癩血風諸瘡腫毒。歸尾五錢

赤芍 黃芩 黃連 黃柏錢一錢

大黃錢三錢 防風錢一錢 金銀花 茜草錢一錢

用柏油八錢。俱入乳鉢內研至。不見水銀星為度。尤如彈子大。待瘡疥痊將。約丸於患處。塗過。