

醫宗金鑑

婦科心法要訣
痘疹心法要訣
種痘心法要旨

幼科心法要訣

種痘心法要旨

清 吳謙等編

醫宗金鑑

婦科心法要訣
痘診心法要訣
種痘心法要旨
幼科心法要訣

人民衛生出版社影印

医宗金鉴(四)

妇科心法要诀 幼科心法要诀
痘疹心法要诀 种痘心法要旨

开本: 850 × 1168/32 印张: 12 1/8

清 吳 謙 等 編

人民卫生出版社影印

(北京書刊出版業營業許可証出字第〇四六號)

•北京崇文區棧子胡同三十六號•

五三五工厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

統一書号: 14048·0990

1956年12月第1版—第1次印刷

定 价: 1.30 元

1962年3月第1版—第8次印刷

印数: 73,501—80,500

內容簡介

「婦科心法要訣」、「幼科心法要訣」、「痘疹心法要訣」、「種痘心法要旨」四書，都是「醫宗金鑑」的一部分，原書卷次是四十四卷至六十卷（原書共有九十卷）。

「婦科心法要訣」，主要是論述中医婦科四大症，即胎、產、經、帶，因此在內容方面包括有各種婦科疾病的診斷和治療，而且都是比較重要的，故可作為研究中医婦科學的參考書。

「幼科心法要訣」是一本較簡明的中医兒科學，但內容仍然很豐富，首列新生兒護理法，次叙小兒各種主要和常見的病症，並全面地介紹了治療方法，所以對研究中医兒科學，是很有參考價值的。

「痘疹心法要訣」是一本關於痘疹的專書。中医對痘疹（包括天花、麻疹等）的治療，具有獨特的經驗。因為研究中醫對痘疹的認識，可以豐富我們對某些急性傳染病的醫療知識。故本書在今天有它一定的參考價值。

「種痘心法要旨」是專論「鼻苗」種痘方法。

以上四書，都是採取歌訣體裁，便於誦記，也為共同特點之一。

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣目錄

調經門

婦科總括

天癸月經之原

婦人不孕之故

月經之常

月經異常

外因經病

內因經病

不內外因經病

血色不正病因

氣穢清濁病因

愆期前後多少病因

經行發熱時熱

經行寒熱身痛

經行腹痛

經行瀉吐

錯經妄行成吐衄崩

經水過多兼時下白帶

調經證治

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七味白朮散

參苓白朮散

歸脾湯

逍遙散

八珍湯

十全大補湯

雙和飲

人參養榮湯

理中湯

四物湯

桂枝四物湯

麻黃四物湯

柴胡四物湯

玉燭散

先期證治

芩連四物湯

地骨皮飲

膠艾四物湯

芩木四物湯

桃紅四物湯

當歸補血湯

聖愈湯

薑芩四物湯

佛手散

過期證治

過期飲

雙和飲

聖愈湯

人參養榮湯

經行發熱時熱證治

加味地骨皮飲

六神湯

逍遙散

經行寒熱身痛證治

羌桂四物湯

逍遙散

黃耆建中湯

經行腹痛證治

當歸建中湯

加味烏藥湯

琥珀散

大溫經湯

吳茱萸湯

經行吐瀉證治

參苓白朮散

理中湯

七味白朮散

香砂六君子湯

錯經妄行吐衄崩證治

三黃四物湯

犀角地黃湯

經閉門

血滯經閉

血虧經閉

血枯經閉

經閉久嗽成勞

婦人經斷復來

室女經來復止

師尼室寡經閉

血滯經閉證治

三和湯

吳茱萸湯

琥珀散

四物湯

血枯血虧經閉證治

六味地黃湯

玉燭散

養榮湯

十全大補湯

經閉久嗽成勞證治

切勞散

婦人經斷復來證治

芩心丸

益陰煎

十全大補湯

八珍湯

逍遙散

歸脾湯

室女師尼寡婦經閉證治

大黃蘆蟲丸

澤蘭葉湯

栝子仁丸

逍遙散

婦病難治

診看婦人須先問經期妊娠

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣

調經門

婦科總括

男婦兩科同一治。所異調經崩帶癥。嗣育胎前並產後。前陰乳疾不相同。

註婦人諸病。本與男子無異。故同其治也。其異於男子者。惟調經經閉。帶濁崩漏癥瘕。生育子嗣。胎前產後諸病。及乳疾前陰諸證。不相同耳。故立婦人一科。以分門而詳治焉。業是科者。必先讀方脈心法諸書。然後讀此。自有豁然貫通之妙。

天癸月經之原

先天天癸始於父母。後天精血水穀生。女子二七天癸至。任通衝盛月事行。

註先天天癸。謂腎間之動氣。乃稟自父母。資其始也。後天精血。謂水穀之所化。得之形成之後。資其生也。經曰。女子一七而腎氣盛。謂腎

間動氣盛也。二七而天癸至。謂先天癸水中之動氣至於女子胞中也。衝爲血海。任主胞胎。衝任皆起於胞中。所以任脈通太衝脈盛。月事以時下。故能有子也。

婦人不孕之故

不子之故。傷任衝。不調帶下。經漏崩。或因積血胞寒熱。痰飲脂膜病子宮。

註女子不孕之故。由傷其任衝也。經曰。女子二七而天癸至。任脈通太衝脈盛。月事以時下。

故能有子。若爲三因之邪傷其衝任之脈。則有月經不調。赤白帶下。經漏經崩等病生焉。或因宿血積於胞中。新血不能成孕。或因胞寒胞熱。不能攝精成孕。或因體盛痰多。脂膜壅塞胞中而不孕。皆當細審其因。按證調治。自能有子也。

月經之常

月經三旬時一下。兩月並月三居經。一年一至爲避年。一生不至孕暗經。

註女子陰類也。以血爲主。其血上應太陰。下應海潮。月有盈虧。潮有朝夕。月經三旬一下與之相符。故又謂之月水月信也。女子月經一月一行者其常也。或先或後。乃其病也。然亦有兩月一行。謂之並月者。有三月一行。謂之居經者。有一年一行。謂之避年者。有一生不行而依然能孕育。謂之暗經者。此所稟之不同。而亦非病。不須治也。

月經異常

經期吐血或衄血。上溢妄行曰逆經。受孕行經曰垢胎。受孕下血漏胎名。

註婦女月經一月一下。此其常也。若經行而吐血衄血。上溢妄行者。是謂逆經。有受孕之後。月月行經而產子者。是謂垢胎。有受孕數月。其血忽下而胎不隕者。是謂漏胎。此皆月經之異乎常者也。

外因經病

天地溫和。經水安。寒凝熱沸。風盪然。邪入胞中。任

衝損。婦人經病本同參。

註經曰。天地溫和。則經水安靜。天寒地凍。則經水凝泣。天暑地熱。則經水沸溢。卒風暴起。則經水波湧而隴起。六淫之邪入於胞中。則損傷衝任。故婦人經病本此同參也。如寒則血凝。熱則血沸。風則血盪然波湧而大下。亦猶經水之被寒熱風而不得安瀾也。

內因經病

婦人從人不專主。病多憂忿鬱傷情。血之行止與

順逆。皆由一氣率而行。

註婦人從人凡事不得專主。憂思忿怒鬱氣所傷。故經病因於七情者居多。蓋以血之行止順逆。皆由一氣率之而行也。

不內外因經病

血者水穀之精氣。若傷脾胃何以生。不調液竭血枯病。合之非道損傷成。

註血者水穀之精氣也。在男子則化為精。在婦人則化為血。上為乳汁。下為月水。若內傷脾

胃。健運失職。飲食減少。血無以生。則經必不調。亦有女子天癸既至。踰期不得與男子合。未期思與男子合。與夫經正行時而合。此皆合之非道。亦致不調。或過淫合多。則液竭。產多乳衆。則血枯。亦皆能損傷陰血。致成經病也。

血色不正病因

血從陽化。色正紅。色變紫黑。熱之徵。黃泔淡紅。濕虛化。更審瘀塊。黯與明。

註血屬陰。從陽化。故其色以正紅為正。雖有經病。亦易為治也。若色變深紅紫黑。乃熱之徵也。或黃如米泔。乃濕化也。淺淡紅白。乃虛象也。更當審其有瘀有塊。色黯色明。以治之。若黯而紫黑。兼見冷證。多屬寒凝。若明而紫黑。兼見熱證。多屬熱結也。

氣穢清濁病因

熱化稠黏臭。必穢。寒化清澈臭。則腥。內潰五色有膿氣。時下而多。命必傾。

註 凡血為熱所化。則必稠黏臭穢。為寒所化。則必清澈臭腥。若是內潰。則所下之物雜見五色。似乎膿血。若更有臟腐敗氣。且時下不止而多者。是危證也。其命必傾矣。

愆期前後多少

經來前後為愆期。前熱後滯有虛實。淡少為虛。不脹痛。紫多脹痛屬有餘。

註 經來或前或後。謂之愆期。皆屬經病。經來往前趕日不足三句者。屬血熱。若下血多。色深紅而濁。則為有餘之熱。若下血少。色淺淡而清。則為不足之熱也。經來往後退日過三句後者。屬血滯。若色淺淡。血少不脹痛者。則屬氣虛。血少滯滯不足之病。若色紫。血多。腹脹痛者。則屬氣實。血多瘀滯有餘之病也。

經行發熱時熱

經行發熱時潮熱。經前血熱。經後虛。發熱無時。察客熱。潮熱。午後審陰虛。

註 經行發熱。時熱潮熱之病。若在經前。則為血

熱之熱。經後則為血虛之熱。發熱時熱多是外感。須察客邪之熱。午後潮熱多屬裏熱。當審陰虛之熱也。

經行寒熱身痛

經來寒熱身痛。當分榮衛與虛實。有汗不脹衛不足。無汗而脹榮有餘。

註 經來之時。惡寒發熱。身體疼痛者。當分榮衛虛實。若發熱惡寒。身痛不脹而有汗者。屬衛虛榮不足。若發熱惡寒。身脹痛而無汗者。屬榮實衛有餘也。

經行腹痛

腹痛經後氣血弱。痛在經前氣血凝。氣滯腹脹血滯痛。更審虛實寒熱情。

註 凡經來腹痛。在經後痛則為氣血虛弱。經前痛則為氣血凝滯。若因氣滯血者。則多脹滿。因血滯氣者。則多疼痛。更當審其凝滯作脹痛之故。或因虛。因實。因寒。因熱。而分治之也。

經行瀉吐

經行泄瀉是脾虛。鴨溏清痛乃寒濕。胃弱飲傷多嘔飲。食傷必痛吐其食。

註 經行泄瀉乃脾虛也。若鴨溏冷痛是寒濕也。

經行嘔吐是胃弱也。若嘔出涎飲。則是傷飲。

若吐出食物。則是傷食。然傷食者多痛而吐。

食。傷飲者不痛而嘔飲也。

錯經妄行成吐衄崩。

逆行吐血錯行崩。熱傷陰陽絡妄行。血多熱去當

用補。血少雖虛須主清。

註 婦女經血逆行。上為吐血衄血。及錯行下為

崩血者。皆因熱盛也。傷陰絡則下行為崩。傷

陽絡則上行為吐衄也。若去血過多。則熱隨

血去。當以補為主。如血少熱尚未減。雖虛仍

當以清為主也。

經水過多兼時下白帶

多清淺淡虛不攝。稠粘深紅熱有餘。兼帶時下濕

熱穢。形清腥穢冷濕虛。

註 經水過多。清稀淺紅。乃氣虛不能攝血也。若

稠粘深紅。則為熱盛有餘。或經之前後兼赤白帶。而時下臭穢。乃濕熱腐化也。若形清腥穢。乃濕瘀寒虛所化也。

調經證治

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七味白朮散

參苓白朮散

歸脾湯

逍遙散

八珍湯

十全大補湯

雙和飲

養榮湯

理中湯

補養元氣四君子。參苓朮草棗生薑。異功加陳兼

理氣。虛痰橘半六君湯。嘔吐香砂六君子。渴瀉七
味藿葛香。脾瀉參苓白朮散。薏桔山蓮砂扁方。思
慮傷脾損心血。歸脾歸耒棗遠香。減參加柴歸芍
薄。逍遙調肝理脾方。合物八珍兼補血。耒桂十全
大補湯。去參苓朮雙和飲。去芍加陳養榮湯。脾胃
虛寒吐且瀉。理中減苓加乾薑。

註 四君子湯。補養元氣虛弱通用之方。卽人參
茯苓白朮炙草。引用棗薑也。異功散。是於補
氣中兼理其氣。卽四君子湯加陳皮也。六君

子湯治脾虛痰飲。卽四君子湯加橘紅半夏
也。香砂六君子湯。治胃虛嘔吐。卽六君子湯
加藿香砂仁也。七味白朮散。治脾虛渴瀉。卽
四君子湯加藿香葛根木香也。參苓白朮散。
治脾胃虛瀉。卽四君子湯加薏苡桔梗山藥
蓮肉砂仁扁豆也。歸脾湯治思慮損傷心脾
氣血。卽四君子加當歸黃耒棗仁遠志木香
也。逍遙散調肝理脾。卽四君子湯減人參。加
柴胡當歸白芍薄荷也。八珍湯於補氣中兼

補其血。卽四君子湯合四物湯也。十全大補
湯大補氣血。卽八珍湯加黃耒肉桂也。雙和
飲平補氣血。卽十全大補湯減人參茯苓白
朮也。人參養榮湯。於補氣中專養榮血。卽十
全大補湯減州芩加陳皮也。理中湯治脾胃
虛寒吐瀉。卽四君子湯去芍加乾薑也。

四物湯

桂枝四物湯

麻黃四物湯

柴胡四物湯

玉燭散

婦人血病主四物。歸芍白芍熟地黃。血瘀改以赤
芍藥。血熱易用生地黃。表熱有汗合桂草。表熱無
汗合麻黃。少陽寒熱小柴並。陽明熱合調胃湯。

註 四物湯。乃婦人經產一切血病通用之方。故
主之也。其方卽當歸川芎白芍藥熟地黃。凡
血瘀俱減白芍藥。改用赤芍藥破之。血熱俱
去熟地黃。易用生地黃涼之。風感太陽衛分。

發熱有汗。本方合桂枝湯。以桂枝甘草解之。
 名桂枝四物湯。寒傷太陽榮分。發熱無汗。本
 方合麻黃湯。以麻黃杏仁桂枝甘草發之。名
 麻黃四物湯。邪傳少陽半表半裏。往來寒熱。
 本方合小柴胡湯。以柴胡黃芩半夏人參甘
 草和之。名柴胡四物湯。邪傳陽明。裏熱便結。
 本方合調胃承氣湯。以大黃朴消甘草下之。
 名玉燭散。

先期證治

芩連四物湯

地骨皮飲

膠艾四物湯

芩朮四物湯

桃紅四物湯

當歸補血湯

聖愈湯

薑芩四物湯

佛手散

芎歸湯

先期實熱物芩連。虛熱地骨皮飲丹。血多膠艾熱
 芩朮。逐瘀桃紅紫塊黏。血少淺淡虛不攝。當歸補
 血歸者先。虛甚參者聖愈補。熱滯薑芩丹附延。逐
 瘀芎歸佛手散。又名芎歸效若仙。

註

經水先期而至。屬熱而實者。用四物湯加黃
 芩黃連清之。名芩連四物湯。屬熱而虛者。用
 四物湯加地骨皮丹皮涼之。名地骨皮飲。血
 多無熱者。用四物湯加阿膠艾葉止之。名膠
 艾四物湯。血多因熱者。用四物湯加黃芩白
 朮和之。名芩朮四物湯。若血多有塊。色紫稠
 黏。乃內有瘀血。用四物湯加桃仁紅花破之。
 名桃紅四物湯。先期血少淺淡。乃氣虛不能
 攝血也。用當歸補血湯補之。其方即當歸黃
 耆也。若虛甚者。則當用四物湯加人參黃耆
 補之。名聖愈湯。若血滯少其色赤者。乃熱盛
 滯血。用四物湯加薑黃黃芩丹皮香附延胡
 通之。名薑芩四物湯。逐瘀須用佛手散。即四

物湯去生地白芍。又名芎歸湯。逐瘀血其效如神也。

過期證治

過期飲

過期血滯物桃紅。附莪桂草木香通。血虛期過無脹熱。雙和聖愈及養榮。

註 經水過期不至。因血氣凝滯脹痛者。用過期

飲。其方卽四物湯加桃仁紅花香附莪朮肉

桂甘草木香木通也。若過期不至並不脹痛

者。乃無血可行。是血虛也。宜用雙和飲。聖愈

湯。人參養榮湯。

經行發熱證治

加味地骨皮飲

六神湯

經來身熱有表發。內熱地骨加胡連。經後六神加耆骨。逍遙理脾而清肝。

註 經來發熱有表邪證者。用前桂枝四物等湯

發之。若內熱者。用地骨皮飲加胡連清之。名

加味地骨皮飲。經後發熱。乃血虛內熱。用四物湯加黃耆地骨皮。補而涼之。名六神湯。若脾虛肝熱。用逍遙散理脾而清肝。

逍遙散 方見前

經行身痛證治

羌桂四物湯

黃耆建中湯

經來身痛有表發。無表四物羌桂枝。經後血多黃耆建中。耆桂芍草棗薑飴。

註 經來時身體痛疼。若有表證者。酌用前麻黃

四物桂枝四物等湯以發之。若無表證者。乃

血脈壅阻也。宜用四物湯加羌活桂枝以疏

通經絡。名羌桂四物湯。若經行後或血去過

多者。乃血虛不榮也。宜用黃耆建中湯以補

之。其方卽小建中湯。桂枝白芍甘草薑棗飴

糖加黃耆也。

經行腹痛證治

當歸建中湯

加味烏藥散

琥珀散

經後腹痛當歸建。經前脹痛氣為殃。加味烏藥湯烏縮。延草木香附榔。血凝碍氣疼過脹。本事琥珀散最良。稜莪丹桂延烏藥。寄奴當歸芍地黃。

註 經後腹痛或去血過多。乃血虛也。宜用當歸建中湯補之。其方即小建中湯加當歸也。經

前腹脹痛。乃血氣凝滯。若脹過於痛。是氣滯

其血也。宜用加味烏藥湯開之。其方即烏藥

縮砂延胡索甘草木香香附檳榔也。若痛過

於脹。是血凝碍氣也。宜用琥珀散破之。其方

即三稜莪朮丹皮官桂延胡索烏藥劉寄奴

當歸赤芍生地黃也。

大溫經湯

吳茱萸湯

胞虛寒病大溫經。來多期過小腹痛。歸芍芍草人

參桂。吳丹膠半麥門冬。不虛胞受風寒病。吳茱萸

湯更加風。藁細乾薑扶苓木。減去阿膠參芍芎。

凡胞中虛寒一切經病。皆因經水來多。胞虛受寒所致。或因受寒過期不行。小腹冷痛者。宜用大溫經湯。即當歸川芎白芍炙草人參肉桂吳茱萸丹皮阿膠半夏麥門冬也。若胞中不虛。惟受風寒為病。宜吳茱萸湯。依大溫經湯方更加防風藁本細辛乾薑扶苓木香。減去阿膠人參白芍藥川芎。即是吳茱萸湯也。

註 凡胞中虛寒一切經病。皆因經水來多。胞虛

受寒所致。或因受寒過期不行。小腹冷痛者。

宜用大溫經湯。即當歸川芎白芍炙草人參

肉桂吳茱萸丹皮阿膠半夏麥門冬也。若胞

中不虛。惟受風寒為病。宜吳茱萸湯。依大溫

經湯方更加防風藁本細辛乾薑扶苓木香。

減去阿膠人參白芍藥川芎。即是吳茱萸湯

也。

經行吐瀉證治

經瀉參苓白朮散。鴨澹清痛理中湯。肌熱渴瀉七

味散。嘔飲香砂六君湯。

註 經來泄瀉乃脾虛也。宜用參苓白朮散。鴨澹

清澈冷痛乃虛寒也。宜用理中湯。肌熱渴瀉

乃虛熱也。宜用七味白朮散。嘔飲痰水。乃虛

濕也。宜用香砂六君子湯。

經行吐衄證治

三黃四物湯

犀角地黃湯

經前吐衄爲熱壅。三黃四物大芩連。經後吐衄仍有熱。犀角地黃芍牡丹。

註 經前吐血衄血。乃內熱壅迫其血。宜用三黃

四物湯瀉之。其方卽四物湯加大黃黃芩黃

連。經後吐血衄血。雖仍有熱。亦不宜瀉。但當

用犀角地黃湯清之。其方卽犀角生地黃赤

芍藥牡丹皮也。

調經門彙方

四君子湯

人參

白朮土炒

茯苓各二錢

甘草一錢

右剉。薑棗水煎服。

異功散

人參

白朮土炒

茯苓各二錢

甘草五分

陳皮二錢

右剉。加生薑水煎服。

六君子湯

人參

白朮土炒

茯苓

半夏

陳皮各一錢

甘草五分

右剉。薑棗水煎服。

香砂六君子湯

卽本方加藿香葉砂仁

七味白朮散

人參

白朮土炒

茯苓各一錢五分

甘草五分

藿香

木香

乾葛各一錢

右剉。水煎服。

參苓白朮散

人參

白朮土炒

茯苓

山藥炒

甘草

蓮肉去心

白扁豆各一錢五分

薏苡仁炒

砂仁

桔梗各八分

右爲細末。每服二錢。薑棗湯調服。