

高等医药院校新版教材同步辅导

GAODENG YIYAO YUANXIAO XINBAN JIAOCAI TONGBU FUDAO



- 第六版教材配套辅导
- 医学院校学生复习考试
- 研究生入学考试

妇产科学

应试指南

主编 李秀英

光明日报出版社

· 医学专业必修课应试指南丛书 ·

妇产学应试指南

主编 李秀英

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

医学专业必修课应试指南/李秀英等编. —北京:光明日报出版社,2004

ISBN7—80145—697—1

I. 医… II. 李… III. 医学—医学院校—教学参考资料 IV. R

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 009911 号

·医学专业必修课应试指南丛书·

妇产科学应试指南

主 编 李秀英

责任编辑 曹 杨

出 版 光 明 日 报 出 版 社
发 行

(北京永安路 106 号 邮编 100050 电话 63082415)

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 邹平县博鸿印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 19

字 数 760 千字

版 次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7—80145—697—1/G

全套定价 395.00 元 本册定价 28.00 元

本书若有印装质量问题,请向承印厂调换

编委会成员名单

主 编	李秀英			
副 主 编	乔岩岩	刘 慧	杨 铎	储 萍
编 者	(按姓氏笔划为序)			
	王长河	方延宁	刘东光	刘景兰
	刘 慧	李秀英	孙 磊	乔岩岩
	许海燕	杨 铎	唐乃富	储 萍

前 言

为满足医学生、研究生及临床医学专业医师考试的需要,我们根据普通高等教育“十五”国家级规划教材,全国高等学校教材《妇产科学》第6版为蓝本,编写了《妇产科学应试指南》一书。参加编写该书的为临床和教学第一线的有多年教学经验的教师。本书主要作为医学院校本科生复习考试、研究生入学考试、临床医学专业医师晋升考试的辅导用书。该书吸收了国内一些最新出版的试题,为培养读者的分析思维能力,还编写了一部分病例型试题,它紧密结合临床工作的重点及难点,使学生能较好地掌握该门学科的理论知识,巩固所学知识,从而提高综合分析能力和解决实际问题的能力。

全书共分产科与妇科两大部分。题型有名词解释、填空题、选择题(A1、A2、A3、A4、B1、B2、X型)、问答题4种题型。每章后面均附有参考答案,以帮助读者深刻理解题意,获得更多的知识。

本书在编写的过程中虽然参阅了大量的资料,但由于时间仓促,难免有不足之处,殷切希望读者批评指正。

编 者
2004年4月

测试题各类型说明

目前,国际上有关医学多选题有两大类,即 A 型题和 B 型题。

该测试题中除 A 型题与 B 型题外,还增加了 X 型题。

一、A 型题

A 型题即最佳选择题(one Best Answer),是最常用的多选题。共分为四种类型即 A1、A2、A3、A4。

A1 型题(最佳选择题肯定型):每一道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案,引导句为肯定陈述,在答题时,只许从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

A2 型题(最佳选择题否定型):每一道题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,引导句为否定陈述,答题时,只许从中选择一个最合适的作为正确答案。

A3 型题(病例组最佳选择题):测试题,每组题都有一段共用题干病例描述,然后提出两个或三个与病例有关的问题,每个问题有 A、B、C、D、E 五个备选答案,答题时,每道题只许从五个备选答案中选一个最合适的作为正确答案。

A4 型题(病例串最佳选择题):测试题,每串题都有一段共用题干病例描述,然后提出 4 个以上与病例相关的问题,随着问题的深入有的问题要增加附加信息,该信息只与回答该问题有关,有的题偶尔也插入只与该题相关的假设信息,每个问题有 A、B、C、D、E 五个备选答案,答题时,每道题只许从五个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

二、B 型题

B 型题为配伍题(Matching sets)数道试题共用 1 组备选答案。共分为两种类型即 B1 型和 B2 型。

B1 型题(最佳配伍题):测试题,先给出 A、B、C、D、E 五个备选答案,然后提出 2~3 个问题,共用这五个备选答案,答题时,要为每个题选择一个最合适的作为正确答案,每个备选答案,可以选择一次、一次以上或一次也不选。

B2 型题(扩展最佳配伍题):测试题,先给出五个以上备选答案,如:A、B、C、D、E、F、G、H 等然后提出 2~3 个问题,共用这组备选答案,答题时,要为每个题选择一个最合适的作为正确答案,每个备选答案,可以选择一次、一次以上或一次也不选。

三、X 型题

X 型测试题,共有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从备选答案中选出 2 个或 2 个以上正确答案。

目 录

第一章	绪论	1
第二章	女性生殖系统解剖	3
第三章	女性生殖系统生理	11
第四章	妊娠生理	21
第五章	妊娠诊断	31
第六章	产前保健	40
第七章	正常分娩	49
第八章	正常产褥	56
第九章	妊娠时限异常	62
第十章	妊娠特有疾病	70
第十一章	异位妊娠	78
第十二章	妊娠晚期出血	86
第十三章	多胎妊娠与巨大胎儿	95
第十四章	羊水量异常	101
第十五章	胎儿发育异常及死胎	106
第十六章	胎儿窘迫与胎膜早破	111
第十七章	妊娠合并内科疾病	117
第十八章	妊娠合并外科疾病	126
第十九章	妊娠合并性传播疾病	131
第二十章	遗传咨询、遗传筛查与产前诊断	139
第二十一章	异常分娩	145
第二十二章	分娩期并发症	162
第二十三章	异常产褥	169
第二十四章	妇科病史及检查	174
第二十五章	外阴上皮内非瘤样病变	180
第二十六章	外阴及阴道炎症	184
第二十七章	宫颈炎症	190
第二十八章	盆腔炎症	195
第二十九章	外阴肿瘤	202
第三十章	宫颈肿瘤	206
第三十一章	子宫肿瘤	213
第三十二章	卵巢肿瘤	220
第三十三章	输卵管肿瘤	227
第三十四章	妊娠滋养细胞疾病	230

第三十五章	生殖内分泌疾病·····	237
第三十六章	子宫内膜异位症和子宫腺肌病·····	245
第三十七章	女性生殖器官发育异常·····	253
第三十八章	女性生殖器官损伤性疾病·····	260
第三十九章	不孕症与辅助生殖技术·····	266
第四十章	计划生育·····	273
第四十一章	妇女保健·····	286
第四十二章	妇产科常用特殊检查·····	287
第四十三章	妇产科内窥镜·····	294
第四十四章	妇产科常用特殊药物·····	295

第一章 绪 论

【教材重点提示】

一、妇产科学的意义及范畴。妇产科学是专门研究妇女特有的生理和病理的一门学科,包括产科学和妇科学两大部分。

产科学是一门关系到妇女妊娠、分娩、产褥全过程,并对该过程中所发生的一切生理、心理、病理改变进行诊断、处理的医学科学,是一门协助新生命诞生的医学科学。

妇科学是一门研究妇女非妊娠期生殖系统的一切病理改变并对其进行诊断、处理的医学科学。

二、妇产科学的特点:妇产科学与人的整体密不可分;妇产科学是一个整体,不可分割;妇产科学是临床医学,也是预防医学。

第二章 女性生殖系统解剖

【教材重点提示】

一、外生殖器包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道前庭五部分。

二、内生殖器:女性内生殖器包括阴道、子宫、输卵管及卵巢。掌握正常子宫的大小、重量、容量、宫颈与宫体之比。子宫的4对韧带(圆韧带、阔韧带、主韧带、宫骶韧带)。各条韧带的起止点与作用。输卵管分为哪4部分。

三、女性生殖器官的血液供应(卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉及阴部内动脉)。各动脉的分出。淋巴的引流与盆腔淋巴的分组。

四、骨盆的组成(骨盆的骨骼、骨盆的关节、骨盆的韧带三部分组成)。骨盆的4种类型:女型、扁平型、类人猿型、男型。骨盆与分娩相关的解剖特点。

五、女性盆底的解剖,外层即浅层筋膜与肌肉;中层泌尿生殖膈;内层盆膈。

六、输尿管的走行与子宫动脉的关系。妇女患阑尾炎时与附件炎的鉴别诊断。

【测试题】

一、名词解释

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1.阴阜(mons pubis) | 9.卵巢(ovary) |
| 2.大阴唇(labium majus) | 10.骨盆(pelvis) |
| 3.阴蒂(clitoris) | 11.盆膈(pelvic diaphragm) |
| 4.阴道(vagina) | 12.肛提肌(levator ani muscle) |
| 5.阴道前庭(vaginal vestibule) | 13.会阴(perineum) |
| 6.前庭大腺(major vestibular glands) | 14.输尿管(ureter) |
| 7.子宫(uterus) | 15.直肠(rectum) |
| 8.输卵管(Fallopian tube or oviduct) | 16.阑尾(vermiform appendix) |

二、填空题

17. 女性内生殖器包括_____、_____、_____及_____。
18. 子宫圆韧带起于子宫_____,输卵管_____,然后向前下方伸展达两侧骨盆壁,再穿过腹股沟管终于_____。
19. 输卵管的全长为_____cm,根据输卵管的形态由内向外可分为_____,_____,_____及_____。
20. 女性内外生殖器官的血液供应主要来自_____,_____,_____及_____。
21. 子宫动脉为_____分支,在腹膜后沿骨盆侧壁向下前行,经_____,宫旁组织到达子宫外侧,距宫颈内口水平约_____cm处_____至子宫侧缘。
22. 腹股沟的浅淋巴结上组沿腹股沟韧带排列,收纳_____,_____,_____及_____部的淋巴结;下组位于大隐静脉末端周围,收纳_____及_____。
23. 阴道下段淋巴引流主要入_____;阴道上段淋巴引流基本与宫颈引流相同,大部分汇入_____,_____与_____;宫体、宫底淋巴与输卵管、卵巢淋巴均汇入_____。

24. 交感神经纤维自腹主动脉前神经丛分出,下行入盆腔分为两部分:①_____,分布于卵巢和输卵管;②_____,大部分在宫颈旁形成骨盆神经丛,分布于宫体、宫颈、膀胱上部等。
25. 骨盆由_____、_____及_____组成。
26. 骨盆的关节_____、_____和_____。
27. 骨盆各部之间的韧带中有两对重要的韧带,一对是_____与坐骨结节之间的_____,另一对是骶、尾骨与_____之间的_____。
28. 根据骨盆形状(按 Call wtell 与 moloy 分类)将骨盆分为_____、_____、_____和_____。
29. 球海绵体肌,位于阴道两侧_____及_____,向后与肛门处_____互相交叉而混合。
30. 输尿管从肾盂开始沿腰大肌前面偏中线侧下降,在_____处经髂外动脉起点的前方进入_____继续下行,于阔韧带基部向前内方行,于宫颈外侧约_____处。

三、选择题

A1 型题

31. 关于女性外生殖器下列哪项是错误的?
A.阴阜 B.大阴唇 C.小阴唇 D.阴蒂及阴道前庭 E.会阴
32. 关于阴道壁,下列哪项是错误的?
A.阴道粘膜由复层鳞状上皮细胞覆盖 B.阴道粘膜呈鲜红色
C.阴道粘膜受性激素影响有周期性变化 D.阴道壁因富有静脉丛
E.局部受损伤易出血或形成血肿
33. 关于成年人子宫,下列哪项是错误的?
A.成年人子宫长约 7~8cm B.宽 4~5cm C.厚 2~3cm
D.容量约 50ml E.宫体与宫颈比例 2:1
34. 子宫最狭窄的部分为:
A.解剖学内口 B.组织学内口 C.子宫峡部 D.子宫颈管 E.子宫颈外口
35. 关于宫颈粘膜哪项是错误的?
A.宫颈管粘膜上皮细胞呈单层高柱状
B.粘膜层有许多腺体能分泌碱性粘液
C.宫颈阴道部为单层鳞状上皮覆盖
D.宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处是宫颈癌好发部位
E.宫颈粘膜受性激素影响也有周期性变化
36. 从宫颈两侧到骨盆侧壁的韧带是:
A.圆韧带 B.阔韧带 C.主韧带 D.宫骶韧带 E.骨盆漏斗韧带
37. 行子宫全切除时,切断下列哪条韧带容易损伤输尿管?
A.圆韧带 B.阔韧带 C.骨盆漏斗韧带 D.主韧带 E.宫骶韧带
38. 行子宫全切除加左侧附件切除术时应切断哪些韧带?
A.双侧圆韧带、双侧阔韧带、左卵巢固有韧带
B.双侧圆韧带、双侧阔韧带、双侧主韧带、双子宫骶骨韧带、左卵巢悬韧带、右卵巢固有韧带
C.双圆韧带、双阔韧带、双主韧带、左卵巢固有韧带
D.双圆韧带、双阔韧带、左卵巢悬韧带、右卵巢固有韧带
E.双圆韧带、双阔韧带、双子宫骶骨韧带

39. 关于输卵管下列哪项是正确的?
 A.全长约 8~14cm B.间质部长约 2cm C.峡部长 1~3cm
 D.壶腹部长 4~8cm E.伞部长 2~1.5cm
40. 关于卵巢下列哪项是错误的?
 A.是一对扁椭圆形的性腺 B.卵巢系膜连接于阔韧带后叶的部位称卵巢门
 C.卵巢外侧以骨盆漏斗韧带连于骨盆壁 D.卵巢由覆层立方上皮覆盖称生发上皮
 E.内有一层纤维组织称卵巢白膜
41. 卵巢动脉为:
 A.髂内动脉前干分支 B.腹主动脉分出 C.肾动脉分出
 D.髂外动脉分出 E.髂总动脉分出
42. 子宫动脉为:
 A.卵巢动脉分出 B.阴道动脉分出 C.阴部内动脉分出
 D.髂内动脉前干分支 E.髂总动脉
43. 左侧卵巢动脉可来自:
 A.左肾动脉 B.右髂内动脉 C.右髂外动脉
 D.左髂外动脉 E.阴部内动脉
44. 右侧的卵巢动脉来自:
 A.髂内动脉 B.腹主动脉 C.髂外动脉
 D.子宫动脉 E.肾动脉
45. 关于女性生殖器淋巴,下列哪项是错误的?
 A.分外生殖器淋巴与盆腔淋巴 B.外生殖器淋巴分深浅两部分
 C.腹股沟浅淋巴分上、下两组 D.腹股沟深淋巴结位于股管内
 E.盆腔淋巴分 2 组,髂淋巴组与骶淋巴组
46. 关于淋巴引流下列哪项是错误的?
 A.盆腔的淋巴分髂淋巴、骶淋巴和腰淋巴
 B.阴道下段淋巴引流主要入腹股沟淋巴结
 C.阴道上段淋巴引流基本与宫颈引流相同
 D.宫体、宫底淋巴与输卵管、卵巢淋巴入腰淋巴结
 E.宫体两侧淋巴沿圆韧带入腹股沟深淋巴结
47. 关于宫颈淋巴引流,下列哪项是正确的?
 A.主要入闭孔与髂内淋巴结 B.大部分入骶前淋巴结 C.入髂总淋巴结
 D.入腰淋巴结 E.入腹股沟淋巴结
48. 内生殖器的神经支配主要由:
 A.交感神经支配 B.交感与副交感神经支配
 C.交感神经纤维自腹主动脉分出 D.大部分在宫旁形成骨盆神经丛
 E.临床上下半身截瘫的产妇不能顺利分娩
49. 在我国妇女骨盆类型中哪种最常见?
 A.女型 B.扁平型 C.类人猿型 D.男型 E.偏斜骨盆
50. 关于女型骨盆,下列哪项是正确的?

- A.骨盆入口前后径长而横径短 B.骨盆入口横径较前后径稍长 C.骨盆入口椭圆形
D.骨盆入口三角形 E.骨盆入口平面狭窄
51. 女型骨盆在我国妇女骨盆类型中占百分之几?
A.52%~58.9% B.23.2%~29% C.14.2%~18% D.1%~3.7% E.41%~50%
52. 骨盆最小平面的范围,前面是耻骨联合下缘,两侧为坐骨棘,后面为:
A.第4~5骶椎间 B.第3~4骶椎间 C.骶岬 D.骶骨下端 E.骶尾关节
53. 关于骨盆底哪项是正确的?
A.外层即盆膈 B.内层即浅筋膜与肌肉
C.中层即泌尿生殖膈 D.中层由尿道、阴道及直肠贯通
E.分娩时不易损伤骨盆底
54. 会阴侧切术时能切到哪些肌肉?
A.会阴浅横肌、深横肌及坐尾肌 B.球海绵体肌、坐骨海绵体肌及会阴深横肌
C.会阴深横肌、球海绵体肌及耻尾肌 D.会阴深横肌、坐骨海绵体肌及耻尾肌
E.会阴深横肌、髂尾肌
55. 关于尿道下列哪项是错误的?
A.尿道长4~5cm,直径约0.6cm B.尿道穿过泌尿生殖膈
C.终于阴道前庭部的尿道外口 D.尿道内括约肌为随意肌
E.女性尿道易引起泌尿系统感染
56. 关于输尿管哪项是正确的?
A.输尿管长约20cm B.最细部分内径2~3mm
C.输尿管在腹膜后 D.在子宫动脉的前方交叉
E.有骶髂关节处经髂内动脉起点前方入盆腔
57. 有关阑尾错误的是:
A.连于盲肠的后内侧壁 B.长7~9cm
C.可达右侧输尿管及卵巢 D.妇女患阑尾炎时可累及子宫附件
E.妊娠期阑尾位置无变化
58. 行子宫切除时的注意事项中哪项是错误的?
A.切断卵巢动静脉时,避免损伤髂外动脉
B.切断子宫动脉时,注意勿损伤输尿管
C.推开子宫前面的腹膜时,避免损伤膀胱
D.推开子宫后面的腹膜时,避免损伤直肠
E.切断子宫骶骨韧带时,避免损伤输尿管
59. 做全子宫及单侧附件切除术时切断下列哪项最不易损伤输尿管?
A.骨盆漏斗韧带 B.卵巢固有韧带 C.子宫骶骨韧带 D.子宫动脉 E.主韧带
- A2型题
60. 女性30岁,因两人打架不慎踢伤外阴部,以半小时后外阴部出现肿物,疼痛难忍,不敢行走,最可能的是:
A.阴阜血肿 B.小阴唇血肿 C.大阴唇血肿 D.阴蒂血肿 E.前庭大腺囊肿
61. 女性28岁,3天前外阴部发现囊肿前来就诊,经检查后发现囊肿位于大阴唇后部,前庭后方小

阴唇与处女膜之间的沟内,最可能为:

- A.外阴肿瘤 B.外阴良性肿瘤 C.外阴上皮内瘤样病变
D.前庭大腺囊肿 E.外阴恶性肿瘤

62. 女性 45 岁,因子宫出血而来院就诊,妇科检查:宫体 40 天妊娠大小,形状不规,表面突起,质硬,双侧附件正常。B 超提示子宫肌瘤,要求入院手术治疗。若行子宫全切+附件切除术时,下述哪项不易损伤输尿管?

- A.切断漏斗韧带时 B.切断圆韧带 C.切断主韧带 D.切断阔韧带 E.切断骶韧带

63. 女性 55 岁,闭经 3 年,子宫出血 3 次入院。妇科检查:宫颈Ⅲ°糜烂,触之出血,宫体后位略小,双侧附件增厚。病理为子宫颈鳞状细胞癌,宫颈癌好发部位是:

- A.柱状上皮 B.鳞状上皮 C.子宫颈外口
D.柱状上皮与鳞状上皮交界处 E.以上均不正确

64. 孕妇 28 岁,39+6 周妊娠,G₁P₀。宫口开大 10cm,估计胎儿体重 4000g,先露部达+2,胎头位置 LOT。需做会阴切开加胎头吸引术。做局部阻滞麻醉时应阻滞哪部分神经?

- A.坐骨神经 B.直肠下神经 C.阴部神经 D.会阴神经 E.阴唇后神经

65. 产妇 24 岁,40 周妊娠分娩,G₁P₁。顺产,产后检查会阴Ⅱ度裂伤。问损伤下列哪部分组织?

- A.坐骨海绵体肌 B.肛门外括约肌 C.球海绵体肌、会阴深横肌及浅横肌
D.坐尾肌 E.耻尾肌

66*. 孕妇 26 岁,12 周妊娠,G₁P₀。右下腹偏上方疼痛,经检查:宫底脐耻之间,胎心 135 次/分。子宫软,右下腹部有压痛及反跳痛,化验白细胞计数 $16 \times 10^9/L$ 。B 超为胎儿及胎盘均正常。问妊娠合并症是:

- A.右侧输卵管炎 B.右侧卵巢炎 C.妊娠合并阑尾炎 D.附件炎 E.盆腔炎

A3 型题

(67~69 题共用题干)

女性 28 岁,2 天前外阴部发现囊肿,前来就诊,检查:体温 38℃,在大阴唇的后部,前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内有一囊性肿物致 8cm×6cm×5cm 大小,表面红、肿、热、触痛明显。

67. 最可能的诊断是:

- A.外阴肿瘤 B.外阴囊肿 C.前庭大腺囊肿 D.前庭大腺炎 E.前庭大腺脓肿

68. 最恰当的处理为:

- A.观察 B.囊肿切开引流术 C.局部热敷
D.用抗生素控制感染 E.局部用药

69. 下述处理哪项不正确?

- A.卧床休息 B.确定病原体 C.选用抗生素及磺胺药
D.中药治疗 E.切开引流术后不易复发

B1 型题

(70~71 题共用备选答案)

- A.卵巢动脉 B.子宫动脉 C.阴道动脉 D.阴部内动脉 E.肾动脉

70. 自腹主动脉分出的是

71. 自髂内动脉前干分出的是

(72~73 题共用备选答案)

A.球海绵体肌 B.坐骨海绵体肌 C.会阴浅横肌 D.肛门外括约肌 E.肛提肌

72. 自两侧坐骨结节内侧面中线会合于中心腱的肌肉是

73. 覆盖前庭球及前庭大腺,向后与肛门外括约肌互相交叉而混合的肌肉是

(74~75 题共用备选答案)

A.女型骨盆 B.扁平型 C.类人猿型 D.男型 E.均小骨盆

74. 骨盆入口呈横椭圆形,髂骨翼宽即浅,入口横径较前后径稍长,耻骨较宽,两侧坐骨棘间径 ≥ 10 cm,为何种骨盆

75. 骨盆入口略呈三角形,两侧壁内聚,坐骨棘突出,耻骨弓较窄,骶坐切迹窄呈高弓形,骶骨较直而前倾,出口后矢状径较短为

B2 型题

(76~77 题共用备选答案)

A.阴阜 B.大阴唇 C.小阴唇 D.阴蒂

E.阴道前庭 F.前庭大腺 G.阴道口及处女膜

76. 当外阴部受到损伤时,最易形成水肿的部位是

77. 当外阴部发生炎症时,最易形成囊肿的部位是

(78~80 题共用备选答案)

A.宫颈管粘膜上皮 B.复层鳞状上皮 C.柱状上皮
D.鳞状上皮 E.柱状上皮与鳞状上皮交界处 F.化生鳞状上皮

78. 宫颈阴道部为何种组织覆盖

79. 宫颈癌好发部位为

来院就诊,妇科检查:阴道前后壁膨出部暴露于阴道口外,宫颈及部分宫体已脱出于阴道口,以上损伤哪部分肌肉

83. 分娩时应保护好哪部分,可避免造成会阴裂伤

X 型题

84. 子宫内膜的功能层指

A.表面 1/3 B.表面 1/2 C.表面 2/3 D.功能层靠近宫腔 E.表面 2/2

85. 下列各项哪些动脉为阴部内动脉的分支

A.痔下动脉 B.会阴动脉 C.阴唇动脉 D.阴蒂动脉 E.阴道动脉

86. 肛提肌有哪儿部分组成

A.球海绵体肌 B.坐骨海绵体肌 C.耻尾肌 D.髂尾肌 E.坐尾肌

四、问答题

87. 骨盆有哪两对重要的韧带?判断中骨盆是否狭窄的重要指标是什么?

88. 当子宫全切除加双侧附件切除时,切断哪些韧带时易损伤输尿管?骨盆底肌和筋膜受损伤时易导致何种疾病?

89. 腹股沟浅淋巴结分几组?各组收纳哪些部位的淋巴结?

90. 腹股沟的深淋巴结收纳哪些部位的淋巴结,最后汇入何处?

91. 输尿管与子宫动脉的关系?

【参考答案】

一、名词解释

1. 即耻骨联合前面隆起的脂肪垫。
2. 为邻近两股内侧的一对隆起的皮肤皱襞,起自阴阜,止于会阴。
3. 位于两小阴唇顶端的联合处,它与男性阴茎海绵体相似,具有勃起性。
4. 为性交器官,月经血排出及胎儿娩出的通道。
5. 为两小阴唇之间的裂隙。
6. 位于大阴唇后部,亦为球海绵体肌所覆盖,如黄豆大,左右各一。
7. 子宫为一壁厚,腔小、以肌肉为主的器官。
8. 为一对细长而弯曲的管,位于子宫阔韧带的上缘内,内侧与宫角相连通,外端游离,与卵巢接近。
9. 为一对扁椭圆形的性腺,具有生殖和内分泌功能,产生和排出卵细胞,以及分泌性激素。
10. 是胎儿阴道娩出时必须经的骨性产道,其大小、形状对分娩有直接影响。
11. 为骨盆底最里面最坚韧层,由肛提肌及其内、外两面各覆一层筋膜所组成,亦为尿道、阴道及直肠贯通。
12. 是位于骨盆底的成对扁肌,向下向内合成漏斗形。
13. 广义的会阴是指封闭骨盆出口的所有软组织,前为耻骨联合下缘,后为尾骨尖,两侧为耻骨下支,坐骨支,坐骨结节和骶结节韧带。
14. 为一对肌性圆索状长管,起自肾盂,终于膀胱,各长约 30cm,粗细不一,最细部分的内径仅 3~4mm,最粗可达 7~8mm。
15. 位于盆腔后部,其上端在第 3 骶椎平面与已状结肠相接,向下穿过盆膈,下端与肛管相连。
16. 阑尾根部连于盲肠的后内侧面,远端游离,长 7~9cm,通常位于右髂窝内。

二、填空题

17. 阴道,子宫,输卵管,卵巢
18. 双角的前面,近端的下方,大阴唇前端
19. 8~14cm,间质部,峡部,壶腹部,伞部
20. 卵巢动脉,子宫动脉,阴道动脉,阴部内动脉
21. 髂内动脉前干,阔韧带基底部,2cm,横跨输尿管
22. 外生殖器,会阴,阴道下端,肛门,会阴,下肢的淋巴
23. 腹股沟淋巴结,闭孔淋巴结,髂内淋巴结,腰淋巴结
24. 卵巢神经丛,骶前神经丛
25. 骶骨,尾骨,左右两块髌骨
26. 耻骨联合,骶髂关节,骶尾关节
27. 骶尾骨,骶结节韧带,坐骨棘,骶棘韧带
28. 女型,扁平型,类人猿型,男型
29. 覆盖前庭球,前庭大腺,括约肌
30. 骶髂关节,盆腔,2cm

三、选择题

- 31.E 32.B 33.D 34.C 35.C 36.C 37.B 38.B 39.A 40.D 41.B 42.D 43.A 44.B 45.E 46.E 47.A
 48.B 49.A 50.B 51.A 52.D 53.C 54.C 55.D 56.C 57.E 58.A 59.B 60.C 61.D 62.B 63.D 64.C
 65.C 66.C 67.D 68.D 69.E 70.A 71.B 72.C 73.A 74.A 75.D 76.B 77.F 78.B 79.E 80.F 81.A
 82.F 83.G 84.C D 85.A B C D 86.C D E

四、问答题

87. 一对是骶、尾骨与坐骨结节之间的骶结节韧带,另一对是骶、尾骨与坐骨棘之间的骶棘韧带。若坐骨棘间径<10cm,坐骨切迹宽度<2横指,为中骨盆平面狭窄。
88. 在切断骨盆漏斗韧带,主韧带、骶骨韧带以及缝合后腹膜时均易损伤输尿管。当骨盆底肌和筋受损时,可导致子宫位置异常,形成不同程度的子宫脱垂。