

ILLUSTRATED HANDBOOK OF WILD FLOWERS



野花图鉴

生活实用植物图鉴系列之一

或叶色艳丽，或花姿奇特

365种争奇斗艳的野生花卉

让你在野外踏青中怡养性情

江珊 徐晔春 主编

观音草



苹婆



美丽紫玉兰



金莲花



玉竹



波斯菊

清明花



牛繁缕



美丽马醉木



蝴蝶戏珠花

汕头大学出版社

187178
S68-64
46

野花图鉴

Illustrated Handbook of
Wild Flowers



主编：江珊 徐晔春
摄影：江珊 等

汕头大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

野花图鉴/江珊, 徐晔春主编. —汕头: 汕头大学出版社, 2007.11

ISBN 978-7-81120-155-0

I. 野... II. ①江...②徐... III. 野生植物: 花卉—观赏园艺—中国—图解 IV. S68-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第163572号

Copyright © 2008 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

广州公元传播有限公司

All rights reserved

所有权利保留

图片提供:  www.fotote.com

野花图鉴

主 编 / 江 珊 徐晔春

责任编辑 / 胡开祥

特约编辑 / 蔡国才

装帧设计 / 唐 薇 王 勇

责任技编 / 姚健燕 刘春芳

出版发行 / 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编 515063

电话 0754-2903126

制 作 /  广州公元传播有限公司

印 刷 / 恒美印务(番禺南沙)有限公司

规 格 / 889 × 1194mm 1/32开 7印张

版 次 / 2008年1月第1版第1次印刷

书 号 / 978-7-81120-155-0

定 价 / 38.00元

(咨询电话: 020-38865309)



前言 PREFACE

我国是世界上野生植物资源较多的国家之一，约有高等植物3万多种，居世界第三位。我国野生植物品种不仅极其丰富，而且非常多样：既有我国特有的珍稀植物，如银杏、珙桐；也有供药用的，如人参、金银花；也有可食用的，如番荔枝、马兰；也有经济作物，如樟、荷木等。另外，现代园林中常见栽培的观赏花卉，如茶花、牡丹、兰花和杜鹃花等，也都是从野生种逐步培育而来。

在这3万多种野生高等植物中，很多具有较强的观赏性，或叶色艳丽，或花姿奇特，这些具有较强观赏性，且未经人工驯化和人工栽培的原生态环境生长的野生植物，我们一般称之为野生花卉。依据生长环境的不同，野生花卉可分为水生花卉、草甸花卉、高山花卉、岩生花卉、荒漠花卉和森林花卉，它们构成了丰富多彩的野花世界，是自然植物群落中重要的组成部分，也是地球生态平衡不可或缺的角色，可以说是大自然赋予给我们人类的物质财富及珍贵遗产。

本书收录了365种野生花卉，科属按恩格勒系统进行划分。排序以科为单位，科排序则按英文字母排列，同科植物按属的拉丁学名的第一个英文字母排序。

本书除对收录花卉品种的中文名、别名、拉丁学名、形态特征和产地分布等一一作出简要说明外，还着重介绍它们独特的生长环境及用途，同时配插

了大量高清晰彩色图片，包括褪底主图、局部特写及原生态图等，使读者更全面地了解各种野生花卉的观赏特点及功用等。

本书图文并茂，适合大专院校师生、园林工作者及花卉爱好者参考使用。



编著者
2008年1月

目录

CONTENT

爵床科 Acanthaceae			
鸭嘴花·····	10	萝藦科 Asclepiadaceae	
白接骨·····	10	牛角瓜·····	23
板蓝·····	11	球兰·····	24
假杜鹃·····	12	凤仙花科 Balsaminaceae	
钟花草·····	12	华凤仙·····	24
小驳骨·····	13	小檗科 Berberidaceae	
观音草·····	13	全缘锥花小檗·····	25
灵枝草·····	14	十大功劳·····	25
垂序马蓝·····	14	紫葳科 Bignoniaceae	
苋科 Amaranthaceae		两头毛·····	26
青葙·····	15	单叶波罗花·····	26
石蒜科 Amaryllidaceae		中甸角蒿·····	27
忽地笑·····	15	火烧花·····	27
石蒜·····	16	紫草科 Boraginaceae	
夹竹桃科 Apocynaceae		斑种草·····	28
清明花·····	16	倒提壶·····	28
海芒果·····	17	大尾摇·····	29
云南蕊木·····	18	附地菜·····	29
萝芙木·····	18	桔梗科 Campanulaceae	
羊角拗·····	19	党参·····	30
络石·····	20	半边莲·····	30
盆架树·····	20	桔梗·····	31
冬青科 Aquifoliaceae		白花菜科 Capparidaceae	
枸骨·····	21	树头菜·····	32
铁冬青·····	21	忍冬科 Caprifoliaceae	
天南星科 Araceae		云南双盾木·····	33
海芋·····	22	金银花·····	33
马兜铃科 Aristolochiaceae		接骨草·····	34
广西马兜铃·····	22	蝴蝶戏珠花·····	34
绵毛马兜铃·····	23	石竹科 Caryophyllaceae	
		瞿麦·····	35

牛繁缕·····	35	山茱萸科 Cornaceae	
鸭跖草科 Commelinaceae		四照花·····	55
鸭跖草·····	36	秀丽香港四照花·····	56
大苞水竹叶·····	36	十字花科 Cruciferae	
裸花水竹叶·····	37	紫花碎米荠·····	56
菊科 Compositae		二月蓝·····	57
蓍草·····	37	葫芦科 Cucurbitaceae	
胜红蓟·····	38	木鳖子·····	57
尼泊尔香青·····	38	川续断科 Dipsacaceae	
白花鬼针草·····	39	大花刺参·····	58
野菊花·····	40	杜英科 Elaeocarpaceae	
菊苣·····	40	尖叶杜英·····	58
蓟·····	41	水石榕·····	59
波斯菊·····	42	杜鹃花科 Ericaceae	
蓝刺头·····	42	吊钟花·····	59
旱莲草·····	43	美丽马醉木·····	60
一年蓬·····	43	大白花杜鹃·····	60
大吴风草·····	44	马缨杜鹃·····	61
马兰·····	44	露珠杜鹃·····	62
莲叶橐吾·····	45	满山红·····	62
千里光·····	45	照山白·····	63
水飞蓟·····	46	亮毛杜鹃·····	63
蒲儿根·····	46	羊躑躅·····	64
耳柄蒲儿根·····	47	杜鹃花·····	65
金钮扣·····	47	亮叶杜鹃·····	65
蒲公英·····	48	云南杜鹃·····	66
夜香牛·····	49	大戟科 Euphorbiaceae	
三裂蟛蜞菊·····	49	泽漆·····	66
黄鹌菜·····	50	大狼毒·····	67
旋花科 Convolvulaceae		土瓜狼毒·····	67
打碗花·····	50	木油桐·····	68
田旋花·····	51	龙胆科 Gentianaceae	
五爪金龙·····	51	湿生扁蕾·····	69
厚藤·····	52	蓝玉簪龙胆·····	69
三裂叶薯·····	52	椭圆叶花锚·····	70
金钟藤·····	53	印度苕菜·····	70
篱栏网·····	53	花锚·····	71
茛萝·····	54	牻牛儿苗科 Geraniaceae	
圆叶牵牛·····	55	野老鹳草·····	71
		毛蕊老鹳草·····	72

鼠掌老鹳草·····	72	首冠藤·····	90
反瓣老鹳草·····	73	云实·····	91
苦苣苔科 Gesneriaceae		南蛇簕·····	92
半蒴苣苔·····	73	苏木·····	92
草海桐科 Goodeniaceae		蝙蝠草·····	93
草海桐·····	74	格木·····	93
藤黄科 Guttiferae		含羞草·····	94
山竹子·····	74	白花油麻藤·····	94
金丝桃·····	75	常春油麻藤·····	95
金丝梅·····	75	葛藤·····	95
金缕梅科 Hamamelidaceae		白车轴草·····	96
枫香·····	76	百合科 Liliaceae	
红花荷·····	76	天门冬·····	96
鸢尾科 Iridaceae		山菅兰·····	97
射干·····	77	万寿竹·····	98
鸢尾·····	78	萱草·····	98
蝴蝶花·····	79	川贝母·····	99
小花鸢尾·····	79	宝兴百合·····	99
矮紫苞鸢尾·····	80	有斑百合·····	100
马蔺·····	80	尖被百合·····	100
金脉鸢尾·····	81	狭叶重楼·····	101
唇形科 Labiatae		云南重楼·····	101
藿香·····	81	玉竹·····	102
筋骨草·····	82	油点草·····	103
美花圆叶筋骨草·····	83	二叶郁金香·····	103
肾茶·····	83	藜芦·····	104
细风轮菜·····	84	毛叶藜芦·····	105
活血丹·····	84	亚麻科 Linaceae	
野芝麻·····	85	石海椒·····	105
宝盖草·····	85	马钱科 Loganiaceae	
益母草·····	86	醉鱼草·····	106
夏枯草·····	86	千屈菜科 Lythraceae	
溪黄草·····	87	千屈菜·····	106
荔枝草·····	88	圆叶节节菜·····	107
紫丹参·····	88	虾子花·····	107
韩信草·····	89	木兰科 Magnoliaceae	
水苏·····	89	美丽紫玉兰·····	108
豆科 Leguminosae		凹叶厚朴·····	108
紫云英·····	90	深山含笑·····	109

锦葵科 Malvaceae		钩距虾脊兰·····	126
磨盘草·····	109	长距虾脊兰·····	127
蜀葵·····	110	三褶虾脊兰·····	127
黄槿·····	110	硬叶兰·····	128
黄花稔·····	111	紫点杓兰·····	128
地桃花·····	111	西藏杓兰·····	129
野牡丹科 Melastomataceae		大花杓兰·····	129
多花野牡丹·····	112	钩状石斛·····	130
野牡丹·····	112	束花石斛·····	131
地氈·····	113	鼓槌石斛·····	132
朝天罐·····	113	细茎石斛·····	132
桑科 Moraceae		高斑叶兰·····	133
构树·····	114	粉叶玉凤兰·····	133
紫金牛科 Myrsinaceae		血叶兰·····	134
粗脉紫金牛·····	114	广布红门兰·····	134
朱砂根·····	115	硬叶兜兰·····	135
密鳞紫金牛·····	116	同色兜兰·····	135
矮紫金牛·····	116	杏黄兜兰·····	136
虎舌红·····	117	鹤顶兰·····	136
桃金娘科 Myrtaceae		台湾独蒜兰·····	137
桃金娘·····	117	火焰兰·····	137
狭叶蒲桃·····	118	白柱万代兰·····	138
睡莲科 Nymphaeaceae		纯色万代兰·····	138
萍蓬草·····	118	线柱兰·····	139
木犀科 Oleaceae		列当科 Orobanchaceae	
扭肚藤·····	119	黄花列当·····	139
矮探春·····	119	酢浆草科 Oxalidaceae	
素方花·····	120	酢浆草·····	140
小蜡·····	120	红花酢浆草·····	141
丁香·····	121	罂粟科 Papaveraceae	
柳叶菜科 Onagraceae		蓣罂粟·····	142
柳兰·····	122	白屈菜·····	142
水龙·····	122	北越紫堇·····	143
毛草龙·····	123	夏天无·····	143
黄花水龙·····	123	刻叶紫堇·····	144
兰科 Orchidaceae		全缘叶绿绒蒿·····	144
多花指甲兰·····	124	红花绿绒蒿·····	145
竹叶兰·····	124	五脉绿绒蒿·····	146
白及·····	125	野罂粟·····	146
银带虾脊兰·····	125		

车前科 Plantaginaceae		瓣蕊唐松草	166
车前草.....	147	金莲花.....	166
白花丹科 Plumbaginaceae		白头翁.....	167
紫金标.....	148	楼斗菜.....	167
白花丹.....	148	银莲花.....	168
蓼科 Polygonaceae		蔷薇科 Rosaceae	
头花蓼.....	149	野山楂.....	168
火炭母.....	149	蛇莓.....	169
拳蓼.....	150	白鹃梅.....	170
圆穗蓼.....	150	水杨梅.....	170
赤胫散.....	151	石楠.....	171
马齿苋科 Portulacaceae		三叶委陵菜.....	171
土人參.....	152	金露梅.....	172
报春花科 Primulaceae		银露梅.....	172
硬枝点地梅.....	153	狭叶火焰花.....	173
点地梅.....	153	沙梨.....	173
广西过路黄.....	154	火棘.....	174
大叶过路黄.....	154	车轮梅.....	174
独花报春.....	155	硕苞蔷薇.....	175
鹅黄灯台报春.....	155	小果蔷薇.....	176
球花报春.....	156	金樱子.....	176
胭脂花.....	156	繅丝花.....	177
偏花报春.....	157	黄刺玫.....	177
钟花报春.....	157	粗叶悬钩子.....	178
假报春.....	158	蓬蘽.....	178
鹿蹄草科 Pyrolaceae		空心泡.....	179
水晶兰.....	158	重瓣蔷薇莓.....	179
毛茛科 Ranunculaceae		中华绣线菊.....	180
露蕊乌头.....	159	麻叶绣线菊.....	180
草玉梅.....	160	单瓣李叶绣线菊.....	181
大火草.....	160	茜草科 Rubiaceae	
华北楼斗菜.....	161	牛白藤.....	181
驴蹄草.....	161	楠藤.....	182
花葶驴蹄草.....	162	玉叶金花.....	182
绣球藤.....	162	鸡矢藤.....	183
还亮草.....	163	无患子科 Sapindaceae	
川西翠雀.....	163	倒地铃.....	183
川赤芍.....	164	三白草科 Saururaceae	
禺毛茛.....	164	鱼腥草.....	184
石龙芮.....	165	虎耳草科 Saxifragaceae	
天葵.....	165	常山.....	185

中国绣球·····	185	马鞭草科 Verbenaceae	
绢毛山梅花·····	186	杜虹花·····	203
七叶鬼灯檠·····	186	兰香草·····	204
羽叶鬼灯檠·····	187	单花莼·····	204
红毛虎耳草·····	187	白花灯笼·····	205
虎耳草·····	188	赧桐·····	206
玄参科 Scrophulariaceae		马缨丹·····	206
母草·····	189	假连翘·····	207
通泉草·····	189	马鞭草·····	208
圆苞山罗花·····	190	单叶蔓荆·····	208
鹿茸草·····	190	堇菜科 Violaceae	
大卫氏马先蒿·····	191	双花堇菜·····	209
全叶马先蒿·····	191	犁头草·····	209
天目地黄·····	192	紫花地丁·····	210
地黄·····	193	早开堇菜·····	211
单色蝴蝶草·····	193	姜科 Zingiberaceae	
波斯婆婆纳·····	194	小草蔻·····	211
茄科 Solanaceae		益智·····	212
洋金花·····	194	艳山姜·····	212
曼陀罗·····	195	闭鞘姜·····	213
假酸浆·····	195	舞花姜·····	213
海桑科 Sonneratiaceae		笔画索引·····	214
八宝树·····	196	拉丁学名索引·····	219
梧桐科 Sterculiaceae		参考文献·····	223
火索麻·····	197		
假苹婆·····	197		
苹婆·····	198		
山茶科 Theaceae			
尖叶山茶·····	199		
金花茶·····	199		
木荷·····	200		
瑞香科 Thymelaeaceae			
狼毒·····	200		
伞形科 Umbelliferae			
紫花前胡·····	201		
抱茎柴胡·····	201		
短毛独活·····	202		
败酱科 Valerianaceae			
白花败酱·····	202		
缬草·····	203		



科属：爵床科鸭嘴花属	学名： <i>Adhatoda vasica</i>	别名：野靛叶、鸭子花、大还魂
------------	----------------------------	----------------

鸭嘴花

形态：大灌木，高达1 ~ 3米。枝圆柱状，灰色，有皮孔。叶纸质，卵形或椭圆状卵形、披针形或矩圆状披针形，长15 ~ 20厘米，宽4.5 ~ 7.5厘米，顶端渐尖，全缘。茎叶揉后有特殊臭味。

穗状花序卵形，花冠白色，有紫色或粉红色条纹，长2.5 ~ 3厘米，冠管卵形。蒴果近木质。



花冠白色



叶纸质，全缘

生长环境：喜温暖、湿润及阳光充足的环境，不耐寒。对土质无特殊要求，一般土壤均可生长。

应用：①多种植于公园、小区，也可盆栽置于阳台、天台等处观赏。②全株入药，具有接骨、祛风止痛、祛痰的功效。

分布：广东、广西、海南和云南等地。我国南方有栽培，在部分地区已逸为野生。

科属：爵床科白接骨属	学名： <i>Asystasiella neesiana</i>	别名：尼氏拟马偕花
------------	----------------------------------	-----------

白接骨

形态：多年生草本，高60 ~ 100厘米；茎4棱。单叶对生，叶片卵形至椭圆状长圆形，长5 ~ 20厘米，边缘具浅齿或微波状。总状花序顶生，长6 ~ 12厘米；花单生或对生；花冠紫色或淡紫红色，漏斗状，花冠筒细长，长约3 ~ 4厘米，裂片5。蒴果长椭圆形，长1.5 ~ 2厘米。花期9 ~ 10月。

生长环境：多生于溪边或林下；喜湿润及半阴环境。

应用：①可供观赏。②叶和根状茎入药，具有止血的功效。



分布：产于华东、华中、华南及西南等省。印度、越南及缅甸也有分布。

科属：爵床科板蓝属

学名： *Baphicacanthus cusia*

别名：马蓝、南板蓝根



板蓝

形态：多年生草本，高约1米，通常成对分枝。叶纸质，卵形或椭圆形，长10 ~ 25厘米，宽4 ~ 9厘米，边缘有粗锯齿。穗状花序直立，长10 ~ 30厘米，花冠圆筒形，冠檐5裂，玫瑰红色、堇色或白色。蒴果棒状，长约2厘米，种子卵形。花期秋季。

生长环境：常生于潮湿的沟谷、林下等地。喜湿润、半阴的环境。

应用：①叶可提取蓝色染料。②根、叶入药，具有清热解毒、凉血消肿的功效。



分布：广东、广西、海南、福建、台湾、云南、四川、贵州和浙江等省区；孟加拉国、印度、缅甸至中南半岛均有分布。我国中部、南部及西南地区有栽培。

科属：爵床科假杜鹃属

学名：*Barleria cristata*

别名：蓝钟花、洋杜鹃

假杜鹃



冠檐5裂,
裂片长圆形

形态：小灌木，高达2米。茎圆柱状，被柔毛，有分枝。叶片纸质，椭圆形、长椭圆形或卵形，长3 ~ 10厘米，宽1.3 ~ 4厘米。

花在短枝上密

集，通常2朵生于叶腋；花冠蓝紫色或白色，2唇形，花冠管圆筒状，冠檐5裂，

裂片长圆形。蒴果长圆形，长1.2 ~ 1.8厘米。花期11 ~ 12月。

生长环境：生于海拔700 ~ 1100米的草坡、路旁、林下或岩石中。习性强健，对栽培的环境要求不严。

应用：①可在公园、庭园等处栽培。②全草入药，具有通筋活络、解毒消肿的功效。



叶片
纸质

分布：广东、广西、海南、福建、台湾、云南、四川、贵州和西藏等省区；中南半岛、印度及印度洋一些岛屿也有分布。

科属：爵床科钟花草属

学名：*Codonacanthus pauciflorus*

别名：针刺草

钟花草

形态：纤细草本，茎直立或基部卧地。叶薄纸质，椭圆状卵形或狭披针形，长6 ~ 9厘米，宽2 ~ 4.5厘米，顶端急尖或渐尖，全缘或有时呈浅波状。花序疏花，花在花序上互生；花冠钟形，白色或淡紫色，长约8毫米，裂片5。蒴果长1.5厘米。花期10 ~ 11月。

生长环境：生于海拔800 ~ 1500米的密林下或潮湿山谷。喜湿润、温暖的环境，忌强光。

应用：观赏。



花冠钟形, 白
色或淡紫色



叶薄纸质



花在花
序上互生

分布：广东、广西、海南、台湾、福建、贵州和云南等省。孟加拉国、印度和越南也有分布。

科属：爵床科驳骨草属

学名： *Gendarussa vulgaris*

别名：接骨草

小驳骨

形态：多年生草本或亚灌木，高约1米。茎圆柱形，节膨大，枝对生。叶纸质，狭披针形至披针状线形，长5 ~ 10厘米，宽5 ~ 10毫米，顶端渐尖，基部渐狭。穗状花序顶生，上部密花，下部间断；花冠二唇形，粉红色或白色，长1.2 ~ 1.4厘米，上唇长圆状卵形，下唇浅3裂。蒴果长约1.2厘米。

花期春季。

生长环境：习性强健，喜温暖、湿润及阳光充足的环境，也耐半阴。对土质要求不严，常野生于路旁灌丛中。

应用：①南方多用于绿篱，适合园路两边、庭院应用。②全株入药，性温、味辛，可治疗跌打损伤、舒筋活络。

花冠二唇形，
粉红色或白色

顶端渐尖

基部
渐狭

叶狭披
针形至
披针状
线形

分布：广东、广西、海南、福建、台湾和云南等省区；印度、斯里兰卡、中南半岛到马来半岛也有分布。我国南方常见栽培。

科属：爵床科观音草属

学名： *Peristrophe baphica*

别名：红丝线、染色九头狮子草、蓝茶

观音草

叶卵形或有时
披针状卵形

形态：多年生直立草本，高可达1米。分枝交互对生，具钝棱和纵沟。叶卵形或有时披针状卵形，顶端渐尖至急尖，干时黑紫色。聚伞花序，由2 ~ 3个头状花序组成，顶生或腋生。花冠粉红色，长3 ~ 5厘米，被倒生短柔毛。花期冬春。

生长环境：多生于海拔500 ~ 1000米的林下。喜湿润及半阴的环境，忌强光。

应用：①可观赏栽培，也可药用栽培。②嫩枝和叶可做染料。③入药，可治疗痰多、咳嗽吐血等症。

花冠
粉红色

顶端渐
尖至急尖

分布：广东、广西、海南、湖南、湖北、江西、贵州和云南等省；印度、斯里兰卡、中南半岛、马来西亚到新几内亚均有分布。现我国有少量栽培。

科属：爵床科灵枝草属	学名： <i>Rhinacanthus nasutus</i>	别名：白鹤灵芝、仙鹤灵芝草
------------	---------------------------------	---------------

灵枝草

形态：多年生草本或亚灌木，株高1 ~ 1.5米；茎密被短柔毛。叶对生，椭圆形或卵状椭圆形，顶端短渐尖或急尖，全缘，两面被柔毛。聚伞花序，着生于枝梢或叶腋，花冠白色，唇形，上唇披针状，比下唇短；下唇3裂至中部。

下唇3裂
至中部



上唇
披针状



生长环境：生于海拔700米左右的疏林下或灌丛。喜温暖、湿润及半阴的环境。

应用：①多供药用栽培，全草入药，可治疗皮肤病、肺结核、咳嗽和高血压等症。②叶可加工为白鹤灵芝茶。



顶端短渐
尖或急尖

分布：原产我国云南省；菲律宾也有分布。我国海南、广东及印度、半岛及印度尼西亚均有栽培。

缅甸、中南

科属：爵床科马蓝属	学名： <i>Strobilanthes japonicus</i>	别名：红泽兰
-----------	------------------------------------	--------

垂序马蓝

形态：多年生灌木状草本，高60 ~ 80厘米。茎丛生，四棱形，上端多分枝。叶对生，披针形或卵状披针形，先端钝尖，边缘有疏钝锯齿。短穗状花序生于枝顶叶腋，花淡紫色至白色，直径约1.2厘米；花冠漏斗状，下部细长成筒，略弯，冠檐5裂，先端圆形。花期6 ~ 7月。



边缘有
疏钝锯齿

叶对生

生长环境：生于沟边、路旁及林缘等阴湿处。性喜温暖，较耐寒。

花淡紫
色至白色

应用：①除栽培观赏外，还可作药用植物栽培。②全草入药，性温、味微辛，具有疏肝解郁、活血化瘀、温中利水的功效。

分布：四川、湖北。广东、四川、湖北、海南和云南等地均有栽培。

科属：苋科青葙属

学名： *Celosia argentea*

别名：野鸡冠花、百日红、狗尾草

青葙

形态：一年生草本，高达0.3 ~ 1米。茎直立，绿色或带红紫色，有纵条纹。叶互生，披针形或椭圆状披针形，长5 ~ 8厘米，宽1 ~ 3厘米，绿色常带红色。穗状花序顶生或腋生，花多数，密集，初为粉红色或白色顶端带红色，后成白色。花期5 ~ 9月，果期6 ~ 11月。

生长环境：生于田边、丘陵、山坡、平原等地，分布地区海拔可高达1100米。

应用：①花序可制成干花观赏或用于插花。②嫩茎叶去苦味后可食用。③种子炒熟后可加工糖果。④种子入药，具有清热明目功效。⑤全株可用于动物饲料。



分布：我国各地；朝鲜、日本、俄罗斯、印度、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚及非洲热带地区也有分布。多野生，少有栽培。

科属：石蒜科石蒜属

学名： *Lycoris aurea*

别名：黄花石蒜、铁色箭

忽地笑


形态：鳞茎卵形，直径约5厘米。秋季出叶，叶剑形，长约60厘米。花茎约高60厘米；伞形花序有花4 ~ 8朵，花黄色，花被裂片倒披针形，反卷和皱缩；雄蕊略伸出花被外。蒴果具三棱，种子近球形。花期8 ~ 9月，果期10月。

生长环境：生于阴湿山坡等地。喜温暖、光照充足的环境，不耐寒，忌暑热，对土质无特殊要求。

应用：①常见的栽培观赏植物，主要用于公园、园林绿地、小区及庭院，也可盆栽观赏；②鳞茎可提取加半他敏，是治疗小儿麻痹后遗症的良药。



分布：福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南等省；日本及缅甸也有分布。我国栽培广泛。

科属：石蒜科石蒜属	学名： <i>Lycoris radiata</i>	别名：红花石蒜、龙爪花、 蟑螂花、平地一声雷
 石蒜 形态：鳞茎宽椭圆形至近球形，直径1 ~ 3厘米。叶深绿色，狭带状，秋季花茎枯萎后即抽出。花茎高30 ~ 60厘米，伞形花序有花4 ~ 7朵，花红色，花被裂片狭倒披针形，边缘皱缩，广展而反卷；雌、雄蕊伸出花被外，比花被长一倍左右。花期8 ~ 9月，果期10月。 生长环境：生于溪边石缝和阴湿山坡处。喜温暖、湿润或半阴的环境，较耐寒，对土壤要求不严。 应用：①栽培广泛，适合校园、小区、公园及风景区栽培观赏，也适合庭院栽培或盆栽观赏。②鳞茎入药，具有解毒、祛痰、利尿、催吐和杀虫等功效。 注意：有小毒，忌误食。  分布：陕西、山东、河南以及长江以南各省。日本也有分布。		

科属：夹竹桃科清明花属	学名： <i>Beaumontia grandiflora</i>	别名：比蒙藤、炮弹果
清明花 形态：高大藤本，茎有皮孔。叶长圆状倒卵形，长6 ~ 15厘米，宽3 ~ 8厘米，顶端短渐尖，叶柄长2厘米。聚伞花序顶生，花3 ~ 5朵或更多；花萼裂片倒卵形、倒披针形或长圆状披针形；花大，美丽，白色，有香味；花漏斗形，花冠筒长约10厘米，先端5裂，裂片卵圆形。蓇葖果形状多变。花期春夏季，果期秋冬季。 生长环境：生于山地林中。喜温暖、阴湿的环境，不耐寒；以疏松、排水良好的沙质壤土栽培为佳。 应用：①园林栽培多植于藤本园，也可植于树下任其攀爬。②根、叶入药，可治疗风湿痛、跌打损伤等症。		
 分布：云南省；印度也有分布。现我国的广东、广西、海南和福建等地均有栽培。		