

增補壽世保元

太乙神鍼附後
錦章書局出版

300



太醫院史目金鑑雲林龔廷賢子才編

眩暉

脉風寒暑濕氣鬱生，延下虛上實。皆暉而眩。風浮寒繁，濕細暑虛，涎泣而滑。虛脉則無治。暉者言其黑暉，言其轉冒。言其昏暉，暉之與冒，暉其義一也。其狀目閉眼，眩身轉耳聾。如登舟車之上，此謂欲倒。蓋虛極來，實亦不可一途而取軌也。風則有汗，寒則掣痛，暑則熱悶，濕則重滯。此四氣乘虛而暉暉也。喜怒哀樂悲恐憂喜，鬱而生痰，隨風上厥，情致虛而暉暉也。淫慾過度，腎家不能繼氣歸原，使氣逆奔而上。此暉暉之出於氣虛也。明矣。吐衄崩漏，肝家不能收攝，營氣使諸血失道妄行。此暉暉之生於血虛也。又明矣。以致新產之後，血海虛損，或瘀不行，皆能暉暉。豈可不推尋致病之因乎？治法隨機應敵，其間以升降鎮嘔行焉。最不可妄施汗下。然而暉暉欲解，自汗則有之。若諸逆發汗，劇者言亂目眩，與夫少陰病下利止，而頭眩時時自汗者，此虛極而脫也。識者將有采薪之憂。

清暉化痰湯 主方治暉暉之總司也。陳皮去半夏姜汁白茯苓去皮各防風羌活各甘草三錢，枳實一錢，川芎黃芩酒炒各白芷細辛南星各七分右剉一劑，生薑三片水煎服。以此作丸亦可。

○氣虛加人參七分，白朮去蘆一錢。○血虛加當歸倍川芎。○有熱加黃連、薑炒七分。

○有熱加黃連、薑炒七分。

○一論頭暉眼黑，惡心煩悶，氣短促，上喘無力，言語心神顛倒，目不敢開，如在風雲中，頭若裂，身重如山，四肢厥冷，不得安卧。此乃胃氣虛冷停痰而致也。

半夏白朮天麻湯 方見頭疾

○一論勞役之人，飢寒暉暉者，脈虛弱也。

補中益氣湯 方見勞瘵 依本方加半夏天麻白芍熟地黃。○一暉暉屬氣虛，有濕痰者，依本方去升麻柴胡加白茯苓川芎。

○一論陰虛火動，暉暉者，脉必數也。

清離滋坎湯 方見勞瘵 依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許。

○一論真陽不足，上氣喘急，氣短自汗，虛極欲倒，如坐舟車。暉暉手足冷，脉虛細也。

參附湯 人參五錢大附子炮三錢右剉一劑，生薑十片水煎熱服。

○一論暉暉之症，因氣虛痰火夾上，故也。

清陽除暉湯 人參六錢白朮一錢白茯苓一錢明天麻八錢，桂榔八錢，覆盆子一錢甘草四錢右剉一劑，生薑三片水煎服。

○一論肥白人日常頭眩眼花。卒時暈倒者名曰疾暈。

清疾祛眩湯 天南星姜汁泡半夏製 天麻 羌活 蒼朮米泔水 川芎 陳皮 茶芩去皮桔梗 枳殼去核烏鵲 酒芩八分 甘草三分 右剉

生薑水煎臨服。入竹瀝生薑汁同服。

○一論體虛之人一時為寒所中。口不能言。眩暈欲倒。手足厥冷。

蓋附湯 乾薑兩 大附子生去皮兩 右剉每服五錢水煎溫服。

○一論一切失血過多。眩暈不醒者。

芎歸湯 川芎 當歸各等

右剉一劑水煎溫服。○虛甚加炮過大附子。

○一論氣血兩虛而伏寒作頭目眩暈者。

十全大補湯方見補益 依本方如有瘦加陳皮半夏。

○一治一人生形體魁梧。不慎酒色。因勞怒頭暈仆地。痰涎上湧。手足麻痺。口乾引飲。六脉洪數而虛。予以為腎經虧損不能納氣歸原。而頭暈不能攝水歸原而為痰。陽氣虛弱而麻痺。虛火上炎而作渴。以補中益氣湯合地黃丸。料治之而已。○一人氣短痰暈。服辛杏之劑。痰甚逼肺。兩尺浮大。按之如無。予以為腎家不能納氣歸元。杳燭致甚耳。用八味丸料。三剉而愈。八味丸見補益 ○一人形體虛勞。神喜怒而帶陽色。口渴吐痰或頭目眩暈。或熱從眼起。左三脉洪而有力。予以為足三陽虧損。用補中益氣湯加麥門冬。五

味及加減八味丸而愈。○一大方疾暈湯 法半夏錢一錢。橘紅一錢。赤茯苓錢一錢。青芩酒洗七分。白术一錢。

膏錢。薄荷錢。甘草一分 右剉一劑。生薑三片水煎臨卧服。○一生冒形體魁梧。不慎酒色。因勞怒頭暈仆地。痰涎上湧。手足麻痺。

口乾引飲。六脉洪數而虛。予以為腎經虧損不能納氣歸原而為痰。陽氣虛無而麻痺。虛火上炎而作渴。補中益氣。含六味丸料治之而愈。其後或勞役或入房。其病即作用前藥而愈。○一孟都憲氣短痰暈。服辛杏之劑。痰盛。遺尿。兩尺浮大。按之如無。余以為腎家不能納氣歸原。杳燭致盛耳。以八味丸料三剉而愈。○一孫都憲形體虛勞。神喜怒而帶陽色。口渴吐痰。或頭目眩暈。或熱從腹起。左三脉洪而有力。右三脉洪而無力。余謂足三陰虧損。用補中益氣加麥門冬。五味及加減八味丸而愈。

十全大補湯見補益 補中益氣湯見內傷八味丸 見補益

麻木

脈浮而濡屬氣虛。關前得之。麻在上體。關後得之。麻在下體也。脉浮而緩屬濕為麻痺。脉緊而浮屬寒為痛痺。脉涩而芤屬死血為木不知痛癢。內經曰。風寒暑三氣合而為痺。故寒氣盛者為痛痺。濕氣勝者著痺。河間曰。留着不去。四肢麻木拘掣也。經又曰。痛者寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深榮衛之行滯。經絡時疏。故不痛。皮膚不濡。故為不仁。夫所謂不仁者。或周身。或四肢。唧

○一論麻木遍身手足俱麻者此屬氣血兩虛宜
加味八仙湯 當歸酒川芎 熟地黃各六分白芍八分人參六分白术去芦二錢陳皮八分半夏曲分白茯苓去皮桂枝三分柴胡分羌活五分防風分秦艽六分牛膝六分甘草各三分 右剉一劑生薑一片棗一枚水煎食遠服

○一論氣虛加黃芪蜜炒八分

○一論麻是渾身風虛也

○一論減益氣湯 黃芪炒人參 白朮 大陳皮 當歸酒一升麻 柴胡 木香各五分香附 青皮桂川芎各七分桂枝 甘草各三分

○右剉一劑生薑煎服

○一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

○補中益氣湯 依前方去青皮川芎桂枝加麥冬三錢防風烏藥共十四味

○一論本是濕痰死血也

○雙合湯 當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏 姜炒共桃仁去皮尖八分白茯苓去皮紅花三分白芥子錢甘草三分

○十片水煎熟入竹瀝薑汁全服

○一論手足麻痺因濕所致也

○香蘇散 方見感冒依本方加蒼朮麻黃黃桂枝白芷羌活木瓜

○一論感風濕手脣或痛或木或遍身麻木

○五精散 方見中寒

○一論婦人心七情六慾氣滯經絡手足麻木宜

○開結舒經湯 薰蘇 陳皮 香附 台烏 川芎 蒼朮米泔水各一錢南星 半夏 當歸各八分桂枝加甘草三分

○入薑汁竹瀝服

○一論口角麻和涎及口角頭面赤腫或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木宜

○止渴消痰飲 黃連 半夏 瓜蒌仁 黃芩 白茯苓 桔梗 枳殼炒 陳皮 天麻 細辛 南星 甘草 右剉生薑三片

水煎服。○血虛加當歸。氣虛加人參。亦有十指麻。胃中有濕痰死血。加蒼朮白朮少佐。熟附子。行經中死血者。四物湯加紅花桃仁韭菜。忘生冷魚腥。發風發熱之物。

○一論十指疼痛。麻木不仁。大附子木香各等分。每服三錢。薑三片。水一碗。煎七分服。

○一論婦人遍身麻痺。謂之不仁。皆因血分受風濕所致。用祛風散送下五補丸。

祛風散 生川烏 白朮 法白芷 各三錢 甘草二錢 右為細末。酒調吞下五補丸。

五補丸 黃芪(一兩)人參五錢附子一个。當歸三錢。白芍(酒炒)五錢。右為細末。蜜煉為丸。如梧子大。每服五七十九粒。祛風散送下。

○一論不仁者。謂不疼和也。痛痒不知針灸。不知是也。經曰。諸乘虛寒而鬱冒。不仁。蓋其血氣虛弱不能周流於一身。於是正氣為邪氣所伏。故肢體頑麻。不知痛癢。寒過厥如死屍而鬱且日也。用麻桂各半湯不愈者。補中益氣湯入薑汁。設或汗如油喘不休喘而直視水漿不入者。此為命絕也。

○一論風熱血燥。皮膚癢痒頭面手足麻。

清涼潤燥湯 當歸酒生地黃各一錢。黃連 黃芩 白芍 墓川芎 各一錢 天麻 防風 羌活 荆芥 各八錢。細辛 分六錢。甘草五錢。右剉水煎。

食迷脹。麻甚加川烏炮三分。

○一論面上木處可將桂枝為末。用牛皮貼。和少水化開。調敷之厚一二分。若脚底硬木處。可將牛皮鎔化入生薑汁調和。仍入南星

末五錢。和匀。臘用厚紙搘貼二三分。乘半熟裏貼脚底。用溫火烘之。此外治也。

○一治兩手指麻木。四肢困倦。怠惰嗜卧。乃熱傷元氣也。黃芪八錢。人參五錢。白芍三錢。柴胡二錢。升麻二錢。五味子十四粒。生甘草五錢。炙甘草

蓬子 右剉水煎。稍熱空心服。○一治兩腿麻木。沉重無力。多汗喜笑。口中涎下。身重如山。語聲不出。右寸脉洪大。黃芪三錢。當歸二錢。陳皮一錢。桔梗一錢。黃柏一錢。柴胡一錢。升麻一錢。知母酒炒五味子一錢。生甘草二錢。右每剉一錢。水煎空心服。少待以早飯壓之。

○一治皮膚間有麻木。乃肝氣不行故也。黃芪一兩。白芍一兩。橘皮一兩。澤瀉五錢。炙甘草一兩。右剉水煎溫服。

癲狂

癲脉搏大滑者。沉小緊急不治。狂脉寔大生沉小死。癲脉虛可治寔則死。

內經曰。巨陽之脈。則脰痛。頭重足不能行。發為胸仆。而暴仆也。是蓋陽氣逆亂。故令人卒然暴仆。而不知人氣復則甦。此則癲之類也。又曰。陽明之脈。則癲疾。欲走吐。腹滿不得卧。面赤而熱。妄見妄言。又曰。其則棄衣而走。登高而歌。踰垣上屋。罵詈不避親疏。是蓋得之於陽氣太盛。胃與大腸寔然躁火。鬱結於中。而為之耳。此則癲狂之候也。曰。癲曰狂。分而言之。亦有異乎。難經謂重陰者癲重

陽者。極素問註云。多喜為癲。多怒為狂。然則喜傷於心。而怒傷於肝。乃二臟相火有餘之症。難經陰陽之說。恐非理也。大抵狂為疾。陽者極素問註云。多喜為癲。多怒為狂。然則喜傷於心。而怒傷於肝。乃二臟相火有餘之症。難經陰陽之說。恐非理也。大抵狂為疾。

火實盛極為心血不足多為水多而火不得生者有之癲病獨主半癲因火動之所作也治法癲者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三症者若神脫耳目瞪如愚痴者縱有千金我醉吾末如之何也已矣○癲者喜大不常顛倒錯亂之謂也○狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也又云狂者狂亂而無主定也○讖語春合日自言日用常行之事為諺也又蓄血症則重復語矣○鄭聲顫無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也○陰陽則狂陽附陰則癲脫陰者目盲脫陽者見鬼

○一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常
養血消心湯 人參 白朮去白茯苓去遠志去川芎各一
甘草五分 麻門冬去心一錢 五分 右剉

一劑水煎服

○一論狂者疾大寒盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱盛者宜

防風通聖散 方見中風 依本方加生地黃桃仁主之一切大風癲狂之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也 以海鹽二兩大燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次啜之以釵探吐熱痰次服

黃連解毒湯 方見感冒 依本方加半夏竹葉竹瀉薑汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也

加味道遙散 當歸 白芍炒白朮去白茯苓去生地黃 柴胡 遠志去皮蘇木 紅花 甘草 右剉一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地黃砂水煎服

○一論發狂無時拔頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心人參主心腹結氣故足以治時疾時熱狂言

苦參丸 苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸薄荷湯送下

○一論一切癲癇瘋狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪蘊結頓服此經效 抱膀丸 水銀一兩硃砂一兩鉛半兩乳香研一兩 右將鉛入跳內水銀結成砂子次下硃砂滴乳乘熱用郁木棍研氣丸如芥實大每一丸空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再服一丸除根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癲狂失心不寐此方用硃砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能安神歸心杏可使利數故乳膏能安神達心志許學士加人參亦謂人參能安心耳

靈芝膏 砂仁炒五分 乳香錢一錢 人參一錢 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癲狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

白金丸 白朮去川芎金砂右為末米糊丸每服五十九溫水送下

○一論癲狂五癇驚悸一切怪症此皆痰火是盛也。

清心渡痰丸 大黃

酒兩黃芩一錢青蒙石五錢沉香半錢牙皂半錢犀角五錢原寸加珠砂五錢

右為細末水為丸每服四五十丸滾水送下

洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下

○一人癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之即愈○一人

氣心風即痰迷心竅發狂用真花石脂黃酒淬一次為細末每服一錢黃酒送下序謂言之心風與風何干涉若痰不盛則有感亦輕

○一論久患心風癲狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守全多言不定此藥大能安神養血寧心定志以柴河車一具長流水

洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下○一人癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之即愈○一人

氣心風即痰迷心竅發狂用真花石脂黃酒淬一次為細末每服一錢黃酒送下

○一人癲狂五癇眩暎時作時止痰涎壅盛心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰鬱人也

驅風化痰湯 人參 白朮 去皮半夏炒黃芩 陳皮 枳實 炒當歸酒洗川芎 白芍 炒桔梗 南星 遠志 甘草泡去心水 瓜蔞仁 白附子

殼桑 天麻 黃連 炒黃芩 甘草 右剉一劑生薑五片水煎溫服

○一癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守全多言不定一切真氣虛損用紫河車入補藥內服之大能安神養血寧心定志治健忘驚

悸怔忡不寐以六味丸加遠志石菖蒲人參白朮各當歸酸棗仁炒○一治心恚狂惑用無灰酒一碗真麻油四兩共和少楊柳

二十條逐一條搗一二下搗過楊枝直候油酒相和如膏煎至八分強者強灌之令熟睡或吐或不吐覺來即醒○一治狂言鬼語

用蝦蟆一個燒為末酒調服○一治癲狂諸病將軍湯 大黃

酒一兩 右用水三升煎之分作三服

○一癲狂病者多怒為癲多喜為狂癲者精神不守言語錯亂妄見妄言登高罵詈是也狂之病始發少卧少飢自賢自責妄妄動登

高而亂棄衣而走是也癲病者賊邪之并於肝狂病者賊邪之并於心也此皆嘔逆宜瀉而不宜補故用大黃以瀉之取其苦寒無

物不降可以瀉實又必數日後方可與食但得寧靜便為吉兆不可見其瘦弱減食方為得體故曰損其食飽之病必再作戒之戒

之緩與之食方為得體故曰損其食飽之病必再作戒之戒

○一治癲狂不食得之驚

厥瘧者用甜瓜蒂半兩為末每服一錢井水調一盞投之即大吐後熟睡勿令驚起神效○一治邪狂癲癲不欲眠妄行不

用白附子一錢半研末和蜜水送下常服一粒能安魂定魄補心益智

○一牧童小子平日口中胡說一片鬼話令人驚駭予診之脉洪大此寘熱也以蚯蚓數條研爛井水調服立愈

○一牧童小子平日口中胡說一片鬼話令人驚駭予診之脉洪大此寘熱也以蚯蚓數條研爛井水調服立愈

癲瘇者發則仆地。悶亂無知。嚼舌吐沫。背反張目上視。手足搐搦。或作六畜聲者。是如益癲疾之原。得之於驚。或在母腹之時。或在有生之後。必因驚恐而致疾。蓋恐則氣下。驚則氣亂。恐氣歸腎。驚氣歸心。併於心腎。則肝脾獨虛。肝虛則生風。脾虛則生痰。塞極而通其發也。暴故令風痰上湧。而癲作矣。內經曰。然所以令人仆地者。厥氣併於上。上是下虛。清濁倒置。故令人仆地。悶亂無知也。濁邪上干天君。而神明壅閉也。舌者。心之苗。而脾之經絡連於舌。本陽明之經絡入上下齒縫中。故風邪壅於心肺。則舌自挺。風邪實於陽明。則口自噤。一挺一噤。故令嚼舌吐沫。春風熱盛於內也。此風來潮湧之象。背反張目上視者。風在太陽經也。足太陽之經起於睛明。挾脊而下。風邪干之。則實而動急。故目上視而背反張也。手足搐搦者。屬肝木。肝本主筋。風熱盛於肝則一身之筋牽掣。故令手足搐搦也。搐搦者。四肢屈曲之名。搦者。十指開提之義也。或作六畜聲者。風痰鼓其氣竅。而聲自變也。譬之弄笛焉。六孔閉塞不同而宮商別異是也。

夫癲之為病。角弓反張。手足搐搦。口吐涎沫。俗云猪圓風也。亦因金衰木旺。生風外出。驚邪入內以致之。蓋癲病一月數發者易治。周一年一發者難治。虛實之判也。實則即攻之。虛者先補可也。治法當先以瓜蒂散吐之。用甜瓜蒂為末。每服一錢。井水調一盞。投之即大吐後熟睡勿令驚起。即效。後以湯藥調理。

○一論癲者宜下。宜吐。茶子喜湧。而能吐頑痰。宜取一丹。搗爛。煎湯服。得大吐便止。

○一論諸癲。神智不靈。時發狂燥。多言好怒。而容不潔。

定神至寶丹 生地黃 姜炒五錢 炙甘草 炒五錢 橘紅 貝母 白芥子 去皮 黃連 遠志 去皮 石菖蒲 酸棗仁 炒五錢 枳實 炒五錢 瓜蔔仁 天花粉 甘草 炒五錢 右剉生薑三片。水煎服。

○一論癲者痰涎壅併然也。

加減導痰湯

主方神效

南星 姜炒半錢 夏陳皮

白芍 去皮 瓜蔔仁

枳實 炒五錢 桔梗

山梔子 黃芩 去皮 一黃連 姜炒各一錢

白芥子 去皮 甘草 炒各一錢

石菖蒲 黃連 姜炒附一錢

參門冬 川芎

清心抑氣湯

當歸酒白芍 炒去皮 白朮 去皮 薤白

茯苓 去皮 陳皮 去皮 半夏 炮

桔梗 炒 山梔子 去皮 黃芩 去皮 一黃連 姜炒各一錢

甘草 炒各一錢

木香 炒各一錢

竹茹 炒各一錢

石菖蒲 炒各一錢

黃連 姜炒附一錢

人參 遠志去皮 甘草 各四錢

右剉一劑。生薑煎服。

另研辰砂 五分

右剉一劑。生薑煎服。

另研辰砂 五分

右剉一劑。生薑煎服。

另研辰砂 五分

右剉一劑。生薑煎服。

另研辰砂 五分

○一論大人小兒。忽然昏倒。地五癲之症。

殊妙水飛用諸心一个削開入砂末五錢。溫酒泡

入後药去子。病人空心食。

南星 沸湯浸三次 劍南酒製二兩。巴豆仁 五錢 石灰

人仁 在內灰令取一錢。又炒以仁全竭去皮。二錢

失足落水。龍胆草 二錢 右為末。麵糊丸。如梧子大。每服十五丸。薑湯送下。

○一論風癲。搐心。志發狂棄衣而走。登高而歌。或數日不愈。踰垣上屋。妄言罵詈。不遵親疎。妄見鬼神。一切潮熱。及風中厭迷牙關。

在內再炒。據此用諸。解去油灰不用。

全竭去皮。二錢。

失足落水。

龍膽草 二錢 右為末。麵糊丸。如梧子大。每服十五丸。薑湯送下。

緊急並可治之

三聖散 防風去薑瓜蒂炒二錢

二錢
藜蘆去苗加減用或一兩或半兩或二兩

右為粗末每服五錢用薑汁二盞煎三沸瀝於大碗中再用薑一盞煎渣三

沸卻入先煎鵝同熬三沸澄清候溫徐徐投下不必盡劑如吐不止煎另白湯嚥三五口立解如不吐再加服之○如服藥多不

吐出處再飲薑汁鹽湯各一二盞投之如不出以光銳喉中探引即出矣須用白盆一个黑盆不見涎形狀吐出青黃涎沫二三升為效吐罷之後吃微溫白粥一二頓此三性散汗吐下三法俱行防風發汗瓜蒂下泄藜蘆湧吐凡用法則禁忌症候小者勿服病久雖合吐勿服○吐血人勿服○主病不正勿服○環口不能正勿服○先正病人心神居淨室中善侍病者一二人溫克和柔喜誘病人則妙矣健防吐後肢牽踰摸呻吟病人請狂必損吐瀉能可溫水及新水降心火勿食熱物

○一論諸風癱瘓不能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩暎胸中煩鬱痰壅塞精神昏倦心氣不足神志不驚恐憂慘虛煩少睡或發癲狂小兒驚癇風搐大人暗風羊癲風癱發叫如雷其效如神

千金保命丹 珠砂此珍珠一錢一胆星一錢甘草一錢麻黃去根節一錢白附子炮一錢雄黃一錢薄荷一錢防風一錢琥珀一錢金箔一錢牛黃一錢一僵蠶炒犀角一錢

麥門冬去心一錢枳殼去核一錢桔梗芦地骨皮一錢神曲炒一錢白茯神去皮一錢白木香去皮一錢人參去芦一錢遠志去心一錢紫胡錢三天麻錢膽碧七分水片少許黃芩錢廣府杏仁錢

紫河車錢天竺黃錢荆芥錢蟬退七分川芎一錢牙皂各一錢右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣用蠟包裹封口取開每服一丸薄荷煎湯磨化下不拘時服忌猪羊肉蝦米胡桃動風之物○一冬伯王指庵公子患癇七年請醫罔效召余治以追風祛疾丸

安神丸二丸兼進半年而愈逾四年未發復因不善保守病發如前差役復求余治余以此方製藥一料投之輒效迄今數年不發氣體已復原矣曩年公優渥贈余匾曰醫士無雙余因此方屢驗故更一字名曰

醫癇無雙丸 南星兩半夏一兩一末用白鵝皂角生姜煎湯浸一夜後切片白鵝皂角去皮姜煎湯浸不用川芎一錢歸身酒炒一錢軟石膏一錢天麻錢僵蠶生地黃一錢荆芥一錢柏穗

五辰砂錢川獨活錢烏犀角錢白茯苓去皮一錢遠志去心一錢水來冬去皮一錢白木香一錢陳皮去白一錢酸棗仁炒五錢軟石膏一錢黃芩錢川黃連

去毛白附子錢珍珠錢甘草各三錢金箔三十片右為細末好酒打稀糊為丸如梧子大金箔為衣每服五十丸空心白湯送下最能

祛風化痰降火補益養血理脾益心定志輕者半料重者全料○一兒十五歲御女後復勞役考試失意患癇狂三年矣過勞則發用十全大補湯加味歸脾湯之類更以紫河車生研如膏入蒸糯米飯為丸如梧子大每服百丸日三四服而癇後遺精盜汗發熱仍用前藥及六味丸而愈此方治癇不拘老幼皆效

清心滾痰丸 治諸風癱瘓有殊效

○一治醫癇方

白堊一兩半荆芥穗二兩

右為末麵糊為丸如黍米大珠砂為衣每服二十九薑湯送下

夫健忘者殊然而忘其事也。蓋心力因重不省而事有始無終。一言訛不知首尾。或主於心脾。二經心之官則思。脾之官亦主忘。此由心慮過急傷於心。則血耗散神不守。舍傷於脾。則胃氣衰傷。而痰火生。二者皆知人事。則卒然而忘也。蓋心主血。因血少而不能養其真臟。或停飲而致勞。以生痰氣。既導脾不得舒。是病皆由此作治之。必須養其心血。理其脾土。凝神定智之劑以調理。亦當以幽閒之處安樂之中。使其絕於憂慮。遠其六慾七情。如此日漸安矣。

○一論思慮傷脾。不能攝血。致血妄行。或吐或下。或健忘。怔忡。驚悸。不寐。發熱。益汗。或心脾傷痛。嗜卧。少食。大便不調。或血虛發熱。或肢體重。婦人月經不調。赤白帶下。或晡熱。內熱。療癰流注。不能消耗。清飲。或因虛傷脾。而作瘧病。歸脾湯。主方。人參。甘草。白木。白茯苓。五錢。白芍。三錢。當歸。三錢。遠志。一錢。甘草。龍眼肉。十克。酸棗仁。三錢。木香。八分。甘草。六分。右剉薑藥煎服。

○一論諸症健忘及驚悸。怔忡等症。

加減補心湯。人參。白茯苓。陳皮。白芍。酒。遠志。甘草。冰糖。棗仁。炒知母。白木。生地黃。當歸。石菖蒲。來門冬。法黃柏。酒。甘草。右剉薑藥煎服。

○一論益心保神。益血固精。壯力強志。令人不忘。有三集化痰滋祐扶頑。療咽乾除驚悸定怔忡。育養心神。大補元氣。讀書勞神勤政。勞心並宜服之。

天王補心丹。大中丞松石劉公傳。加石菖蒲。百部。杜仲。甘草。懷生地。四天門。冬法桔梗。各五錢。當歸。柏子仁。酸棗仁。炒五味子。

各一錢。麥門冬。法遠志。甘草水。白茯苓去皮。元參。丹參。人參。○一方。加酒炒黃連二兩。右為細末。煉蜜為丸。如梧子大。砂砂為衣。每服二十九粒。臨困。燈心竹葉煎湯送下。燈心棗湯亦可。如飲人多。不思大便。不寢。恐不宜也。又當服後方。

安神定智丸。功同補心丸。人參。五錢。白木。白茯苓。白芍。神。法遠志。甘草水。石菖蒲。去毛。黃柏。酸棗仁。炒各一錢。辰砂。另研。水。蜜。為衣。右為細末。元服肉四兩。熟石膏三兩。為丸。如梧桐子大。辰砂為衣。每服二十九粒。清米湯送下。不拘時日。

○一論凡人多識不忘。春心血足而無所蔽也。若心血不足。邪氣蔽之。則傷其虛靈之體。而學問易忘矣。通介虫之靈物也。龍鱗蟲之靈物也。假二物之靈。以養心之靈。欲其同氣相求。云爾。遠志。甘草。溫味厚。可使人心味厚。可使養陰。菖蒲。味辛。氣溫味平。則利竅。氣溫則通。神以之而治易忘。斯近理矣。

聰明丸。春元周用廷經驗。敗風甲。燬龍骨。入龍膽。中遠志。去心。石菖蒲。九節。各等分。右為末。每服一錢。酒調下。日三服。

○一論讀書辛苦。而有房勞者。當歸。生地黃。白木。元參。各一錢。川芎。白芍。白茯苓。黃柏。酒。炒知母。炒來門冬。法山梔。炒甘草。各五錢。右剉一劑。生薑酒服。

○一論癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用紫河車人補藥內服之大能安神養氣益土治健忘
驚悸怔忡不寐用六味丸加速志石菖蒲人參白茯神菖蒲酸棗仁炒

○一論諸虛健忘等症以十全大補湯去川芎肉桂黃芪加陳皮遠志石菖蒲夢門久酸棗仁黃柏知母

驚悸

脉寸口脉動而躁動為驚弱為悸 心中驚悸脉必大結飲食之慄沉伏動滑

夫驚悸即動悸也動之為慄惕然而驚悸之為病心下怯怯如人所捕皆心虛膽怯之所致也又曰驚者恐怖之謂悸
怖驚悸健忘三症名異而病同又云心虛跳躍有時而厥者屬血虛益人之所主者心惟心之所養者血心血虛神氣不守此驚悸
之肇端也

○一人聞聲即驚醫者令病人坐於堂下使兩人扶之醫自堂上以小凳木槌手擊而口云吾擊凳亦常事耳爾何必驚且擊且言患者視之久而驚遂定此深得子治之法也

○一論驚悸怔忡健忘不寐屬心血虛者

補心湯 主方 當歸酒洗

川芎炒白芍

甘草

右剉一劑水煎溫服

○一方加柏子仁

○一論血虛心神不安驚悸怔忡不寐並治

安神鎮驚丸

當歸

川芎

生地黃

白朮

甘草

右剉

一劑水煎溫服

○一方加柏子仁

○一論七情六慾相感而心虛夜多夢寐睡卧不寧恍惚驚怖痰迷屬心氣虛

益氣安神湯 富歸

黃連

生地黃

麥門冬

酸棗仁

遠志

白茯神

破故紙

心

人參

黃芪

膽星

淡竹葉

錢

甘草

右剉一劑薑

一枚水煎服

○一論小兒大人被驚神不守舍痰迷心竅恍惚健忘諸癲癇風心風等症

安神醒心丸

南星末

五味子

連翹

甘草

右剉

一劑水煎服

○一方加柏子仁

仁炒研末

右用雄猪心血

三錢

入竹沥打麵糊為丸如梧桐子大金箔為衣每服五十丸食遠白湯送下小者二十九丸

○一論異夢多驚有二法一於夢中戴粗大靈砂一囊一於枕中置真麝香一囊皆能杜絕異夢而療夜驚

○一論夜夢○陰盛夢大水恐懼○陽盛夢大火燔燎○陰陽俱盛夢相侵○上盛夢飛○下盛夢墮○飽夢與人食飢夢取食○心

夢白物斬血籍○肺實○惡兵刃○血戰○腎虛夢舟船溺水○腎實夢伏水中若有所畏

卷之三

夫怔忡者心中不安惕惕然如人將捕是也屬血虛有虛便動屬虛時作時止者痰因火動瘦人多是無火肥人屬痰怔忡者心胸躁動謂之怔忡此心血不足也多因當貴戚戚貧賤不遂所願而成

○一論血虛火盛怔忡心慌恍惚煩躁不寧

養血清心湯

右剉一劑生薑煎服

○一論心煩憤懣驚悸怔忡胸中氣亂此血虛而火盛也

殊妙神丸

各等分，為末。煉蜜丸，如黍米大。每服五十丸，食遠米湯送下。

○一論思慮即心跳者是心中無氣少血故作怔忡也

四物安神丸

子右對

○一論心氣怔忡而自汗者。不過一二服而愈。

參歸腰子湯

汁送下。如吃不盡腰子同上二味熬渣焙乾為細末。山藥糊為丸如梧子大。每服三五十丸。米湯送下。

○一論精神虛慄恍惚不寧心思昏暗氣不足健忘怔忡

五味寧志丸

右為細末煉蜜為丸。如菜豆大半飢時吞門冬去心煎湯下五六十九。

虛煩

夫虛煩者心胸煩擾而不寐也多是體虛攝養有乖榮衛不調使陰陽者二氣有所偏勝也或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛內經曰陰虛則內熱陽虛則外寒陽盛則外熱陰盛則內寒令人虛煩多是陰虛生內熱所致虛勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之症卻無霍亂臨病宜審之○巢氏病源曰心煩不得寐者心熱也但虛煩不得

寐者痰冷也

○一論病後虛煩不得眠及心胆虛怯觸事易驚短氣憊乏或復自汗等症

溫胆湯 半夏
七錢加竹茹 枳實
三錢加各 陳皮
四錢 白茯苓
去皮二錢半 甘草
一錢半 右剉分二劑薑茶煎服 一方加酸棗仁炒遂

○一論大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不痛不可汗下宜服

竹葉石膏湯方見傷寒

不寐

不寐有二種有病後虛弱及年高人陽衰不寐者有瘧在胆經神不守舍亦令不寐虛者用六君子湯加炒酸棗仁黃芩痰者用溫胆湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁傷寒不寐者當求之本門

○一論心胆虛怯晝夜不眠百方無效服此如神

高枕無憂散 人參
五錢 軟石膏
三錢 陳皮
半夏
姜白茯苓 枳實
炒竹茹 麥門冬
去酸棗仁 甘草
各一錢 右剉一劑龍眼五個

水煎服

○一論動則勞心瘦多少睡心神不足

養心湯 人參 麥門冬
去酸棗仁法 白茯苓
去皮白茯神杜當歸酒白芍酒 遠志
甘草水山藥 龍眼肉
柏子仁 酸棗仁 甘草
將右剉蓮肉五個

安神復睡湯 當歸 川芎 白芍
酒熟地黃 益智仁 酸棗仁
炒遠志去甘草水 遠志
去心水煎溫服

○一論心氣不足恍惚多忘或勞心胆冷夜卧不睡此藥能安神定智

加味定志丸 人參
兩 白茯苓
去皮木遠志 甘草冰石菖蒲
去心冰石菖蒲 滑脂
二錢 酸棗仁
炒二兩 柏子仁
炒二兩 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大

砂乳香為衣每服五十九卧東湯送下

附睡法 睡不厭路覺不厭舒眠者曲膝趺腹以左右肋側卧修養家所謂獅子眼是也如此則氣深滿丹田常暖腎水易生益人多弘舒體而臣則一氣宣而寡蓄神散而不潛故卧惟覺時可舒體耳○西山醫李通引千金方睡訣云睡則必側覺正而伸早晚以時先睡心後睡眼晦昏以為此古今未發之妙

○一論暗虛卧不安心多驚悸 酸棗仁
一兩炒 右為末每服二錢不拘時竹葉湯調下

○一治心下怔忡眼倒即大聲打鼻睡即醒不寐余以羚羊角鳥犀角各用水磨濃汁入將所用或養心湯或復睡湯內服之立效

○一治曉虛常多畏寒不能獨卧如人捕狀頭目不清 人參 茶梗 五味子 桂心各三 柏子仁 甘菊花 白茯苓 桑杞子
分三 山茱萸五錢 地黃五錢 右為末 每服二錢 温酒調下

厥症

臍陽風脉滑而沉實 陰厥脉細而沉伏

氣虛則發厥 血虛則發熱厥者 手足冷也 氣屬陽陽虛則陰凌之 故發厥也 血屬陰血虛則陽凌之 故發熱也 氣虛發厥者 寶用溫藥 血虛發厥者 不宜用涼藥 寶用溫養氣血之藥 以補之 宜養陰黃芪建中湯之類是也 又有一種病實熱者 極而手足厥冷 所謂熱深厥亦深此 寶用涼藥 管以脉別之 此最難辨

○一論陽厥者 是熱深則厥深 盖陽極則發厥也 急以六乙順氣湯治之

○一論陰厥者 始得之 身冷脉沉四肢厥逆足踰卧唇口青或自利不渴 小便色白宜四逆理中湯之類 仍速灸關元一百壯 當有汗為度 一論痰厥者 卒然不省人事喉中有水雞聲者是也 用牙皂白礬等分為末 吹鼻即以膏油一盞入薑汁少許灌之立醒 或燒竹瀝蓋汗灌之亦可

○一論蛇厥者 乃胃寒所致 經曰 蛇者長虫也 胃中冷即吐蛇宜地巾湯加炒川椒五粒 檻榔五分 吐烏梅丸

○一論氣厥者 與中風相似 但風中身溫氣中身冷 以藿香正氣散加南星木香烏藥如存 痘以四七導痰湯主之

○一論暴怒暴死名曰氣厥 益怒則氣上 氣上則上焦氣實而不下行 下焦氣逆而不吸收 故令暴死 氣上宜降之

五磨飲子 木香 沉香 檻榔 枳殼 台烏藥 右五味等分 白酒磨服立效

建中湯見汗症 六一順氣湯見傷寒 四逆湯見中寒 藿香正氣湯見霍亂 四七湯見諸氣

心胃痛

脈沉細而遲者 易治浮大弦長春難治

胃脘痛者多因縱恣口腹喜好辛酸冷飲熱酒而博復食寒涼生冷 朝傷暮損日積月累自營成疾 痰火煎熬血亦妄行 痛血相雜始得升降故胃脘疼痛在酸喫嘔雖惡心皆噎膈反胃之漸者也 俗醫以燥熱之藥治之 以火濟火誤矣 古方有九種心痛曰飲曰食曰風曰熱曰冷曰憚曰蛇曰瘧曰霍亂者皆可以熱藥治之 乎須分久人若明知身犯寒氣口得寒物而病於初得之時當用溫散溫利之藥若拘久則成營矣 营則成熟宜用炒山梔為君 热藥為之嚮導則邪易伏 痘易退 痘安之後若縱恣不改病必再作難治矣 此病雖日久不食不死必須待服藥數劑痛定過一日漸而少食方得痊安其有真心痛者大

寒觸犯心君。又曰：污血衝心，手足青過節者，早發夕死，夕發早死，非藥所能療也。

○一論胃脘積有鬱熱，痛不可忍者。此方治心胃痛之主方也。

清熱解鬱湯 山梔仁炒黑，去皮，研末，每錢五分，川芎一錢，黃連炒香附，各一錢，枳殼去穰，炒蒼朮米泔浸陳皮分甘草三分，右剉一劑，生薑三

片水煎，熱服後戒飲食大半日，再服一劑。神效。如痛甚，加薑汁二三匙，入藥同煎。

○一論諸積氣為痛，心膈痛，腹痛，癥瘕，血瘀，腎氣痛，腸下痛，大使不通，氣噎，宿食不消等症。

神保丸 木香二錢，胡椒五錢，全蝎上蟻巴豆十粒，研末。右為末，入巴豆霜再研，湯浸茶解為丸，如梧子大，硃砂三錢為衣，每服三十

粒。○心膈痛，柿蒂燈芯湯下。○腹痛，柿蒂根薑煎湯下。○血積痛，炒薑醋湯下。○肺氣盛者，白芍蛤粉黃升各一錢，同研為散，煎桑

白皮糯米飲調下三錢。○氣喘，桑白皮、糯米飲下。○腎氣痛，腸下痛，炒回音酒下。○大便不通，蜜調梗榔末一錢調下。○氣噎，木香

湯下。○宿食不消，茶下。或酒漿飲任下。○酒飴熱毒過度，痰飲致臂痛，柿蒂湯下。○諸風，惟膀胱、大腸下痛，最難治，獨此藥能治之。○

有人病項筋痛，諸醫皆以為風，治之數月不瘥，乃流入背膂久之，又注右膝，掣痛甚苦，乃合服一投而瘳，再服除根。

○一論治心胃刺痛，并兩脇肋痛，嘔吐胸痞，大使堅，六脉數，或發熱口乾。

清上飲 柴胡 黃芩 赤芍 厚朴 枳實 施子 磬金 黃連 半夏 青皮 大黃 砂硝 甘草 右剉生薑三片，水煎熱服。

○一治心氣及胃脘諸痛，鬱火所致者。肥施子去殼十五枚，炒黑，去皮，研末，香附童便炒一錢，右剉水煎三滾，入薑汁三四匙，再煎一滾去渣。

人百草霜二匙，調和服之。○一治心胃痛，不可忍者，或心神恍惚。施子炒黃連炒二味等分，用茯苓、苡仁、神減半，水煎服立止。○一

治因多食煎炒燒餅米拌熟麵之類，以致鬱胃脅當心而痛，或嘔吐不已，漸成翻胃。黃連錢甘草一錢，右剉水煎溫服立止。

○一治胃脘心氣作痛，有熱者。酒餅炒施子炒石膏三錢，右剉水煎一服立止。

○一論男婦小兒慣常心腹作痛，宜服一料，以拔病根，永不再發。此藥能消痰涎，消食積，酒積肉積，茶積一切諸癥，在胃脘當心而

痛，及宿滿惡心，嘈雜嘔氣，嘔吐，在酸脾疾諸痛，神效。

無價金丹 白朮去皮炒，和貴數炒，而蒼朮炒，朱砂炒，茯苓研，麥芽炒，神曲炒半夏湯泡各澤瀉，赤茯苓去皮川芎，黃連炒土白螺鈿，研各一錢。

砂仁 草豆蔻 黃芩陳土青皮去皮，研末，生薑各五錢，陳皮去淨，香附子童便，瓜萎仁，桔梗各三錢，厚朴去皮，研末，木香錢，甘草二錢。

右為細末，青何葉泡湯浸晚粳米研粉作糊為丸，如梧子大，每服七十丸，至一百丸，米湯送下。○春酸加吳茱萸湯治寒月用五錢，熱月用二錢半。○久病坎虛加人參，扁豆石蓮肉各五錢。○時常口吐清水，加炒滑石一兩，牡蠣煅五錢。

○一論胃脘痛屬寒者。

丁胡三達湯 丁香 良薑 官桂各一分，右剉一劑。

水煎七公用胡椒五十粒，炒為末，調入藥內，煖服。

一方用良薑末三錢。

分米湯調下立止○治心胃刺痛不可忍者胃口冷氣所致者乾姜炒官桂

○一論一切氣痛心痛腹疼及冷氣痛。

良薑

一兩

吳茱萸

四兩

胡椒

一兩

右為末每服五分輕者三分用飛過硃砂三分溫酒調服

○一論氣自腰腹間攻心痛不可思。腹中水冷自汗如洗手足攀急厥冷二三錢酒煎八分入益仁捻溫服○一治諸般心腹氣痛或瘀血作痛。

桃靈丹

桃仁五錢五靈脂一錢大

右為末

每服五分

輕者三分

用飛過硃砂

三分溫酒調服

○一論寒邪冷氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂甚則經年不瘥。

桂附丸

西園公履驗川烏頭炮去破附子三錢桂心一錢

右為末

醋糊為丸如梧子大

每服二十丸酒下或醋湯下

○一人心胃刺痛手足稍冷出汗指甲

青白無不效

余用當歸三錢煎湯外用水磨木香沉香烏藥枳殼磨濃服立止

○一論寒邪冷氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘九溫水下覺至痛處即止若不止加至五十九以知為度若是朝服無所覺至午後再進二十丸若久心痛每服三十丸至五十九

盡一劑終身不發治心痛徹骨皆如神○一論心腹疼痛每作必胸滿嘔吐厥冷面赤唇麻咽乾口燥寒熱不時而脉洪大屢服寒瀉損真之故內真寒而外假熱也且脉弦洪而有怪狀乃脾氣虧虛肝木乘之而然當暖補其胃

補中益氣湯

方見內傷

依本方加半夏茯苓吳茱萸

○一婦人胃脹當心而痛盛右寸關俱無左雖有微而似絕子足厥冷病勢危篤察其色眼胞上下青腫此脾虛肝木所勝用參术茯苓陳皮甘草補其裏氣用木香和胃以行肝氣用吳茱萸散脾胃之寒止心腹之痛急與一劑俟滾先服煎好再進諸病悉愈何可泥其痛無補法而反用攻補之藥禍不旋踵○一婦人懷抱勞倦不時心腹作痛年久不愈諸藥不應余用歸脾加炒山楂而愈○一唐儀部胸內作痛月餘腹亦痛左關弦長右關弦緊此脾虛肝木所乘以補中益氣加半夏木香二劑而愈又用六君子湯二劑而安此面色黃中見青

○一論有蟲毒必面白白斑紅又痛後便能食時作時止是也用二陳湯加苦練根皮煎服上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治或曰痛而久卧不安自按心腹時大吐或青或黃唇緩目無睛光此蟲痛也

○一治蛔蟲作痛神方用苦練根上皮洗淨白水煎露一宿次日早燒猪肉一塊喫其氣然後服藥其法上半月服其蟲盡下

○一治寸白蟲作痛用酸石榴東南根二兩槟榔五錢七十五錢白水煎露一宿末日五更冷服未服先燒些豬肉喫其氣不可食其藥上半月服之立效

○一論胃冷蛔蟲上攻心痛嘔吐四肢冷

烏梅丸 當歸四錢人參六錢炮薑一錢肉桂一錢大附子炮一錢川椒去壳炒細辛一錢黃連一兩黃柏六錢右為末烏梅三十箇去核搗爛入蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯送下烏梅用好醋浸一宿去核於五升米飯上蒸熟杵如泥和藥令相得納白中杵三千下入蜜和為丸又治胃膈發噦咳而嘔嘔甚則長蟲出

○一論蟲攻心痛并腹中有塊按之不見往來痛無休止

化蟲丸 雄武三錢胡粉炒枯砂 苦棟根皮去浮皮各一錢 檳榔各五分 右為末麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸米飲入真芝麻油一二點打牙服之其蟲小者化為水大者自下○一婦年四旬心胃刺痛時痛時止不思飲食食則即吐手足厥冷胸中痞悶口乾作渴余曰此胃中有蟲也以二陳湯加槟榔枳實烏梅花椒炒黑乾薑苦棟根皮生薑煎一服打下蟲一大碗遂止

○一論急心痛

元靈散 五靈脂去砂元胡索炒義木大良薑炒當歸各半分 右為末每服二錢熟醋湯調下

○一論諸心氣痛不可忍者

絳雪散 白礬一錢砂姜生薑各半分 右為末每服一錢五分輕者一錢空心白湯調下

○一論心痛方 白礬一錢砂五分 右為細末薑汁打麵糊為丸如黃豆大每服一丸溫酒送下

○一治心胃刺痛如神 用生礬枯砂等分為末麵糊丸如櫻桃大每服三丸燒酒送下立止○一治心胃刺痛黑砂糖半錢熱酒調服

○一治心氣痛五靈脂一錢枯砂二分為末溫酒調下○一治心胃痛至死用良薑末三分米湯調下立止○一徐四可治胃脫痛用

炒鹽一錢生薑七片水煎一錘溫服立止

○一論心腹痛不問寒熱新久一服立止 官桂五分白芍二錢甘草三分 右剉水煎服○如感冒寒邪加香薷○如有熱加芩連○如大便閉及下痢初起任服寒藥不通腹痛不止加大黃枳殼立效

一治胃脘痛甚諸藥不效者 黃連一錢香附子去皮附子炮一錢右剉一劑生薑三片乘一枚水煎稍熱服一治心疼痛荆子炒焦為末

米飲調下○又方蜜一小錘酒一碗同蜜煎滾調枯砂末一錢溫服出汁一治諸血諸氣痛不可忍及心脾氣血諸病又治血滯腰痛

三香沉麝丸 內翰蘇沉方 砂砂 血竭 沉蘇各一沉香分木香分麝香分 右剉為末磁器盛青草膏如皂角子大每服一丸薑鹽湯噙下 婦人產後氣血痛並主之亦治脾痛血滯腰痛用繩斷牛膝桃仁炒煎溫湯送下血暈用乳香泡湯研化服

脈心腹痛不得息脉細小遲者生脉大而疾者死
腹痛
夫腹痛寒氣多於中焦干於脾胃而痛者有宿積停於腸胃者有結滯不散而痛者有痛而嘔者有痛而渴者有痛而大便不通者有

脉心腹痛不得息脉細小遲者生脉大而疾者死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死

死