



国家护士执业考试与护理专业
初级（士）资格考试

模拟试卷

主编 钱晓路 姜安丽



人民卫生出版社

2009
年版

国家护士执业考试与护理专业
初级(士)资格考试

模拟试卷

主 编 钱晓路 姜安丽

副主编 余剑珍 马秀芬 王玉升 桑未心 申翠华

秘 书 吴 明

编 者 (以姓氏笔画为序)

马秀芬 王玉升 申翠华 吴 明 余剑珍

张 清 张美芬 李芳芳 陈荣凤 姚跃英

姜安丽 党世民 徐卓立 桑未心 钱晓路

黄怀宇



人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2009 年版国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试 模拟试卷/钱晓路等主编. —北京: 人民卫生出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-117-11153-9

I. 2… II. 钱… III. 护理学-护士-资格考核-习题
IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 204691 号

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

2009 年版

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试
模拟试卷

主 编: 钱晓路 姜安丽

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10.25

字 数: 239 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-11153-9/R · 11154

定 价: 20.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

由卫生部教材办公室策划、人民卫生出版社出版的国家护士执业考试辅导用书具有科学、权威、实用的特点,帮助很多考生顺利地通过了执业资格考试,是一套得到社会、考生、市场广泛认可的很好的考试辅导用书。在此基础上,为使图书规模和结构更合理、进一步优化各品种功能,突出权威性和指导性,力求为考生提供“合理、针对性强、实用性强、高效”的复习辅导用书,卫生部教材办公室启动了 2009 年版的修订工作。

本次修订继续坚持“两按照一针对”的原则,即:严格按照新考试大纲要求的知识点编写,不漏写,不超纲;严格按照考试的命题重点编写,突出重点、淡化一般知识点;针对考生复习量大、复习时间紧的特点,突出内容结构的逻辑性,便于考生记忆或启发回忆。同时,本次修订的具体方法为:①全套用书以考试大纲为依据,以卫生部规划的中职、高职高专护理专业教材为蓝本。②图书内容不拘泥于考试大纲的编排体例,根据知识的系统性和内在联系对大纲的知识点进行合理整合。③知识点的阐释和习题的解析以“能理解、好记忆、够考试”为度。④根据护理学科的特点,加强了人文学科的相关内容。

2009 年版辅导用书包括三种:

1. 国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试——考点精编
2. 国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试——习题精选与答案解析
3. 国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试——模拟试卷

与同类图书相比,本套用书具有以下鲜明特点:

1. 内容科学、权威,参考性和实用性强。

为提高本套书的考试指导效能,卫生部教材办公室特聘请了复旦大学护理学院、第二军医大学、河北省承德卫生学校、黑龙江省卫生学校、山东省立医院、上海交通大学护理学院、上海市职工医学院、天津医科大学护理学院、中山大学护理学院、西安交通大学继续教育学院、广州卫生学校、福建省厦门卫生学校、原中国人民解放军北京军医学院等重点医学院校的数十名熟悉国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试的资深专家承担 2009 年版辅导用书的编写工作,深刻剖析考点,详细解析重点和难点,并精心编制了模拟试卷,从而帮助考生达到事半功倍的复习效果。

2. 图书品种的不同内涵为具有不同复习习惯的考生提供了多种选择。

《考点精编》整合、精解考点,使考点得到系统、精炼的阐释,便于考生记忆;并且,在每一个考点后根据大纲的要求,分别用“★”表示“了解”,“★★”表示“熟悉”,“★★★”表示“掌握”,以便考生在全面复习时能抓住重中之重,合理安排复习时间。《习题精选与答案解析》提供覆盖所有考点的习题,同时提供重点习题的答案解析,便于考生在作题时复习和巩固考点。《模拟试卷》全真模拟考试,有助于提高考生的应试能力。无论考生习惯于以复习基本知识为主,或以作题为主,或边复习基本知识边作题,都可以选择到适合自己的品种。

3. 图书篇幅合理,各学科比例和国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试试题的比例一致。

本套用书避免“内容泛滥”和“题海战术”。我们在广泛调研的基础上,确定《考点精编》90万字左右,《模拟试卷》提供仿真试卷3套,《习题精选与答案解析》提供1500~2000道题,共约150万字。该规模科学、合理,有利于节省考生的精力、时间和费用。

卫生部教材办公室

2009年1月

目 录

模拟试卷一

基础知识卷.....	1
相关专业知识卷	10
专业知识卷	20
专业实践能力卷	31
答题卡	43
参考答案	51

模拟试卷二

基础知识卷	53
相关专业知识卷	63
专业知识卷	73
专业实践能力卷	84
答题卡	95
参考答案.....	103

模拟试卷三

基础知识卷.....	105
相关专业知识卷.....	114
专业知识卷.....	124
专业实践能力卷.....	135
答题卡.....	147
参考答案.....	155

模拟试卷一

基础知识卷

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 高血压病致病理性改变的器官一般不包括
A. 眼底
B. 肝脏
C. 心脏
D. 肾脏
E. 脑
2. 红斑狼疮致病的相关因素中不正确的是
A. 同卵孪生
B. 雌激素影响
C. 服用皮质激素
D. 光照
E. 病毒感染
3. 与类风湿性关节炎发病无关的是
A. 自身免疫
B. 长期生活在湿冷环境中
C. 过度劳累
D. 遗传因素
E. 感染
4. 引起急性心肌梗死的根本原因是
A. 冠状动脉粥样斑块引起的狭窄
B. 冠状动脉收缩、舒张功能异常
C. 冠状动脉内膜损伤导致痉挛
D. 冠状动脉栓塞
E. 冠状动脉不稳定性斑块破裂出血
5. 心力衰竭最常见的诱发因素是
A. 妊娠
B. 心律失常
C. 摄盐过多
D. 感染
E. 过度劳累
6. 无自主运动及对声、光的反应,但按压眼眶时呈现痛苦表情称为
A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 昏睡
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
7. 呼吸频率过快是指呼吸次数超过
A. 16 次/分钟
B. 18 次/分钟
C. 20 次/分钟
D. 22 次/分钟
E. 24 次/分钟
8. 属于病理性检查结果的是
A. 瞳孔对光反射灵敏
B. 巴宾斯基征阳性

- C. 双侧膝反射均不明显
 - D. 腹壁反射明显
 - E. 双侧跟腱反射检查不满意
9. 左心室增大时心尖冲动位置应该
- A. 向右移位
 - B. 向下移位
 - C. 向上移位
 - D. 向左上移位
 - E. 向左下移位
10. 心包积液病人常有的脉搏是
- A. 水冲脉
 - B. 短绌脉
 - C. 奇脉
 - D. 交替脉
 - E. 不整脉
11. 肾性水肿最先出现于
- A. 眼睑、颜面
 - B. 胸腔、腹腔
 - C. 足踝、胫前
 - D. 背部、骶部
 - E. 会阴部
12. 再生障碍性贫血的发生机制为
- A. 造血原料缺乏
 - B. 骨髓造血功能低下
 - C. 急性失血
 - D. 严重感染
 - E. 红细胞破坏
13. 出现交叉性瘫痪时病变部位在
- A. 大脑皮质
 - B. 脑干
 - C. 内囊
 - D. 小脑
 - E. 脊髓
14. 吸气性呼吸困难的发生机制是
- A. 上呼吸道狭窄
 - B. 细小支气管狭窄
 - C. 肺组织弹性减弱
 - D. 麻醉药抑制呼吸中枢
 - E. 呼吸面积减少
15. 呼吸衰竭患者的主要诱因是
- A. 过度劳累
 - B. 精神紧张
 - C. 呼吸道感染
 - D. 营养不良
 - E. 长期吸烟
16. 产生盐酸的胃黏膜细胞是
- A. 表层柱状上皮细胞
 - B. 黏液细胞
 - C. 主细胞
 - D. G 细胞
 - E. 壁细胞
17. 肝硬化伴大量腹水取半卧位的原因是
- A. 有利于腹水消退
 - B. 增加回心血量
 - C. 减轻心脏负荷
 - D. 减轻呼吸困难
 - E. 降低腹内压力
18. 糖尿病基本病理生理改变是
- A. 胰岛素绝对或相对不足
 - B. 胰高血糖素分泌减少
 - C. 糖皮质激素分泌过多
 - D. 生长激素分泌过多
 - E. 甲状腺激素分泌过多
19. 支气管扩张的最常见原因是
- A. 婴幼儿期支气管-肺组织感染
 - B. 腐蚀气体吸入
 - C. 气管异物

- D. 支气管周围淋巴肿大
E. 肺囊性纤维化
20. 不属于胃肠黏膜保护因素的是
A. 胃黏膜
B. 胃黏液屏障
C. 胃酸
D. 前列腺素
E. 表皮生长因子
21. 诱发慢性肾炎肾功能恶化的因素不包括
A. 感染
B. 劳累
C. 肾毒性药物的使用
D. 偶发性室早
E. 血压升高
22. 特发性血小板减少性紫癜血小板抗体产生的主要场所是
A. 肝脏
B. 脾脏
C. 骨髓
D. 单核细胞
E. 血管内皮
23. 急性白血病发热的主要原因是
A. 感染
B. 代谢亢进
C. 内出血
D. 坏死组织吸收
E. 抗原抗体反应
24. 脑血管疾病的危险因素中哪项属无法干预的因素
A. 高血压
B. 心脏病
C. 糖尿病
D. 年龄
- E. 短暂性缺血发作
25. 脑血栓形成最常见的原因是
A. 脑动脉粥样硬化
B. 糖尿病
C. 高脂血症
D. 高血压
E. 真性红细胞增多症
26. 高渗性脱水的原因不包括
A. 高热
B. 长期禁食
C. 呼吸增快
D. 大量输注葡萄糖
E. 长期昏迷而未补液
27. 临床休克代偿期相当于休克病理生理分期的
A. 微循环收缩期
B. 微循环扩张期
C. 微循环衰竭期
D. 正常微循环
E. 微循环代偿期
28. 以下说法不正确的是
A. 金黄色葡萄球菌感染容易局限
B. 溶血性链球菌感染容易扩散
C. 铜绿假单胞菌对大多数抗生素不敏感
D. 大肠埃希菌感染脓液臭味
E. 脆弱拟杆菌感染脓液恶臭
29. 属于闭合性损伤的是
A. 裂伤
B. 爆震伤
C. 火器伤
D. 剥脱伤
E. 擦伤

30. 甲状腺功能亢进属
 - A. 代谢性疾病
 - B. 自身免疫性疾病
 - C. 遗传性疾病
 - D. 先天性疾病
 - E. 内分泌失调性疾病
31. 急性乳房炎常见于
 - A. 未婚女性
 - B. 妊娠妇女
 - C. 产后 3~4 周的哺乳期妇女
 - D. 产后 6 个月的哺乳期妇女
 - E. 未哺乳妇女
32. 腹外疝的主要病因是
 - A. 腹腔感染
 - B. 营养不良
 - C. 长期吸烟
 - D. 遗传因素
 - E. 腹壁缺损和腹内压增高
33. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是
 - A. 腹腔内有无原发病灶
 - B. 病原菌的种类不同
 - C. 有无并发休克
 - D. 腹痛的性质不同
 - E. 有无腹内脏器损伤
34. 胃癌最多发生于
 - A. 胃窦部
 - B. 贲门部
 - C. 胃后壁
 - D. 胃大弯
 - E. 胃小弯
35. 急性阑尾炎的主要病因是
 - A. 细菌侵入
 - B. 急性肠炎
 - C. 肠道蛔虫
 - D. 急性腹膜炎
 - E. 阑尾管腔梗阻
36. 乙状结肠扭转多见于
 - A. 长期负重者
 - B. 习惯性便秘者
 - C. 排尿困难者
 - D. 晚期妊娠者
 - E. 饱餐后剧烈运动者
37. 直肠癌最主要的转移途径是
 - A. 直接蔓延
 - B. 腹腔内种植转移
 - C. 腹腔内播散
 - D. 淋巴转移
 - E. 血行转移
38. 肛瘘常发生在下列哪种治疗后
 - A. 痔注射疗法后
 - B. 肛裂切除术后
 - C. 血栓外痔剥离术后
 - D. 肛管周围脓肿切开引流术后
 - E. 内痔切除术后
39. 门-腔静脉交通支中,最重要的是
 - A. 胃底、食管下端交通支
 - B. 直肠下端交通支
 - C. 腹壁交通支
 - D. 腹膜后交通支
 - E. 肠系膜血管交通支
40. 下列胆色素结石形成的原因中,应除外
 - A. 大肠杆菌产生 β -葡萄糖醛酸酶增多
 - B. 结合胆红素被水解
 - C. 结合胆红素与钙离子结合
 - D. 胆红素钙是胆色素结石的重要

基础

E. 胆道蛔虫引起

41. 下列哪项不是血栓闭塞性脉管炎的病因

- A. 长期吸烟
- B. 气候寒冷潮湿
- C. 性激素失调
- D. 下肢活动较少
- E. 自身免疫功能紊乱

42. 泌尿系结石的形成与下列哪项因素无关

- A. 职业
- B. 饮食结构
- C. 饮水不足
- D. 尿路梗阻
- E. 卧床休息

43. 良性前列腺增生的发生主要与下列哪项因素有关

- A. 前列腺炎
- B. 习惯性便秘
- C. 泌尿系感染
- D. 泌尿系结石
- E. 男性激素代谢失衡

44. 后尿道损伤的常见原因是

- A. 骑跨伤
- B. 骨盆骨折
- C. 膀胱镜检查致伤
- D. 手术误伤
- E. 插尿管损伤

45. 骨折按病因分类,其中不妥的是

- A. 创伤性骨折
- B. 压缩性骨折
- C. 疲劳性骨折
- D. 撕脱性骨折

E. 病理性骨折

46. 急性血源性骨髓炎病人健康史调查中,无重要意义的是

- A. 发病近期有化脓性感染病史
- B. 发病近期有局部损伤史
- C. 发病近期有感冒病史
- D. 营养状况不良
- E. 从事体力劳动

47. 肘关节脱位常见类型是

- A. 前脱位
- B. 后脱位
- C. 外侧方脱位
- D. 内侧方脱位
- E. 半脱位

48. 有关排卵的描述,正确的为

- A. 排卵在下次月经来潮前约 14 天
- B. 排卵在月经周期的中间
- C. 围绝经期多数尚能规律排卵
- D. 自青春期起便周期性规律排卵
- E. 卵子直接排入输卵管伞端

49. 评估胎膜早破最快捷的辅助检查方法为

- A. 羊膜镜检查
- B. 测流液 pH 值
- C. B 超查羊水量
- D. 检查胎方位
- E. 观察子宫收缩

50. 导致产后出血的原因,不包括

- A. 凝血功能障碍
- B. 年龄因素
- C. 宫缩乏力
- D. 胎盘因素
- E. 软产道损伤

51. 产褥感染的概念,不妥的是
 - A. 产褥期的乳腺感染
 - B. 产后生殖道的局部炎症
 - C. 分娩导致的生殖器感染
 - D. 重者产褥感染有全身炎性变化
 - E. 此为产妇四大死亡原因之一
52. 妇科疾病常与病人隐私、性生活有关,采集护理病史时不恰当的做法是
 - A. 态度和蔼耐心询问
 - B. 尊重病人的人格
 - C. 单独轻声询问隐私性病史
 - D. 询问与性伴侣的交往过程
 - E. 认真地承诺保守病人隐私
53. 我国政府为保护劳动妇女的生殖健康,规定月经期妇女不得从事的工作岗位是
 - A. 电脑操作
 - B. 野外作业
 - C. 新闻采访
 - D. 课堂授课
 - E. 临床护理
54. 幼儿期是指
 - A. 生后 29 天至 1 周岁
 - B. 1 至 3 周岁
 - C. 2 至 5 周岁
 - D. 3 至 5 周岁
 - E. 4 至 6 周岁
55. 出生时体重为 3.1kg,生后 9 个月的体重应为
 - A. 6.5kg
 - B. 7.0kg
 - C. 7.5kg
 - D. 8.0kg
 - E. 8.8kg
56. 小儿患病特点主要是
 - A. 感染性疾病较多
 - B. 起病较慢
 - C. 表现较典型
 - D. 预后较差
 - E. 预防效果差
57. 正常 1 岁内婴儿,每日每公斤体重约需要热量
 - A. 377kJ(90kcal)
 - B. 460kJ(110kcal)
 - C. 418kJ(100kcal)
 - D. 502kJ(120kcal)
 - E. 544kJ(120kcal)
58. 小儿断奶时间最迟不超过
 - A. 10 个月
 - B. 12 个月
 - C. 16 个月
 - D. 18 个月
 - E. 20 个月
59. 8 个月的小儿出现神经系统异常时的表现是
 - A. 角膜反射阳性
 - B. 吞咽反射阳性
 - C. 颈肢反射阳性
 - D. 腹壁反射阴性
 - E. 双侧巴宾斯基征阳性
60. 麻疹的主要传播途径是
 - A. 呼吸道传播
 - B. 虫媒传播
 - C. 消化道传播
 - D. 血液传播
 - E. 皮肤接触传播
61. 小儿上部量与下部量相等的年龄是
 - A. 1 岁

- B. 2岁
C. 5岁
D. 6岁
E. 12岁
62. 新生儿对某些传染病有一定免疫力,主要是通过胎盘从母体获得了哪种抗体
A. IgG
B. IgA
C. IgM
D. IgE
E. IgD
63. 维生素D缺乏性手足搐搦症的发病机制与佝偻病不同点是
A. 钙吸收障碍
B. 磷代谢障碍
C. 维生素D缺乏的程度
D. 甲状旁腺调节功能不足
E. 血钙磷乘积下降
64. 病人,男性,50岁,尿毒症。用5%碳酸氢钠溶液纠正酸中毒,静脉滴注将完毕时突然出现手足抽搐。最可能的原因是
A. 脑水肿
B. 低血磷
C. 低血钙
D. 碱中毒
E. 低血钾
65. 病人,女性,30岁,因甲亢服药无效,拟在颈丛神经阻滞下行甲状腺大部分切除术,术前不宜选用
A. 苯巴比妥钠
B. 哌替啶
C. 阿托品
D. 氟哌利多
E. 地西洋
66. 病人,26岁,孕52天行人工流产术,若术中不慎损伤穿破阴道后壁,最可能伤及邻近器官是
A. 直肠
B. 阑尾
C. 膀胱
D. 尿道
E. 输尿管
67. 病人,30岁,诊断“先兆流产”,用药物“黄体酮”保胎,其作用是运用孕激素功能中的
A. 使子宫内膜由增生期转为分泌期
B. 使宫颈闭合,黏液减少变稠
C. 降低子宫肌肉对缩宫素的敏感性
D. 抑制输卵管的蠕动
E. 对下丘脑、垂体的负反馈作用
68. 病人,26岁,要求放置宫内节育器。询问月经史 13 $\frac{8-10}{26}$ 量多,医生认为邢某不宜放置宫内节育器,原因是
A. 急性生殖道炎症
B. 宫颈口过松
C. 子宫畸形
D. 子宫脱垂
E. 月经过多
69. 瑶瑶,男,体重 9.2kg,身高 75cm,头围 46cm,胸围 46cm,牙齿 8 枚,其年龄约为
A. 8 个月
B. 10 个月
C. 12 个月
D. 16 个月
E. 18 个月
70. 玲玲,女,2 个月婴儿体重 4kg,每日给 8%糖牛奶 440ml,如用奶粉代替,每月需奶粉

- A. 1.25kg
B. 1.65kg
C. 1.80kg
D. 2.10kg
E. 2.30kg

71. 颖颖,男,出生时胎龄 33 周,母乳喂养,现生后 2 周,首先应添加的辅食及添加目的为

- A. 米汤,以补充热量
B. 菜汤,以补充矿物质
C. 米汤,以补充维生素 B
D. 鱼肝油,以补充维生素 A
E. 鱼肝油,以补充维生素 D

二、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次,多次或不被选择。

(72~74 题共用备选答案)

- A. 支气管扩张
B. 支气管哮喘
C. 支气管异物
D. 胸膜炎
E. 肺不张
72. 吸气性呼吸困难伴三凹征
73. 呼气性呼吸困难伴哮鸣音
74. 呼吸困难伴一侧呼吸运动减弱

(75~77 题共用备选答案)

- A. 左心房首先受累
B. 右心房首先受累
C. 左心室首先受累
D. 右心室首先受累
E. 左右心室均受累
75. 二尖瓣狭窄导致

76. 主动脉瓣关闭不全导致
77. 高血压导致

(78~80 题共用备选答案)

- A. 低渗性脱水
B. 等渗性脱水
C. 高渗性脱水
D. 低钾血症
E. 高钾血症

78. 长期禁食病人易发生
79. 大量出汗易发生
80. 输入大量久存的库血易发生

(81~85 题共用备选答案)

- A. 脐环
B. 腹部切口
C. 股环
D. 腹股沟管
E. 直疝三角
81. 腹股沟斜疝的疝环是
82. 腹股沟直疝的疝环是
83. 股疝的疝环是
84. 脐疝的疝环是
85. 腹部切口疝的疝环是

(86~88 题共用备选答案)

- A. 阴道
B. 子宫颈
C. 子宫体
D. 输卵管
E. 卵巢
86. 性腺器官是
87. 受精场所是
88. 胎儿娩出的通道是

(89~91 题共用备选答案)

- A. 新生儿期
B. 婴儿期

- C. 幼儿期
- D. 学龄期
- E. 青春期

89. 最易发生意外事故的年龄期
90. 容易发生营养性疾病的年龄期
91. 容易发生变态反应性疾病的年龄期

三、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择备选答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

92. 食管癌的病因有
- A. 长期饮烈性酒
 - B. 饮食中含碘高
 - C. 亚硝胺
 - D. 真菌
 - E. 遗传因素
93. 发生甲状腺危象的常见诱因有
- A. 感染
 - B. 劳累
 - C. 精神创伤
 - D. 外科手术
 - E. 药物反应
94. 引起心跳呼吸骤停的原因是
- A. 大失血失液
 - B. 缺氧, CO_2 蓄积
 - C. 惊吓
 - D. 麻醉意外
 - E. 手术过度牵拉内脏
95. 甲状腺大部分切除术后出现呼吸困难,考虑可能与以下哪些因素有关
- A. 切口内血肿压迫
 - B. 喉头水肿
 - C. 双侧喉返神经损伤
 - D. 气管塌陷
 - E. 喉上神经损伤
96. 胃癌的发病与下列哪些因素有关
- A. 长期进食腌制食物
 - B. 胃息肉
 - C. 遗传
 - D. 内分泌紊乱
 - E. 幽门螺杆菌感染
97. 肝内型肝硬化门脉高压症的常见病因为
- A. 血吸虫病
 - B. 肝炎后
 - C. 饮酒过度
 - D. 营养不良
 - E. 脂肪肝
98. 小儿体格生长的高峰阶段有
- A. 婴儿期
 - B. 幼儿期
 - C. 学龄前期
 - D. 学龄期
 - E. 青春期
99. 维生素 D 缺乏性佝偻病的主要病因包括
- A. 日光照射不足
 - B. 喂养不当
 - C. 疾病影响
 - D. 需要量增加
 - E. 先天不足
100. 主要病因病理为血管病变的妊娠期疾病有
- A. 前置胎盘
 - B. 胎盘早剥
 - C. 妊娠合并贫血
 - D. 妊娠合并心脏病
 - E. 妊娠高血压综合征

相关专业知识卷

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 能早期发现肾小球滤过功能异常的肾功能检查是
 - A. 尿浓缩稀释试验
 - B. 尿肌酐检查
 - C. 血肌酐及尿素氮检查
 - D. 酚红排泄试验
 - E. 内生肌酐清除率
2. 下面血常规检查结果异常的是
 - A. 血红蛋白量 80g/L(8g/dl)
 - B. 红细胞计数 $5 \times 10^{12}/L$ (500 万/ μl)
 - C. 白细胞计数 $6 \times 10^9/L$ (6000/ μl)
 - D. 白细胞分类计数中性粒细胞占 70%
 - E. 白细胞分类计数淋巴细胞占 25%
3. 红细胞、血红蛋白减少见于
 - A. 肺心病
 - B. 频繁呕吐
 - C. 妊娠中晚期
 - D. 高原生活
 - E. 胎儿、新生儿
4. 下列哪种情况下易出现脓状便
 - A. 溃疡性结肠炎
 - B. 直肠癌
 - C. 阿米巴痢疾
 - D. 过敏性结肠炎腹绞痛后
 - E. 消化不良
5. 做粪便隐血试验应注意的问题中不包括
 - A. 检查前晚禁食动物肝、血类食物
 - B. 避免使用磺胺类降糖药
 - C. 勿食大量菠菜
 - D. 停用铁剂
 - E. 有牙龈出血者吐出唾液
6. 在进行磁共振显像检查前必须去除的物品是
 - A. 发带
 - B. 袜子
 - C. 心脏起搏器
 - D. 外衣裤
 - E. 塑料物品
7. 属于双极导联的是
 - A. aVR 导联
 - B. II 导联
 - C. V₅ 导联
 - D. V₁ 导联
 - E. V₃ 导联
8. 符合单纯型慢性支气管炎的表现是
 - A. 时间肺活量减少
 - B. 功能残气量增加
 - C. X 线示两肺下野纹理增粗
 - D. 动脉血二氧化碳分压升高
 - E. 两肺散在哮鸣音
9. 最简单而有效的早期确诊肺癌的方法是
 - A. 胸水查癌细胞
 - B. 痰查癌细胞

- C. X线检查
D. 支气管镜检查
E. 肺活组织检查
10. 确诊肺结核最重要的依据为
A. 典型的症状、体征
B. 结核菌素试验阳性
C. 痰中找到结核菌
D. 血沉加速
E. X线发现病灶
11. 肝硬化出现腹水和水肿时血清清蛋白一般低于
A. 35g/L
B. 30g/L
C. 25g/L
D. 20g/L
E. 15g/L
12. 对判断上消化道活动性出血最有意义的是
A. 心率增快
B. 血压下降
C. 腹痛加重
D. 黑便
E. 血 BUN 增高
13. 正常人体 OGTT 试验时血糖降至空腹水平或以下的时间是
A. 30min
B. 60min
C. 120min
D. 150min
E. 180min
14. 鉴别 1 型和 2 型糖尿病最好的指标是
A. 糖化血红蛋白测定
B. 葡萄糖耐量试验
C. 胰岛素释放试验
D. 空腹血糖
E. 尿糖
15. 腰椎穿刺术后护理措施不妥的是
A. 术后去枕平卧 4~6h
B. 术后 24h 内不可下床
C. 颅压高者多饮水
D. 密切观察意识及瞳孔变化
E. 及时处理脑疝先兆
16. 易导致泌尿系感染的诊断检查是
A. 肾脏 B 超检查
B. 静脉肾盂造影
C. 逆行肾盂造影
D. 酚红排泄试验
E. 内生肌酐清除率
17. 可以准确反映人体贮存铁的指标是
A. 血清铁
B. 血浆铁蛋白
C. 血红蛋白
D. 红细胞计数
E. 肌红蛋白
18. 做清洁中段尿培养时不正确的是
A. 收集清晨第 1 次尿
B. 收集标本前严格消毒外阴
C. 严格无菌操作保证标本不受污染
D. 标本收集后应 1h 内做培养
E. 用抗生素期间不宜做尿培养
19. 慢性肾炎病人 24h 尿蛋白常为
A. 小于 1g/d
B. 小于 150mg/d
C. 小于 2g/d
D. 1~2g/d
E. 1~3g/d