



2008

卫生专业技术资格考试辅导丛书

主管护师资格考试 全真模拟试卷

(第二版)

主 编 张利岩 刘万芳

ZHUGUAN HUSHI
ZIGE KAOSHI
QUANZHEN
MONI SHIJUAN



军事医学科学出版社

2008 主管护师资格考试 全真模拟试卷

主 编 张利岩 刘万芳

副主编 付淑云 杨凯平 罗 敏

编 者 (以姓氏笔画排列)

王 英 史 晶 付淑云

刘万芳 杨凯平 李 华

张向兰 张利岩 林美雄

罗 敏 纪慧茹 唐 伟

管晓萍

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

内容提要

为方便广大考生更好地熟悉主管护师资格考试内容,做好考前准备,我们依据考试大纲,针对实际考试情况,编写了五套全真模拟试卷。模拟卷(共3500道题)严格遵照大纲要求,几乎覆盖了绝大部分考核知识点。希望考生在复习好书本知识的基础上,认真做好每一道题,通过模拟卷练习,帮助自己顺利应考。

图书在版编目(CIP)数据

2008 主管护师资格考试全真模拟试卷/张利岩,刘万芳主编.

-北京:军事医学科学出版社,2008.1

ISBN 978-7-80245-020-2

I. 2… II. ①张… ②刘… III. 护理学-护士-资格考核-习题
IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 158739 号

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路 27 号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,86702315,86702759

86703183,86702802

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmsp.cn>

印装:京南印刷厂

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:17

字数:532 千字

版次:2008 年 1 月第 1 版

印次:2008 年 1 月第 1 次

定价:32.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

参加主管护师考试的考生往往借助复习护士执业资格考试的内容,而护士执业资格考试是护理学专业资格考试三个层次中最基础的考试之一,对主管护师的考试来说,往往造成复习程度低,复习知识点不够深入,考试通过率也不会很高。这说明报考主管护师资格考试的护士虽然积累了大量的临床经验,但如果没有系统地复习和梳理知识点,上了考场也不能有效发挥自己的水平。

为方便广大考生更好地熟悉主管护师资格考试内容,作好考前准备,我们依据考试大纲,针对实际考试情况,编写了《2008 年主管护师资格考试全真模拟试卷》,希望能帮助广大考生顺利通过考试。

一、主管护师资格考试作为国家级考试,考题难度范围严格遵照大纲,大纲要求的考核知识点万变不离其宗,考生必须脚踏实地地复习,切实掌握大纲要求的知识内容,应对考试自然轻松,千万不要抱侥幸心理去猜题。

二、主管护师资格考试内容涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学和健康护理、感染护理、社区护理,考试分四张卷,分别为基础知识卷、相关专业知识卷、专业知识卷和专业实践能力卷,每张试卷 100 道题,其中专业实践能力每个专业都有各自的试卷,分别由内科、外科、妇产科和儿科组成。在本书中,考生可根据自己所报的专业选择相应的习题,快速检验自己对知识的掌握程度。

三、模拟测试对应有非常有效果,通过大量做练习题的方式掌握知识是往年考生的经验。本书有五套模拟卷(共 3500 道题),严格遵照大纲要求,几乎覆盖了绝大部分考核知识点。希望考生在复习好书本知识的基础上,认真做好每一道题,在做习题的过程中,将自己认为的难点、难题做适当标注,如有时间一定要回过头复习,不要把题做过去就不管了,特别是曾经做错的题,回头多温习几遍,对应考非常有益。

四、近年考题在突出考核基本知识的同时,更重点突出了对主管护师的应用能力的考核。体现到试卷上就是病例题越来越多,这也是考生反映考题越来越难的根本所在。本书增加了病例题的比例,希望考生能够更加准确地进行备考。

由于本书涉及的知识内容广泛,虽反复修改,但由于水平和能力有限,可能会存在错误和疏漏,恳请广大考生给予指正。

张利岩 刘万芳

2007 年 11 月

目 录

模拟试卷一	(1)
模拟试卷二	(54)
模拟试卷三	(107)
模拟试卷四	(160)
模拟试卷五	(213)

模拟试卷一

基础知识

一、在以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 引起小儿疱疹性咽峡炎的病原体是
 - 腺病毒
 - 合胞病毒
 - 疱疹病毒
 - 白色念珠菌
 - 柯萨奇病毒
- 急性坏死性肠炎大便性状为
 - 墨绿色稀便
 - 柏油便
 - 赤豆汤样
 - 便中带血丝
 - 蛋花汤样
- 急性感染性喉炎最主要的护理诊断是
 - 气体交换受损
 - 清理呼吸道无效
 - 低效性呼吸型态
 - 体温过高
 - 焦虑
- 室间隔缺损不易发生的并发症为
 - 肺炎
 - 细菌性心内膜炎
 - 心力衰竭
 - 脑栓塞
 - 肺水肿
- 血小板减少性紫癜患儿起病的症状是
 - 鼻、牙龈出血
 - 颅内出血
 - 呕血、便血
 - 血尿
 - 皮肤黏膜出血
- 心源性呼吸困难最先出现的是
 - 急性肺水肿
 - 阵发性夜间呼吸困难
 - 劳力性呼吸困难
 - 心源性哮喘
 - 端坐呼吸
- 下列哪项不是右心衰竭的临床表现
 - 恶心、呕吐
 - 早期在身体疏松部位出现水肿
 - 肝肿大、肝区胀痛
 - 颈静脉怒张
 - 口唇发绀
- 洋地黄类药物中毒所致心律失常中最常见的是
 - 室上性心动过速
 - 室颤
 - 室性早搏
 - 窦性心动过速
 - 窦性心动过缓
- 诊断高血压心脏病必须具备的先决条件
 - 心绞痛
 - 心律不齐
 - 左心室肥厚
 - 右心室扩大
 - 心力衰竭
- 慢性心衰病人的病情观察,不包括
 - 关节活动范围和肢体活动能力
 - 皮肤黏膜发绀情况
 - 颈静脉怒张和肺部啰音
 - 每日测量体重
 - 身体下垂部位有无水肿
- 二尖瓣狭窄主要的临床症状是
 - 栓塞
 - 右心功能不全症状
 - 左心功能不全症状
 - 心悸等心律失常症状
 - 心绞痛
- 风湿性心脏病病人出现下列何种临床征象,可提示发生脑动脉栓塞
 - 休克
 - 咯血
 - 偏瘫
 - 腰痛、血尿
 - 剧烈胸痛
- 慢性支气管炎最突出的症状是

A. 长期反复咳嗽、咳痰

B. 反复发热

C. 咳大量脓痰

D. 反复咯血

E. 时有喘息

14. 关于慢性支气管炎病人的治疗, 下列哪项不

妥

A. 缓解期应常规服用抗生素预防感染

B. 急性发作期以抗感染治疗为主

C. 喘息明显者应给予解痉、平喘药物

D. 多饮水, 以稀释痰液

E. 缺氧明显者可给予低流量吸氧

15. 下列关于排痰的措施, 不妥的是

A. 多饮水以利于痰液稀释

B. 痰多且无力咳痰者应以祛痰为主

C. 咳嗽反射减弱或消失的病人应给予机械吸痰

D. 为了增加病人的耐受能力, 体位引流应在餐后半小时内进行

E. 勤翻身拍背可促进排痰

16. 下列对慢性胃炎患者健康教育中不正确的是

是

A. 养成细嚼慢咽的进食习惯

B. 戒烟戒酒

C. 硫糖铝应在餐后 1 小时服用

D. 吗叮啉等促胃肠动力药应在饭前半小时服用

E. 避免使用泼尼松及利血平

17. 消化性溃疡的好发部位

A. 十二指肠球部

B. 十二指肠降部

C. 十二指肠乳头部

D. 十二指肠水平部

E. 十二指肠升部

18. 诊断急性胰腺炎时, 血清淀粉酶至少应超过

A. 100 U

B. 200 U

C. 300 U

D. 400 U

E. 500 U

19. 急性胰腺炎患者应禁用的药物为

A. 西咪替丁

B. 吗啡

C. 生长抑素

D. 阿托品

E. 杜冷丁

20. 碘化物治疗甲状腺危象的主要机理是

A. 反馈性抑制垂体释放 TSH

B. 使增生的甲状腺缩小

C. 抑制甲状腺激素的合成

D. 抑制甲状腺激素的释放

E. 使有机碘生成减少

21. 癫痫大发作时护理措施错误的是

A. 扶持患者卧倒

B. 将患者头部侧向一边

C. 按压抽搐肢体

D. 解开患者衣领、衣扣和腰带

E. 在患者上下臼齿间放压舌板

22. 下列哪种癫痫发作时应该用药物从速制止

A. 单纯失神发作

B. 全面性强直-阵挛发作

C. 简单的部分性发作

D. 复杂的部分性发作

E. 癫痫持续状态

23. 妊娠晚期, 正常胎儿羊水中不应含有

A. 脂肪

B. 胎粪

C. 毳毛

D. 脱落的上皮细胞

E. 性激素

24. 有关“护理程序”概念的解释, 哪项不妥

A. 是指导护士工作及解决问题的工作方法

B. 其目标是增进或恢复服务对象的健康

C. 是以系统论为理论框架

D. 是有计划、有决策与反馈功能的过程

E. 由估计、诊断、计划、实施四个步骤组成

25. 为痰液黏稠病人辅助叩背吸痰的目的是

A. 震荡胸壁促进胸肌血液循环

B. 气管震动促进 IgA 功能

C. 促进痰液松动, 易于吸出

D. 震荡胸壁提高呼吸肌功能

E. 震动胸壁对抗对气管刺激

26. 给长时间用氧的病人吸氧时哪种做法不妥

A. 宜用鼻塞法吸氧

B. 氧浓度为 25% ~ 29%

C. 鼻塞用清水湿润

D. 先调节流量再插鼻塞

E. 停用前先关闭氧气开关

27. 半坐卧位适用于以下哪种病人

A. 胎膜早破

- B. 颈部手术后
C. 脑水肿
D. 脊柱手术后
E. 颅骨牵引
28. 为病人进行鼻饲治疗时,胃管插入长度相当于病人的
- A. 眉心至胸骨柄长
B. 眉心至剑突长
C. 发际至剑突长
D. 发际至胸骨柄长
E. 鼻尖至剑突长
29. 推平车上下坡时病人头部应在高处是因为
- A. 防止血压下降
B. 避免呼吸不畅
C. 减轻头部充血不适
D. 预防坠车
E. 有利于与病人交谈
30. 铺无菌盘时不应
- A. 用无菌持物钳夹取治疗巾
B. 注意使治疗巾边缘对齐
C. 治疗巾开口部分及两侧反折
D. 有效期不超过 6 小时
E. 避免潮湿和暴露过久
31. 长期医嘱的有效时间是
- A. 24 小时以内
B. 24 小时以上
C. 1 周以上
D. 1 个月以上
E. 12 小时以内
32. 下列关于“压力与适应”学说的解释,不正确的一项是
- A. 适应是应对行为的最终目标
B. 压力是身体对任何需要作出非特异性反应的一个过程
C. 多种压力源可导致一种压力反应
D. 适应是所有生物的特征
E. 压力给人造成不利影响
33. 为小儿进行大量不保留灌肠时,灌肠筒内液面应高于肛门
- A. 3~5 cm
B. 4~7 cm
C. 5~8 cm
D. 6~9 cm
E. 7~10 cm
34. 给男病人导尿时,其中提起阴茎 60° 的目的是使
- A. 耻骨前弯消失
B. 尿道第 1 个狭窄部消失
C. 耻骨下弯消失
D. 耻骨前弯、下弯均消失
E. 尿道 3 个狭窄均消失
35. 演变过程第二阶段特点不包括
- A. 以病人护理为中心
B. 实施整体护理
C. 护理知识体系逐步形成
D. 护理工作方法是护理程序
E. 护理任务扩展到对所有人、生命周期的所有阶段的护理
36. 哪项不属于非语言交流
- A. 倾听
B. 面部表情
C. 倾诉
D. 专业性皮肤接触
E. 沉默
37. 护理评估开始的时间是
- A. 做完治疗后开始评估
B. 第一次抽血后开始评估
C. 为病人做完入院介绍后开始评估
D. 与病人第一次见面时开始评估
E. 参加医生查房后开始评估
38. 颅脑损伤病人的护理措施哪项不正确
- A. 按 GOS 表评估意识
B. 监测瞳孔变化
C. 测生命体征
D. 有无夏柯征出现
E. 正确使用脱水药
39. 对于少尿或无尿的病人,最主要的护理措施是
- A. 预防感染
B. 绝对卧床休息
C. 限制蛋白质的摄入量
D. 严格控制钾的摄入量
E. 保证饮食的总热量
40. 复苏药物使用途径应首选
- A. 口服
B. 肌肉注射
C. 皮下注射
D. 静脉注射
E. 气管内给药
41. 高压蒸汽灭菌时,包裹不应过大,应小于

- A. 33 cm × 22 cm × 15 cm
B. 55 cm × 22 cm × 15 cm
C. 55 cm × 33 cm × 15 cm
D. 55 cm × 33 cm × 22 cm
E. 55 cm × 30 cm × 20 cm
42. 手术区皮肤消毒时,不能使用碘酊的部位是
A. 腹部
B. 胸部
C. 颈部
D. 四肢
E. 面部
43. 浅昏迷与深昏迷的区别,不包括
A. 语言应答
B. 对强烈刺激的反应
C. 角膜反射
D. 生命体征
E. 瞳孔对光反射
44. 以下关于代谢性酸中毒的叙述不正确的是
A. 呼吸加深加快
B. 常伴发高钾血症
C. 幽门梗阻病人易发生
D. 外科临床最常见的酸碱失衡类型
E. 重症病人常用 5% 碳酸氢钠溶液纠正
45. 抗体克治疗最根本的措施是
A. 积极处理原发疾病
B. 及时纠正酸碱平衡失调
C. 早期应用血管活性药物
D. 及时、快速、足量补充血容量
E. 应用强心药以增加心肌收缩力
46. 特发性血小板减少性紫癜急性型和慢性型的临床特点,下列哪项描述不妥
A. 急性型多见于儿童,慢性型多见于青年女性
B. 急性型起病前多有上感病史,慢性型起病隐匿,不易觉察
C. 急性型出血较为严重,内脏出血多见,慢性型出血较轻,贫血多为首表现
D. 慢性型多数反复发作
E. 急性型大部分会转变为慢性型
47. 根据血红蛋白下降程度,中度贫血是指
A. Hb < 150 g/L
B. 男性 Hb < 120 g/L, 女性 Hb < 110 g/L
C. Hb < 90 g/L
D. Hb < 60 g/L
E. Hb < 30 g/L
48. 在应用阿托品治疗有机磷农药中毒时,一旦发生何种症状提示发生阿托品中毒即停用阿托品
A. 肺部湿性啰音消失
B. 颜面潮红
C. 口干
D. 心率加快
E. 尿滞留
49. 肾病综合征常见的并发症有
A. 感染、血栓形成、电解质紊乱
B. 水肿、感染、低蛋白血症
C. 水肿、感染、高血压脑病
D. 循环充血、高血压脑病、肾衰竭
E. 高胆固醇血症、血栓形成、低血钠
50. 病人,女性,45 岁,以“流行性乙型脑炎”入院。查体温 39.8℃,呼吸 38 次/分,脉搏 120 次/分,血压 135/75 mmHg,节律不整,对光反应迟钝,呼吸音粗,可闻及干湿性啰音,颈强直(+),经救治无效死亡,该病人最可能的死亡原因是
A. 高热
B. 脑水肿
C. 脑疝
D. 中枢性呼吸衰竭
E. 肺内感染
51. 某少儿班,近半个月连续发现 10 余名 3~4 岁少儿精神不振,食欲差,其中 5 名儿童出现发热,巩膜黄染,对于未患病少儿,下列哪种处理最适宜
A. 立即检查肝功能
B. 立即注射甲肝疫苗
C. 立即注射乙肝疫苗
D. 立即注射甲肝疫苗和免疫球蛋白
E. 立即疏散该班
52. 类风湿关节炎的临床特征不包括
A. 近端指间关节肿痛
B. 四肢关节对称性肿痛
C. 掌指关节肿痛
D. 腕关节肿痛
E. 远端指间关节肿痛
53. 霍乱最常见的严重并发症是
A. 急性肺水肿
B. 代谢性酸中毒
C. 肾衰竭
D. 低钾综合征
E. 低钙血症
54. 护士注意甲状腺大部切除术后病人说话声音是为了评估有无

- A. 伤口出血
- B. 气管塌陷
- C. 麻醉清醒
- D. 神经损伤
- E. 痰液阻塞

55. 肝叶切除病人的术后护理错误的是

- A. 应专人护理
- B. 术后取平卧位
- C. 吸氧 3~5 天
- D. 鼓励早期下床活动
- E. 术后给予静脉补充营养

56. 门静脉高压症病人外科手术治疗的主要目的是

- A. 紧急制止上消化道出血
- B. 防止肝功能衰竭
- C. 提高抵抗力
- D. 降低门静脉的压力
- E. 减轻腹水

57. 急性腹膜炎伴有休克的患者是

- A. 半卧位
- B. 去枕平卧位
- C. 上半身及下肢各抬高 10°~30°
- D. 卧平位
- E. 侧卧位

58. 在急救现场如有少量肠管脱出,采取

- A. 送回腹腔
- B. 消毒单包裹
- C. 用清洁碗覆盖保护包扎
- D. 消毒后送回腹腔
- E. 用消毒碗覆盖保护包扎

59. 胃大部切除术后 2 天内,除生命体征外应重点观察的是

- A. 神志
- B. 胃管引流液
- C. 肠鸣音
- D. 腹胀
- E. 伤口敷料

60. 门静脉高压症分流术后护理不正确的是

- A. 使用抗菌药
- B. 低蛋白饮食
- C. 早期起床活动
- D. 进食高纤维食物
- E. 忌食过烫食物

61. 女性,35 岁,左肾结核无功能,右肾轻度积水,功能尚可,膀胱容量正常,上肺浸润性肺结核。

目前最恰当的治疗是

- A. 抗结核治疗
- B. 左肾部分切除
- C. 左肾切除
- D. 左肾造瘘
- E. 右肾造瘘

62. 一病员胫腓骨骨折,复位后石膏固定,肢体肿胀较明显,治疗中病人未能积极功能锻炼,2 个月后来除石膏复查,见骨折已愈,经 1 个月关节活动练习,膝关节活动度仍很差,此现象称

- A. 损伤性骨折
- B. 创伤性关节炎
- C. 关节僵硬
- D. 缺血性骨坏死
- E. 缺血性肌挛缩

63. 男性,62 岁,进行性排尿困难,夜尿次数增多,直肠指诊发现前列腺明显肿大,最可能的诊断是

- A. 膀胱癌
- B. 膀胱结石
- C. 前列腺增生
- D. 尿管狭窄
- E. 膀胱结核

64. 患者,女性,17 岁,跌倒时手掌撑地,现肘部关节肿胀,对确定肘关节后脱位诊断较有价值的表现是

- A. 手臂功能障碍
- B. 肘部剧烈疼痛
- C. 可摸到尺骨鹰嘴
- D. 受伤时手掌撑地
- E. 肘后三点关系正常

65. 一肾病综合征患儿,有胸水,全身水肿严重,阴囊水肿明显,护理该患儿不应采用的方法是

- A. 衣服宽松
- B. 避免肌肉注射
- C. 阴囊部用吊带托起
- D. 保持皮肤清洁干燥
- E. 让患儿卧于橡胶单上以利清洗

66. 4 岁患儿急性肾小球入院,1 日来尿量 100 ml,水肿明显,2 小时前开始气急,两肺有湿啰音,心率 130 次/分,心律呈奔马律,肝脏增大。可能并发了

- A. 急性肾功能衰竭
- B. 急性循环充血
- C. 电解质紊乱
- D. 高血压脑病

E. 支气管炎

67. 骨盆骨折合并尿道损伤和休克时,处理顺序应是

- A. 骨盆牵引固定、抗休克、处理尿道损伤
- B. 骨盆牵引固定、处理尿道损伤、抗休克
- C. 抗休克、处理尿道损伤、骨盆牵引固定
- D. 抗休克、骨盆牵引固定、处理尿道损伤
- E. 处理尿道损伤、骨盆牵引固定、抗休克

68. 诊断颅底骨折最可靠的临床表现是

- A. 意识障碍
- B. 脑脊液漏
- C. 脑脊液含血
- D. 颅底骨质凹陷
- E. 头皮皮下出血

69. 男性,34岁,右侧第4~7肋骨折,呼吸极度困难,发绀,出冷汗。检查:BP 65/40 mmHg,右胸饱满,气管向左侧移位,叩诊鼓音,颈、胸部有广泛皮下气肿,首要的处理方法是

- A. 立即吸氧
- B. 开胸探查
- C. 输血、补液
- D. 胸腔穿刺排气减压
- E. 气管插管辅助呼吸

70. 右心衰病人常有食欲不振、恶心、呕吐、腹胀等,是由于

- A. 肺循环淤血
- B. 胃肠道淤血
- C. 迷走神经反射增强
- D. 交感神经反射增强
- E. 左心室扩大压迫膈肌

71. 被管理对象包括几个要素

- A. 1个
- B. 2个
- C. 3个
- D. 4个
- E. 5个

72. 下列哪项健康教育属于群体教育形式

- A. 个别谈话
- B. 报刊小册子
- C. 专题讲座
- D. 健康咨询
- E. 广播收音

73. 社区健康教育的对象不包括

- A. 健康人群
- B. 高危人群

C. 患病人群

D. 患者家属及照顾者

E. 住院人群

74. 纤维内窥镜的消毒灭菌宜用

- A. 乙醇浸泡法
- B. 戊二醛浸泡法
- C. 紫外线照射法
- D. 高压蒸汽灭菌法
- E. 煮沸法

75. 隔离衣使用的要求正确的是

- A. 每周更换一次
- B. 要保持袖口内外面清洁
- C. 必须完全盖住工作服
- D. 隔离衣潮湿,晾干后再使用
- E. 隔离衣挂在传染病区走廊内,应外面向外

76. 为防止交叉感染,具有针对性的措施是

- A. 无菌物品与非无菌物品分开存放
- B. 无菌物品应放在清洁干燥固定的地方
- C. 一份无菌物品只供一位病人使用
- D. 无菌物品应定期检查
- E. 用无菌钳夹取无菌物品

二、以下提供若干个病例,每个病例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每题下面 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(77~79 题共用题干)

男性,21岁,查体时发现心尖部舒张期隆隆样杂音,左房增大。

77. 该患者最可能的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 二尖瓣狭窄并二尖瓣关闭不全

78. 该患者左房失代偿期最严重的表现是

- A. 咯血
- B. 端坐呼吸
- C. 急性肺水肿
- D. 快速房颤
- E. 心绞痛

79. 该患者可出现的并发症,下列哪项少见

- A. 栓塞
- B. 心力衰竭
- C. 急性肺水肿
- D. 感染性心内膜炎

E. 房颤

(80~82 题共用题干)

患者女性,30岁,去年冬季发生进食后胃区痛,且有打嗝、反酸,持续约20天。查体在剑突左侧有局限压痛,但无反跳痛。

80. 应做何检查可以确诊

- A. B超
- B. 胃镜
- C. CT
- D. 化验血常规
- E. 化验胃酸

81. 考虑何病所致

- A. 胃溃疡
- B. 急性胃炎
- C. 慢性胃炎
- D. 十二指肠溃疡
- E. 食管憩室

82. 目前认为是何种细菌感染

- A. 幽门螺旋杆菌
- B. 链球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 化脓球菌
- E. 绿脓杆菌

(83~84 题共用题干)

83. 患儿,男,7岁,糖尿病,一直胰岛素治疗,血糖控制平稳,晚间突然腹痛,稀水样便,父母给予止泻药,晨起发现意识模糊,急诊收入院,呼气有酮味,急查血糖 27.9 mmol/L。此患儿医疗诊断为

- A. 低血糖昏迷
- B. 高血糖昏迷
- C. 乳酸酸中毒
- D. 酮症酸中毒
- E. 半乳糖血症

84. 根据病情对此患儿的救治原则是

- A. 快速进食甜食
- B. 快速胰岛素静脉滴注
- C. 化验血脂水平
- D. 观察尿液颜色
- E. 控制感染

(85~91 题共用题干)

患者,女性,48岁,8月初由外地来京探亲,因“发热、头痛5天,神志不清2天”于9月18日入院,经餐后确诊为流行性乙型脑炎。

85. 该病人确诊为流行性乙型脑炎的最主要依据是

- A. 血培养
- B. 骨髓培养
- C. 脑脊液常规检查
- D. 脑脊液涂片检查
- E. 特异性IgM抗体

86. 下列血常规检查结果,符合该病人特点的是

- A. WBC $2.4 \times 10^9/L$, N 44%, L 56%
- B. WBC $3.4 \times 10^9/L$, N 70%, L 30%
- C. WBC $5.5 \times 10^9/L$, N 55%, L 45%
- D. WBC $5.8 \times 10^9/L$, N 70%, L 30%
- E. WBC $19.2 \times 10^9/L$, N 80%, L 20%

87. 下列脑脊液检查结果,符合该病人特点的是

- A. 外观混浊,细胞数 $1500 \times 10^6/L$
- B. 外观清亮,细胞数 $1200 \times 10^6/L$
- C. 蛋白轻度升高,糖和氯化物正常
- D. 蛋白明显升高,糖和氯化物明显降低
- E. 蛋白、糖和氯化物均明显升高

88. 检查发现病人呼之不应,双侧瞳孔等大等圆,对光反射迟钝,此时病人的意识状态为

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

89. 病人 T 40℃, P 90次/分, R 38次/分,颈强直,球结膜水肿,肺部呼吸音粗,可闻及痰鸣,下列处理措施错误的是

- A. 吸痰
- B. 翻身拍背、体位引流
- C. 遵医嘱给予安乃近快速降温
- D. 遵医嘱给予甘露醇脱水治疗
- E. 开窗通风,保持室内空气新鲜

90. 该病人最易出现的并发症是

- A. 呼吸衰竭
- B. 压疮
- C. 支气管肺炎
- D. 窒息
- E. 应激性溃疡

91. 提示病人出现中枢性呼吸衰竭的最可靠体征是

- A. 呼吸困难
- B. 呼吸急促
- C. 呼吸浅促
- D. 呼吸节律不整
- E. 出现“三凹征”

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中间选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(92~93 题共用备选答案)

- A. 高压氧疗
- B. 高流量给氧
- C. 面罩给氧
- D. 持续低流量给氧
- E. 呼吸末期正压给氧

92. 左心衰竭肺水肿吸氧方法为

93. 慢性阻塞性肺部疾病吸氧方法为

(94~95 题共用备选答案)

- A. 呼气性呼吸困难
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 深大呼吸
- D. 呼吸浅促
- E. 呼吸节律异常

94. 支气管哮喘

95. 喉头水肿

四、在以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中间选择所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

96. 关于肠梗阻病人的护理,下列护理措施正确的是

- A. 应用吗啡止痛
- B. 胃肠减压
- C. 纠正电解质紊乱
- D. 半卧位
- E. 禁食

97. 下列符合 SLE 临床表现的是

- A. 可长期中、低度发热
- B. 近端指间关节、腕、膝关节常受累
- C. 可出现纤维素性心包炎
- D. 可表现为偏瘫
- E. 可出现严重贫血

98. 鼓励泌尿系统病人多饮水的目的是

- A. 有利于炎症消退
- B. 补充血容量
- C. 减少结石形成
- D. 清除体内代谢废物
- E. 冲洗尿道

99. 防治脑水肿是脑复苏的关键,应尽早施行下述哪些措施

- A. 低温
- B. 脱水疗法
- C. 镇静止痉
- D. 皮质类固醇应用
- E. 高压氧疗法

100. 对丹毒病人治疗护理措施应包括

- A. 抬高患肢
- B. 切开引流
- C. 呼吸道隔离
- D. 应用抗生素
- E. 50% 硫酸镁湿敷

答案

1. E 2. C 3. C 4. D 5. E 6. C

7. B 8. C 9. C 10. A 11. C 12. C

13. A 14. A 15. D 16. C 17. A 18. E

19. B 20. D 21. C 22. E 23. B 24. E

25. C 26. E 27. B 28. C 29. C 30. D

31. B 32. E 33. B 34. A 35. E 36. C

37. D 38. D 39. D 40. D 41. D 42. E

43. A 44. C 45. D 46. E 47. C 48. E

49. A 50. D 51. D 52. E 53. C 54. D

55. E 56. A 57. C 58. E 59. B 60. C

61. A 62. C 63. C 64. E 65. E 66. B

67. C 68. B 69. D 70. B 71. E 72. C

73. E 74. B 75. C 76. C 77. A 78. C

79. D 80. B 81. A 82. A 83. D 84. B

85. E 86. E 87. C 88. D 89. C 90. C

91. D 92. B 93. D 94. A 95. B

96. BCDE 97. ABCDE 98. ACE 99. ABCDE

100. ADE

相关专业知识

一、在以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中间选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 护理诊断 PSE 公式中的 P 代表

- A. 病人的健康问题
- B. 症状与体征
- C. 病人的既往病史
- D. 病人的现病史
- E. 健康问题的相关因素

2. 一人扶助病人翻身侧卧,应注意

- A. 协助病人手臂放于身体两侧
- B. 使病人两腿平放伸直

- C. 协助病人先将臀部移向床缘
D. 护士手扶病人肩、膝部助翻身
E. 翻身而使病人上腿伸直
3. 预防溶血反应的措施包括
A. 严格执行无菌操作
B. 输血前肌注异丙嗪
C. 做好血液质量检查
D. 输血前静注 10% 葡萄糖酸钙
E. 输血前静注地塞米松
4. 强酸、强碱中毒最适合用哪种物质作保护剂
A. 茶叶水
B. 阿托品
C. 呋塞米
D. 依地酸二钠
E. 蛋清
5. 人类基本需要是
A. 生理的需要是指个体需要有保障、受保护
B. 安全的需要是指个体渴望归属于某一群体
C. 尊重的需要是指个体希望爱与被爱
D. 自我实现的需要是指个体有自尊、被尊重和尊重人的需要
E. 爱与归属是指个体渴望归属于某一群体, 希望爱与被爱
6. 对于因疾病需要长期卧床的卧床病人, 压疮最易发生在
A. 髌部
B. 髂前上棘
C. 髂嵴
D. 大转子处
E. 额部
7. 成人主要的造血器官是
A. 骨髓
B. 肝
C. 脾
D. 淋巴结
E. 胸腺
8. 尿查 17-羟类固醇标本中需使用浓盐酸防腐剂是因为
A. 防止尿中激素被氧化
B. 固定尿中有机成分
C. 保持尿液的化学成分不变
D. 避免尿液被污染变质
E. 防止尿液颜色改变
9. 处理下列医嘱时应首先执行
A. 停止医嘱
B. 临时备用医嘱
C. 即刻医嘱
D. 定时执行的医嘱
E. 新开出的长期医嘱
10. 某患儿, 9 岁, 扁桃体切除术后伤口局部有少量出血, 可在颌下
A. 放置热水袋
B. 放置冰囊
C. 用乙醇纱布湿敷
D. 进行红外线照射
E. 用 50% 硫酸镁进行湿热敷
11. 有关青霉素快速过敏试验法, 下述正确的是
A. 每毫升试验液含青霉素 500 单位
B. 试验液滴在电极板负极头上
C. 75% 乙醇消毒前臂内侧皮肤
D. 开启计时开关 15 分
E. 试验部位出现白斑, 属阴性反应
12. 书写病区报告的顺序是先写
A. 施行手术病人
B. 转入病人
C. 危重病人
D. 新入院病人
E. 转出病人
13. 下列哪种药物需用蓝边瓶签、有色密盖瓶盛放
A. 乙醇
B. 酵母片
C. 氨茶碱片
D. 糖衣片
E. 高锰酸钾
14. 给一位左上肢外伤病人床上擦浴, 下述何项正确
A. 由外眦向内眦擦拭眼部
B. 脱上衣时先脱左肢
C. 擦毕按摩骨突处
D. 穿上衣时先穿右肢
E. 擦洗动作要轻慢
15. 特发性血小板减少性紫癜病人应避免使用下列哪种药物
A. 泼尼松
B. 阿莫西林
C. 红霉素
D. 潘生丁
E. 地西洋

16. 慢性肾炎病情迁延, 病变缓慢进展, 最终将发展为
- 肾病综合征
 - 肾小动脉硬化症
 - 尿路严重感染
 - 慢性肾功能不全
 - 梗阻性肾病
17. 钩体病早期的“三体征”是指
- 高热、结膜充血、浅表淋巴结肿痛
 - 咽部充血、结膜充血、肝脾肿大
 - 结膜充血、腓肠肌压痛、浅表淋巴结肿痛
 - 结膜充血、腓肠肌压痛、肝脾肿大
 - 充血、出血、渗出
18. 为防止洗胃液误吸入气管, 病人的最佳体位应是
- 头低位
 - 头低位并左侧卧位
 - 头低位并右侧卧位
 - 侧卧位
 - 仰卧位
19. 下列哪一项对诊断麻疹恢复期最有意义
- 发热、流涕、咳嗽
 - 结膜充血、流泪
 - 咽红、口腔黏膜充血
 - 手心、脚心有斑丘疹
 - 皮肤呈麦麸样脱屑, 棕褐色色素沉着
20. 腰椎穿刺的禁忌证, 不包括
- 合并糖尿病
 - 全身有感染性疾病
 - 病情危重、躁动不安
 - 颅内压明显增高
 - 穿刺部位皮肤感染
21. 尿道损伤术后防止尿道狭窄最好的方法是
- 多用肾上腺皮质激素
 - 定期尿道扩张
 - 理疗
 - 长期应用抗菌药
 - 多饮水
22. 肾移植术后病人服用免疫抑制剂的时间为
- 终生
 - 1 年
 - 3 年
 - 5 年
 - 10 年
23. 健康教育中常用的术语为
- 术语
 - 姿势
 - 面部表情
 - 眼睛运动
 - 身体运动
24. 健康教育时知识灌输的时间以哪项为宜
- 10 分钟
 - 15 ~ 20 分钟
 - 25 ~ 30 分钟
 - 35 ~ 40 分钟
 - 45 分钟以上
25. 对手术器械最有效的灭菌法是
- 燃烧法
 - 高压蒸汽灭菌法
 - 煮沸消毒法
 - 烤箱干热灭菌法
 - 微波消毒灭菌法
26. 干烤法杀灭芽孢的条件是
- 箱温 80 ~ 100℃, 时间 10 分钟
 - 箱温 120 ~ 140℃, 时间 15 分钟
 - 箱温 160 ~ 170℃, 时间 40 ~ 50 分钟
 - 箱温 150℃, 时间 60 分钟
 - 箱温 180℃, 时间 20 ~ 30 分钟
27. 对铜绿假单胞菌感染的病人用过的剪刀, 其消毒灭菌的步骤是
- 灭菌, 再清洁, 灭菌
 - 清洁后用高压蒸汽灭菌
 - 彻底清洗后, 用化学消毒剂浸泡消毒
 - 直接采取燃烧法达到灭菌
 - 与其他器械先浸泡消毒后, 再分别清洁灭菌
28. 管理的首要职能是
- 组织
 - 指挥
 - 计划
 - 控制
 - 协调
29. 下列关于呼吸运动的调节的描述错误的是
- 外周化学感受器即颈动脉窦和主动脉体化学感受器
 - $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$ 时, 外周化学感受器兴奋, 使呼吸加深、加快
 - 酮症酸中毒时呼吸中枢反应是呼吸加深加快
 - COPD 病人血气显示 $\text{PaO}_2 55 \text{ mmHg}$, PaO_2

- >60 mmHg 时,吸氧浓度应 <35%
- E. 动脉血或脑脊液中 CO_2 浓度升高的早期作用是兴奋呼吸中枢
30. 感染过程的几种表现中,最易识别的是
- A. 病原体被清除
B. 隐性感染
C. 显性感染
D. 病原携带状态
E. 潜伏性感染
31. 心脏、呼吸骤停病人复苏后医嘱使用 20% 甘露醇 250 ml 静脉滴注,将该液体滴注完毕最多需要
- A. 5 分钟
B. 5~10 分钟
C. 10~15 分钟
D. 15~30 分钟
E. 60 分钟
32. 最易骨折的肋骨是
- A. 第 1、2 肋
B. 第 2、3 肋
C. 第 4~7 肋
D. 第 8~10 肋
E. 第 11、12 肋
33. 下列哪项检查结果提示可能是慢性肝炎与肝硬化
- A. 血清转氨酶升高
B. 血清碱性磷酸酶升高
C. 血清直接胆红素升高
D. 白蛋白与球蛋白比例倒置
E. 凝血酶原时间延长
34. 上消化道出血病人的粪便可呈
- A. 脓血样
B. 果酱样
C. 米泔水样
D. 柏油样
E. 白陶土样
35. 静脉输液的目的不包括
- A. 纠正体内水、电解质及酸碱失衡
B. 增加血红蛋白,纠正贫血
C. 补充营养,维持能量
D. 输入药物,治疗疾病
E. 增加循环血量,维持血压
36. 腰椎穿刺术一般选择的部位为
- A. 腰 1~2 椎间隙
B. 腰 3~4 椎间隙
C. 胸 6~7 椎间隙
D. 胸 8~9 椎间隙
E. 胸 9~10 椎间隙
37. 病人侧卧位时,腰穿脑脊液的压力超过多少提示颅内压增高
- A. 140 mmH₂O
B. 160 mmH₂O
C. 180 mmH₂O
D. 200 mmH₂O
E. 220 mmH₂O
38. 对于怀疑为急性胰腺炎的病人,最具诊断意义的实验室检查是
- A. 白细胞计数
B. 血钙测定
C. 尿淀粉酶测定
D. 血清淀粉酶测定
E. 血清脂肪酶测定
39. 糖尿病患者不宜食用下列哪种食物
- A. 粗粮
B. 水果
C. 动物脂肪
D. 海鲜
E. 植物油
40. 不符合室性早搏特点的是
- A. QRS-T 波群提前出现
B. QRS-T 波群前没有 P 波
C. 提前出现的 QRS-T 波群形态异常,时限常 ≥ 0.20 秒
D. 早搏后可见有一完全代偿间歇
E. 偶发早搏一般无症状
41. 不符合阵发性心动过速特点的是
- A. 阵发性快速而规则的异位心律
B. 由 3 个或 3 个以上连续发生的早搏形成
C. 具有突发突止的特点
D. 根据异位节律点的部位分为房性和室性两类
E. 心律基本规则
42. 进行非同步电除颤时,电量应选择在
- A. 100~150 J,最高可达 200 J
B. 150~200 J,最高可达 250 J
C. 200~300 J,最高可达 360 J
D. 200~360 J,最高可达 400 J
E. 300~400 J,最高可达 450 J
43. 同步电击复律的同步触发装置利用病人心电图中的 R 波来触发,在心动周期的哪一时期发放

电流,可使异位快速心律失常转复为窦性

- A. 绝对不应期
- B. 除极期
- C. 相对不应期
- D. 复极期
- E. 超常期

44. 小儿预防接种程序正确的是

- A. 生后 2~3 天接种卡介苗
- B. 5 个月口服脊髓灰质炎减毒活疫苗
- C. 3 个月接种麻疹疫苗
- D. 8 个月接种白、百、破疫苗
- E. 10 个月接种乙型肝炎疫苗

45. 婴儿每日需要的能量 (kcal/kg) 和水 (ml/kg) 分别是

- A. 70, 110
- B. 80, 120
- C. 90, 130
- D. 100, 140
- E. 110, 150

46. 预防新生儿破伤风主要应做好

- A. 口腔护理
- B. 脐部护理
- C. 眼睛护理
- D. 臀部护理
- E. 皮肤护理

47. 对肺炎患儿家长健康教育内容正确的是

- A. 定期进行体格检查
- B. 避免体育活动
- C. 免疫程序延缓一年进行
- D. 每月复查肺炎一次
- E. 根据节气增减衣服

48. 小儿, 4 个月。突发高热、咳嗽、呼吸困难。医生听诊双肺有干、细湿性啰音。进一步检查外周血, 确认为细菌感染所致肺炎。血化验的特点是

- A. 白细胞总数降低
- B. 白细胞胞浆见中毒颗粒
- C. 淋巴细胞增高
- D. 出现核右移
- E. 嗜中性粒细胞减少

49. 某新生儿于出生后 24 小时出现呼吸困难, X 线检查呈“白肺”。应考虑可能为

- A. 呼吸困难
- B. 新生儿肺透明膜病
- C. 新生儿肺炎
- D. 新生儿窒息

E. 新生儿湿肺

50. 下列哪项不属于护患沟通技巧

- A. 开放式提问技巧
- B. 非语言沟通
- C. 交谈技巧
- D. 沉默技巧
- E. 行为训练技巧

51. 确诊乳腺包块性质最可靠的方法是

- A. 乳房钼靶 X 线检查
- B. 乳头溢液涂片
- C. 乳房触诊
- D. 活组织病理检查
- E. B 超

52. 肠扭转最多见于

- A. 饥饿时运动
- B. 饱食后卧床
- C. 饱食后剧烈活动
- D. 腹部曾有创伤
- E. 腹内曾手术过

53. 下列不适合选择腹腔镜检查的情况为

- A. 寻找腹腔内异物
- B. 不孕症
- C. 子宫内膜异位症
- D. 内出血休克
- E. 异位妊娠

二、以下提供若干个病例, 每个病例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每道下面 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(54~55 题共用题干)

男性, 40 岁。多年胃十二指肠溃疡, 近半个月来胃病发作, 饮食后突然腹部疼痛剧烈, 刀割样, 血压 100/70 mmHg (13.3/9.3 kPa), 脉搏 100 次/min, 全腹压痛, 反跳痛, 肌紧张。

54. 下列哪项检查有助于诊断

- A. 腹腔穿刺
- B. 化验血白细胞
- C. 化验血红细胞
- D. 黄疸指数
- E. 化验血胆红素

55. 确诊后处理原则

- A. 抗生素治疗
- B. 输液治疗
- C. 止痛治疗
- D. 手术治疗