

国家职业资格培训中药调剂员参考用书

中药饮片彩色图集

王建宋辉主编



中國海圖出版社

R282 5-64

国家职业资格培训中药调剂员参考用书

中药饮片彩色图集

王 建 宋 辉 主编



中国海潮出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药饮片彩色图集 / 王建 宋辉 主编—北京：中国海关出版社，
2008.9

ISBN 978-7-80165-474-8

I . 中… II . 王… III . 饮片—图集 IV . R283.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 190126 号

中药饮片彩色图集

王建 宋辉 主编

出 品 人：左 铁

责 任 编辑：冯雪松

版式设计：黄金支点

出版发行：中国海关出版社

地 址：北京市朝阳区东土城路甲 9 号远东大厦 5 层 (100013)

网 址：<http://www.haiguanbook.com>

编 辑 部：(010)85271833-653

发 行 部：(010)84252703

经 销：新华书店

印 刷：三河腾飞印务有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

字 数：120 千字

插 图：400 幅

印 张：13.25

书 号：ISBN 978-7-80165-474-8

版 次：2008 年 9 月第 1 次版

印 次：2008 年 9 月第 1 次印刷

定 价：68.00 元

海关版图书，印装有错误可随时调换。

前言

《中药饮片彩色图集》是由北京医药集团教育培训中心组织编写的一本旨在面向国家职业资格培训中药调剂员考试的参考用书。其中收载的400种中药饮片是中药调剂员教程里中药鉴别项下规定的品种。

本书收载的中药饮片按《中药调剂员国家职业资格培训教程》中规定的初级、中级、高级要求的顺序和内容排列，每种中药饮片项下包括彩色图片和文字两部分，文字部分包括中文名、汉语拼音、拉丁学名、来源、产地、炮制、性状、贮藏、性味功效等内容。

本书注重中药饮片的鉴别，每种饮片都配有带标尺的彩色图片，对培训教程中中药饮片的文字说明是一个很好的补充对照，可以较好地帮助考生识别考试要求的中药饮片。也可作为喜爱中医药的读者的科普读物。

在编写本书的过程中，得到了北京医药教育培训中心领导与老师们的大力支持，在此表示衷心感谢！


由于时间仓促，水平有限，本书难免有不足之处，敬请读者指正。

编者

2008年6月于北京


III 索引 CONTENTS

初级工 / 1



		15 白头翁			
		白芷	33	麸苍术	51 黄柏
		白术		芦根	盐黄柏
		土白术	34	鲜芦根	黄柏炭
		炒白术		苦参	53 丁香
		白及	35	板蓝根	月季花
		白茅根		知母	54 合欢花
		白薇	36	泽泻	红花
		半夏		盐泽泻	55 辛夷
		法半夏	37	茜草	金银花
2	干姜	20 清半夏		南沙参	56 玫瑰花
	姜炭	姜半夏	38	香附	菊花
3	大黄	21 龙胆		醋香附	57 野菊花
	酒大黄	生姜	39	桔梗	槐花
4	熟大黄	22 玄参		柴胡	58 炒槐花
	大黄炭	鲜地黄	40	党参	槐花炭
5	山豆根	23 生地黄		射干	59 侧柏叶
	山药	熟地黄	41	浙贝母	侧柏炭
6	麸炒山药	24 地榆		黄芩	60 荷叶
	川贝母	地榆炭	42	酒黄芩	荷叶炭
7	川芎	25 西洋参		黄芪	61 桑叶
	酒川芎	百合	43	炙黄芪	银杏叶
8	广防己	26 蜜百合		漏芦	62 淡竹叶
	木香	百部	44	藁本	番泻叶
9	煨木香	27 蜜百部	45	五加皮	63 八角茴香
	牛膝	当归		地骨皮	大枣
10	酒牛膝	28 酒当归	46	肉桂	64 山楂
	天冬	延胡索		合欢皮	炒山楂
11	甘草	29 醋延胡索	47	杜仲	65 焦山楂
	炙甘草	防己		盐杜仲	女贞子
12	升麻	30 防风	48	牡丹皮	66 酒女贞子
	丹参	麦冬		厚朴	小茴香
13	酒丹参	31 远志	49	姜厚朴	67 盐小茴香
	白芍	制远志		秦皮	马兜铃
14	炒白芍	32 赤芍	50	桑白皮	68 蜜马兜铃
	酒白芍	苍术		蜜桑白皮	五味子

中级工 / 104



69	醋五味子	87	全 蝎				
	牛蒡子		牡 蚵				
70	炒牛蒡子	88	煅牡蛎	105	土茯苓	121	葛 根
	王不留行		龟 甲		山慈姑		紫 菟
71	炒王不留行	89	醋龟甲	106	川木香	122	蜜紫菀
	车前子		鸡内金		煨川木香	123	大血藤
72	盐车前子	90	炒鸡内金	107	川牛膝		川木通
	火麻仁		醋鸡内金		酒牛膝	124	天仙藤
73	炒火麻仁	91	穿山甲	108	太子参		关木通
	使君子		炮山甲		天花粉	125	苏 木
74	瓜 萎	92	醋山甲	109	巴戟天		竹 茄
	枳 实		桑螵蛸		制巴戟天	126	姜竹茹
75	麸炒枳实	93	生斑蝥	110	巴戟肉		皂角刺
76	小 薊		米斑蝥		盐巴戟天	127	沉 香
	马齿苋	94	生石膏	111	乌 药		忍冬藤
77	石 鲻		煅石膏		石菖蒲	128	鸡血藤
	鲜石斛	95	白 矾	112	白 前		降 香
78	灯芯草		枯 矾		蜜白前	129	钩 藤
	灯芯草炭	96	芒 硝	113	白 苓		桂 枝
79	青 蒿		玄明粉		北豆根	130	通 草
	鱼腥草	97	朱 砂	114	北沙参	131	鸡冠花
80	茵 陈		自然铜		何首乌		鸡冠花炭
	益母草	98	煅自然铜	115	制何首乌	132	松花粉
81	鲜益母草		青礞石		羌 活		旋覆花
	麻 黄	99	煅青礞石	116	狗 脊	133	蜜旋覆花
82	蜜麻黄		雄黄粉		烫狗脊		密蒙花
	薄 荷	100	紫石英	117	骨碎补	134	款冬花
83	鲜薄荷		醋煅紫石英		烫骨碎补		蜜款冬花
84	土鳖虫	101	滑 石	118	独 活	135	生蒲黄
	水牛角		滑石粉		前 胡		蒲黄炭
85	水牛角浓缩粉	102	磁 石	119	蜜前胡	136	夏枯草
	水 蜈		煅磁石		秦 芫		枇杷叶
86	烫水蛭	103	赭 石	120	黄 精	137	蜜枇杷叶
	地 龙		煅赭石		酒黄精		炙淫羊藿

138 紫苏叶
139 川棟子
炒川棟子
140 木瓜
烏梅肉

141 龍眼肉
決明子

142 炒決明子
苦杏仁

143 煅苦杏仁
炒苦杏仁

144 砂仁
枳壳

145 桔子
炒桔子

146 焦桔子
车前草

仙鹤草
148 半边莲

半枝莲
149 老鹳草

伸筋草
150 佩兰

金钱草
151 卷柏

卷柏炭
152 泽兰

细辛
153 荆芥

荆芥穗
154 荆芥炭

芥穗炭
155 香薷

鴨跖草
156 蒲公英

瞿麦
172 徐长卿

高级工 / 157

158 生晒人参

红参

159 红参片

人参须

160 人参粉

三七

161 三七粉

醋三棱

162 川乌

制川乌

163 千年健

天麻

164 天麻片

天南星

165 制天南星

胆南星

166 片姜黄

生白附子

167 制白附子

红大戟

168 盐附子

黑顺片

169 白附片

青木香

170 京大戟

醋大戟

171 生草乌

制草乌

徐长卿

黄连

173 黄连片

酒黄连

174 姜黄连

黄黄连

175 锁阳

续断

176 酒续断

盐续断

177 绵马贯众

绵马贯众炭

178 土荆皮

白鲜皮

179 苦楝皮

香加皮

180 首乌藤

络石藤

181 海风藤

桑寄生

182 檀寄生

檀香

183 西红花

芫花

184 醋芫花

洋金花

185 大青叶

山茱萸

186 酒山茱萸

千金子

187 千金子霜

马钱子

188 制马钱子

马钱子粉

桃仁

190 煅桃仁

炒桃仁

191 广藿香

马鞭草

192 地锦草

金沸草

193 积雪草

牛黄

194 乌梢蛇

乌梢蛇肉

195 酒乌梢蛇

珍珠

196 珍珠粉

197 石决明

金钱白花蛇

198 海马

海龙

199 鹿茸

200 鹿茸片

羚羊角

201 羚羊角片

羚羊角粉

202 儿茶

冬虫夏草

203 灵芝

青黛

204 昆布

茯苓

205 猪苓

雷丸

206 血竭

没药

207 醋没药

乳香

208 醋乳香

安息香

209 苏合香



初级工





● 干 姜 | GanJiang

RHIZOMA ZINGIBERIS

【来源】为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的根茎。


【产地】主产于四川、贵州等地。

【炮制】取药材拣去杂质，浸至4~5成透，洗净，润透，切成3~4mm厚片，干燥。

【性状】为横切或纵切片，片形不规则，边缘多厚而内卷，切断面黄白色，有明显的淡黄色小筋脉点，显粉性，质硬脆。气特异，味辛辣。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

【性味功效】性热，味辛。温中散寒，回阳通脉。



● 姜 炭 | JiangTan

【来源】同干姜。


【产地】同干姜。

【炮制】取干姜块，用武火炒至外表焦黑色，内部焦褐色，喷淋清水，熄灭火星，取出，晾凉。

【性状】为不规则块状，表面焦黑色或棕褐色，断面边缘呈棕黑色，中心棕褐色，质地疏松。气香，味微辣。

【贮藏】置密闭容器内，防潮。

【性味功效】性热，味辛。温中散寒，温经止血。



● 大 黄 | DaHuang

RADIX ET RHIZOMA RHEI

【来源】为蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L. 唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的根及根茎。


【产地】掌叶大黄主产于甘肃、青海、西藏、四川；唐古特大黄主产于青海、甘肃、西藏；药用大黄主产于四川、贵州、云南。

【炮制】取药材拣去杂质，大小分开，洗净，润透，切3~4mm厚片，干燥。

【性状】为圆形、半圆形片或不规则片状，切面淡红棕色或黄棕色，颗粒性，根茎髓部较大，有星点环列或散在；根形成层明显，木质部发达，具放射状纹理，无星点。气清香，味苦微涩，嚼之粘牙，有沙粒感，唾液染成黄色。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

【性味功效】性寒，味苦。泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。



● 酒 大 黄 | JiuDaHuang

【来源】同大黄。


【产地】同大黄。

【炮制】取大黄片，用黄酒拌匀，闷1~2小时，用文火炒至微变色，取出，晾凉。

【性状】形似大黄片或块，表面深褐色，有酒香气。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

【性味功效】性寒，味苦。善清上焦血分热毒。



● 熟 大 黄 | ShuDaiHuang

【来源】同大黄。


【产地】同大黄。

【炮制】取大黄片或块，用黄酒拌匀，闷1~2小时，至酒吸尽，蒸至内外变为黑色或黑棕色，取出，干燥。

【性状】形似大黄片或块，表面黑褐色，有特异气味。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

【性味功效】性寒，味苦。泻下力缓，泻火解毒。



● 大 黄 炭 | DaHuangTan

【来源】同大黄。


【产地】同大黄。

【炮制】取大黄片或块，用武火炒至表面焦黑色，喷淋清水，灭尽火星，取出，凉透。

【性状】形似大黄片或块，焦黑色，无臭，味微苦。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

【性味功效】性寒，味苦。凉血化瘀止血。



● 山豆根 | ShanDouGen

RADIX ET RHIZOMA SOPHORAE TONKINENSIS

【来源】为豆科植物越南槐 *Sophora tonkinensis* Gangnep. 的根。

【产地】主产于广西、广东、贵州等地。

【炮制】取药材拣去杂质，切去芦头，浸泡，洗净，切成2~4mm厚片，干燥。

【性状】为圆形或不规则半圆形片，切断面显纤维性，皮部淡黄棕色，木部黄白色。微有豆腥气，味极苦。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

【性味功效】性寒，味苦。清热解毒，消肿利咽。



● 山药 | ShanYao

RHIZOMA DIOSCOREAE

【来源】为薯蓣科植物薯蓣 *Dioscorea opposita* Thunb. 的根茎。


【产地】主产于河南、河北等地。

【炮制】取药材拣去杂质，大小分档，浸至适度，捞出，润透，切4~5mm厚片，及时薄摊，勤翻，晒干。

【性状】为类圆形片，断面白色，平坦，粉性，偶见棕色的维管束点。味淡，微酸。

【贮藏】置通风干燥处，防霉，防蛀，防潮。

【性味功效】性平，味甘。补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。



● 熟炒山药 | FuChaoShanYao

【来源】同山药。

【产地】同山药。

【炮制】取麸皮撒入热锅中，用中火加热至冒烟，投入山药片，炒至微黄色，取出，筛去麸皮，晾凉。

【性状】形似山药片，表面淡黄色、黄色或黄棕色，偶有焦斑，气微香。

【贮藏】置通风干燥处，防霉，防蛀，防潮。

【性味功效】性平，味甘。补脾健胃。



● 川贝母 | ChuanBeiMu

BULBUS FRITILLARIAE CIRRHOSAE

【来源】为百合科植物川贝母 *Fritillaria cirrhosa* D. Don、暗紫贝母 *Fritillaria unibracteata* Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 *Fritillaria przewalskii* Maxim. 或梭砂贝母 *Fritillaria delavayi* Franch. 的鳞茎。

【产地】川贝母主产于四川、西藏、云南等地；暗紫贝母主产于四川阿坝藏族自治州。甘肃贝母主产于甘肃、青海、四川等地；梭砂贝母主产于云南、四川、青海等地。

【炮制】取药材拣去杂质，晒干或低温干燥。


【性状】(1) 松贝 呈类圆锥形或近球形，高0.3~0.8cm，直径0.3~0.9cm。表面类白色。外层鳞叶2瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”；顶部闭合，内有类圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶1~2枚；先端钝圆或稍尖，底部平，微凹入，中心有1灰褐色的鳞茎盘，偶有残存须根。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦。

(2) 青贝 呈类扁球形，高0.4~1.4cm，直径0.4~1.6cm。外层鳞叶2瓣，大小相近，相对抱合，顶部开裂，内有心芽和小鳞叶2~3枚及细圆柱形的残茎。

(3) 炉贝 呈长圆锥形，高0.7~2.5cm，直径0.5~2.5cm。表面类白色或浅棕黄色，有的具棕色斑点。外层鳞叶2瓣，大小相近，顶部开裂而略尖，基部稍尖或较钝。

【贮藏】置通风干燥处，防霉，防蛀。

【性味功效】性微寒，味甘、苦。清热润肺，化痰止咳。



● 川芎 | ChuanXiong

RHIZOMA CHUANXIONG

【来源】为伞形科植物川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort. 的根茎。


【产地】主产于四川、贵州、云南等地。

【炮制】取药材，拣净杂质，大小分档，洗净，用清水浸1小时，捞起，闷润，中途淋水至润透，切成2~3mm厚片，晒干，筛去灰屑。

【性状】多为纵切片，边缘不整齐，形似蝴蝶，切面黄白色，有错综纹理，散有棕黄色油点，形成层环波状弯曲，髓部色较深。具浓郁特异的香气，味苦、辛，后微甜，稍有麻舌感。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀，防泛油。

【性味功效】性温，味辛、微苦。活血行气，散风止痛。



● 酒川芎 | JiuChuanXiong

【来源】同川芎。


【产地】同川芎。

【炮制】取川芎片用黄酒拌匀，待吸尽，润透，用文火炒干，取出，晾凉。

【性状】形似川芎片，表面颜色略深，偶有焦斑，略有酒气。

【贮藏】置阴凉干燥处，防霉，防蛀，防泛油。

【性味功效】性温，味辛、微苦。活血行气，止痛功能增强。



● 广防己 | GuangFangJi

RADIX ARISTOLOCHIAE FANGCHI

【来源】为马兜铃科植物广防己 *Aristolochia fangchi* Y.C.Wu ex L.D.Chou et S.M.Hwang 的根。


【产地】主产于广东、广西等地。

【炮制】取药材拣去杂质，分档，洗净，润透，切成2~3mm片，干燥，筛去灰屑。

【性状】为类圆形或长圆形的厚片。未去尽栓皮的表面多呈灰棕色，有粗糙的纵沟纹，去净外皮的呈淡黄色，切面灰黄色，有明显的车轮纹。气微，味苦。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

【性味功效】性寒，味苦、辛。祛风止痛，清热利水。



● 木香 | MuXiang

RADIX AUCKLANDIAE

8

【来源】为菊科植物木香 *Aucklandia lappa* Decne. 的根。

【产地】主产于云南等地。

【炮制】取药材拣去杂质及泛油变色的根，按大小分档，洗净，闷润至透，切成2mm厚片，晒干或低温烘干。

【性状】为横切片，圆形或椭圆形，边缘不整齐。切面淡黄棕色，有一棕色环及放射状纹理，并有棕色油点散布。老根切片木部中央呈枯朽状。气强烈芳香，味苦辛。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮。

【性味功效】性温，味苦、辛。行气止痛，温中和胃。



● 煨木香 | WeiMuXiang

【来源】同木香。

【产地】同木香。

【炮制】取未经干燥的木香片，置铁丝匾或铁皮盘中，一层草纸一层木香片，间隔平铺数层，压紧置烘箱或无烟炉火上，低温或文火煨至木香片中的油分渗在纸上，取出晾凉，弃去草纸。

【性状】煨后色较深，形如木香片，有网纹，香气微。

【贮藏】贮于干燥容器内，防潮。

【性味功效】性温，味苦、辛。
实肠止泻。



● 牛膝 | NiuXi

RADIX ACHYRANTHIS BIDENTATAE

【来源】为苋科植物牛膝 *Achyranthes Bitentata* Bl. 的根。


【产地】主产于河南、河北、山西等地。

【炮制】取药材，拣净杂质，用清水洗净，闷至内外湿度一致，切成5~10mm长段，干燥。

【性状】为圆柱形的段。切面棕黄色，半透明，中央有黄白色木心，周围有黄白色筋脉点，排列成数列同心环，气微，味微甜而涩。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮，防走油。

【性味功效】性平，味甘。逐瘀通经，补肝肾，强筋骨。



● 酒牛膝 | JiuNiuXi

【来源】同牛膝。

【产地】同牛膝。

【炮制】取牛膝段加黄酒拌匀，闷透，用文火炒干，取出，晾凉。

【性状】形似牛膝段，色较深，呈棕色偶有焦斑，稍有酒气，味微甜而稍苦涩。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮，防走油。

【性味功效】性平，味甘。补肝肾，强筋骨，活血化瘀。



● 天冬 | TianDong

RADIX ASPARAGI

10

【来源】为百合科植物天门冬 *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. 的干燥块根。

【产地】主产于贵州、四川、广西等地。

【炮制】取药材，拣去杂质及泛油色黑者，洗净，晒至八成干，切5mm厚片，干燥。

【性状】为类圆形横切片或斜片，黄棕色，半透明，有角质样光泽，有粘性，常粘结成团块。气微，味甜，微苦。

【贮藏】置通风干燥处，防霉，防蛀。

【性味功效】性寒，味甘、苦。养阴润燥，清肺生津。

