

神州醫學社新編

竹林編照

葉天士手集秘方

上海世界書局出版

中華民國廿四年三月四版

葉天士秘方 (全二冊)

價洋五角

編輯者 青浦陸士諤

印刷者 上海廣文書局

發行者 上海世界書局

版權所有不准翻印

總發行所 上海四馬路
世界書局

序

秘方者。師徒相授。從未著之簡策者也。顧未著之簡策。後之人從何纂集成書。曰。秘方之源。非人不授。非時不授。故名之曰秘。歲月既久。私家各本所傳。各自記述。然方之秘雖淺。而纂秘方者。大都不知醫之人。所以秘方之書雖多。而合用者甚鮮也。葉天士為清初名醫。其手集秘方。大抵本諸平日之心得。較之驗方新編等。自不可同年而語。顧其書雖善。體例亦頗可議。如既列咳嗽門。又列咳逆門。跡近重出。且其中如諸瘡丹毒無名腫毒等。篇列方互有出入。頗有混淆之弊。因係先輩手澤。未便擅自更張。方有重出者。亦未敢貿然刪改。致損本來面目。惟逐細校讐。勘明魯魚豕亥。使窮鄉僻壤。有不便延醫者。按書救治。不致謬誤。是則較者之苦心也。

中華民國九年二月

目

珠街閣陸士諤序於松江醫室

葉天士秘方目錄

目錄

- | | |
|-----------|----|
| (二) 中風 | 一 |
| (三) 補益 | 二 |
| (三) 瘓 | 三 |
| (四) 盜汗 | 四 |
| (五) 咳嗽哮喘 | 五 |
| (六) 吐血 | 六 |
| (七) 淋濁遺精 | 七 |
| (八) 痹脹 | 八 |
| (九) 痞塊 | 九 |
| (十) 脳噎 | 十 |
| (十一) 便閉 | 十一 |
| (十二) 風寒濕痺 | 十二 |
| (十三) 針灸 | 十三 |
| (十四) 黃疸 | 十四 |
| (十五) 鈎白 | 十五 |

- | | |
|-------------|----|
| (十六) 暑痧癰瘍 | 一 |
| (十七) 消渴 | 二 |
| (十八) 瘰癧 | 三 |
| (十九) 瘰瘍 | 四 |
| (二十) 泄瀉 | 五 |
| (二十一) 痘瘍 | 六 |
| (二十二) 沐瀉 | 七 |
| (二十三) 痢 | 八 |
| (二十四) 痢 | 九 |
| (二十五) 脱肛 | 十 |
| (二十六) 痿漏 | 十一 |
| (二十七) 腸風 | 十二 |
| (二十八) 痴血 | 十三 |
| (二十九) 心口胃脘痛 | 十四 |
| (三十) 呃逆 | 十五 |
| (三十一) 耳 | 十六 |
| (三十二) 目 | 十七 |

士 立 古 兵 大 兵 九 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵

- | | |
|------------|----|
| (三) 鼻 | 一 |
| (三) 口 | 二 |
| (三) 舌 | 三 |
| (三) 牙 | 四 |
| (三) 咽喉 | 五 |
| (三) 癰瘍 | 六 |
| (三) 疔瘍 | 七 |
| (三) 疠 | 八 |
| (三) 疡 | 九 |
| (三) 广瘡結毒 | 十 |
| (三) 魚口便毒下疳 | 十一 |
| (四) 中毒急救 | 十二 |
| (五) 膜瘡 | 十三 |
| (五) 諸瘡 | 十四 |
| (五) 諸丹毒 | 十五 |
| (五) 跌打損傷 | 十六 |

重 痘 痘 痘 痘 痘 痘 痘 痘 痘 痘 痘

- | | |
|----------|---|
| (五) 小兒雜症 | 一 |
| (五) 婦人經帶 | 二 |
| (五) 崩漏 | 三 |
| (五) 胎前 | 四 |
| (五) 產後 | 五 |
| (六) 婦人雜症 | 六 |

主 窝 窝 窝 窝 窝 窝 窝 窝 窝 窝 窝

葉天士秘方

(二) 中風

牛黃清心丸。此藥專治痰厥。昏眩不醒。口噤痰喘。及小兒驚風發搐。五癇等症極效。

膽星一兩薑汁炒 白附子一兩 蟲金一兩
川烏一兩 錫錢一兩 半夏一兩皮硝
皂角湯泡五次。每次用之。

右五味共為細末。用臘月黃牛膽三個。取汁和藥。仍入膽內。繫口掛風簷下。至次年取膽內藥一兩。四錢。加度過芒硝。水飛辰砂。硼砂各一錢。冰片麝香各一分。研極細末。和在一處。糊糊為丸如芡實大。金箔為衣。薑湯化下。

治暴仆瘧涎壅塞

竹瀝一盞。薑汁五匙。調入白礬末一錢。灌下。

治筋骨疼痛如夾板狀不可忍者

用驃子修下蹄爪甲。燒灰存性。研末。或黃酒。或湯調服。立愈。

治癱瘓秘方

熟牛骨髓一碗 熟白蜜一斤半 炒白麵一兩 炮薑末三兩

右四味和勻。如彈丸大。每日三四丸。細嚼。黃酒下。大效。

又

威靈仙 蒼朮 牛膝 桂枝 木通各一兩

右為末。黃酒五動。煮一炷香。早晚服。

治雞腳風 手足及指。拳掌如雞腳狀。膝骨蓋下。兩邊各有小窩。共四穴。謂之鬼眼。各將蕲艾灸三次。即愈。愚謂以驅寒濕。雷火針針四穴。亦效。

中風卒倒

治卒然倒仆。瘧涎壅盛。難

辨虛實。扶病人於避風室內。用炭火一盆。將米醋灑上。使醋氣衝入口鼻。病輕者即甦。重者亦易治。勿遽服補藥。米湯之類。恐痰涎永繫於心。致成終身痼疾。此法即虛中亦可用。

中風昏迷不省。方三 不論風寒食痰邪祟。一時昏仆不省者。用生薑汁半鍾 童便一鍾 和勻。盪溫灌下。即醒。

牙兒炎去皮筋 生明礬兩 二味同入水中煮化。取出曬乾為末。北細辛五錢去土 洗共研細末。用少許吹入鼻中。

人手足指甲。炒黃酒煮服。立醒。

白鹽梅揩齒。即能開。並不傷齒。不論男婦。小兒中風。口噤身直。用乾雞屎。或鵝糞炒黃。再以黑豆同炒。酒

前去淳服即齒開能言。

中風口噤不語方三

白明礬研末用生薑自然汁調化幹

馬料豆升煮濃汁如饴含汁在口即

能言也。

側柏葉一握去枝葱白一握連根研

如泥無灰酒一觴煎十餘沸溫服按

葉能行血消風葱白散氣祛痰酒能

退氣和力如初中即服數杯能使

一切易治。

初中痰盛不省人事

蘇合香丸一圓用竹瀝薑汁調藥灌

下醒後用。

白朮土炒當歸天麻各二

薄荷桂枝南星薑汁川芎陳皮

各一水煎臨服加竹瀝一酒杯薑

汁三茶匙和匀服。

中風口眼喎斜方四

生瓜萎絞汁和大麥麵炙熟熨心頭

一正便止勿令過分。

口渴用皂莢五兩去皮為末三年老醋和糊。左渴塗右右渴塗左乾更上之以正處塗之立便牽正。

又用石灰一合醋炒調如泥於不患灸法最妙。聽會穴耳珠前陷中頰車穴目下八分用參大父丸灸三壯即效如不效再灸。

中風灸法一時昏仆氣塞涎流不語藥物難施之際灸法最善。

百會穴頭頂風池穴耳後一寸五分

大椎穴項背第一節骨陷中曲池穴屈肘正中足三里穴膝眼下三寸

絕骨穴外踝上三寸附筋間使穴手掌上橫紋以上七

壯如何證用此灸法即愈。

中風手足麻痺

羌活煎湯洗如大腸燥熱不見虛

證者用狼實厚朴大黃羌

活各二錢水煎服自解。即化湯。中風拘攣中風昏仆省後筋絡攣結肢節疼痛或半身不遂者用八角刺樹皮俗名老鼠刺樹高三五尺冬季結紅子鮮者取皮四錢水蓮葉似茶花葉而色老生片歲一無灰酒二觴煎至兩碗作二次服大有奇功三四服全效。

預防中風方凡人覺大指次指麻木或眉稜骨痛三年之內定有風疾此方

勿視為泛泛也。

希發草三財製

製首烏當歸熟地黃各八兩

牛膝續斷秦艽

細末煉蜜九桐子大空心淡酒

回春再造丸專治中風中寒痰迷氣厥左癱右瘓半身不遂口眼歪斜腰腿

疼痛手足麻木筋骨拘攣步履艱難凡

小兒急慢驚風諸般危急之證立見神

效真有起死還生之功回春再造之力。

直斬蛇一條頭尾各去三寸酒浸

二兩五錢去毒

北細辛一兩

草庵仁二兩

山羊血一兩安榮大培晚另三

二兩五錢去毒

大黃二兩

麻黃二兩

人參二兩切片另研

上肉桂二兩

白蘆薈一兩

川羌活二兩

川黃連二兩

西半黃二兩

丁香一兩

陳

硃砂一兩飛淨另研

進犀角二錢另研

乳香一兩

去油七錢

沒藥一兩土油沉木香一兩

血竭七錢

分五

虎脰骨一對重一

錢去毒

病在左部用四物湯為引當歸白芍生地川芎各一錢煎湯送下病在右部用四君子湯為引人參白朮茯苓甘草各一錢煎湯送下無力用參者當參代之亦可其餘薑湯黃酒隨證酌用大人每服一丸重二錢小兒大者每服一錢小者每服五分孕婦忌服

以上十六味細料各藥秤准另研為末以後諸藥製法妥當總用烘乾磨末

大熟地二兩炒虎脰骨一對重一兩外酥火

綿黃耆二兩炒天竹黃一兩

骨碎補一兩

何首烏二兩炒

粉甘草二兩炒

地

龍五錢去土淨炒天麻二兩

炒

元參二兩

製附子一兩

威靈仙二兩酒浸炒

白芷二兩

川芎二兩

炒

台烏藥一兩炒

白蔻仁一兩

兩頭尖二兩

炒

威靈仙二兩酒浸炒

白芷二兩

川芎二兩

炒

大熟地二兩炒虎脰骨一對重一兩外酥火

綿黃耆二兩炒天竹黃一兩

骨碎補一兩

何首烏二兩炒

粉甘草二兩炒

地

龍五錢去土淨炒天麻二兩

炒

元參二兩

製附子一兩

白

威靈仙二兩酒浸炒

白芷二兩

兩頭尖二兩

炒

龜版一兩

全蝎一兩

當歸一兩

酒炒

史國公藥酒方

防風秦艽川草薢鱉甲虎

腰骨丸羌活晚蘿沙黃油松

芥發丸專治肝腎風氣四肢麻痺骨

關疼痛腰膝無力亦能行大腸氣治三

十六種風或受寒熱而起癱瘓年久不

愈服久神效

太元湯治中風疾塞不語染布活龍缸水一盞溫灌下即能言

語按藍汁解諸風熱毒散經絡結氣

水之易研細末煉蜜丸如彈子大每服

一丸空心豆淋酒下

浮萍一粒丹治中風癱瘓三十六種無名風疾遍身癩癧脚氣並治跌撲損傷胎孕筋搖掌結此藥性寒而散中風扶大者功效至靈服之百粒乃為完人

紫背浮萍宜七月十五日採嫩淨以竹節撒下置水一盆映

之易研細末煉蜜丸如彈子大每服

一丸空心豆淋酒下

好酒白蜜和勻洒在葉上鋪入瓶中上鍋內蒸透取出晒燥再酒再蒸共晒九次碾末蜜丸如桐子大每服五十九空心白酒下病五七年者服至

二十九病轉盛者乃藥勝於病服至十九空心白酒下病五七年者服至

四十九仍如完人

節 白朮 土炒各二兩 鑄各三
歸根八兩 兩 川牛膝一兩 杜仲 鹽汁拌炒各四兩 當

乾葛根八兩 兩 枸杞子五兩 蒼耳子四兩 兩 蓼子一助黃酒當

右藥切片。盛夏布袋中。投大蟬內。

入好酒三十五助。封口浸十四日。將

蟬入湯鍋內煮三個時辰。取蟬入土

埋三日去火氣。每日清晨午後各服

三五杯。大有奇效。愈於服他藥也。

(二) 補益 奇想補心丸

柏子仁 二助去油為末 白朮 一助 生地

生地 一助 紅棗肉 三助熟

右煉蜜為丸。彈子大。每日三服。百

日後百病消除。

棉子丸。烏鬚黑髮。燙腎種子。陽虛人

宜服此藥。

用棉花子十數助。用滾水泡過。放蒲包內悶一炷香。取出晒裂殼。取仁。并去外皮。用淨仁三助。壓去油。用火酒三助泡一夜。取起蒸三炷香。曬乾。

腰痛神方 雄豬腰子一付銅刀破開去中鹽少半錢五錢去絲 大茴 半錢當歸半錢杜仲半錢 上肉桂 五錢 川棟子各一兩

用綾絹做暖腰。入藥蜜行腰上着肉者神妙。

先將艾樣軟。次以各藥為末。和勻。

廣木香 一助 真川椒 一助 大茴 炒 故紙 錢 升麻 各一兩 川附子 五錢 薏苡半助

丁香 四錢 上肉桂 五錢 川棟子各一兩

廣木香 一助 真川椒 一助 大茴 炒 故紙 錢 升麻 各一兩 川附子 五錢 薏苡半助

共為細末。蜜丸。桐子大。每服二三

錢。黃酒泡一夜。酒乾。薑汁拌炒去絲。度。杞子 一助黃酒浸蒸晒乾

又 起者一二付。即愈。

右為末。入腰子內。放磁器中。過一宿。明日早用韭菜土下鋪蒸熟。用火酒洗去藥末。將腰子用銅刀切片。好陳酒。空心送下。多年者吃五六付。乍

長春方 治腎虛精冷之症。
魚鰓 一助蛤粉炒成珠極焦 棉花子 一助去盡仁去皮 醬油少許者。熟。每日切幾片。空心好酒下。

將橘米半升。填入肚內。好酒一鍾。以仁 四兩 治下部無力。

雄豬肚 一個 紅棗肉 半斤 蓮肉 四兩 沖熟。去藥酒下。一醉即愈。

杜仲 一助 捩骨脂 一助 牛膝 一助 香附 各三兩 青鹽半錢

大。每服三錢。

歸國酒方

甘菊花八兩 杞子一斤 當歸八兩 龍眼肉三兩

右藥將火酒三斤。酒釀十斤。泡二十一日用。

二仙酒方

燒酒一壇。十斤。入龍眼肉一斤。桂花四兩。白糖八兩。將泥封固。愈久愈佳。

養元藕粉 治年老人健脾養胃。日常服之極效。

白蓮藕粉

建蓮肉心

白茯苓

白蜜

白扁豆炒 川貝母去心

懷山藥

右七味各等分。共研磨為細末。用人乳拌成一塊。每用一兩。開水冲服。治咯血吐血。瘍久不止。

聰明豆

杜仲六兩

菟絲子六兩

破故紙六兩

製首烏六兩

或鹽三兩 小茴香三兩

右六味量用水煎汁。煮馬料豆一

斗煮透。收乾藥汁。渣再煎汁。去渣。煮豆收盡藥汁。灑乾收贮。每服三錢。淡鹽湯送下。或乾嚼亦可。老年人最宜常服。

(三) 癬

治吐血癬症

桂圓七個 紅棗十四個 蓼子二個

小黑豆九粒

桂圓七個

紅棗十四個

蓮子二個

水二碗。煎一碗。空心早服。連巢吃完為妙。

治虛勞咳嗽吐血。肺痿肺癱。吐膿血垂危者。服之即愈。

用茭白細根。約三四兩。搗碎。將真陳酒煮絞汁。每日服一二次。至一二十

日即愈。

老鷄鴨六十隻。取汁二十杯。生地黃根。蘿蔔麥冬各取汁五杯。將六汁煎煉。入蜜一斤。飴糖八兩。隔水煮熟。任以食之。其餘藥渣。入六味地黃一料。同磨末。蜜丸如桐子大。每朝鹽湯送下三錢。

日用一二匙

治酒癬吐血

用雞距子一兩。水二鐘。煎一鐘。不拘時服。渣再煎服。服至數十日愈。

六月雪一斤切片。入瓦罐內。河水井水各半。同煎至無味。去渣。將不落水大雄豬肺一個。煮至肺化。掠去筋膜。入藕汁八飯碗。白蜜人乳梨汁童便各一飯碗。煎成膏子。早晚服一酒杯。

滋陰鴨方二治虛勞咳血吐血。

老鷄鴨二三年者一隻。去毛雜入大原生地四兩。大麥門冬去心四兩。鱉好鴨腹。置磁器中。加無灰酒一斤半。隔水煮熟。任以食之。其餘藥渣。入六味地黃一料。同磨末。蜜丸如桐子大。每朝鹽湯送下三錢。

又方

烏嘴鳳頭白鴨活者一對。出嘉興一雄腸胃久虛。葛可久白鳳膏。用之取金木相生之義。養之於家。

俟有鮮紫河車一具。剪碎與鴨食之。

待其食完。又須一人將鴨東趕西走一日。鴨不住脚。方能消化。然後緝覽去毛。去腸中之垢。連雜連骨煮極爛。撻起骨渣。收成自然鴨膏。其骨渣配藥共磨末。男病配入六味地黃加參冬五味子一料。女病配入八珍歸脾一料。共為末。入鴨膏杵和為丸。每日早晚各服三錢。淡鹽湯送下。此方男女虛勞損怯。痰嗽失血羸瘦者。服之起死回生。大有奇功。能救人一命。故不以鮮河車活鴨為嫌也。

外除癆病仙方

雄黃錢 硫砂錢 磷香分 硫黃

錢一

右四味各研細末。磁瓶收貯。至端午日午時。將滴花燒酒調勻。用獨裏

大蒜一個。去蒂蘸藥。從背尾骨逐節擦上。看青腫處即知癆蟲所在。其處

搔擦數次。其蟲自滅。不拘新舊一切。

癆病。皆能除根。如病重者。須擇大醫。

吉日總以午時擦之為妙。此方能開

背後三重關竅。即虛怯哮症。夏之

人端午日擦之。亦能神清氣爽。筋絡

流通。大有裨益。可廣傳濟。舉以起沉

疴。

(四) 盜汗

治盜汗方

蓮子粒 黑棗肉 漱參合 馬料

荳全

用水一大碗。煎八分服。三劑愈。

又方

黃芪 馬料荳

二味煎服。半月愈。

又

五倍子去蛀末。炙乾研末。男用女唾。

女用男唾。調厚糊填臍中。外用舊膏

藥貼之。勿令泄氣。兩次即愈。

止汗方

黑荳三錢 浮參一錢 烏梅個一

煎湯服。

(五) 咳嗽哮喘

治痰嗽諸虛奇驗方

藕汁 梨汁 蘿蔔汁 人乳 薑

汁 白糖 沙糖 童便各四

將八味放磁瓶內。用炭火熬煎。只

剩一肋為止。每日空心白滾湯送下

四錢。服完即愈。如能常服。則精神強

健。永無虛損。

治小兒吼嗽。併大人咳嗽屢驗方。

欬冬花(三錢) 晶糖(五錢)

將二味放茶壺內。泡湯當茶吃。自

然漸愈。

兼治大人。

治小兒天哮。一切風濕燥熱。咳嗽痰喘。

海浮石(淨末) 飛滑石(淨末) 甜杏

仁(淨末) 薄荷(淨末)

四錢 四錢

右為極細末。每服二錢。用百步煎

湯下。

虛人欬嗽

以噠杏仁三錢去尖皮

川貝母二錢去心研

冬青葉八分

南沙參二分

錢

右四味同煎頻服。

熱嗽有痰面赤煩熱午前更甚起於

夏季者多。

桑白皮 黑山梔 知母 桔梗

杏仁 黃芩 象貝各一錢 五分

生甘草五分

水煎服。

肺熱久嗽 痰少有聲。肌瘦將成肺癆者。

杏仁 紫苑 款冬花 枇杷葉

去毛分桑皮各等

製大黃

三分

右各為末蜜丸如櫻桃大食後夜半減化一丸。

肺鬱痰嗽。胸膈疼痛夜卧不安者。

貝母

杏仁各等

共搗研入薑汁白糖蒸餅為丸夜

卧含化。

咳嗽方二

胡桃肉三

生薑半

卧時嚼服即

飲湯二三呷再食

胡桃一枚

生薑

氣壅痰盛者用

雪梨一個

開一竅

入白礬錢

用紙封固隔水蒸熟

食二三次愈。

食積痰嗽

蘿蔔子半

焙燥研為末以糖和丸

如櫻桃大綿裏含化汁下甚效。

秋月肺燥欬嗽

嗽多痰少午後至夜更甚者。

松子仁兩

胡桃肉錢研膏加熱

蜜五錢

和勻每服二錢食後沸湯點服

日久痰多者加北五味

二錢

屢效。

糞喘欬嗽方二

藕汁 梨汁 白果汁 蘿蔔汁各

分和等

飼鍋內熬成膏隨意服之

白蜋殼多年陳者

股過存性為極細末以米

飲湯調服一錢日三服

蓋覲蛤粉皆能清熱行滯

濕熱去則痰自消咳自止

久嗽不愈方二

枇杷葉切碎去毛淨

杏仁去尖皮

共研

等分泡湯多服即止若無痰虛

止用枇杷葉去毛蜜汁泡湯飲

又方

以噠杏仁去皮尖

胡桃肉四兩泡去衣

上白糖六兩

共搗如餠時時入口含化如痰未盡加川貝母五錢同搗能治一切久嗽及體虛午後面赤氣沖至晚更盛者屢效如神。

老生薑達皮二錢五分

白糖一兩

服其薑糖逐漸加重要加至糖四兩。二味共搗用白滾湯冲服每日一

薑一兩為度。

苧麻根大燒存用生豆蔻蘸食三五

此為試驗

錢。或以豬肉二三片蘸食即效。

鹽哮方

豆腐漿每日早晚久服即效。如小兒用芝麻稽瓦上炙焦存性出火氣研細以生豆腐蘸食即效。

哮證應驗方

菜菔子八兩
淨五錢
研末
牙皂角七枚
明礬將清水漂

右三味同在飯上蒸三次。又水漂再蒸三次。研末拌糖服。

哮病神效方

露蜂房一個能祛
同治瘧疾
天南星二錢
同製
製半夏錢
二
製川烏一錢
五分
枯礬二錢研細
膠蜂房內
白附子一錢
五分

如氣促坐卧不定者

胡桃肉連衣杏仁去皮
兩
老生蠶各
一

右藥共研細末約一兩重。均五十

日連喫。每日清晨用水豆腐花或豆腐漿冲服。末藥二分不可多服。至要

至要。

按此方竟用研細白明礬二錢入

蜂房同炒已成枯蠶矣而以枯礬再

矣。不亦失其礬性乎。

勞證發熱喘嗽

鮮百部二觔切細用無灰酒浸蟬內灰火煨熟。每日五更溫服一杯。以好為止。

口燥有痰喘嗽

瓜萎一個入明礬乘大一塊同燒存性研細以熟蘿蔔蘸食。一服即效。

老年癆喘

秋白梨一個去心入燕窩一錢。先用滾水泡再入冰糖一錢蒸熟。每日早晨服勿間斷。

胡桃肉連衣杏仁去皮
兩
老生蠶各
一

痰暈方

明礬大煅研末。薑湯調下。吐之即愈。治癆大方。咳嗽吐痰面鼻發紅者。一服即愈。

明礬大煅研末。薑湯調下。吐之即愈。

枯礬研細
再研用
三四錢

蛤粉
三

二味煉蜜為丸如指頭大臨卧口噙三丸。其效如神。

治癆火神水方。一名玄霜。黑鉛一觔。并成一薄餅。中穿一洞。以繩繫之。將好米醋半甕。即以鉛餅懸掛甕中。醋約一寸許。甕口用皮紙若干緊。再以磚石壓之。勿使泄氣。放屋下陰處。待釀日

喘急欲絕者

韭菜汁服之可治。

膈中老痰

不論男婦久積老痰。或失音。或發喘。湯藥不效者。蜜陀僧一二錢。砂糖調白湯送下。痰與藥從大便出無碍。不宜

水煎服。

取起鉛餅。上有白霜拭下。每鉛一粒。取

白霜二兩為止。其霜治噎膈。每服五分。
噙口內。以白湯送下。若治痰火咳嗽。每
服三分。照前法服。

治痰火方

枇杷葉五十葉。去淨毛。水五十杯。煎
至五六杯。再重湯燉至三四杯。每藥
三茶匙。用蜜一茶匙調下。立愈。
治老人上氣喘急。不得卧。
生薑汁五兩。黑砂糖四兩。用水煎二
十沸。時服半匙。漸漸愈之。

治喘

瓜萎一個。明礬棗大一塊。同燒存性。
研末。以熟蘿蔔蘸食。無盡病除。

(六) 吐血

治瘧火骨蒸。吐血不止之症。重者十
服八服即愈。

人參 天冬 麥冬 二味去心
各錢半
芩 五分 杏仁 二粒去皮尖
蓮肉 六粒 人乳 二
白蜜 三粒去核

甜梨 一株銅刀
挖去心

將前藥製碎。納梨肉。仍以梨蓋蓋
之。用棉紙封固。飯上蒸熟。日間吃其
藥。臨卧吃此梨。

治吐血不止

用碗盛清水。吐血在內。浮者肺血也。
沈者肝血也。半沈半浮心血也。各隨

所見。以羊肺肝心煮熟。蘸白芨末。日
日吃之。或只用白芨為末。米飲調服
亦效。

治吐血方 吐血者偶吐一二口。或不
時吐之。
側柏葉濃煎。和童便常服之。

又
用藕節為末。入炒蒲黃血餘灰等分。
調服之。奇效。

用雞子一個。打開。和三七末一錢。藕
汁一小杯。陳酒半小杯。隔湯燉熟食

之。不過兩三枚自愈。

吐血不止 四方

白茅根肉。射餘。水煎服之。經霜敗
荷葉燒存性。研末。新汲水調服二錢。
千年蓮根搗汁。去渣。用福珍酒沖
服。鮮馬糞三四個。炭火瓦上焙焦。
研末。黃酒冲服即愈。

血熱妄行

生荷葉 生父葉 生側柏葉 鮮
生地各等 分

生地 分

生地 分

鼻血不止 七方

好陳酒燙熱。自足浸至膝腕。以出汗
為度。刀刮指甲細末。吹入鼻中立
止。本人頭髮燒灰。吹入鼻中立止。
人乳滴入鼻中立止。童便二三
碗。得血止神安。臨卧時用廣西真山
羊血。每服三分。引血歸源。不過三服。
血自止。竈雞不拘多少。炒研為末。
加冰片少許。吹鼻即止。鮮嫩荷葉

蒂七個。水煎服。乾天竹子三十粒。

研末。滾水冲服。一二次立愈。

(七) 淋濁遺精

治赤白濁。兼治夢遺。名將軍蛋。

生大黃三分。生雞子一個。

將雞子頂尖上敲損一孔。入大黃

末在內。紙糊煮熟。空心吃之。四五朝

即愈。神奇秘方。

治色慾過度。精濁白濁。小水長而不痛

者。并治婦人虛寒淋帶崩漏等症。

生龍骨水飛。生牡蠣水飛。生菟絲粉

生蓮菜子粉。

右四味各等分。不見火研末。生乾

麵冷水調漿為丸。每服一錢。六七服

即愈。

治白濁。

用頭生雞蛋五枚。開一小孔。每個入

白蔥肉二枚。飯上蒸熟。每日吃一個

即愈。

治遺精滑失。

白龍骨研細。蓮菜子炒一
右為末。空心陳酒調服二錢。

小菟絲九。治女癆夜及遺精。白濁崩
中。帶下諸症。

石蓮肉兩。白茯苓二兩。菟絲子

石蓮肉二兩。白茯苓一兩。菟絲子

或滾水冲入。空心服二三次。必效。

思仙丹。治陰虛火動。夢遺神方。

蓮鬚十兩。石蓮肉十兩去內青。芡

右為末。再以金櫻子三粒去毛子。

水淘淨。入大鍋內。水煎濾過再煎。加

飴糖和勻前藥丸。如桐子大。每服七

克。食前再服。此方治遺精之聖藥。屢用

屢效。但石蓮子陳久者難得。

約精丸。治小便中洩精不止。

白龍骨研細。新韭子冬霜後採一
次日曬乾搗細。

右末。酒調糯米為丸。桐子大。每服

三十九。空心鹽湯下。

白龍丸。治腎損遺精。白濁滑泄。盜汗

等症。不惟療遺精之疾。且能壯陽固精。

鹿角霜二兩。龍骨一兩。牡蠣殼二兩。

右末。酒打麵糊為丸。梧桐子大。每

服三十九。鹽湯送下。

遠志丸。治赤濁如神。

遠志去心八兩。茯神。益智仁各二
兩。

右為求酒搗糊為丸梧桐子大。每

服五十九空心棗湯送下。

白濁方 色白如泔漿濁在溺後不痛

者溫熱所致。

五爪龍藤連根各八兩

土茯苓 杜牛膝

錢三次煎升治下疳如神。

又方

用黃柏木。猪脊筋去同搗和為丸如

桐子大早晚各服三十九。開水送下。

赤白濁方。

木通錢五錢 滑石五錢 甘草梢二錢 蔓

右四味水煎空心服。

血淋痛不可忍方三

側柏葉 紫節

車前子 滑石各三錢

生草梢分五錢 碎砂少許

煎濃溫服即效。

又方

旱蓮草 車前草同取汁。每服一鐘。

立效。

髮灰錢二

藕節湯調服三次愈。

砂石牀

石首魚腦骨五副大錢

滑石五錢 俱研

細末分作兩服。木通煎湯調下以

好為度。

膏淋

海金沙 飛滑石各一兩

瞿參

杏仁各三錢 甘草梢二錢

調服。

右為末。每服二錢。參冬通草煎湯

立效散 治下焦結熱。小便淋秘。痛而

尿血。

右為末。每服二錢。參冬通草煎湯

右為末。每服五錢。薑葱燈心煎湯

調下。

小便不通。

麻骨一兩 濃煎湯服之即通。

一切秘結方二

生蜜一大杯。滾水一碗。調元明粉三

錢。溫服即通快。不損脾胃。
大小便五七日不通者。

牙皂一兩

通。

三錢即通。

(八) 滴服

治五臟神方

蘿蔔子十六粒用巴豆

牙皂一兩五錢去

沉香五錢

枳壳四大錢去

大

黃一兩

琥珀兩

右共為末。每服一錢。隨病輕重加減。雞鳴時熱酒送下。薑皮湯亦可。後服金匱腎氣丸。調理收功。

治水臌腫脹

輕粉二錢 巴豆四錢去油

生硫黃一錢

右研末。做成餅。先以新棉一片鋪

臍上。次以藥餅當臍按之外。以帛縛

之。如人行五六里。自然瀉下。候五六次。除去藥餅。以溫粥補之。久患者隔日方取去藥餅。一餅可救二十人。其效如神。愈後。忌飲涼水。

脹滿實症 方二

上鱉即接骨蟲瓦上焙燥。每用一二個。以沈香一錢磨水調服。甚效。

又方

皮硝入雞腹中煮食。善能消痞除脹。
見王漁洋集

腹脹如鼓

大田螺一個。鹽半匕。和殼生搗如泥。置臍下一寸三分。用潤布繫繫之。便溲一通。其病立愈。

水腫鼓脹方 兼治肚腹膨脹實症。

沉香兩 牙皂一兩 木香錢 檀榔三錢

二兩

共為細末。燒酒為丸。每服三錢。五更時溫酒送下。不飲酒者。滾湯送下。十

從大便出。若水腫甚者。用葶苈三錢。酒煎送下。七日見效。

水腫水鼓從小便出。氣鼓頻得。失氣

西瓜一個。大蒜病人年紀若干歲。即用蒜若干瓣。

鼓脹方

皮硝入雞腹中煮食。善能消痞除脹。

以西瓜一個切去蓋。將大蒜照年紀用若干瓣。插種在西瓜肉內。仍將切下瓜蓋。用竹釘插牢。入甕內以糠火滿。

魚連茶蒜吃更妙。此藥從頭吃起。病從頭上消起。如從尾上吃起。即從腳上消起。立效之仙方也。

治氣臌方

將大蝦暴一隻破開。用大砂仁填滿腹中。黃泥封固。炭灰煅紅。冷定去泥研末。陳皮湯調服。放屁即愈。

腹脹及四肢發腫

乾雞屎半觔。酒一斗。浸七日。日飲三杯。或炒燥為末。酒下二錢即效。按此方即黃帝素問雞屎醴法也。治臌脹所謂一劑知二劑已也。勿忽視之。

治水臌方

陳芑蕉扇去筋燒灰存性五分 千金子去油二兩

半分滑石分

共為細末。以腐皮色。滾水送下。十

服全愈。

治水臌氣臌方

沾黑魚一尾。重七八兩。去鱗甲。將肚剖開。去盡腸。人好黑。礬五分。松蘿茶

三錢。男子用蒜八瓣。女用七瓣。共入魚腹內。放在磁器中蒸熟。令病人吃

魚。連茶蒜吃更妙。此藥從頭吃起。病

從頭上消起。如從尾上吃起。即從腳

上消起。立效之仙方也。

治氣臌氣脹方

蘿蔔子二兩。搗碎。以水搗汁。用砂仁

一兩。浸一夜。炒乾。又浸。又曬。凡七次

為末。每米湯送下一錢。立效。

治臌脹方

四五月將黃牛糞陰乾。微炒黃耆為

末。每服一兩。煎半時。濾清服之。不過

三服即愈。

解脹敷臍方

治一切臌。肚飽發虛。

大田螺一個 雄黃一錢 甘遂末一錢

分 膚香一錢

先將藥末用田螺搗如泥。以麝置臍。放藥臍上。以物覆之。束好。待小便

大通去之重者用此相兼。小便大通。

病即解矣。

治中滿腹脹

陳葫蘆一個。要三五年者佳。以糯米一半。作酒待熟。用葫蘆瓢於炭火上炙熟。入酒浸之。如此五六次。將瓢燒存性為末。每服三錢。酒下神效。

治臌脹方

雄豬肚子一個。入大蒜頭四兩。加小換榔砂仁末三錢。木香二錢。砂鍋內河水煮熟。空心服。豬肚立效。

又

取舊葫蘆一個。浸糞坑內一月。取起掛長流水中三日。炒黑為末。每兩加木香末二錢。每日空心砂仁湯送下。二錢。

治肝氣方

烏梅個 鮮橘皮錢 青鹽分 真

川椒錢

石藥空心服。

(九) 痘塊

又

紅芥菜子即芥子血芥不拘多少。生黃汁浸

一宿。大約芥子一酒杯。加麝香一錢。

阿魏三錢。同搗極爛如膏藥。攤青布

乾。不拘多少。量用者。蒜頭去皮膜。同

放石臼內打爛。捏成餅。晒乾為末。每

助入蛤子壳煅灰研粉四兩。再將老

蒜打膏為丸。桐子大。每服百丸。空心

食後白湯下。一日三服效。

斷無不消。

名藥猪泡

麝香錢 阿魏錢 水紅花子 大

黃 跑尾 甘遂 急性子 甘草

各五錢

右為細末。用豬水泡一個。量痘塊

大小。用尿胞大小裝入乾燒酒半胞。

將前藥末放入胞內。繫紮住口。用白

布將胞兜紮於患處。俟塊化盡。即去

之。不可遲也。

治痘塊八反膏

鰲頭 茄菜 葱 窨 甘草 甘

水紅花子 遂 芫花 海藻 阿魏 鱉甲

右應禹冰者為末。應搗爛者搗爛。放病上。用包袱繫。待乾再換。則痘亦消。