

阿坝地区中兽医验方

四川民族出版社

阿壩地区中兽医驗方

中共阿壩州委畜牧業生產辦公室編

四川民族出版社

一九六〇年一月

阿壩地区中獸醫驗方

中共阿壩州委畜牧業生產辦公室編

(漢文版)

*

四川民族出版社出版

成都人民中路

四川省新華書店發行 四川民族出版社印刷廠印刷

*

開本787×1092毫米1/32·印張17/8·字數40,000

1960年6月第一版 1960年6月第一次印刷

印數: 1—1,000 定價: 1角4分

統一書號: M14140·1

535.5

5047

出版者的話

本書初稿，曾經中共阿壩州委畜牧業生產辦公室編印分發給所屬各縣。這次出版時，我們對書中文字進行了必要的修改，刪去了部分療效不高的驗方，統一了調制藥量的單位名稱。變動的地方如有錯誤，由我們負責。

再者，本書付印前，曾蒙西南民族學院農牧業專修科畜牧獸醫教研組的同志們代為審閱，並提出了寶貴意見，在此一併致謝。

一九六〇年一月

前 言

我州有农、牧和半农半牧三种地区。各族人民，从事畜牧业生产，已有數千年的歷史；在对危害牲畜的疾病斗争中，積累了很多宝贵的医療經驗，从而保证了牲畜的發展。

1958年，在党的建設社会主义总路綫的光輝照耀下，在省委、州委的正确领导下，畜牧业獸医战綫上的全体同志，鼓足了革命干劲，深入群众，进行个别訪問和以縣或区、鄉为点，多次召开民間獸医、老农和牧民座談会，搜集与整理了一些医療驗方。后来，这些驗方又經過群众試驗，一般效果良好。直到1959年9月，在全州召开的獸医診斷會議期間，到会同志們通过对中共八届八中全会文件的学习，人人鼓足了干劲，个个当編輯，再次对这些驗方作了研究与充实，編成了这本小冊子。

为了便于参考起見，在整理編排上，我們根据牲畜的病类，分成六个部分：傳染病、非傳染性內科病、寄生虫病、外科病、产科病和其它雜症。在非傳染性內科病部分，又根据牲畜的生理系統划分为神經系、消化系等。本書采用的病名，大部分是群众常用的；匯編的驗方，都作过療效观察，效果較好。希望同志們在应用时，也要根据实际情况，灵活掌握，如有什么問題和意見，請随时告訴我們，以便今后修改增訂，使它更丰富、更适用。

中共阿壩州委畜牧业生产办公室

1959年9月

目 錄

第一部分 傳染病..... (1)

一、馬的傳染病..... (1)

(一) 馬鼻疽 (二) 炭疽 (三) 馬腺疫

二、牛的傳染病..... (3)

(一) 牛瘟 (二) 牛出敗 (三) 牛傳染性胸膜肺炎
(四) 氣腫疽 (五) 口蹄疫 (六) 犢牛白痢

三、羊的傳染病..... (8)

羊出敗病

四、豬的傳染病..... (8)

(一) 豬瘟 (二) 豬肺疫 (三) 仔豬白痢

第二部分 非傳染性內科病..... (11)

一、呼吸系疾病..... (11)

(一) 肺炎 (二) 咳嗽 (三) 感冒 (四) 膿性鼻炎
(五) 豬、牛流鼻血 (六) 咽喉炎 (七) 嗆水

二、消化系疾病..... (15)

(一) 消化不良 (二) 拉稀 (三) 腸炎性下痢
(四) 便秘 (五) 口腔炎 (六) 麻疔
(七) 痙攣疝 (八) 風氣疝 (九) 便秘疝
(十) 過食疝 (十一) 一般疝痛 (十二) 牛鼓脹病
(十三) 羊鼓脹病 (十四) 牲畜一般鼓脹
(十五) 牛羊水脹 (十六) 胆脹

三、中毒..... (25)

(一) 豬飽瀉症 (二) 馬牛誤食毒草 (三) 開水
(四) 霉爛飼料中毒 (五) 牛吃生豆后肚脹
(六) 牛被水老鼠咬傷肚脹

四、神經系的疾病..... (26)

- (一) 風症 (二) 扯風 (三) 牛打人
(四) 猪牛風癱 (五) 牛四脚寒 (六) 黑汗風

五、泌尿系疾病..... (29)

- (一) 尿閉結 (二) 血尿病 (三) 小便不通

第三部分 寄生虫病..... (30)

- (一) 猪蛔虫病 (二) 馬圓虫病 (三) 羊肺絲虫病
(四) 牛眼虫病 (五) 肝吸虫病 (六) 牛前后吸盤
吸虫病 (七) 牛羊腦胞虫病 (八) 疥癬病
(九) 馬胃蝇蛆病 (十) 牛皮蝇蛆病 (十一) 羊鼻
蝇蛆病 (十二) 虱子 (十三) 馬、牛鼻內生虫
(十四) 羊陰道生蛆 (十五) 羊蹄岔生蛆 (十六) 外傷生蛆

第四部分 外科病..... (38)

- (一) 膿腫 (二) 外傷 (三) 鞍傷 (四) 新創傷
(五) 陈旧創傷 (六) 羊打傷 (七) 挫傷
(八) 跌傷 (九) 蛇咬傷 (十) 豹子咬傷 (十一) 馬坏
疽性皮炎 (十二) 羊嘴生瘡 (十三) 羊火眼病
(十四) 馬角膜翳 (十五) 非穿孔性彈傷 (十六) 骨折
(十七) 跛行 (十八) 腐蹄病 (十九) 釘傷
(二十) 床子 (二十一) 牛生瘻 (二十二) 浮腫
(二十三) 牛箍嘴瘻 (二十四) 羊睪丸腫

第五部分 产科疾病..... (43)

- (一) 胎衣不下 (二) 难產 (三) 子宮脫出
(四) 乳房炎 (五) 產后風癱 (六) 產后無奶

第六部分 其他雜症..... (46)

- (一) 五癆七傷 (二) 僵病 (三) 牲畜一身腫脹
(四) 胸腹水腫

附 錄

- 一、牲畜壯補湯 二、碘酊代用品 三、牲畜催情藥方

第一部分 傳染病

一、馬的傳染病

(一) 馬鼻疽 (俗名下鼻、吊鼻等，藏名達內)

病狀：病畜鼻粘膜上發生紅色小結節、流鼻涕，由稀而濃，為綠色、白色或紅色，發生干咳。牲畜逐漸消瘦，口色發白，顎凹淋巴腺腫脹，槽口有硬疙瘩，四肢和腹部等處發生小包，繼變為爛斑，流濃狀液体，周圍發生捻珠狀腫條，馬來因点眼呈陽性反映。

治療：1. 當歸二兩，茯苓六錢，連翹七錢，荷葉六錢，菊花七錢，大黃六錢，玄參六錢，山枝八錢，黃連五錢，半夏六錢，黃芩六錢，玉京五錢，秦艽一錢，茵陳六錢，貝母五錢，百合八錢，花粉七錢，柴胡六錢，知母五錢，蜂蜜二兩為引。把藥研成細末，用開水浸泡灌服。

(松潘縣何永清)

2. 冬花、二冬、黃芩、知母、梔子、桔梗、杏仁、葶利、益智、百部、桑皮、蘇子、山藥、百合、瓜蒌、花粉、白芨、沙參、斗齡、枇杷葉、紫苑、破舊紙、秦艽、膠珠各六錢，把藥研成細末，加開水煎，然後加蓋悶二十分鐘，再加少許開水和蜂糖，一次灌服。若病重可服二劑。

(松潘)

3. 黃鼠狼肉晒干研細，每匹患馬灌二至四錢，或老鴉肉

晒干研細，每匹喂一至二錢，还可同时用老鴉毛熏鼻。

(馬尔康)

4.內服老鴉肉及煮好的血湯。

(馬尔康)

(二) 炭疽(俗名土气，藏名撒)(馬、牛、猪、羊等都患此病)

病狀：一般都是突然發病，病畜体温增高，打寒顫，四肢站立不穩，顯肚痛，呼吸困難，脉搏快而弱，不吃草料，舌呈紫黑色，眼仁散大，眼皮腫脹，口、眼、鼻、肛門等流血，血色發烏黑，不凝固。死后尸僵不全。

治療：1.木通、陈皮各一两二錢，石膏五錢，黃芩、黃柏各一两，黃連九錢，煎水灌服。

(松潘)

2.發病初期急救时，用二只野鴿子宰去头部，把鴿血灌入病畜口內，經過急救再服上方即可治愈。

(松潘)

3.用新鮮的热鷄、鴨血、鹽水、火葯各二至四两，混合灌服。

(茂汶)

4.于病畜左側肋骨第十二至十三之間，以耳基部之圍長为标准，从腰脊頂部往下量即为扎針点。进針約为一寸八分至二寸四分，或于腹下靜脉云門穴扎針放血，然后用白酒四至八两，陰山黑泥巴(不要有沙石)半小碗，鹽巴八至十六两，混勻一次服。如果几种葯不全，可单服一种。

(若尔盖)

(三) 馬腺疫 (俗名喉結)

病狀：發高燒，鼻孔和鼻咽粘膜發炎，下鼻初為水狀液，後變為粘液或濃液，顎下淋巴結腫大，以手按摩熱而能動，病畜感痛。

治療：1. 手術切除顎凹淋巴結，傷口用干馬屎（干葶麻葉搓絨更好）塞入。為了把未割盡的淋巴結全部爛掉，可酌情塞入少許碎細瓦片，使其化膿爛掉，就可自愈。

(松潘)

2. 桔梗、天花粉、金銀花、杏仁各一兩，貝母、紅花、寸冬、當歸、大黃各八錢，山豆根、桑白皮各四錢，辛夷、蛇退各三錢，加入蜂蜜三兩，煎水灌服。

(松潘)

3. 桔梗、黃柏、薄荷、黃連各一兩，川芎、當歸、青黛、硼砂、白矾各三錢，加入蜂蜜四兩，燒酒二兩，煎水灌服。

(松潘)

二、牛的傳染病

(一) 牛瘟 (俗名爛腸瘟，藏名果爾)

病狀：口腔粘膜潰爛，舌上齒齦有麩皮狀物，奇臭，大便先干後稀，如揚塵水狀，內含血或腸粘膜。

治療：1. 貓頭鷹一個，猴子肉一斤，啄木鳥（黑毛紅嘴的）一個，麝香二至三錢，加水五十斤，煮二至三小時，牛每次服六至十兩，一般服一、二次即愈。在服此方的同時，還應用啄木鳥的毛熏鼻。

(馬爾康)

2. 老鴉一只，地滾子一只，黃鼠狼一只，熊胆一兩，滲

水燉好內服，可治療十頭牛。如口腔有水泡，可先刺破，再用烙鐵烙之。

(馬尔康)

3.把啄木鳥的骨肉炒干研細，吹入鼻孔或內服，治療和預防均有效。

(小金)

(二) 牛出敗 (俗名喉病，藏名是格)

病狀：發燒，鼻干而冷，頸直伸，喉部腫脹，流口水或泡沫，咳嗽，流淚和黃色鼻涕，舌腫大伸出口外，呼吸迫促等。

治療：1.先將患過此病的牛血，晒干或炕干，然後喂給其他病畜。

2.烏鴉一只，拔毛煮熟去骨後，喂病畜，每頭每天一至二次，連服二至六天即愈。

3.熊胆、魚胆各二至三分，每天服二次。

4.牛奶一斤，酥油半斤，麥類糧食一斤(炒後磨面)，熊胆五分，麝香五分，冰片四分，分二次喂給。

5.公雞一只，將頭砍斷，立即塞入病畜口內，讓病畜將血吞下，一次即愈。

6.大黃熬水，混入搗絨的大蒜內，每天服二至三次。

(黑水)

7.鍋烟二兩，鹽巴二兩，混入冷水沖服。

(三) 牛傳染性胸膜肺炎 (又叫牛肺炎，藏名囉)

病狀：病初期發高燒，牲畜起立和飲水時易發現咳嗽，隨著病勢發展，咳嗽逐漸厲害，短干而感痛，呼吸迫促而淺，頸部直伸，鼻孔張開，按壓肋間隙時呈現痛感，常站立不臥，前肢張開。

治療：1.甘草二兩，黃糖四兩，清油八兩。先將甘草、黃糖加

适量水共煮，待煎好冷却后，一次灌下，再将清油一日分三次灌服。（松潘縣海宝全用此方治療三十六头病畜，均痊愈）

2. 熊胆二錢，麝香五分，蜂蜜四兩，一般动物胆一錢，鷄蛋四至六个，甘草一两，棒木西（藏名）二至四兩。以上除蜂蜜鷄蛋外均要熬六至八小时，甚至二十四小时。熬时水量保持十至二十四斤，熬后用罈罐裝好密封，每头每次內服二至三兩。（馬尔康本真公社用此方治愈十九头病畜）

3. 鮮野羊血（不超过二十四小时）混入食鹽四至六兩，一次內服。（若尔盖試驗站用此方治療四十头病畜，僅死五头）

4. 宰殺重病牛一头，取血加麝香一两，熊胆二兩，振蕩均匀，二晝夜后，再喂病牛或健康牛各二碗，病牛可愈，健康牛可預防。

（馬尔康）

5. 蒿本、生地、党参各一两，当归、杏仁各九錢，白芷、川芎各六錢，牛夕、厚朴各八錢，分二次煎水服用。服用时，每次加酒二兩，蜂蜜三兩。

（松潘）

6. 厚朴、枳壳、桔梗、瓜蒌仁各一两，枇杷叶二兩，黃芩、百合各八錢，煎水灌服。

（松潘）

7. 紫苏三兩，知母四兩，紫苑三兩，大黃三兩，甘草三兩，桔梗四兩，貝母五兩，白矾三兩，白朮四兩，防風三兩五錢，干姜三兩，蜂蜜一斤为引。以上各药研細，成牛每天喂二次，每次喂四兩药粉，喂前先放罐

內煎熱混合適量蜂蜜灌服。這付劑量可喂八頭病牛。

(馬爾康)

8. 甘草、豬苓各三錢，干葡萄一兩，地官一兩，石面（土藥）一兩，沉香一兩，兔胃一個，冰糖二兩，黃花一兩，丁香一錢，用水熬服。（松潘縣海寶全用此方治療八十三頭病牛，僅死三頭）

9. 取患此病死去的牛胸腔液，加麝香一兩，水柏枝（恩波其香）鋤成小節節五至十斤，熊胆五錢，藏紅花五錢，混合熬水，邊熬邊攪，約二晝夜，濾渣即成。用量為一市斤，小牛減半內服，可治療也可預防。

(馬爾康)

(四) 氣腫疽（又叫黑腿病）

病狀：病來得急劇，發高熱，軀體各部富有肌肉處，如臀、腰、腿、頸和胸部等很快出現腫脹，起初有熱痛，以後變冷而無知覺，按之有捻發音，常伴發跛行，運動障礙等症，一般一、二天就會死去。

治療：1. 腫脹部位用刀切開，放出烏血，用碘酒或石炭酸洗滌殺菌，再將傷口包紮好。如四肢下部腫脹，還可在患部上方以馬尾毛或繩索結扎，防止蔓延竄毒。此法僅可用于初期或急救。

2. 大蒜半斤，樟腦一錢五分至三錢五分，白酒四兩，一次灌服。用于初期。

(茂汝)

3. 大蒜六至八兩，樟腦一兩五到三兩五錢。

用法：先將大蒜搗爛混合樟腦，加水適量，一次內服。連服二次可愈。初期療效可達百分之九十五以上。

(松潘縣謝明全)

(五) 口蹄疫 (藏名可乐佳采尼采或简称卡擦)

病狀: 初高烧, 口內發生大小不等的水泡, 數日破后形成爛斑, 流口水牽成綫狀, 有惡臭味, 繼之蹄部腫脹, 蹄叉發生水泡成跛行。

治療: 1. 口蹄患部塗搽土猪油, 并灌服土猪肉湯。

(馬尔康)

2. 先以鍋烟、鹽巴撒在口蹄患部, 再抹上蜂糖。

(馬尔康)

3. 白矾二两, 食鹽四两, 开水一百两, 洗口蹄患部, 每天上、下午各一次, 洗后撒上枯矾末。

(茂汶)

4. 花椒、食鹽熬水洗滌口腔及蹄部患处。

(茂汶)

5. 病畜蹄叉初期潰爛时, 用硼砂燒后兌水洗滌可以固蹄。

(金川)

6. 硼砂二两, 开水一百两溶化洗口。

(茂汶)

7. 用灰碱水洗口, 再撒生豌豆粉于水泡上。

8. 蹄腫脹部剪去毛, 用鹽水洗淨, 燒酒塗搽, 然后把木香搗碎, 以酒泡后包上, 每日更換一次, 四至六日可消腫。

(黑水)

9. 洗淨蹄部患处, 涂上鹽和酥油。

(六) 犏牛白痢

治療: 1. 黄酒和奶渣等量炒之, 混合均匀內服, 每头一两五錢至二两五錢。(松潘縣用此方治療九头病牛均愈)

2. 百分之二的石灰水, 混合在十份的面湯內, 給病畜內服。

(茂汶)

三、羊的傳染病

羊出敗病

病狀：和牛出敗病相似，也可變成慢性的，但慢性的多發生于老羊，有時腕及跗關節處腫脹，蹄部發炎等。

治療：枯苓、梔子、連翹、大力、知母、玄參、花粉、甘草各二錢，黃連一錢，一併研為細末，用開水沖服或煎服。

（松潘）

四、豬的傳染病

（一）豬瘟（又名爛腸瘟）

病狀：最急性的常常症狀不顯，很快死亡。急性的發燒、不食、拱背，常昏迷臥地不起，渾身發抖，後肢無力，大便先干後稀，有時帶血及粘膜，很臭，眼屎多，耳、腹、大腿內側有紫色血斑。慢性的常由急性轉變而成，消瘦、咳嗽、食慾不良，下痢等。

治療：1.薄荷、知母、荊芥、威靈仙、防風、黃柏各三錢。混合為煎劑、粉劑均可。大豬一次服。（松潘縣薛訪介紹，此方療效可達百分之八十以上）

2.細辛、雄黃、牙皂、白芷各五錢，麝香一錢，混合制成功關散，並配合尾、耳放血法治療。

（黑水）

3.木瓜五錢，當歸四錢，菊花、白芷各三錢，厚朴、茵陳各四錢，槐花五錢，貫仲、合香各二錢，蒼朮三錢，生地四錢，麥冬五錢，枳實四錢，火麻仁三錢，小木通五錢，滑石二錢，花粉四錢，蒲公英八錢，薤白八錢，排方藤二錢，用水熬服。（松潘）

- 4.大黃、蒼朮各二錢，辛夷一錢五分，明雄二錢，牙皂一錢，梔子二錢，樟腦一錢五分，薄荷三錢，細辛一錢五分，柴胡二錢，黃芩二錢，一并研為細末，用蜂糖做丸，分兩次服。
(松潘)

(二) 猪肺疫 (俗名清水症或鎖喉症等，藏名怕噁呀)

病狀：發高燒、喉部腫脹、呼吸困難、咳嗽、流眼淚，以手按壓其胸部感疼痛，頭、耳、胸側有紅色出血點，常作狗坐姿式。

治療：1.石膏、竹筴各二兩，水黃連四錢，藏青果一錢，加仙人掌適量熬水，分兩次內服。

(茂汶)

- 2.巴蕉油一兩，蚯蚓三十根，白糖一兩，混合內服。

(茂汶、金川)

- 3.水黃連五錢，地丁草二兩，益母草一兩五錢，陳艾一兩，車前草二兩。混合蒸熟後，一日三次服完。

(茂汶、金川)

- 4.雄黃二錢，冰片一錢五，麝香二厘，礞砂一錢，辰砂一錢。將上藥研成細末，用筒吹入喉管，每天二至三次。

(小金)

- 5.用人中白 (即尿桶上的污垢) 與石灰混合，調成糊狀、塗在猪肚皮上，每天二次，兩天即愈。

(小金)

- 6.用火針穿刺頭子腫脹部。

(黑水)

- 7.內服蛇油或蛇血。

(黑水)

- 8.挖耳子草根、馬鞭稍共煎水喂。

(金川)

- 9.蜂糖、白草霜調喂。

(金川)

10. 桔梗、广豆根、知母各四錢，馬勃、桑白皮各三錢，杏仁四錢。熬水分四次灌服。（松潘）

11. 黃芩五錢，黃連三錢，玄參四錢，豆根、桔梗各五錢，百部二錢，瓜壳六錢，馬勃三錢，滑石、杏仁各四錢，木通五錢，知母四錢，桑白皮三錢，麥冬四錢，熬水內服。（松潘）

（三）仔猪白痢

治療：1. 大黃一两五錢，大蒜二个，酒麵一两。大黃熬水、大蒜搗爛兌水，酒麵研細混合加于飼料中喂母猪，每天二次，連服二至三天，療效百分之百。

（松潘）

2. 甘草一錢，大蒜三两，酒四两，混泡两天。喂时加百草霜（鍋烟子），連服两天（分四次服），療效百分之九十。（茂汶）

3. 苏打二片，加少量煤油（約五滴），混合在飼料內一天一次，喂一至三天。

（茂汶）

4. 猪苓五錢，泽瀉八錢，貢朮一两，桂枝六錢，干姜一两，研細喂哺乳母猪，小猪則自愈。

（茂汶）

5. 烏梅、干柿蒂各三錢，黃連、白芷仁各五錢，姜黃三錢，研成細末。为小猪七次量，每天一次；母猪喂药后，再喂百分之二的石灰水一碗。

（茂汶）

6. 粉葛、黃芩、白芍、甘草各一两，木香三两，大黃五錢，石菖蒲为引。以上药喂哺乳母猪，小猪則自愈。

（茂汶）