

增補壽世保元

太乙神鍼附後
錦章書局出版

R24
7

新學
和

PDG

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

小兒形色論

論歌脉十五條

入門審候歌

觀形察色面目圖

眼胞絡屬脾 痒爛主風熱

眼烏珠屬肝青主肝有聲

眼瞳人屬腎 不轉睛腎虧

眼尾角屬心紅主心有熱

眼白睛屬肺白主肺受冷

觀面部

左腮屬肝其色青者為順白者為逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛淡赤主潮熱痰嗽右腮屬脾其色白者為順赤者為逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤澀或淋閉不通

額上屬心其色赤者爲順黑者爲逆若青黑主驚風腹痛瘰癧啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚渴骨熱

鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便閉而鼻燥衄血

額屬腎。其色黑者為順。黃者為逆。若色赤。主腎與膀胱有熱。而小便不通。



左腮屬肝

右腮屬肺

額屬心

鼻屬肝

類屬腎

又

面赤心家熱。面黃脾有積。面青肝有風。唇赤心家熱。唇黃脾有積。唇白肺虛寒。唇燥脾有熱。
 眼赤心經熱。眼青肝有驚。眼黃脾有積。眼白肺有驚。鼻青主吐瀉。人中青感風。人中赤肺家。人中黑瘦弱。
 風池紅多啼。風池黃吐逆。山根紫傷冷。承漿主吐瀉。唇紅面赤。臉青唇黑。唇青面白。面黃如土。
 前下眉頭皺。驚風而煩紅。渴來唇帶赤。熱甚眼腫。面黃多食積。青色是驚風。面白多成瀉。傷寒色紫紅。

手指脈紋式

夫小兒三歲以下有病須看男左女右手。虎口三關紋理。兩手食指本節為風關。中節為氣關。第三節為命關。其紋曲直不同。如紋只在本節病易治。透過中節則病重。過第三節則難治。驚則紋青。淡紅則寒。熱在表深紅必主傷風。痘疹紋亂則病久。紋細則腹痛多啼。乳食不消紋粗直射指甲。必主驚風。惡候結黑如墨必困重難救。此乃神聖工巧之一端也。

虎口三關脈紋圖

虎口又手處是也。三關在第二指。久看三節。
 第一節風關。第二節氣關。第三節命關。

脈指歌



小兒食指辨三關。男左女右。一般看。皆知初氣中風候。末是命門易亦難。要知虎口氣紋脈。倒指看紋分五色。紅黃安樂五臟和。紅紫依稀有損益。紫青傷食氣虛煩。青黑之時症候逆。忽然結黑在其間。好手醫人心胆寒。若也直上到風關。粒米短長分兩端。如槍衝射驚風至。分作枝叉有數般。弓反裏順外為逆。順逆交連順已難。又頭長短猶可救。如此醫人仔細看。初看掌心中。有熱便知身體熱。相從壯熱。腳冷傷積定。腳熱額熱是感風。額冷腳熱驚所得。瘡疹發來耳後紅。孩子無事忽大叫。不是驚風是天病。大呼氣促長聲驚。課吃熱毒悶心裏。急須吐下却和脾。若將驚藥真堪笑。利後努氣眉頭皺。不勢不皺腸有風。熱冷不調分赤白。脫肛因熱毒相攻。十二種痢何為惡。禁口刮腸大不同。孩兒有病不可下。不熱自汗兼自濕。神困顛陷四肢冷。乾嘔氣虛神怯怕吐蟲。面白毛焦。府氣潮熱食不化。鼻塞咳嗽及虛痰。脉細腸鳴燥煩訝。方將有積與疎通。下了之時必生詫。孩兒實熱下無辜。面赤睛紅氣壯強。脉大弦洪肚上熱。肝腮喉痛尿如湯。屎硬腹脹脇肋備。四肢浮腫夜啼長。遍體生瘡肚臍痛。下之必愈是為良。

小兒脉理

小兒一歲。變蒸已足。方有脉。自寸口而生。予見小兒初生未滿月。手掌高骨之際。亦有脉息。吸吸而動。脉者氣血之波瀾。既生乃成人。必有氣血焉。得無脉但不見有大人察其端的之至意也。

小兒病瀕絕脈。一指三關定息數遲冷數熱古今傳。浮風沉積當先識。左手人迎主外症。右手氣口主內疾。外候風寒暑濕侵。內候乳食痰積致。洪緊無汗是傷寒。浮緩傷風有自汗。浮洪多是風熱盛。沉細元因乳食積。沉緊腹中痛不休。弦緊喉間作氣急。紫促之時疹痘生。緊數之際驚風至。虛軟慢驚作癇癎。緊實風癩發搐搦。軟而細者為疳蟲。年而實者因便閉。脈扎大小便中血。虛瀉有氣。驚悸。滑主露濕冷所傷。弦急客忤君須記。大小不勻為惡候。二至為脫三至卒。五至為虛四至損。六至平和曰無疾。七至八至病猶輕。九至十至病勢急。十一至至死無疑。此訣萬中無一失。

小兒五臟主病脉歌

心脉 心脉浮數驚與熱。 傷暑焦啼明白訣。 平腸疝氣及盤腸。 壅結口瘡小腑流。 心脉沉遲臟腑寒。 諸氣有冷痛難當。 小便頻數腸中冷。 下指端詳仔細看。 肝脉 肝脉浮數定主風。 目赤醫膜又主疳。 流淚出血眼生翳。 或痒宜痛怕羞明。 肝脉沉遲主有寒。 面青唇白眼喜張。 諸病傳入慢風候。 良醫仔細要參詳。 脾脉 脾脉浮數熱痰涎。 能食胃惡脾臟堅。 滯頤口瘡停癰結。 唇紅臉赤胃中熱。 脾脉沉遲主風吹。 更加吐瀉慢脾傳。 氣虛胃弱不能食。 滯頤嘔惡醒脾丸。 肺脉 肺脉浮數主便血。 傷寒咳嗽通身熱。 氣急痰盛或瘡症。 瀉痢潮熱大腑溢。 肺脉沉遲主風寒。 臟腑滑腸或洞泄。 仍有咳嗽與痰涎。 下根不定即無根。 腎脉 腎脉浮數實有熱。 偏墜膀胱痛又赤。 口鼻咬牙是腎驚。 傳身齒內出鮮血。 腎脉沉遲定有寒。 臟腑停留入腎囊。 偏墜膀胱尤不痛。 光浮虛大最難當。

小兒死症真訣

黑色如懸針眼下。虛醫也須怕。忽然腹痛鼻青時。不必更求醫。青色連目橫入耳。此候必知死。黑色繞口及連目。看看定不足。黑色眉間也不良。十日必然亡。人中黑色入口來。孩子入泉理。水腫之病準頭黑。報君腎氣滅。咳嗽切忌白入眉。肺絕要君知。孩子吐時鼻色白。命斷能再得。中風切忌面如妝。馬能得久長。目睛無光兼直視。必定三朝死。更有腫人不動時。死候要君知。目似開如又不開。也是死之媒。口禁全然不進乳。此病終不起。瀉下之物如瀉血。孩兒不得活。長吐不止止又吐。休要勞心顧痢久不食。更咬食。絞與死為鄰。瀉痢不歇歇又來。指目下泉台。小便艱難又太渴。畢竟難得活。大使用藥全不通。扁鵲也無功。耳上主瘡黑。斑出。醫人無此術。久嗽四肢皆逆冷。無由難得醒。休熱多應睡不醒。休要費精神。痘疹出後熱不退。此候應為害。下裏青黑不止時。不覺見良醫。久

渴之後加燥渴命必難得活。腹腫脹時氣又驚終久命不甦。

小兒死候形症

大衝無脉滿口枯涎身出黑汗。古縮生瘡。五心凸腫。瀉出黑血。丹毒遍身。瀉止又瀉。直視看人。面黑狂燥。驚叫咬人。吐瀉不止。魚口氣。驚。鼻乾黑燥。忽作鴉聲。啼哭無淚。兩眼半開。四肢羸瘦。氣喘無煙。肚大青筋。四肢逆冷。汗珠不流。唇反舌縮。用手撒人。搖頭動項。顙門作坑。涎如牽鋸。拘腰凸肚。鼻內氣冷。患者皆死。以上並是死候。難以醫瘥。不可順情。

看兒眼法

小兒諸病。但見兩眼無睛光。黑睛無運轉。目眩無蜂芒。如魚眼。猶眼之狀。個個不治。或神藏於內。外若昏固者無妨。其有病驚而眼中神氣不脫者。可以活。眼者五臟六腑神氣之所發。神氣已脫。脉雖僅存。亦未能保。

相兒命短長法

兒初生。叫聲連延相屬者壽。聲絕而後揚急者不壽。啼聲散不成人。膈中無血者好。膈小者不壽。通身軟弱者無骨者不壽。魚口長大者壽。自開目者不成人。目視不正數動者大非佳兒。汗血者多死。不壽。汗不流不成人。小便凝如脂膏不成人。頭四破不成人。常搖手足者不成人。早坐早行早齒早語。皆惡性非佳兒。頭毛不周匝者不成人。髮稀少者強不聽人。額上有旋毛者。早貴妨父母。兒生枕骨不成者能言而死。尿管不成者能偃而死。掌骨不成者能匍匐而死。燭骨不成者能行而死。臍骨不成者能立而死。身不收者死。魚口者死。股間無生肉者死。頭下破者死。陰不起者死。陰囊下白者死。卵縫通達裏者壽。

急驚

脉訣啟蒙曰。小兒脉促急為虛驚。直指云。浮數洪緊為急驚。沉遲散緩為慢驚。虎口脉紋青紫為驚風。紅者風熱輕。赤者風熱盛。青者驚風。紫者驚風。青紫相半驚。積風熱俱有主急驚風。黃而尖紫伸縮來去主慢驚風。紫絲青絲或黑絲。隨隱相雜。以出而不出。主慢脾風。形勢灣入裏者順。出外者逆。

夫急驚風者。因內有鬱熱。外挾風邪。心受熱而積驚。肝家主風而發熱。夫木制任金。金盛則金受剋。金衰不能平木。木能生火。火得風則煽煙起。故子母縱橫。血亂無併。痰涎壅塞。閉不通。風火蓄盛而不得泄。暴烈而成急驚也。其症牙關緊。壯熱涎潮。置視反張。搖擗。攣動唇口。眉眼眊引。煩併六脉浮散。其緊治先搐鼻通關。痰涎壅盛以吐風散吐之。次用敗毒散。保命丹。或雄黃解毒丸下之。驚退而神志未定。投安神散。但噴藥不下。通關不曉。眼睛翻轉。口中出血。兩足擺跳。肚腹搐動。或神緩而摸牀尋衣。症為而晨昏氣促。心中熱痛。忽大叫聲者不治。

嚏散 半夏 牙貝 等分為末用少許吹入鼻中。

○一論小兒急慢驚風熱口禁不省人事手心伏熱痰涎咳嗽上壅喘急並宜湧法。

吐風散 全蝎^四 瓜蒂^十 赤小豆^三 右為末每歲兒服一匙溫米飲調下未吐再服。

○一論小兒急慢驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重及痘疹欲搐發搐并時行瘟疫等症宜。

加味救急散 羌活 獨活 前胡 柴胡 白茯苓^五 人參 枳殼^五 桔梗 天麻 全蝎 姜炭 白附子 地骨皮 川芎

甘草 右作一劑生薑三片水煎熱服。

○一論小兒急慢驚風眼赤口噤搐搦頭大痰喘咳嗽熱服。

南極香星湯 膽星 防風 白附子 蟬退 薄荷 甘草 右剉水煎服。

○一論小兒潮熱驚風 木通 車前 赤茯苓 麥門冬 蟬退 防風 白芍 甘草 燈草 水煎服。

○一論小兒驚風咳嗽痰喘 天南星^四 大者炮去皮為末每服生薑三片水煎溫服。

○一論小兒胎驚內吊肚腹堅硬目睛上視手足搐搦角弓反張痰咳嗽熱一切急慢驚風並皆治之。

至聖保命丹 南星^四 炮去皮用白礬水浸一宿取出半夏^五 同煮上青黛 薄荷^{各一} 全蝎^五 天麻 白附子^五 姜 露^五 汁 防風

鬱金 甘草^五 麝香^五 射干^五 砂砂^五 為末 右為細末煉蜜為丸朱砂為衣焚實大每服一丸燈心薄荷湯化下。

○一論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌下無不活為用。

千金散 內閣秘傳 全蝎^五 真姜炭^五 朱砂^五 牛黃^五 冰片 天麻 黃連^五 膽星 甘草^五 右為末每服五七厘薄

荷燈心金銀煎湯不拘時調下。

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑。

安神散 人參 茯苓^五 遠志^五 天麻 白附子 麥門冬 全蝎 蓮肉 茯神^五 朱砂^五 右為細末每服燈心湯下。

○一論小兒困於熱驚搐不乳視其脉紋如亂魚骨此風熱急驚之症也先用抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡壯脾平

肝逐熱退而驚定愈矣。

○一論小兒癇癇啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡鈎藤鈎啼叫漸暖更加當歸又二劑而安。

○一論小兒目內色青發搐目上下叫哭不已或用牛黃清心丸不愈反咬牙頓悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯

及六味地黃丸而痊。

慢驚

夫慢驚風者。因外感風寒。內傷乳食。而作吐瀉。或得大病之餘。或誤吐下之過。脾胃兩虛。脾與肺母子也。母虛亦令子虛。而生枯痰。胃虛則能生風。風能動。故其症目偏喜開。痰滯咽喉。如牽鋸狀。口鼻氣冷。唇緩而青。涎流口角。將復瘳。疑是也。治宜祛風活痰。健脾生胃。不可妄用肥麝。色粉等藥。其有眼開四肢厥冷者。名曰慢脾風。極危。速用回陽之藥。手足漸溫。復以醒脾散理之。其服藥不效。大衝脉尚有者。大百會穴。但面黯神憊。魚口。鴉聲。脾病脇動。身冷粘汗。頭搖髮直。睛定口瘡。喘噎臥卧。唇縮氣促者。不治。

加味中和散 治小兒慢驚風 人參 白朮去沙各 白茯苓去皮 陳皮焙 半夏洗 全蝎炒 天麻洗 細辛洗 薄荷洗 甘草炙 右剉一劑。姜棗煎服。乳母亦宜服之。

○一論小兒吐瀉不止。作慢驚風。脾困胃沉。默默不食。宜醒脾散 人參 白朮洗 茯苓洗 木香 金蝎 姜蚕 白附子 天麻 甘草 一方去天麻姜蚕。加泡南星。半夏。麝香。米二

百粒。水煎。熱服之。 右剉生薑三片。棗一枚。水煎服。

○一論慢驚。乃元氣虛損。而至昏愴。急灸百會穴。若待下痰不愈。而後灸之。則元氣脫散。而不救矣。此乃臟腑傳變已極。總歸虛處。惟脾受之。無風可逐。無驚可瘳。此因脾虛。不能攝涎。而作痰也。此方專治慢驚。涎潮發搐。或吐或瀉。不思飲食。神昏氣弱。且用

紫金錠子 人參 白朮洗 茯苓洗 白茯苓洗 山藥炒 乳香 辰砂二 赤石脂七 麝香微 右為細末。以麝一兩。為丸。如彈

子。大金丹為衣。每一粒。薄荷湯研化服。

○一論小兒嘔吐不食。手足搐搦。痰涎上壅。手足指冷。額黑唇青。此腎水勝心火也。用五味異功散。加木香。炮姜。煨安。乃去炮姜。再劑而愈。

○一論小兒潮熱發搐。痰涎上湧。手足指冷。左腮至申酉時。青中隱白。手足時搐。此肝經虛弱。肺金所勝。而潮搐。脾土虛弱。而手足冷也。用補中益氣湯。以調補脾肺。用六味地黃丸。以滋補肝腎。而愈。蓋病氣有餘。當認為元氣不足。若用瀉金伐肝。清熱伐痰。則誤矣。

○一論小兒慢驚。睡多驚啼。凡面黃脉細者。難治。用此藥與乳母服之。

釀乳法 木香 沉香 藿香 丁香 枳殼 陳皮 人參 神曲炒 麥芽炒 右剉每服四錢。紫蘇十葉。生薑十片。棗五枚。水煎。先令乳

母食後。捏去宿乳汁。服之。即便吐瀉。時令藥入乳之脉穴。令兒吮不可過飽。亦良法也。

五味異功散。調補中益氣湯。調六味地黃丸。調服。

慢脾

慢脾之症。面赤額汗。舌短頭低。眼合不開。睡中搖頭吐舌。短噎腥臭。噤口咬牙狀。手足微搐。不收。或身冷。或身溫。而四肢冷。其脉沉微。

陰氣極盛胃極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極經歸虛處惟脾所受經曰慢脾風老遠風則無風口逆無聲可療但脾間痰涎壅滯而然耳世所謂驚難瘳者慢脾風是也宜服

加味四君子湯 人參^紅白茯苓^紅蒼朮^紅炮乾姜^{方四}白朮^{妙六}製附子^紅羌活^紅天甘草^{方四} 右剉生姜三片棗一枚水煎服

○一論慢驚慢脾危惡之症藥力不到者但看兩脚而中間陷處有太衝脉即灸百會六三五壯炷如小麥大灸後仍與醒脾之劑調之

○一論小兒慢脾風內虛昏迷不醒宜
加味大醒脾散 人參 白朮^姓 白茯苓^姓 桂橘紅 丁香 南星^姓 全蝎^姓 天麻^姓 白附子^姓 山藥^妙 本香 石蓮肉^姓 磁石^妙 菖蒲

肉豆蔻^妙 砂仁 甘草
○一論小兒驚風後聲啞不能言及諸病後不能言 天南星^一 个炮去皮為末每半字五歲兒半錢豬猪胆汁調食前服

○一論治慢驚慢脾之聖藥也一錠即有起死回生之功頃刻奏效故名回生錠真海上仙方也急驚亦效
回生錠 人參^五 白朮^去 白茯苓^姓 懷山藥 桔梗^略 甘草^紅 胆星^五 赤石脂^五 辰砂^錢 乳香^半 蒙石^三 牛黃^一 麝香^錢

右為末五月五日午時取搗勻印作錠子金箔為衣陰乾每三五分薄荷湯化下

諸疳

脉訣啟蒙曰小兒脉單細為疳勞 虎口紋白色面白者為疳

夫疳者甘肥無節乳哺不調或重賦怯弱血氣不足蓋十五歲已前為疳已後為勞也書藉五疳病關五臟要亦脾家有一臟有積失治而傳其餘也脾家病去餘臟皆已症雖分平治當以補為先宜用地黃丸五疳膏肥兒丸之類

○一論小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋大便色^三疳白小便渾濁或澄之如米泔此疳病也

消疳湯 山查^姓 白芍^妙 黃連^姓 白茯苓^姓 白朮^姓 澤瀉^姓 青皮^四 甘草^三 右剉一劑姜棗煎服

○一治小兒疳積發熱肚大青筋骨瘦如柴

消疳退熱飲 山查^姓 烏藥 燈心 竹茹 枳榔尖 使君子 蘇黃仁 淮木通 黑牽牛 大黃 柴胡 莪朮^根 枳殼^去 黃

芩 甜葶藶 右剉水煎溫服

○一論肝膽紅熱毒塵瀝或耳內耳下生瘡發熱潮熱或肝經濕熱下注囊癰便毒腫潰或小腹脇股結核凡肝胆經部分一切瘡瘍

發熱并用之

九味紫胡湯 柴胡 黃芩^妙 人參 山梔 半夏 龍膽草 當歸 芍藥^略 三甘草^紅 水煎服

曾補書世宗元

○一論小兒肝疳。白睛遮睛。肝經虛熱。血燥。或風客淫氣。而患瘰癧結核。或四肢酸攣。眼目抽動。痰涎上壅。凡傷損出血多。抽掣發熱。又治腎疳。腦熱消瘦。手足如冰。寒熱往來。滑泄肚脹。口臭乾渴。齒齦潰爛。爪黑面黃。遍身兩耳生瘡。或耳內出水。或發熱自汗盜汗。便血諸血失瘕。或小便淋閉。咳嗽吐血。或咽喉燥痛。口舌瘡裂。或稟賦不足。肢體瘦弱。解顛倒。五遲五軟。或畏明下墮。或早近女色。精血虧耗。五臟齊損。凡屬腎肝諸虛不足之症。皆宜用此。以滋化源。其功不能盡述。

為細末和地黃膏加煉蜜為丸如梧子大每服三五丸空心白滾水下

○一治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴肚大青筋手足如柴精神困倦屢試無效服此藥則諸瘥不生元氣虛弱者服半月身體健壯。

芙蓉仁二錢 蓮肉五錢 甘草二錢 石為細末和勻重七兩每次用藥末一兩煉蜜四兩調成膏每日中晚間各服一二茶匙

○一論消痞化積磨癖清熱伐肝補脾進食殺蟲潤肌膚養元氣真王道也

肥兒丸
人參三錢 白朮三錢 白茯苓三錢 黃連五錢 史君子四錢 神曲炒 麥牙炒 山查肉各三錢 甘草三錢 蘆薈二錢 盛泥封固

癖疾。

夫癖塊者嬰兒飲食失調三焦闔格以致停滯腸胃不得宣通初得爲積久則氣血與痰裡積塞於腹脇及瘰癧家縱飲生冷漿水亦能成之其症作痛有時面黃肌瘦倦怠無力或生潮熱寒熱是也治先定去寒熱次用消堅散結和脾胃之劑理之更用火法貼藥久之自効。

○一論小兒腹中痞塊發熱增寒口乾小便赤或大便稀瀉或腹脹腫滿或痰嗽啼熱不思飲食面黃肌瘦四肢困倦等症
淨府湯 柴胡錢黃芩錢半夏錢人參錢白朮錢白茯苓錢豬苓錢澤瀉錢三稜錢莪朮錢山查肉錢胡黃連錢

右剉一劑。生姜三片。棗二枚。水煎。溫服。

○一論小兒癰積日久不消元氣虛弱脾胃虧損肌肉消削肚大青筋發熱口乾肚腹脹滿
抑肝扶脾散 人參_五白朮_六茯苓_八青皮_六龍胆草_八白芥子_八柴胡_三山查_八神麴_六陳皮_六黃連_一姜炒胡黃連_三

甘草分三 右剉一 劑生薑三片棗一枚水煎溫服

黃龍丸 扶海劉小亭傳。雄黃^{一錢} 蜈蚣^{二條} 獨內蘆薈^{三錢} 阿魏^{二錢} 牛黃^{一分} 天竺黃^{一分} 右為末化黃蠟一兩為丸如菜豆大先服七丸則熱退次服九丸則現消三服十一丸則病根除每用黃蠟煎童子清入藥于黃酒下。

肥兒丸^{治疳疾如神} 一專貼癖積氣塊身體發熱口內生疳此藥用狗皮攤貼患處每八重七錢貼三日止熱七日覺腹微痛十日大便下膿血為驗大有神効忌生冷腥葷發物百日。

神仙化癖膏 真香油^{二斤} 秦花^{三錢} 黃丹^{一兩} 斷^{二兩} 冰黃柏^{五錢} 穿山甲^{四片} 當歸^{三錢} 義木^{五錢} 全蝎^{十個} 大黃^{三錢} 蜈蚣^{五條} 木鱉子^{十個} 右將藥入油內煎黃色為度濾去渣搗爛待用油冷時下黃丹用文武火熬槐柳條不住手攪黑烟氣滴水成珠手試軟硬方可離火次下五味細藥並入搗爛粗渣子內。

真阿魏^{而乳香} 沒藥^{五錢} 麝香^{五錢} 皮銷^{三錢} 攪勻以磁器內盛之如用坐水中鎔開不可火上化如有馬刀梃子瘡加琥珀一兩在內無不效驗。

一將軍百戰百勝膏 貼癖如神。大黃 白芷^{各三錢} 義木^{一兩} 木鱉子^{十個} 蜈蚣^{十條} 穿山甲^{十片} 巴豆^{一百個} 單麻子^{一百個} 梃子^{五錢} 黃連^{五錢} 槐柳條^{三百條} 香油^{二斤} 入藥熬黑去渣濾淨再加黃丹一斤熬熟水成珠再加血竭^{五錢} 蘆薈^{五錢} 天竺黃^{五錢} 輕粉^{五錢} 阿魏^{五錢} 麝香^{五錢} 胡黃連^{五錢} 麝砂^{五錢} 為末下油為妙。

一治小兒癖疾發熱之甚及眼瞤方。明目化癖丹 牛黃^{一片} 腦^{一分} 熊胆^{一分} 麝香^{三錢} 乳香^{三錢} 右共為細末先將乳汁於銅杓內炭火上滾黃色下前藥急取出攪勻於油單紙上丸如米粒大男左女右卧時點入大眼角內合眼自化頭上出汗至胸前第二丸汗至臍上第三丸汗至臍下再點三二丸腹痛濃血自愈妙不可言。

化癖金丹 內閣秘傳。蟾酥^水 黃蠟^{二錢} 羚羊角 牛黃^{五錢} 麝香^{三錢} 巴豆肉^{一兩} 礞砂 冰片^{各三錢} 右為末丸如菜子大每用一粒用扁豆針在患處刺破皮入之用膏藥貼上一伏時揭起其癖化膿血出盡服調理脾胃之約而愈。

一論小兒患癖年深不愈請醫以攻剋殺伐之劑屢投不愈以致元氣耗傷脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面色痿黃肚大青筋身熱自汗喘急氣促泄瀉腹脹浮腫不思飲食遂以補中益氣湯久服而愈。

熱證

小兒之病惟熱居多。天熱有虛有實。實則面紅目赤氣喘口乾燥渴小便赤澀大便堅閉五心煩熱日夜焦啼發壯熱宜大連翹飲主之。虛則面白眼青氣微口中清冷恍惚神緩大便稀而小便頻夜則盜汗發虛熱宜惺惺散主之。其有身體生熱沸熱驚風上盛下

虛此冷熱不調候也。如熱在表宜汗。在裡宜下。表裡俱熱則宜解散。其或表裡已解。熱又時來。此表裏俱虛。氣不歸元。而陽浮於外。不可再服涼藥。必使陽斂於內。身體自涼。宜參苓白朮散主之。又有潮熱則發熱。有熱驚熱。顛叫恍惚。夜熱多發。旦止。除熱寒邪未盡。食熱肚腹先發熱。瘧熱骨蒸。盜汗。壯熱。一向不止。煩熱。心燥不安。積熱。煩赤口瘡。風熱。汗出身熱。虛熱。困倦。少力。客熱。來去不定。瘧熱。逆救。水寒熱。發如癰狀。血熱。已午時發。癰熱。疹熱。耳聾。六者大同而小異。諸症得之。各有所歸。其間或有三兩症交互者。宜隨其輕重而處治之。益小兒氣稟純陽。臟腑生熱。陰陽氣變。薰蒸於外。致令身熱也。若肝熱則兩眼赤痛。流淚羞明。或生翳障。心熱則口内生瘡。小便赤腫淋瀝不通。肺熱則鼻衄不止。大腑閉結。脾熱則多涎沫。口內長流。心脾熱則生重舌。木舌。胃熱則作口臭。腎熱則耳聾。或出濃汁。此五臟所生主熱。各不同。是不可以概論也。大抵熱則生風。風則悖矣。

○一論小兒心經邪熱。心與小腸受盛。乃水實之處。常宜通利。壅則結滑。則利。熱則溫。盛則淋。平涼心火。三焦自順。不待疾作而解。證成而療者。疎通有之矣。一十五味加湯使用。覺溫熱客熱。寒邪風邪。胃之肺經。心將受之。不受。觸傳於小腸。或閉或澀。或赤或白。淋瀝不通。榮衛不通。變之作疾。其發多端。以致脇熱。眼目赤腫。唇口白瘡。津液不生。涕唾稠盛。須在表裏俱得其宜。驚風惡能散之。痰熱亦自消除。連翹之功。可謂大矣。

大連翹飲 連翹 瞿麥穗 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍藥 山梔子 木通 當歸 防風 黃芩 柴胡

甘草 荊芥穗 蟬退 右剉作一劑。竹葉十個。燈草十莖。水煎服。○風痰熱變。熱如麥門冬。○寬熱。再熱加大黃。○胎

熱。瘡疹餘毒。如薄荷葉。○癰疽毒熱。加大黃芒硝。

○一論小兒溫積熱毒。唇口腫破。生瘡。牙齦出血。口臭煩熱。咽喉煩燥。不寧。并瘡疹餘毒未解。頭面身體多生瘡。宜

五福化毒丹 犀角 三桔梗 而生地黃 赤茯苓 貝母 甘草 粉草 朴硝 連翹 玄參 青黛 右為細末。煉蜜

為丸。如龍眼大。每服一丸。薄荷湯研化下。兼有驚。加朱砂為衣。

○一論小兒變蒸一症。乃小兒蒸皮長骨。變幻精神。不須服藥。其有傷風咳嗽。痰涎壅塞。聲重。變蒸為熱。且服此方。

惺惺散 人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 白芍 天花粉 細辛 薄荷葉 右剉每服三錢。水煎溫服。

感冒

○一論小兒感冒風寒。用老葱三四根。春極爛。以手抹來。相搭滿掌。烘溫。後同病者過身擦之。通氣處再偏擦幾。暖處出汗立愈。又

不相妨。

出痘疹屢驗絕妙

○一治小兒面青身冷。默默不語。用燈火過身。手足按穴。爆之立醒。

人參敗毒散 羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 白茯苓 川芎 薄荷葉 人參 甘草 右剉姜葱煎服。

○一論小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎并痘疹初作。

羌活膏 人參 羌活 獨活 前胡 川芎 桔梗 天麻 薄荷 地骨皮 甘草 右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸姜湯研化下。

○一論小兒四時感冒傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰涎壅嗽及驚風潮搐疊毒中暑并瘡疹欲出發搐皆可服之。壯實小兒三五日服一丸可免驚風痰嗽等疾宜。

抱龍丸 南星 天竺黃 雄黃 辰砂 右為細末煮甘草膏為丸如皂角子大每服一丸薄荷

湯研化下。百晷內者作三服或用蠟雪水煮甘草膏汁和藥尤佳。

按右方若風熱痰嗽或急驚發搐昏睡咬牙形病俱實宜用此方。若初冒風寒咳嗽痰盛氣喘者屬客邪內作也。先用十一味參蘇飲若邪既解而腹脹吐瀉或發搐咬牙睡而露睛屬脾肺氣虛也用四君子湯加陳皮名異功散切忌祛痰表散若過服而致前症者尤宜補溫脾肺。

參蘇飲方見

脾胃

○一論小兒諸病因藥攻伐元氣虛損脾胃良德惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或無飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細軟弱右關寸獨甚亦宜用之大凡久病或過服剋伐之際虧損元氣而諸症悉具之最宜此湯調補若無有前症之兒為患者尤宜用之。

補中益氣湯 黃芪 陳參 白朮 當歸 陳皮 甘草 升麻 柴胡 右剉姜棗煎空心溫服。

○一論小兒脾胃虛弱或因剋伐之過致飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不寔脾胃虛損吐瀉少食宜用。

四君子湯 人參 白朮 白茯苓 甘草 右剉姜棗煎服。

六君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或大便不調肢體消瘦面色痿黃即四君子湯加陳皮半夏。

○一論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐瘧盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有疾致兒患此者母亦當服之。

異功散 人參 白茯苓 白朮 甘草 陳皮 右用姜棗煎服。

傷食

經云脉滑者有宿食也。虎口脉紋黃色為脾家有積。○小兒脉沉者為乳不消。

夫小兒傷食皆因乳哺不節過食生冷堅硬之物脾胃不能消化積滯中脘外為風寒所搏或因夜臥失蓋以致頭疼身熱面黃目胞微腫腹痛脇脹足冷肚熱喜睡神昏不思飲食或惡食或惡心或嘔或噦或口噴酸氣或大便敗卵臭或氣短痞悶或胃口作痛或心下痞滿按之則痛此皆為陳積所傷也宜以萬應丸利之若內停於食或外又感寒邪者則人迎氣口俱紫盛頭疼惡寒拘急兼前等症宜以太和散佐之萬氏曰乳者奶也哺者食也乳後不可與食食後不可與乳緣小兒脾胃怯弱乳食易傷難以消化初得成積久則成癖成疳變為百病可不慎乎。

萬應丸治傷食百病。

○一論內傷乳食吐腹脹痛外感風寒頭疼發熱宜服

太和丸 紫蘇 陳皮 香附 羌活 蒼朮 川芎 枳殼 山查 神曲 麥芽 甘草

○一治小兒食積腹痛膨脹肚硬青筋黑丑 性極抑 三香 右為細末每服五分黑砂糖調入滾水服立消。

○一論小兒時常傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令常食之

消食餅 蓮肉 山藥 白茯苓 芡實 麥芽 神曲 扁豆 山查 右各等分為末每四兩入白麩一斤水同和烙焦餅用。

○一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃。

啟脾丸 人參 白朮 白茯苓 山藥 蓮肉 山查肉 陳皮 澤瀉 山查 右為末煉蜜為丸如菜豆大每三

四十丸空心米湯送下小兒常患傷食諸疾服之立愈。

○一論小兒傷食肚大腹脹用微酒小曲一枚為末打入鷄子一個攪勻入鹽少許蒸熟食每早服一次可數次而愈。

○一論健脾胃進飲食消滯積殺疳蟲長肌肉乃保嬰第一方也。

保嬰丸 臨川徐培鴻試驗 人參 白朮 五錢 橘紅 五錢 白茯苓 四錢 甘草 一錢 青皮 三錢 砂仁 二錢 木香 二錢 山藥 五錢 蓮肉 二錢

史君子 去酸 山查肉 三錢 神曲 三錢 右共為細末用生荷葉包裹米煮熟去荷葉將藥搗爛以淨布扭出再煮成糊為丸如

麻仁大每二十五丸或三十五丸至五十丸陳米炒熟煎過不拘時服。

○一論小兒食積後咬牙欲吐煩悶腹脹皆積鬱黃赤此脾土傷而肝氣所積食積發厥也先令鷄翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿

藥而愈。

一、小兒好吃棕、成腹脹痛、用白酒麴末同黃連末為丸服之。

○一、小兒因停食腹痛、服峻利之藥、後患瘡目、瞽而作此、元氣下陷、以補中益氣湯治之。

千金肥兒餅 小兒無病、日常食三五餅、可防患於未然、妙不可言。

嬰孩恒關乳 飲食不消停、脾胃一傷損、吐瀉兩相併、痰嗽加喘、熱積致泄瀉、面黃肌瘦、腹脹吐青筋。

赤子焦啼叫 慈母苦傷情、吾心懷幼切、家蓮子茯苓、芡實乾山藥、扁豆薏仁、己上各四兩、神曲麥芽陳。

人參史君子 山查國老并、六味每二兩、白糯米二升、藥米均為末、布裏飯內蒸、白糖二斤半、調和餅印成。

每日二三餅、諸病即安、肥兒王道藥、價可擬千金。

吐瀉 夫小兒吐瀉、皆因本氣未完、六淫易侵、兼以調護失常、乳食不節、遂使脾胃虛弱、清濁相干、蘊作而然、大概有冷有熱有食積三者之

不同也、蓋冷者脾胃虛寒、水穀不化、小便白而大便青、或如糖柏、手足厥冷、或吐或瀉、宜助胃養主之、如上之症、或兼有外感風寒、

內傷生冷、身熱乍涼、乍熱作吐瀉者、宜藿香正氣散主之、熱者脾胃有濕、大便黃而小便赤、口乾煩渴、四肢溫、或吐或瀉、宜甘露

散主之、如上之候、有兼中暑受熱作吐瀉者、宜如金湯主之、或益元散亦可、食積者、因傷食過多、積滯脾胃、則吐脹發熱、若吐如酸、

酸氣若瀉、如敗卵臭、宜萬應丸、微利即愈、利後不愈、乃脾胃虛弱、仍以助胃養主之、凡吐瀉初起、即服燒針丸、鎮固之、即效、大抵吐

瀉之症、多因乳食、以傷脾胃、乳食傷胃、則為嘔吐、乳食傷脾、則為泄瀉、吐瀉不止、漸至日深、道其胃氣之虛、慢驚之候、自此而得、可

不慎乎。

吐瀉不治症

小兒瀉石定、精神好者、脾敗也、吐瀉唇深紅者、內熱故也、不退必死、面黑氣喘者、不治、大瀉不定、止之又瀉、腎敗也、遺瀉不

覺必死。

燒針丸 治吐瀉如神、黃丹水飛朱砂水飛白礬水飛右為末、棗肉為丸、如黃豆大、每服三四丸、戩針尖上、放燈焰上燒過、存性

至爛、涼米泔水調服、瀉者食前、吐者無時、外用菜豆粉、以雞子清和作膏、以塗腳心、如瀉塗顙門上、則去之。

○一治脾胃虛弱、吐瀉不食、凡虛寒症、先服此、以正胃氣。

五味異功散 人參 白朮水浸茯苓水浸陳皮 甘草 右剉散、姜棗煎服。

○一論小兒吐瀉、脾胃虛弱、飲食不進、腹脹滿、腸鳴、吐瀉虛寒等症。

助胃膏 人參 白朮水浸茯苓水浸丁香 木香 砂仁 白豆蔻 肉豆蔻 官桂 藿香 甘草水浸陳皮 山藥水浸右為細

未煉蜜為丸如彈子大每服一匙米湯化下。兼治乳便青。或時夜啼。胎寒腹痛。

○一論四時不正之氣。寒疫時氣。山嵐瘴氣。雨濕蒸氣。或中寒腹痛。胃風吐瀉。中濕身重。泄瀉脾胃不和。或飲食停滯。復感外寒。頭疼。增寒。嘔逆。惡心。肋脇悶。或發熱無汗。

香薷正氣散 香薷_{陳皮}紫蘇_{陳皮} 厚朴_{白朮} 白茯苓_{桔梗} 大腹皮 白芷 甘草_{五分} 右剉一劑。姜棗煎服。

○一論小兒夏秋之月。霍亂吐瀉。身熱口渴。

加減茹苓湯 猪苓_{澤瀉}白朮_{赤茯苓} 黃連_{五苓散} 乾葛_{天花粉} 甘草_{五分} 右剉生薑煎服。○如熱極加石膏。

知母。○瀉極加升麻。○腹痛加炒白朮一錢。肉桂三分。寒痛亦加。

○一論小兒五種泄瀉。赤白痢疾。宜用

鐵門拴 文蛤_{一兩} 白礬_{一兩} 黃丹_{二錢} 右為末。用黃蠟一兩化開。為丸。如菜豆大。每服大人十五丸。小兒五七丸。用茶一錢。姜

二錢煎湯下。

小兒水瀉痢疾。用蜜三匙。枯礬末三錢。蘿蔔汁調服。○微汗忌醋。

○一論小兒脾胃久虛。嘔吐泄瀉。頻并不止。津液枯竭。發熱煩渴多燥。但欲飲乳。食不進。羸困失治。變成慢驚風癇。不問陰陽虛實。是正

宜服之。

人參白朮散 人參 白朮_{去苗} 白茯苓_{去皮} 藿香 木香 乾葛 甘草 右剉姜棗煎服。○如小兒頻瀉痢。將成慢驚。如山藥扁

豆肉豆蔻_{各一錢} 姜汁_{煎服} 若慢驚已作。加細辛_{天麻} 金竭_仁 白附子_{各一分} 若小兒冬月吐瀉。多是胃寒。胃虛所致。加丁香

○若胃虛不能食。而泄瀉不止者。不可用淡滲之藥。但胃元氣少故也。以白朮散補之。○如不能食而渴者。倍乾葛加天花粉。○

如能食而渴者。白虎湯加人參。

○一論小兒嘔吐不止宜

金棗丸 木香 半夏 南星_{湯洗} 薑汁_浸 丁香 陳皮_{各二錢} 砂仁 藿香_{各五錢} 人參_{一錢} 右為細末。姜汁打糊。和成錠。辰砂為衣。

姜湯送下。

○一論小兒久瀉久痢不止。及滿口生瘡。白爛如泥。痛哭不已。諸醫罔效。用

巴豆_{去殼} 瓜子仁_燒 銀錢_{各一錢} 共搗一處。如泥。津調貼在兩眉間。豆帛包待成泡。揭去即愈。

○一論小兒泄瀉。用巴豆汁末為膏。貼在臍門上。燒線香一炷。火盡即去。巴豆立效。

○一論小兒世為不止。用山藥沙為末。不拘多少。入粥。同粥食之。立止。

○一小兒久濕兼脫肛小腹重墜四肢浮腫而色痿黃時或黃青諸藥到口即嘔吐香乳母憂鬱傷脾大便不靈先用補中益氣湯後用五味異功散及四神丸調治其母不兩月而子母俱痊

○一小兒傷食嘔吐服代之藥嘔中見血用清熱涼血之約又大便下血唇色白而或青問其故於余余曰此脾土虧損肝火所乘而然也令空心用補中益氣湯食遠用異功散以調補中氣使逆血各歸其原而愈

○一小兒吐瀉不止或取轉過多四肢發厥虛風不省人事用此四肢溫煖神識漸省

益陽散 天南星為末每服三錢入京棗二枚同煎服

痢疾

○一治小兒吐不定 五倍子兩個一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同為末每服半錢米泔水調下

小兒入痢者乃饑飽勞後風寒暑濕因觸胃天地八風之邪而得故以命名痢也大抵多由脾胃不和飲食過度停積於脾胃不能消化又為風寒暑濕干之故為此疾傷熱則赤傷冷則白傷風則純下青血傷濕則下如豆汁冷熱交并赤白兼下若下重後重急迫窘迫痛者火性急速而能燥物故也或夏末初起有暴折於盛熱無所統故各搏肌膚之中於外則為瘡發於內則為痢內外俱發則為瘡痢凡痢病日久則腫滿下焦偏冷上焦偏熱則為上重下虛若脾胃濕熱之毒重塞清道而上以致胃口閉塞而噤口之症又有一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也當先推其歲運以平其外察其鬱結以調其內審其所傷別其虛實冷熱以治之條然明白不可盡談

痢疾不治症

凡小兒下痢如豆腐色者死○下如屋漏水者死○下痢日久大便如孔者死○下痢如竹筒注水者死○又小兒赤白同下久而不禁小便赤流腹痛發時熱唇紅舌胎氣促心煩坐卧不安狂渴飲水穀道傾陷腹面各似瘡飲食全不進者並不治

清熱化滯湯 治痢主方 黃連吳茱萸煎 白芍藥 陳皮 白茯苓去苓 枳殼炒 黃芩 甘草 石剉生姜一片水煎空心溫服○

初起積熱正熾加大黃芒硝○血痢加酒炒黃芩當歸地榆○白痢加厚朴枳殼○赤白並下加川芎歸尾桃仁紅花滑石陳皮乾姜粉○白痢久虛加白朮黃芪茯苓去苓連枳殼○赤痢久虛下後未愈去苓連加當歸白芍白朮川芎阿膠珠○裡急後重加木香枳榔○腹痛加白芍川芎玄胡索枳殼○小便赤少加木通猪苓澤瀉○下如豆汁加白朮蒼朮防風○食積加山楂枳實麥芽

神曲○久痢氣血兩虛加人參黃芪當歸川芎升麻肉桂○下後二便流利惟後重不去者氣陷於下也以升麻提之

○一論小兒痢疾屬熱居多用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅花白痢加滑石末同煎

開板丹 黃丹蠟黃蠟 乳香沒藥 杏仁去皮尖 巴豆去油 右將四味為細末將黃蠟溶開後將末約同蠟拌勻攪勻成塊

凡如黃豆大每服一丸空心服紅痢冷甘豆湯下白痢冷乾薑湯下水瀉米湯下忌生冷油膩

○一治休息痢及瘡瀉日久不能安用雞子一枚打碎用黃蠟一塊如指大銚內鑲以雞子拌和炒熟空心食之

○一治小兒痢疾方用雞子一個冷水下鍋煮二三沸取出去白用黃研碎以生薑汁半小鍾和勻與兒服之不用茶神效

○一治小兒患痢脫肛色赤或痛以補中益氣湯送吞連丸而愈後傷食作瀉或脫肛不久仍以益氣湯服更以厚麻仁研塗頂門

○一治小兒久痢裡急後重欲去不去手足並冷皆胃氣虛寒下陷也以補中益氣湯加木香補骨脂倍加升麻柴胡

○一治紅痢及噤口用白螺搗爛盒臍中頂刻効

○一治痢不拘赤白白蘿蔔汁蜜各等分攪勻服三四匙効

○一治小兒噤口痢用田梨一個挖空入蜜填滿紙已大煨熟吃立止

○一治噤口痢瀉欲未設不下者石蓮子去殼并內紅皮及心為細末每服量兒大小或五分或一錢三錢用陳倉米湯調下如

嘔加生薑汁一二匙

○一治血痢用苦參炒為末每服三分或五分米湯調下

○一治白痢用肉豆蔻麵包煨乳香一粒共為末每服二三分米湯調服

○一治久痢不止用陳蘿蔔煎湯一服立止○一方用薤菜煎湯服効

○一治瀉久不止不肯服藥用肉豆蔻煨去油為末三錢麥麴四兩同和切麴入葱薑煮如常食之

瘧疾

夫瘧者外因感受風寒暑濕內因飲食飢飽而作也其症不一先寒後熱者名寒瘧先熱後寒者名溫瘧寒而不熱者名牝瘧熱而不

寒者名癘瘧不寒而熱骨節疼痛身重腹脹自汗善嘔者名濕瘧噯氣吞酸胸膈不利者名濕瘧一日一發受病一月間日一發受

病半年連發二日間一日者氣血俱病也起於三陽者多熱而終於日起於三陰者多寒而發於夜發於日者隨症而治發於夜者

加血藥并用升提暫瘥可截久瘥如補經久不愈一見飲水結胸中脫名曰瘧母此最難症一二發間用截太早必變浮腫瘡痢之

疾然無見之瘧自飲食得之居多治須以消導扶胃氣為本此秘訣也

○一論食瘧吐嘔痰沫及時行瘧瘧不問先寒後熱諸瘧通用
清脾引 青皮 厚朴 煨草果 白木 桂 白茯苓 柴胡 黃芩 半夏 煨甘草 右剉棗煎服○小使赤加猪苓澤瀉

○一論傷食感寒發瘧及中脘虛寒嘔逆惡心等症

養胃湯 蒼朮 煨厚朴 煨草果 陳皮 半夏 煨白茯苓 人參 蒼香 草果 甘草 右剉烏梅一個生薑水煎服