

LINCHUANG CHANGYONG YAOPIN
TONGYONGMING GUANLI

临床常用 药品通用名管理

(下卷)

◎ 主 编 解晓明

◎ 执行主编 王 栋

陕西科学技术出版社

临床常用药品通用名管理

(下卷)

主 编 解晓明
执行主编 王 栋

江苏工业学院图书馆
藏书章

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临床常用药品通用名管理/解晓明主编. —西安:陕西科学技术出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-5369-4516-6

I. 临… II. 解… III. 药物名称—基本知识 IV. R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 108013 号

解晓明 主 编
林 王 副主编

-
- 出 版 者 陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
<http://www.snstp.com>
- 发 行 者 陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001
- 印 刷 陕西丰源印务有限公司
- 规 格 850mm×1168mm 16 开本
- 印 张 72.5
- 字 数 2145 千字
- 版 次 2008 年 8 月第 1 版
2008 年 8 月第 1 次印刷
- 定 价 190.00 元(上下卷)
-

版权所有 侵权必究

主 编 解晓明

执行主编 王 栋

副主编 谭志萍

王惠川

张 柳

谭铁强

编委 刘立平

胡 斌

李 艳

刘 艳

屈海婷

靳晓芳

李 蓓

张晓燕

上官静

刘昕

徐亚平

赵晶瑞

陈 锡

张倩





解晓明，陕西省医院管理学会副会长，陕西省医师协会副会长，陕西省医学会常务理事，西安市第四医院院长，西安市突出贡献专家。先后毕业于大同医学院、第二军医大学临床医学和卫生事业管理专业。历任儿科副主任医师、医务科主任、业务副院长、院长。从事医疗、管理工作近 30 年，荣获“全国百姓放心医院优秀管理者”、“陕西省白求恩精神奖”、“陕西省劳动模范”。曾主编《疑难青光眼的诊断与治疗》《现代医院流程管理》、《医院职位说明与职责管理》等著作，并参与多项科研项目，其中《小儿肥胖症的诊断治疗研究》《西安地区 7~15 岁儿童功能正常值测定》获得西安市科技进步奖。所在医院为“全国卫生系统先进集体”并连续 9 年被评为“西安市卫生系统综合目标评比一等奖”，率先在陕西省的医院中实行 VI 形象设计和医院流程管理。



王栋，医院管理学硕士，西安市第四医院院长办公室主任，副主任医师，陕西省高技能人才专家评审委员会常委，1967 年 12 月出生，先后就读于西北大学管理科学与哲学系行政管理专业，第二军医大学临床医学专业、陕西中医学院中医学专业、南开大学医院管理学专业。历任西安市第四医院理疗科主任、综合病区主任、医院“非典”办公室主任、基建科副科长、院长办公室主任，系陕西省康复医学会常务理事，中华医学会西安分会第四、五届物理医学与康复专业委员会委员。著有《中国脊疗》、《现代医院制度管理》、《临床康复治疗技术》、《现代医院流程管理》等著作。

前 言

随着医疗事业的发展和现代科技的进步,药品品种与日俱增,药物名称种类繁多,“一药多名”的问题已成为困惑临床医生、护士、药师日常选药的难题,也给广大患者带来了极大的不便。2007年5月1日,卫生部颁布并正式实施《处方管理办法》,规定:“医师开具处方应当使用经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称”。因此,规范医疗机构和医务人员的处方行为,准确辨认药品的商品名和别名,不仅对提高医务者自身的业务素质起着重要作用,而且也是体现医院管理水平的一项重要内容。

为了进一步规范医院管理,推动临床合理用药,规范处方药品名称,提高药物治疗水平,我们组织了一批从事药品管理、临床药学和临床药理研究的专家、教授编写了这本《临床常用药品通用名管理》,重点对卫生部公布的1000余种药品进行了完整的收载,详细介绍了临床常用药品的通用名称(中、英文)及其相对应的商品名、异名,并对每种药品的类别、规格、适应症、用法用量、不良反应、注意事项、禁忌症等进行了相应的说明,涵盖内容十分全面。

本书的编写坚持基于临床、便于临床的原则,在编写时采用表格的形式,既简练,又直观,突出了实用性、方便性的特点,为各类人群提供了十分便捷的检索平台。该书可操作性极强,不仅适合临床医师开具处方时参阅,也为药师、护师临床配方使用药物提供依据,还可对药店人员、大众百姓选药购药进行指导,是一部应用性极高的实用参考书。

本书在编写过程中,各位编委参阅了相关的资料和文献,做了大量的工作;同时还得到了有关领导的大力支持与协助,在此对他们表示衷心地感谢,并对参与此书编写的所有工作人员深表谢意。

由于编写、修订时间仓促以及编者水平有限等因素,难免有不当之处,敬请读者提出宝贵意见,以便我们进一步完善和提高。

编 者

2008年7月

通讯地址:西安市第四医院 王栋

电 话:13991914164 13379095660

电子邮箱:wangdong1967@126.com

网 址:www.grmg.com.cn

目 录

第一篇 临床常用药品通用名	(1)
第一章 抗微生物药物	(2)
第一节 抗生素	(2)
第二节 合成抗菌药	(84)
第三节 抗分枝杆菌药	(112)
第四节 抗真菌药	(123)
第五节 抗病毒药	(135)
第六节 其他	(154)
第二章 抗寄生虫病药	(156)
第一节 抗吸虫病药	(156)
第二节 抗疟药	(157)
第三节 驱肠虫药	(164)
第四节 抗丝虫病及抗黑热病药	(168)
第三章 解热镇痛及非甾体抗炎药	(171)
第一节 解热镇痛及非甾体抗炎药	(171)
第二节 抗痛风药	(197)
第三节 镇痛药	(201)
第四章 麻醉用药物	(215)
第一节 全身麻醉药	(215)
第二节 局部麻醉药	(222)
第三节 麻醉辅助药	(227)
第五章 维生素及矿物质缺乏症用药物	(237)
第一节 维生素类	(237)
第二节 矿物质类	(251)
第六章 营养治疗药	(258)
第一节 肠外营养药	(258)
第二节 肠内营养药	(263)
第七章 激素及调节内分泌功能药	(264)
第一节 下丘脑垂体激素及其类似物	(264)
第二节 肾上腺皮质激素类	(274)
第三节 雄激素、抗雄激素及同化激素类	(283)
第四节 雌激素、抗雌激素、孕激素及抗孕激素类	(290)
第五节 胰岛素及其他影响血糖的药物	(308)
第六节 甲状腺激素类	(321)

第七节 甲状旁腺及钙代谢调节药	(326)
第八章 调节免疫功能药	(338)
第一节 免疫抑制药	(338)
第二节 生物反应调节药	(347)
第九章 抗肿瘤药物	(358)
第一节 细胞毒药物	(358)
第二节 激素类及抗激素类抗肿瘤药	(414)
第十章 抗变态反应药物	(443)
第一节 H_1 受体阻断药	(443)
第二节 过敏介质阻释药	(457)
第十一章 神经系统用药物	(458)
第一节 抗帕金森病药	(458)
第二节 抗重症肌无力药	(467)
第三节 抗癫痫药	(469)
第四节 脑血管病用药	(480)
第五节 中枢兴奋药	(496)
第六节 镇静催眠药	(505)
第七节 抗偏头痛药	(512)
第八节 其他类	(512)
第十二章 治疗精神障碍药	(522)
第一节 抗精神病药	(522)
第二节 抗焦虑药	(540)
第三节 抗抑郁药	(551)
第四节 抗躁狂药	(563)
第十三章 呼吸系统药物	(565)
第一节 祛痰药	(565)
第二节 镇咳药	(569)
第三节 平喘药	(575)
第四节 其他	(594)
第十四章 消化系统药物	(595)
第一节 抗酸药及抗溃疡病药	(595)
第二节 抑酸药	(608)
第三节 助消化药	(615)
第四节 胃肠解痉及胃动力药	(621)
第五节 泻药、止泻药	(635)
第六节 肝病辅助治疗药	(644)
第七节 利胆药	(662)
第八节 其他消化系统药物	(672)
第十五章 循环系统药物	(682)

第一节 强心药	(682)
第二节 抗心律失常药	(687)
第三节 利尿降压药	(695)
第四节 钙拮抗药	(696)
第五节 作用于 α 受体的药物	(715)
第六节 其他血管舒张药	(718)
第七节 血管紧张素转换酶抑制药	(723)
第八节 血管紧张素II受体拮抗药	(731)
第九节 抗心绞痛药	(738)
第十节 调血脂药	(741)
第十一节 抗休克血管活性药	(751)
第十六章 泌尿系统药物	(765)
第一节 利尿药	(765)
第二节 脱水药	(771)
第三节 前列腺疾病用药	(772)
第四节 其他	(779)
第十七章 血液系统药物	(781)
第一节 止血药	(781)
第二节 抗凝血药	(794)
第三节 溶栓药	(799)
第四节 血浆及血容量扩充药	(803)
第五节 抗贫血药	(807)
第六节 升白细胞药	(815)
第七节 抗血小板聚集药	(822)
第十八章 调节水、电解质及酸碱平衡药物	(830)
第十九章 皮肤科外用药物	(840)
第一节 抗感染药	(840)
第二节 角质促成剂及溶解药	(850)
第三节 肾上腺皮质激素类药物	(852)
第四节 其他	(858)
第二十章 眼科用药	(873)
第一节 抗感染药	(873)
第二节 抗青光眼药	(876)
第三节 肾上腺皮质激素类药物	(885)
第四节 其他	(886)
第二十一章 耳鼻喉科用药	(909)
第二十二章 口腔科用药	(919)
第二十三章 妇产科用药	(923)
第一节 子宫收缩药	(923)

(288)	第二节 其他	(926)
(289)	第二十四章 解毒药	(936)
(290)	第一节 重金属、类金属中毒解毒药	(936)
(291)	第二节 氰化物中毒解毒药	(943)
(292)	第三节 有机磷酸酯类解毒药	(945)
(293)	第四节 其他解毒药	(947)
(294)	第二十五章 诊断用药物	(957)
(295)	第二十六章 生物制品	(977)
(296)	第二篇 医院药学部职位说明与职责	(984)
(297)	第三篇 医院药学部工作制度	(1014)
(298)	第四篇 医院药学部工作流程	(1041)
(299)	附 录	(1062)
(300)	1. 卫生部关于印发处方常用药品通用名目录的通知	(1063)
(301)	2. 处方管理办法	(1064)
(302)	3. 药品不良反应报告和监测管理办法	(1073)
(303)	4. 药物非临床研究质量管理规范	(1083)
(304)	5. 医疗机构药事管理暂行规定	(1088)
(305)	6. 医疗机构制剂配制质量管理规范	(1092)
(306)	7. 卫生部、国家计委、国家经贸委、国家药品监督管理局、国家中医药管理局、国务院纠风办 关于印发《医疗机构药品集中采购工作规范(试行)》的通知	(1097)
(307)	8. 中华人民共和国药品管理法中华人民共和国药品管理法实施条例	(1108)
(308)	9. 医疗机构麻醉药品、一类精神药品供应管理办法	(1126)
(309)	10. 药品生产质量管理规范	(1132)
(310)	11. 麻醉药品管理办法	(1146)
(311)	12. 精神药品管理办法	(1149)
(312)		章八十一第
(313)		章一第
(314)		章二第
(315)		章三第
(316)		章四第
(317)		章十二第
(318)		章一第
(319)		章二第
(320)		章三第
(321)		章四第
(322)		章一十二第
(323)		章二十二第
(324)		章三十二第
(325)		章一第

第十三章 呼吸系统药物

第一节 祛痰药

- 575 氯化铵 Ammonium Chloride
- 576 溴己新 Bromhexine
- 577 氨溴索 Ambroxol
- 578 糜蛋白酶 Chymotrypsin
- 579 羧甲司坦 Carbocisteine
- 580 标准桃金娘油 Myrtol Standardized

编 号	药品通用名称		
575	药品中文名称		药品英文名称
	氯化铵		Ammonium Chloride
商 品 名	硃砂、硃砂		
异 名	氯化铵, Salmiac, Amchlor		
类 别	呼吸系统药物	祛痰药	
制剂规格	片剂:0.3g		
适 应 症	用于粘痰不易咳出者。常与其他镇咳祛痰药配合成复方制剂应用,还用碱血症和酸化尿液。		
用法用量	成人常用量:口服祛痰,一次 0.3~0.6g,一日 3 次。儿童每日 30~60mg/kg,利尿:口服,每次 0.6~2g,每日 2~3 次。		
不良反应	可引起恶心、呕吐、胃痛等刺激症状及高氯性酸中毒。		
注意事项	①用药 7 天,症状未缓解,应立即就医。②肝肾功能异常者及老年患者慎用。③孕妇、哺乳期妇女及消化性溃疡患者应在医师指导下使用。④如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。⑤对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。⑥本品性状发生改变时禁止使用。⑦请将本品放在儿童不能接触的地方。⑧如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。		
禁 忌 症	①肝肾功能严重损害,尤其是肝昏迷、肾功能衰竭、尿毒症者禁用。②镰状细胞贫血患者及代谢性酸中毒患者禁用。		
备 注			

编 号	药品通用名称		
576	药品中文名称	药品英文名称	
	溴己新	Bromhexine	
商 品 名	必嗽平(片、注射剂),赛维(盐酸)(葡萄糖)(注射剂),必消痰		
异 名	溴己胺,必消痰,溴苄环己胺,盐酸溴环己胺,Bisolvon		
类 别	呼吸系统药物	祛痰药	
制剂规格	片剂:8mg;针剂:4mg:2ml		
适 应 症	本品主要用于慢性支气管炎、哮喘等引起的粘痰不易咳出的患者。		
用法用量	口服。成人,一次8~16mg,一日3次。 皮下注射、肌注、静注或静滴:每次4~8mg,每日1~2次。 雾化吸入:0.2%溶液,每次2mg,每日1~3次。		
不良反应	偶有恶心、胃部不适。可能使血清转氨酶暂时升高。		
注意事项	①本品对胃肠道黏膜有刺激性,胃炎或胃溃疡患者慎用。②肝功能不全患者应在医师指导下使用。③本品性状发生改变时禁止使用。④请将本品放在儿童不能接触的地方。⑤儿童必须在成人监护下使用。⑥如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。		
禁 忌 症	对本品过敏者禁用,过敏体质者禁用。		
备 注			

编 号	药品通用名称	
577	药品中文名称	药品英文名称
	氨溴索	Ambroxol
商 品 名	长效痰易净(缓释胶囊),润津(盐酸)(片),美舒咳(片),痰之保克(片),沐舒坦(盐酸)(片、糖浆、注射剂),沐舒痧(片),兰勃素(缓释胶囊),立确坦(盐酸)(注射剂),美斯可(片),安普索(盐酸)(片),奥勃抒(缓释胶囊),百沫舒(缓释胶囊),乐舒痰(片、口服液),奥舒灵(微胶囊),乐舒凡(口服液),双倡(盐酸)(片),百沫舒(缓释胶囊),安普索(片),瑞田(盐酸)(口服溶液),贝莱(盐酸)(片、口服液),平坦(盐酸)(片),兰苏(盐酸)(片),维可莱(注射剂),菲得欣(盐酸)(葡萄糖)(注射剂)伊诺邻(盐酸)(注射剂),欣得生(盐酸)(注射剂),依诺邻(盐酸)(注射剂),考夫克(盐酸)(片),开顺(盐酸)(注射剂),耐邦(盐酸)(葡萄糖)(注射剂),美舒(盐酸)(注射剂),海天欣(盐酸)(葡萄糖)(注射剂)	

异 名	木舒痰,溴环己胺醇,氨溴醇,胺溴素,盐酸氨溴环醇,舒痰,安布索,Mu-cosolvan		
类 别	呼吸系统药物	祛痰药	
制剂规格	片剂: 30mg 针剂: 2ml:15mg		
适 应 症	适用于痰液粘稠而不易咳出者。		
用法用量	口服。成人,一次 1~2 片,一日 3 次,饭后服。 皮下注射: 15~20mg, 静注: 1.2~1.6mg/(kg·d), 2~3min 内缓慢静注。		
不良反应	*** 偶见皮疹、恶心、胃部不适、食欲缺乏、腹痛、腹泻。***		
注意事项	①孕妇及哺乳期妇女慎用。②儿童用量请咨询医师或药师。③应避免与中枢性镇咳药(如右美沙芬等)同时使用,以免稀化的痰液堵塞气道。④本品为一种粘液调节剂,仅对咳痰症状有一定作用,在使用时应注意咳嗽、咳痰的原因,如使用 7 日后未见好转,应及时就医。⑤如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。⑥对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。⑦本品性状发生改变时禁止使用。⑧请将本品放在儿童不能接触的地方。⑨儿童必须在成人监护下使用。⑩如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。⑪胃溃疡患者慎用。		
禁 忌 症	对本品过敏者禁用。		
备 注			

编 号	药品通用名称	
578	药品中文名称	药品英文名称
	糜蛋白酶	Chymotrypsin
商 品 名	2-糜蛋白酶	
异 名	胰凝乳蛋白酶, Alpha-Chymar, Avazyme	
类 别	呼吸系统药物	祛痰药
制剂规格	针剂: 800 单位; 4000 单位。	
适 应 症	用于治疗创面的炎性水肿、炎性粘连、血肿、溃疡等。	

用法用量	以生理盐水 5ml 溶解本品 4000 单位,肌肉注射、亦可湿敷,喷雾吸入(配成 0.5mg/ml 浓度,每次 5mg)
不良反应	①本品不可供静脉注射。②注射局部有疼痛,有的且可引起局部红肿,停药后自行消退。③个别有荨麻疹、轻度恶心、头晕等反应。过敏体质者慎用。
注意事项	①不满 20 岁的眼病患者或玻璃体液不固定的创伤性白内障患者忌用,因可导致玻璃体丧失。②如引起过敏反应,应立即停用,并用抗组织胺类药物治疗。③本品水溶液极不稳定,必须临用前现配。④用前需作过敏试验。
禁忌症	禁用于严重肝脏疾患及血凝功能不正常的患者。
备 注	

编 号	药品通用名称		
579	药品中文名称	药品英文名称	
	羧甲司坦	Carbocisteine	
商 品 名	美咳(片),化痰(片),强利痰灵(片),金立爽(片),羧甲基半胱氨酸(片),百越(泡腾片),霸灵(片、口服液),佳勃斯(口服液),康普利(泡腾片),卡立宁(颗粒剂),利灵		
异 名	羧甲半胱氨酸,强利灵,利灵,S—CarbomethylcysteineS S—CMC, Mucodyne, Carbocysteine, Loviscol, Carboxymethylcysteine		
类 别	呼吸系统药物	祛痰药	
制剂规格	片剂:0.25g 口服液:2%10ml,5%10ml,10ml:0.5g,10ml:0.5g		
适 应 症	用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。		
用法用量	口服:成人每次 0.25g,一日三次;儿童按体重一次 30mg/kg,一日 3 次,或遵医嘱。		
不良反应	可见恶心、胃部不适、腹泻、轻度头痛以及皮疹等。		
注意事项	①用药 7 日后,如症状未缓解,应立即就医。②有消化道溃疡史者慎用。③2 岁以下儿童用量请咨询医师或药师。④孕妇、哺乳期妇女慎用。⑤对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。⑥本品性状发生改变时禁止使用。⑦请将本品放在儿童不能接触的地方。⑧儿童必须在成人监护下使用。⑨如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。⑩服用本品时,应避免同时应用强镇咳药,以免稀化的痰液堵塞呼吸道。		

禁 忌 症	消化道溃疡活动期患者禁用。		号 数
备 注	药品中文名称	药品英文名称	

编 号	药品通用名称		各 品 商
580	药品中文名称	药品英文名称	
	标准桃金娘油	Myrtol Standardized	
商 品 名	桃金娘油,吉诺通		剂 型
异 名	桃金娘烯醇,强力稀化粘素		注 意 事 项
类 别	呼吸系统药物	祛痰药	
制剂规格	胶囊:120mg,300mg		
适 应 症	急慢性鼻窦炎和支气管炎,也适用于支气管扩张、慢性阻塞性肺疾患、肺部真菌感染、肺结核、矽肺,可在支气管造影术后使用,以利于造影剂的排出。		
用法用量	急性病成人 300mg,3~4 次/日。慢性病 300mg,2 次/日。急性病 4~10 岁儿童 120mg,3~4 次/日。慢性病 120mg,2 次/日。		
不良反应	个别患者偶见胃肠道不适。		
注意事项			
禁 忌 症			重 要 注 意 事 项
备 注			

第二节 镇咳药

581	可待因	Codeine	
582	复方甘草	Compound Liquorice (Brown's Mixture)	
583	喷托维林	Pentoxyverine	
584	阿桔片	Compound Platycodon	
585	苯丙哌林	Benproperine	
586	二氧丙嗪	Dioxopromethazine	
587	右美沙芬	Dextromethorphan	

编 号	药品通用名称		剂 型
581	药品中文名称	药品英文名称	
	可待因	Codeine	
商 品 名	尼柯康(磷酸)(缓释片)		号 数
异 名	基吗啡, Morphine Methylether, Paveral		
类 别	呼吸系统药物	祛痰药	080
制剂规格	缓释片:15mg,30mg		分 品 商
适 应 症	①镇咳,用于较剧的频繁干咳,如痰液量较多宜并用祛痰药;②镇痛,用于中度以上的疼痛;③镇静,用于局麻或全麻时。		
用法用量	成人常用量:口服,一次 15~30mg,一日 30~90mg;极量:口服一次 100mg,一日 250mg。		
不良 反 应	1. 较多见的不良反应有:① 心理变态或幻想;② 呼吸微弱、缓慢或不规则;③ 心率或快或慢、异常。 2. 少见的不良反应:① 惊厥、耳鸣、震颤或不能自控的肌肉运动等;② 荨麻疹;瘙痒、皮疹或脸肿等过敏反应;③ 精神抑郁和肌肉强直等。 3. 长期应用可引起依赖性。常用量引起依赖性的倾向较其他吗啡类药为弱。典型的症状为:鸡皮疙瘩、食欲减退、腹泻、牙痛、恶心呕吐、流涕、寒颤、打喷嚏、打呵欠、睡眠障碍、胃痉挛、多汗、衰弱无力、心率增速、情绪激动或原因不明的发热。		
注 意 事 项	下列情况应慎用:①支气管哮喘;②急腹症,在诊断未明确时,可能因掩盖真象造成误诊;③胆结石,可引起胆管痉挛;④原因不明的腹泻,可使肠道蠕动减弱、减轻腹泻症状而误诊;⑤颅脑外伤或颅内病变,本品可引起瞳孔变小,模糊临床体征;⑥前列腺肥大病,因本品易引起尿潴留而加重病情。⑦重复给药可产生耐药性,久用有成瘾性。		
禁 忌 症	对本品过敏的患者禁用。		
备 注			

编 号	药品通用名称	
582	药品中文名称	药品英文名称
	复方甘草	Compound Liquorice (Brown's Mixture)

商品名	布朗合剂		止咳药
异名	棕色合剂, BM		
类别	呼吸系统药物	镇咳药	
制剂规格	每片含:甘草浸膏粉、阿片粉、樟脑、八角茴香油。 溶液:100ml		
适应症	用于镇咳祛痰。		
用法用量	口服或含化。成人一次 3~4 片,一日 3 次。 口服液成人每次 10ml,每日 3 次,小儿每次 1ml,每日 3~4 次。不饮水服用,疗效更佳。		
不良反应	有轻微的恶心、呕吐反应。		
注意事项	①本品不宜长期服用,如服用 3~7 天症状未缓解,请及时咨询医师。②儿童用量请咨询医师或药师。③当本品性状发生改变时禁用。④如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。⑤儿童必须在成人监护下使用。⑥请将此药品放在儿童不能接触的地方。		
禁忌症	①对本品成份过敏者禁用。②孕妇及哺乳期妇女慎用。③胃炎及胃溃疡患者慎用。		
备注			

编号	药品通用名称	
583	药品中文名称	药品英文名称
	喷托维林	Pentoxyverine
商品名	咳必清(片),鲁明贝宁(枸橼酸)(片)	
异名	托可拉斯, 枸橼酸维静宁, 托可拉斯, 维静宁 Toclase, Carbetapentaner Citrate, Atussil, Fustpentan, Carbetane	
类别	呼吸系统药物	镇咳药
制剂规格	片剂:25mg	
适应症	适用于各种原因引起的干咳。	
用法用量	①成人常用量:口服,一次 25mg,一日 3~4 次。②小儿常用量:口服,5 岁以上一次 6.25~12.5mg,一日 2~3 次。	