

果部中品

一種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

三種宋本先附注云宋附

一種今移

四種陳藏器餘

已上總一十七種

內四種今增圖

梅實葉根核仁烏梅白梅附

木瓜附檳櫚

柿蒂附

芋葉附

烏芋

茨菇剪刀草也自外經今移

枇杷葉附子

荔枝子附宋

乳柑子附宋

甘蔗音

石蜜乳糖也

少唐唐

梔音卑附宋

四種陳藏器餘

摩廚子

懸鈎

石都念子

鈎栗

本草彙精要卷之三十三

果部中品

果之木

梅實 無毒附烏梅白梅

植生

梅實 出神農本經 主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾

以上朱字神農

本止下痢好唾口乾 以上黑字名醫所錄

〔苗〕謹按木似杏而枝幹勁脆春初時開白花甚清馥花將謝而葉始生二月結實如豆味酸美人皆啖之五月採將熟大於

杏者以百草烟熏至黑色為烏梅以鹽淹暴乾者為白梅也

〔地〕〔圖經曰〕生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之〔道地〕鄂州今安吉為勝

〔時〕〔生〕春初開花二月結實〔採〕

五月〔收〕火乾〔用〕實

〔質〕類杏實〔色〕生青熟黃〔味〕酸〔性〕平

收〔氣〕氣之薄者陽中陰也〔臭〕香〔主〕生

止渴除冷熱痢

〔製〕去核用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉煮汁已休息痢○根除風痺○烏梅治傷寒煩熱及霍亂燥渴虛勞瘦羸產婦氣痢〔陶隱居云〕白梅點痣蝕惡肉〔唐本注云〕實利

筋脈去痹〔藥性論云〕核除煩熱〔日華子云〕實止渴○葉止霍亂○白梅傳刀箭所傷及刺在肉中○烏梅除勞及骨蒸去煩悶澀腸消酒毒并偏枯皮膚麻痺去黑點令人得睡〔陳藏器云〕烏梅消痰祛瘡

瘡調中止吐逆〔孟詵云〕大便不通氣奔欲死烏梅湯泡按去核杵丸如棗大內下部即通〔湯液本草云〕烏梅燒灰傳一切瘡肉及虻蟲

〔合治〕烏梅合建茶乾薑為丸止休息痢○合蜜為丸

石榴皮根湯下治〔禁〕傷寒下部生蠶瘡

服黃精不宜食○多啖傷骨蝕脾胃發熱損齒○梅根出土者不用○生食令人膈上熱

木瓜 無毒附模櫨

植生

木瓜實主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

名醫所錄

〔名〕櫨〔苗〕〔圖經

曰其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳味酢可食爾雅謂之櫟宣州人種時尤謹遍滿山谷始實成則鏤紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以充上貢焉又有一種櫟大枝可作杖策利筋脈又截其木乾之作桶以濯足尤益陶隱居云彼人以爲果最療轉筋如轉筋時但默呼其名及書木〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今山陰蘭〔時〕〔生〕春末開花〔收〕暴乾瓜字於患處即愈〔地〕亭尤多處處有之〔道地〕宣城爲佳〔時〕〔採〕秋取實〔收〕暴乾

〔用〕實〔質〕類模櫟子而葉有別〔色〕赤黃〔味〕酸〔性〕溫〔氣〕陽中之陰〔臭〕香〔主〕除脚氣去濕痹〔行〕

手足太陰經〔製〕雷公云凡使勿令犯鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日曬却陰經用黃牛乳汁拌蒸從已至未其木瓜如膏煎却於日薄攤曬乾用〔治〕實侑酒去痰○

根及葉煮湯淋足脛止蹶陶隱居云凡轉筋呼木瓜及書二字於患處即愈日華子云木瓜止吐瀉賁狹及水腫冷熱痢心腹痛消渴嘔逆心膈痰唾○根及實除脚氣○櫟櫟消痰解酒毒及咽酸浸油梳

頭治髮赤并白〔陳藏器云〕木瓜下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止○櫟櫟去惡心止心中酸水水痢止酒痰水〔衍義曰〕木瓜入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力不可缺〔合治〕煮酒

瓜爛研裹〔禁〕櫟櫟不可多食損齒及骨〔解〕櫟櫟解〔質〕和圓子蔓子膝筋急痛〔禁〕食損齒及骨〔解〕酒毒〔質〕土伏子爲僞

柿無毒

植生

柿主通鼻耳氣腸癖不足名醫〔名〕牛妳柿紅柿朱柿牛心柿蒸〔苗〕〔圖經曰〕三丈春敷青葉類梨葉而圓大夏開青白花其實結於花心至秋漸大而熟柿之種類甚多黃柿生近京

州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘珍樺音也柿出宜欽荆襄閩廣諸州但可生噉不堪乾也諸柿食之皆美而益人其乾柿火乾者謂之烏柿出宣州越州性甚溫日乾者謂之白柿入藥微

冷又有一種小柿謂之輓棗俚俗暴乾貨之謂之牛妳柿其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柿有七絕

一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥大〔衍義曰〕柿有著蓋柿於蒂下別生一種又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今市賣之蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深紅色又一種塔

柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰極甘故也去皮掛大木株上使風日中自乾食之動風火乾者味不佳生則澀以溫水養之需澀去可食逮至自然紅爛澀亦自去乾則性平〔地〕

〔圖經曰〕舊不著所出州土今近京州郡及華山宣州越州南北皆有之

〔時〕
〔生〕春生葉
〔採〕秋熟取

實
〔收〕
火暴
乾乾

〔用實〕

〔色〕
黃紅

〔味〕甘

〔性〕寒 〔氣〕薄味厚 〔臭〕香

〔主〕止吐血
厚腸胃
〔製〕

火熏并
泰乾用
〔治〕

〔療〕〔日華子云〕潤心肺止渴
瀉腸療肺痿心熱嗽消痰開胃

○乾柿潤聲喉。殺蟲〔陳藏器云〕多食去面。肝除腹中宿血。○帶止噦氣〔唐本注云〕火柿金瘡火瘡生肉止痛。○慳熟柿止口乾。壓胃間熱〔孟詵云〕乾柿消宿血〔補〕〔孟詵云〕乾柿虛勞不足健脾胃氣。○

紅柿續經脈氣〔合治〕黃柿合米粉作糗食小兒止痢○乾柿合酥蜜煎食治脾胃薄食○木皮搗末合米飲和服治下血不止亦止上衝下脫者〔禁〕牛妳柿性冷不可多食○凡食

柿不可與蟹同食
〔解〕酒毒
令人腹痛大瀉

1

果之草

芋有毒

叢生

芋主寬腸胃充肌膚滑中

名醫錄所

八名

芋土芝

蓮
禪
芋
白
芋

莒青莒

于真
紫芋

「苗」

圖經

白葉山藥

而如荷葉而圓其種

類雖多大抵性効相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鴟謂之芋魁三年不採者謂之莒彼人蒔之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鴟之沃則以爲濟世陽丸是也江西閩中出者形長而大葉

皆相類甚細者如雞卵生于大魁傍食之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須園圃蒔者爲佳其野芋生溪澗非人所種者根葉亦相類不堪食也〔唐本注云〕此有六種有青芋紫芋眞芋白芋連禪芋野

芋其青芋毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋真芋連禪芋紫芋毒少蒸煮噉之兼肉作羹亦佳蹲鴟之饒蓋此謂也野芋有大毒而不可噉〔衍義曰〕江浙二川者最大而長京洛者差圓而小惟東

西京者佳他處味不及也當心出苗者爲芋頭四邊附芋頭而生者爲芋子八九月已後可食至時掘出置十數日陸以好土勾埋至春猶好生則味辛而涎多過食亦能滯氣困脾也〔地〕〔圖經〕

塘最多閩蜀淮甸尤殖今處處有之〔衍義曰〕江浙川廣最佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月已後取根〔收〕曬乾〔用〕根〔色〕紫青〔味〕辛〔性〕

平散〔氣〕氣之薄者〔臭〕朽〔主〕煩熱〔製〕蒸煮熟爛可食〔治〕〔療〕〔日華子云〕芋破宿血去死肌○葉止瀉及妊孕心煩迷悶胎動不安〔陳藏

器云小者開胃及腸閉產後煮食破血及飲汁止血渴〔孟詵云〕〔合治〕野芋合醋摩傳蟲瘡疥癬紫色者破氣作湯浴去身上浮風〔補〕〔陳藏器云〕食之令人肥白〔合治〕野芋合生薑并魚煮食下氣調中補虛○芋葉合鹽研傳〔禁〕久食令人虛勞無力滯氣困脾冬月宜食他時〔解〕中野芋蛇蟲咬并癰腫毒及暑傳箭毒〔禁〕月不可食○野芋有大毒不可輒食食則殺人〔解〕毒惟土漿及糞汁解之

烏芋無毒

叢生

烏芋主消渴痺熱温中益氣

名醫所錄

〔名〕

藉姑烏荑

水萍芍下子切

〔苗〕

〔圖經曰〕烏芋今烏荑也苗似龍鬚而細正青色根黑如

指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中生人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不饑爾雅所謂之芍是也〔衍義曰〕今人謂之勃臍皮厚色黑肉硬白者謂之豬勃臍皮薄色澤淡紫肉軟者謂之羊勃臍此二種藥中罕用荒歲人多採以充糧也〔地〕〔圖經曰〕處處水田中皆有之〔時〕三月三日十月取〔收〕暴乾〔用〕根〔色〕紫

〔味〕甘

〔性〕微寒

〔氣〕氣薄味厚

〔臭〕香

〔主〕清胃熱

〔製〕生用或

〔治〕毒除胸中實熱氣可

作粉食明耳目〔日華子云〕治黃疸開胃下

〔禁〕患冷氣人不可生食食之令腹

脹氣滿小兒秋食臍下當痛

〔解〕丹石

毒

〔解〕丹石

毒

食服金石藥人食之良〔丹溪云〕下石淋

〔禁〕患冷氣人不可生食食之令腹

脹氣滿小兒秋食臍下當痛

〔解〕丹石

毒

〔解〕丹石

毒

毒

毒

茨菇有毒一云無毒

泥生

茨菇主百毒產後血悶攻心欲死產難胎衣不出搗汁一升服之○莖葉搗爛如

泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便

消退甚効

名醫所錄

〔名〕

白地栗芽剪刀草

薺尾草

〔苗〕

〔圖經曰〕葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜

苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽一兩莖

莖上分枝開小白花四瓣葉深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑人採

煮食之味甘美而無毒也福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

〔地〕

〔圖經曰〕生江

湖及京東近水

煮食之味甘美而無毒也福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

煮食之味甘美而無毒也福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

河溝田中今〔時〕〔生〕春生苗〔採〕正二月〔收〕暴乾〔用〕根及莖葉〔質〕類芋而小〔色〕白〔味〕苦

〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚〔臭〕香〔治〕〔療〕〔日華子云〕葉研傳蛇蟲咬〔禁〕不可多食發虛熱及腸風痔瘻崩中人患脚又發脚氣癱緩風損齒令人失顏色

皮肉乾燥卒食之令人嘔水孕婦亦不宜服

果之木

枇杷葉無毒

植生

枇杷葉主卒碗不止下氣名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕木高丈餘葉作驢耳形背有毛其木陰密婆娑

把賦云稟金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也〔地〕〔圖經曰〕襄漢吳蜀

其實作棣如彈丸黃色微有毛皮肉甚薄中核如小栗其性味與葉不同也〔性〕平〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕肺氣渴疾〔製〕雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三

洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡爲度剉碎或煮汁用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕葉和胃氣冷嘔噦不止〔日華子云〕葉

瘡〔圖經曰〕木白〔合治〕葉合木通款冬花紫苑杏仁桑白皮等分大黃減半〔禁〕去毛不淨射人

皮止嘔逆不下食〔爲末蜜丸含化療肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞

實久食發痰熱○子和熱炙肉及熱麵食患熱毒黃病

荔枝子無毒

植生

荔枝子主止渴益人顏色名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕木高二三丈自徑尺至於合抱頗類桂木冬青

之雞縷三四月結實如松花之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月成熟其木大者子至百斛白暴荔枝并蜜煎荔枝肉俱爲上方之珍果白暴者不失其味其市者多用雜色荔枝入鹽梅暴之而皮深紅味亦少酸殊失本真又有焦核荔枝味更甜美或云是木生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥此木以荔枝爲名者以其結實時枝弱而蒂牢不可摘

有之〔道地〕〔時〕〔生〕〔冬〕〔採〕〔收〕〔用〕〔實核〕〔色〕〔赤〕〔味〕〔甘〕〔性〕〔平〕〔氣〕〔陽中之陰〕

〔臭〕〔香〕〔主〕〔生津止渴〕〔益氣駐顏〕〔治〕〔喉痹腫痛水煮含差〕〔補〕〔別錄云〕通神益智健氣悅顏色

〔治〕〔核火燬末合酒服〕〔禁〕〔多食發熱〕〔解〕〔食過多發熱者〕〔以蜜漿解之〕

乳柑子

無毒

植生

乳柑子主利腸胃中熱毒止暴渴利小便

名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕樹若橘樹其實亦類橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤

酸霜後甚甜故名柑子又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽痛餘者不甚用〔衍義曰〕乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各不同亦互

有緊慢者也

〔地〕〔圖經曰〕生嶺南及江

〔時〕〔生〕〔四月葉脫復〕〔收〕〔暴乾〕〔用〕〔皮〕〔質〕〔類橘而圓〕

〔色〕〔生青熟黃赤〕〔味〕〔甘〕〔性〕〔大寒〕〔氣〕〔氣之薄者〕〔臭〕〔香〕〔主〕〔清胃熱〕〔治〕〔療〕〔圖經曰〕

〔日華子云〕皮〔合治〕〔皮末合酒服療產後肌浮〕〔皮末合鹽水煎服治酒毒或醉昏悶煩渴〕〔禁〕〔多食令人脾冷發痼癖大腸洩多作湯消酒渴〕〔人食其肉多致臟寒或洩利發陰汗〕〔解〕〔丹石毒〕

果之草

甘蔗無毒

叢生

甘蔗主下氣和中助脾氣利大腸

名醫所錄

〔名〕崑崙蔗 荻蔗 竹蔗

〔苗〕

〔圖經曰〕此有二種一種似荻節疎而細短者謂荻蔗一

種似竹麻長者謂之竹蔗又廣州出一種數年生皆如大竹長丈餘今江澤閩廣蜀川所生大者亦高丈許人取竿汁以爲沙糖是也〔陶隱居云〕蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南爲勝並煎爲沙糖今江東甚多而劣於蜀者味亦甘美

〔地〕

〔圖經曰〕出江東爲勝廬陵亦有

〔時〕

〔生〕春生苗〔採〕八月九月取莖

〔用〕莖

〔色〕赤

〔味〕甘

〔性〕平

〔氣〕氣厚於味

〔臭〕香

〔主〕除熱

〔治〕

〔療〕〔日華子云〕利大小腸下氣痼消痰除心煩熱〔別

錄云〕擣汁服主發熱口乾小便澀〔補〕〔日華子云〕補脾益氣

〔合治〕擣汁七升合生薑汁一升相和爲三服主胃反朝食暮吐暮食朝吐或旋旋吐者

〔禁〕不可共酒

痰〔解〕酒毒

石蜜無毒

煎鍊成

石蜜主心腹熱脹口乾渴性冷利

名醫所錄

〔名〕

捻糖乳糖

〔地〕

〔圖經曰〕此卽乳糖也鍊沙糖和牛乳爲之可作餅塊〔唐本注云〕

用水牛乳米粉乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀人云用牛乳汁和沙糖煎之作餅堅重此與蟲部石蜜同名而異類也〔孟詵云〕波斯國來者良東吳亦有此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳〔衍義曰〕川浙最佳其味厚其他次之煎鍊成以銅象物達遠至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黃白色者謂之捻糖易消化入藥至少

〔收〕包裏勿令見風

〔色〕黃

〔味〕甘

〔性〕寒

〔氣〕氣之薄者

〔臭〕香

〔主〕生津

〔治〕

〔療〕〔孟詵云〕目中熱膜明目

〔陶隱居云〕去熱止渴

〔合治〕

合棗肉巨勝子末爲丸含之潤肺氣助五臟津液

沙糖無毒

沙糖主心腹熱脹口乾渴功體與石蜜同而冷利過之名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出蜀地

有荻蔗竹蔗於經霜後人取竹蔗管其汁以爲沙糖今泉福吉廣州多作之荻蔗惟蜀川煎作稀糖亦堪

嗽商人所貨者其糖多以荻蔗爲之而竹蔗者少也〔衍義曰〕沙糖次於石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫黑色

今醫家治暴熱多以此物爲先導小兒多食則損齒土制水也及生蠅蟲裸蟲屬土故因甘遂生〔收〕貯之〔色〕紫〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕薄者

陽中〔臭〕香〔主〕心熱〔製〕去葉用箬取汁煎〔治〕〔療〕〔日華子云〕潤心肺殺蟲之陰〔臭〕香〔主〕口渴〔製〕鍊成糖去滓用〔衍義曰〕退心肺大腸熱及暴熱〔合治〕

白糖合酒煮〔禁〕多食令人心痛生蟲消肌肉損齒發疳蠱不宜與鯽魚同食成服治腹緊〔禁〕疳蟲與葵同食生流癖與笋同食使笋不消成癥身重不能行履〔解〕酒毒

果之木 梔杣無毒 植生

梔杣主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中去胃中熱名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕

黑閑居賦云梁侯烏杣之杣是也但可生噉不堪乾用諸杣食之皆美而益人惟杣杣更壓丹石毒爾然其性冷復甚於杣故散石家熱噉之亦無嫌不入藥用惟可作漆甚妙

〔地〕〔圖經曰〕生江淮南及宣歙〔時〕〔生〕春生葉〔用〕實〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕薄者〔臭〕朽荆襄閩廣諸州〔時〕〔採〕十月取實

〔主〕清胃熱〔治〕〔療〕〔日華子云〕止渴潤心肺除腹臍冷熱〔忌〕不宜與蟹同食令〔解〕壓丹消酒毒

四種陳藏器餘

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患

痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒

毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒爲末服之亦主喉中塞也○鈎栗味甘平主不饑厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不饑生高山子小圓黑又有櫛音諸子小於橡子味苦澀止瀉痢破血食之不饑令健行木皮葉煮取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也○石都念子味酸小溫無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬爲粉甘美益人隋朝植於西苑也○摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五臟久服令人肥健生西域及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩廚生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香穉射可以煎熬彼州之人仰以爲儲斯調國名也○海藥云謹按異物志云生西域三月開花四月五月結

實如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也

本草品彙精要卷之三十三

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

三種神農本草經

朱字

五種名醫別錄

黑字

一十種宋本先附

注云宋附

七種今補

一種今移

四種陳藏器餘

已上總三十種

桃核仁

花鳥毛蠹皮葉膠實等附

杏核仁

花附

安石榴

根殼附

梨

鹿梨鵝梨消梨附

林檎

宋附

李核仁

根皮附

楊梅

宋附

胡桃

宋附樹皮附

獼猴桃

宋附

海松子

宋附

柰

菴羅果

宋附

橄欖

音覽宋附核中仁附

楡梲

宋附

榛子

宋附

龍眼自木部
今移

椰子皮宋附漿等附
自木部今移

榧實自木部
今移

香圓補今

馬檳榔補今

平波補今

八檐仁補今

銀杏補今

株子補今

必思答補今

棠毬子自外經
今移

四種陳藏器餘

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

本草品彙精要卷之二十四

果部下品

果之木

桃核仁無毒

植生

桃核仁

出神農本經

主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲○桃花殺疰惡鬼令人好顏色○

桃鳧微溫主殺百鬼精物○桃毛主下血瘕寒熱積聚無子○桃蠹殺鬼邪惡不

祥

以上朱字神農本經

桃核仁止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止痛○

桃花味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面○桃鳧味苦療

中惡腹痛殺精魅五毒不祥○桃毛平帶下諸疾破堅閉刮取毛用之○桃蠹食

桃樹蟲也○莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○葉味苦辛平無

毒主除尸蟲出瘡中蟲○膠鍊之主保中不饑忍風寒

以上黑字名醫所錄

〔名〕

崑崙桃山桃

油桃金桃

餅子桃〔桃鳧〕

〔用〕

〔圖經曰〕木高丈餘三月開紅花有深淺二色漸敷青葉如柳葉而大花謝始結實漸大如杏六七月成熟圃人欲其肥美詭異多以他木接之殊失本性此

種不宜用也入藥當以自然生成而不經接者則不失本性而治療有功也其實已乾着木上經冬不落此名桃鳧又名桃奴正月採之以中實者良〔衍義曰〕桃核仁桃品亦多京畿有油桃光小於衆桃不益脾有小點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅

子如此數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者（雷公云）用鬼燭體勿用乾桃子其鬼燭體只是千葉桃花結子在樹上乾不落者於十一月內探得可爲神妙（東京賦云）上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以草（地）（圖經曰）生泰山川谷今處處有（時）索而飼虎今人作桃符板云左神荼右鬱壘者是也（道地）東京及陝西出者佳

〔生〕三月開花〔採〕正月取〔收〕陰乾〔用〕仁花龜毛蠶莖〔質〕類杏仁〔色〕皮黃〔味〕甘〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣〔臭〕微香〔主〕破血殺蟲〔行〕足厥陰經〔製〕（雷公云）凡使須擇去皮用白朮烏

緩〔氣〕陰中之陽〔治〕時後漉出用手擘作兩片其心黃如金色任用〔療〕（圖經曰）桃花貼面上瘡黃水出并眼瘡○桃梟除中惡毒氣蠱疰

忤○花主下惡氣消腫滿利大小腸（藥性論云）桃符主中惡（孟詵云）桃仁殺三蟲止心痛○葉治女人陰中生瘡如蟲齧疼痛者可生搗綿裏內陰中日三四易瘥○花曬乾杵末以水服二錢匕小兒半錢

治心腹痛○白毛及膠主惡鬼邪氣○桃符及奴主精魅邪氣（日華子云）樹上自乾桃實治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血○葉治惡氣小兒寒熱客忤（別錄云）桃膠如彈丸含之治虛熱渴○桃葉治腸痔大

腸常下血杵取一斛蒸之內小口器中以下部搗上坐蟲自出○桃枝上乾不落桃子燒灰水服療胎下血不出○桃葉治諸蟲入耳熱按塞兩耳即出○桃白皮治狂狗咬人以一握水煎服○桃樹蟲屎治瘰

病令不相染爲末水服方寸匕○東行桃枝煮湯浴治天行時疫癘者○東引桃枝白皮一握水煮服半升主鬼疰心腹痛不可忍○燒桃仁傅治產後陰腫痛（補）（日華子云）桃益色○桃蠶食之肥悅人顏

色（別錄云）戊子日取東引桃枝二（合治）桃花漬酒飲之除百病益顏色○桃仁去皮尖合粳米煮寸枕之補心虛治健忘令耳目聰明

煮汁煮粥空心食之主尸疰鬼氣咳嗽痰癰注氣血氣不通日漸消瘦○桃仁一升去皮尖炒令煙出熱研如脂膏合酒三升攪令相和服取汗療風勞毒腫痛攣痛或牽引小腹及腰痛不過三瘥○桃仁三

十枚別研合蠶蟲三十枚去翅水蛭二十枚各炒以大黃一兩同爲末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆大桃仁湯下療傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血者利下瘀血惡物便愈未利再服○

收未開花陰乾與桑椹紫者等分作末以猪脂和先取灰汁洗去瘡痂即塗藥治瘡瘡

〔禁〕實味酸多食令人有熱

杏核仁

植生