



2008

卫生专业技术资格考试辅导丛书

妇产科主治医师资格考试

历年考题纵览 与 应试题库

(第二版)

主 编 秦 俭 卢瑜群 苏梅香

FUCHANKE ZHUZHI YISHI
ZIGE KAOSHI
LINIAN KAOTI ZONGLAN
YU YINGSHI TIKU



军事医学科学出版社

3
卫生专业技术资格考试辅导丛书——

2008 妇产科主治医师资格考试 历年考题纵览与应试题库

(第二版)

主 编 秦 俭 卢瑜群 苏梅香

副主编 刘文萃 韩吉晶 王雪莹

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

内容提要

本书以历年考试试题为模版,结合历年考生的应考经验和教训,以题库的形式(含往年真题)覆盖妇科主治医师资格考试大纲全部考核知识点,帮助考生在短时间内达到考核要求。模拟试题尽量接近真题风格,达到仿真练习的效果。

图书在版编目(CIP)数据

妇产科主治医师资格考试历年考题纵览与应试题库/秦俭,卢瑜群,苏梅香主编.

—北京:军事医学科学出版社,2008.1

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-80245-022-6

I. 妇… II. ①秦… ②卢… ③苏…

III. ①妇科学—医师—资格考核—习题 ②产科学—医师—资格考核—习题

IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 197839 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,86702315,86702759,

86703183,86702802

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:三河佳星印装有限公司

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:16.5

字 数:463 千字

版 次:2008 年 1 月第 1 版

印 次:2008 年 1 月第 1 次

定 价:30.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换。

致 考 生

2008年卫生专业技术资格考试考试大纲和题型虽然不会变化,但是难度肯定有所加大,专家预计2008年考试通过率仍然不足40%。这不禁使考生朋友们忧心忡忡。如何高效率地全面复习,如何掌握考试技巧,如何在短时间内熟悉考试题型、难度,是考试成败的关键。以下是编者对考生朋友们提出的几点建议,希望能对你们应考有所帮助。

一、高效率全面复习

卫生资格考试为全国统一题库,考试内容繁多,灵活性强。许多考生复习不够全面,仓促应战,结果兵败如山倒。那么应该怎样全面复习呢?

1. 制定学习计划:充足的复习时间是全面复习的首要保证,制定好的学习计划要严格执行。不要临考之前一个月才拿起书本临阵磨枪。

2. 注重基础:基础知识也要下功夫,包括药理、微生物、生理、病理等知识不能忽略。

3. 参考书选择:不能只复习《指导》,应该认真研读规划本硕连读教材和本专业权威参考书,如外科的《黄家驷外科学》,内科的《实用内科学》。

4. 多做习题:但要切忌四处乱找题。本书题库覆盖全面,是在对历年考题总结、分析、整理基础上编写的,对考生掌握命题规律十分有益。

5. 搜集信息:往年考生对于考试都有许多宝贵的经验和教训,他们对于难度、考点掌握得比较清楚,也有成功经验可以借鉴。网上也有很多这种应考的评论和经验的帖子,相互交流、信息共享对于考生是非常有帮助的。

二、熟悉人机对话考试

2008年起卫生专业资格考试扩大了人机对话考试的范围,全科医学、临床专业(专业代码为026至084)以及中药学初级(士)、初级(师)、中级(专业代码分别为002、014、091)、中医护理学初级(师)、中级(专业代码分别为016、098)的各专业“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“专业实践能力”4个科目的考试,均改用人机对话的方式进行。人机对话要求考生要有一定的计算机操作基础。熟悉人机对话的考试形式对考生水平发挥有着重要影响。

与传统的笔试不同的是,在人机对话考试中的某些特定情况下,考生作答操作是“不可逆”的。在进行“专业知识”科目考试时,在某一题型(如“单选题”)的测试过程中,考生是可以随时查看、修改此题型内任何一题的选择答案的,而一旦确认完成作答,进入新的题型时(如结束“单选题”,进入“多选题”),考生将不能退回到前一测试题型(“单选题”)进行查看和修改答案。在进行“专业实践能力”科目考试时,针对每道案例分析题,只有完成前一个问题才能看到下一问题,并且在确定进入下一问题后是无法对前面问题的作答进行查看和修改的(如当确认完成“第1问”,进入“第2问”后,考生无法查看或修改其“第1问”的选择)。这种

情况下,控制答题速度和掌握时间十分重要,既要认真、慎重,又不能在疑难问题上纠缠过多的时间。在人机对话考试整个过程中,计算机屏幕下方会显示答题进度和考试剩余时间,方便考生参考。

另外,网上可以找到人机对话机房模拟版软件,考生可下载自行练习。

三、掌握题型、难度和考核要求

(一) A1 型题(单句型最佳选择题)

每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择,称为正确答案,其余四个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确,相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义,在答题时,应当找出最佳的或最恰当的备选答案,排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

例1:能固定宫颈,并保持子宫不向下脱垂的主要结构为

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 骶骨韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

参考答案:C

(二) A2 型题(病历摘要型最佳选择题)

每道题由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和五个备选答案组成。

例2:初产妇孕足月临产10小时,ROA,胎心136次/分,宫口开大4cm,2小时后再次肛诊宫口扩张无进展,本例的诊断是

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延缓
- C. 活跃期阻滞
- D. 活跃晚期阻滞
- E. 第二产程停滞

参考答案:C

(三) A3 型题(病历组型最佳选择题)

每道题开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2~3个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。

例3:(共用题干)

初产妇,因第二产程延长,胎吸分娩,胎儿体重4000g,胎儿娩出后阴道持续出血,有凝血块。

(1)此时阴道出血原因最可能的是

- A. 产后宫缩乏力
- B. 软产道裂伤
- C. 胎盘剥离不全

D. 凝血功能障碍

E. 子宫破裂

参考答案:B

(2) 最适宜的处理是

A. 注射麦角新碱

B. 注射催产素

C. 配血, 输血

D. 开放静脉, 手取胎盘, 检查软产道

E. 仔细检查, 宫颈, 阴道, 有裂伤立即缝合

参考答案:D

(3) 产后 1 小时, 再次出血, BP 7.5/4 kPa (70/30 mmHg), 面色苍白, 出冷汗, 此时出血原因是

A. 胎盘剥离不全

B. 胎盘残留

C. 子宫收缩乏力

D. 凝血功能障碍

E. 软产道裂伤

参考答案:C

(四) A4 型题 (病历串型最佳选择题)

每道试题开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景, 然后提出 3~6 个相关的问题, 问题之间也是相互独立的, 每个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时, 可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息, 这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关, 又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

例 4. (共用题干)

女性, 24 岁, 半年前曾患乙型肝炎, 目前停经 49 天, 诊断为妊娠。检查: GPT 正常, HBsAg (+), HBeAg (+), 前来咨询乙型肝炎对妊娠和胎儿的影响

(1) 妊娠对肝功能的影响哪项是正确的

A. 妊娠期肝脏血液循环量增加

B. 妊娠期肝内糖原储备量减少

C. 妊娠期血清碱性磷酸酶增高

D. 妊娠晚期血清白蛋白增高

E. 血清胆固醇下降

参考答案:C

(2) 乙型肝炎, 母体传染胎儿的可能性与下列哪项有关

A. 乙型肝炎病毒不能通过胎盘传染给胎儿

B. 分娩时可传染给婴儿, 但唾液、汗液不传播乙型肝炎病毒

C. 胎儿多半受感染

D. 婴儿不会成为病毒携带者

E. 按程序注射乙型肝炎疫苗可阻断母婴传播

参考答案:C

(3) 乙型肝炎对妊娠的影响主要为

A. 胎儿宫内生长受限

B. 胎方位异常

C. 羊水过多

D. 产后出血增加

E. 难产率增加

参考答案:D

(4) 妊娠合并急性肝炎产后处理中哪项是错误的

A. 肌肉注射麦角新碱

B. 雌激素回奶

C. 新生儿注射乙型肝炎免疫球蛋白

D. 给予广谱抗生素

E. 继续给予保肝药物治疗

参考答案:B

(五) B1 型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个以上题干组成,五个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 5:(共用备选答案)

A. 子宫内膜炎、子宫肌炎

B. 产后下肢血栓性静脉炎

C. 急性盆腔结缔组织炎

D. 急性盆腔腹膜炎

E. 产后子宫滋养细胞肿瘤

(1) 产后 2~3 周寒战,下肢肿胀,疼痛,皮肤紧张发白

(2) 产后 3~4 天,体温 38℃,子宫体轻压痛,恶露量多且臭

(3) 产后 3 天突然畏寒,高热达 40℃,恶心,呕吐,下腹剧痛且有压痛,反跳痛,腹肌紧张感

参考答案:(1)B (2)A (3)D

(六) B2 型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E、F、G、H 等若干个备选答案与三个或三个以上题干组成,备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 6:(共用备选答案)

A. 0 期

B. Ia 期

C. IIa 期

D. IIb 期

E. III_a期

F. IV_a期

G. IV_b期

宫颈癌以下临床分期是

(1)宫颈癌穹隆部受累

(2)宫颈癌累及膀胱及直肠

(3)病变仅限于上皮层内,未穿透基底膜,无间质浸润

(4)宫颈癌宫旁增厚未达盆壁

(5)宫颈癌镜下早期浸润,深度<5 mm

参考答案:(1)C (2)F (3)A (4)D (5)B

(七)X型题(多重是非选择题)

每道题由1个题干和5个备选答案组成,形式类似于A1型题,但正确答案不只1个,可以是2个、3个、4个、5个备选答案都正确。X型题题干可以是一个问题、一段对话、一段病史,也可以是图表或临床检查资料等。选择项提供的正确答案或错误答案都应是肯定的,不能在选项中有部分正确、部分错误或似是而非的答案,也不能同时存在两个相互矛盾的答案。

例7:女性生殖器官的临近器官有

A. 阑尾

B. 乙状结肠

C. 输尿管

D. 膀胱

E. 直肠

参考答案:ACDE

众多的考生认为,考试多年了,题型谁都明白,但实际上并非如此,大家可以从中找出一些规律,如B1型题,往往选择具有比较、鉴别意义的一个主题作为命题的重点对象。

主治医师资格考试采用的是标准化命题,与在医学院期间的考试题型区别很大,与医师资格考试要求的知识的广度性考核要求也有区别,更多的是以考核知识的灵活运用为目标,大量的病例分析题出现在试卷中就不足为奇了。所以总是出现五个备选答案中有两个难以决定取舍的情况。

以下附载一2007年考生的考试心得,希望对2008年考生应考能有所裨益:

2007年妇产科学考试题型较往年有所变化,四门考试各有所侧重。基础解剖骨盆结构与径线必须掌握,在基础部分要考,在产科部分也要考;盆腔淋巴血管的解剖也同样是基础部分必考的内容,妇科肿瘤部分也要考。除了要掌握妇产科的本专业内容外,还应掌握本专业更深层次的专业知识及专业技能知识——掌握这点很重要,安排复习方向、重点应放在本专业知识的学习上。

我认为准备考试应该配备两本书:人民卫生出版社的《考试指南》和一本有针对性的考试习题集。事半功倍!

上机考试为四科中难度较大的,考核的是综合能力,考核知识点较深入,为临床实践的积

累,重在临床思维的建立。题型为病历分析,涉及该病历的所有知识均为考核点,如发病机制,临床表现,诊断,鉴别诊断,辅助检查,治疗方案等。病历分析题一定要注意所给的临床症状与体征的综合分析,如果诊断错误,处理就必然错误,尤其是妇科肿瘤、分期与后续治疗密切相关,如宫颈癌Ⅰb期后就不再手术治疗,如果对分期不清楚,则治疗就可能出现错误。病历题每题之间都是环环相扣,前面判断错误,就会发生连锁反应,造成多个题目出错,而当你醒悟判断出错时,还不允许回头修改。上机考核较多的需要阅片,如B超,CT,MR及各种造影等,电脑中提供的片子较工作中的质量较差,不甚清晰,因此需要掌握每种疾病的特殊影像表现,同时需要工作中多多练习阅片,方可辨别。

匆忙间回想了一下,得出以上考试心得,希望对2008年考生能有所帮助。

通过2007年卫生专业技术资格考试的实践检验,本书得到了广大考生的好评。考生普遍反映我社出版的这套辅导丛书具有很好的实用性、权威性,能在短时间内提高考生的应试能力。2008年我们再接再厉,在原有基础上邀请了更多的卫生专业技术资格考试专家参与到本丛书的编写中来,同时吸收了广大考生的反馈意见,使本书的质量又有大幅度的提高。不仅题量得到扩充,无论从题型,还是知识点的覆盖都更加贴近考试内容。

为广大考生服务是我们出版本套丛书的根本目的和宗旨。考生在准备考试和复习中会对复习题和考试本身产生一些疑惑和问题。为了增强本书的互动性,同时满足考生与专家、考生与考生的直接交流,我们在军事医学科学出版社网站设立了医考论坛。考生可以在这里提出疑问,我们会不定期请专家针对一般性问题进行答疑。我社网址是 www.mmsp.cn,欢迎广大考生充分利用这个平台,学习、交流、反馈意见。同时我们还推出热线电话,热线电子信箱和热线QQ,方便考生联系我们。

电话:010-86702863

QQ:237563664

Email:jhwei1212@yahoo.com.cn

希望您能够借助本书的帮助,顺利通过考试!

目 录

第一单元	女性生殖系统解剖	(1)
第二单元	女性生殖系统生理	(14)
第三单元	妊娠生理	(22)
第四单元	妊娠的诊断	(29)
第五单元	孕期监护与保健	(34)
第六单元	正常分娩	(46)
第七单元	正常产褥	(55)
第八单元	病理妊娠	(59)
第九单元	妊娠合并症	(87)
第十单元	妊娠合并性传播疾病	(97)
第十一单元	异常分娩	(101)
第十二单元	分娩期并发症	(114)
第十三单元	产褥期异常	(127)
第十四单元	妇科病史与检查	(131)
第十五单元	外阴色素减退与外阴瘙痒	(134)
第十六单元	女性生殖系统炎症	(137)
第十七单元	女性生殖器肿瘤	(161)
第十八单元	滋养细胞疾病	(209)
第十九单元	月经失调	(218)
第二十单元	子宫内膜异位症和子宫腺肌病	(231)
第二十一单元	女性生殖器畸形	(237)
第二十二单元	女性生殖器损伤性疾病	(240)
第二十三单元	不孕症	(243)
第二十四单元	计划生育	(246)
第二十五单元	妇女保健	(252)

第一单元 女性生殖系统解剖

【考纲要求】

女性生殖系统解剖	1. 骨盆	(1) 骨盆的类型 (2) 骨盆与分娩相关的解剖特点	掌握
	2. 外生殖器	外阴的范围和组成	掌握
	3. 内生殖器	内生殖器及其功能	掌握
	4. 女性生殖系统血管和淋巴	(1) 盆腔血管来源与分支 (2) 盆腔淋巴分布与各器官淋巴管的流经方向	熟悉
	5. 骨盆底	(1) 骨盆底 (2) 会阴	掌握
	6. 邻近器官		熟悉

【本章注意点】

1. 真假骨盆的界限,假骨盆与产道无关系,但它的径线大小可以影响真骨盆。

2. 坐骨棘是骨盆的一个重要标志,该平面是骨盆最小平面,此平面大小与分娩能否顺利有重要的关系。骨盆的各个径线的正常值必须记忆,因为它是评估产道与分娩方式选择的重要指标。

3. 内生殖器的基本结构及在女性一生不同时期所发生的变化。宫颈与宫体的比例变化必须掌握。

4. 支持子宫的韧带、血管、神经。

5. 临近器官如膀胱、输尿管与内生殖器的解剖关系,因为在子宫全切手术时处理相关韧带——主韧带、子宫骶骨韧带、骨盆漏斗韧带时易损伤输尿管。

【A型题】

1. 子宫动脉从下述哪条动脉分支

- A. 髂内动脉
- B. 髂外动脉

C. 臀上动脉

D. 卵巢动脉

E. 股动脉

参考答案:A

2. 右卵巢动脉是从哪条动脉分支的

A. 髂内动脉

B. 髂外动脉

C. 肾动脉

D. 腹主动脉

E. 髂总动脉

参考答案:D

3. 骶耻外径的距离是指

A. 耻骨联合至第5腰椎棘突

B. 耻骨联合中点至米氏菱形窝上角下1.5 cm

C. 耻骨联合中点至髂后上棘联线中点上1.5 cm

D. 耻骨联合上缘中点至米氏菱形窝上角上1.5 cm

E. 耻骨联合上缘中点至第5腰椎棘

突下

参考答案:E

4. 骶结节韧带位于

- A. 骶骨与坐骨棘之间
- B. 骶骨与闭孔之间
- C. 骶骨与尾骨之间
- D. 骶骨与坐骨结节之间
- E. 骶骨与耻骨联合之间

参考答案:D

5. 能固定宫颈,并保持子宫不向下脱垂的主要结构为

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 骶骨韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

参考答案:C

6. 下述各项哪项是错误的

- A. 前庭大腺位于大阴唇后部
- B. 输卵管、卵巢常被称为子宫附件,简称附件
- C. 子宫颈与子宫体之比成人为 1:1, 婴儿为 1:2
- D. 子宫内膜分为基底层和功能层,功能层又分为致密层和海绵层
- E. 子宫体和子宫颈之间形成的最狭窄的部分称为子宫峡部

参考答案:C

7. 右侧卵巢动脉来自

- A. 右髂总动脉
- B. 右髂内动脉
- C. 腹主动脉
- D. 右髂外动脉
- E. 右肾动脉

参考答案:C

8. 孕妇 28 岁,孕 1 产 0 孕 29 周,骨盆测量:髂嵴间径 26 cm,髂前上棘间径 25 cm,骶耻外径 18.5 cm,坐骨结节间径 9 cm,骶岬不突,骶骨弧度中等,坐骨棘内突,坐骨切迹宽,

耻骨弓角度 100° ,该孕妇骨盆属于下列哪种类型

- A. 女型骨盆
- B. 男型骨盆
- C. 扁平骨盆
- D. 均小骨盆
- E. 漏斗骨盆

参考答案:A

9. 正常输卵管的长度为

- A. 10 ~ 18 cm
- B. 15 ~ 20 cm
- C. 8 ~ 14 cm
- D. 10 cm 左右
- E. 20 cm 左右

参考答案:C

10. 关于子宫肌层不正确的是

- A. 由平滑肌束及弹力纤维组成
- B. 肌纤维的分布外层多为纵行,内层多为网状结构,中间为环行
- C. 非孕时厚约 0.8 cm
- D. 肌层是子宫体壁的 3 层结构中最厚的一层
- E. 子宫收缩时血管被压缩,能有效地制止产后出血

参考答案:B

11. 关于成人子宫,下列哪项不正确

- A. 子宫呈前后略扁的倒置梨形
- B. 宫腔容量约 5 ml
- C. 重约 50 g
- D. 长度 6 ~ 7 cm
- E. 子宫下段较上部稍窄

参考答案:D

12. 主韧带位于

- A. 子宫峡部两侧与骨盆侧壁之间
- B. 阴道穹隆两侧与骨盆侧壁之间
- C. 子宫动脉两侧与骨盆侧壁之间
- D. 宫颈两侧与骨盆侧壁之间
- E. 宫体两侧与骨盆侧壁之间

参考答案:D

13. 阴道下段淋巴引流主要入

- A. 腹股沟淋巴结
- B. 腰淋巴结
- C. 髂内淋巴结
- D. 髂外淋巴结
- E. 骶前淋巴结

参考答案:A

14. 骨盆的关节包括

- A. 耻骨联合与骶尾关节
- B. 耻骨联合与骶髂关节
- C. 耻骨联合、骶髂关节与骶尾关节
- D. 骶髂关节与骶尾关节
- E. 骶尾关节

参考答案:C

15. 关于女性内生殖器的血管,下列哪项不正确

- A. 子宫动脉为髂内动脉前干的分支
- B. 右卵巢动脉可来自右肾动脉
- C. 左卵巢动脉可来自左肾动脉
- D. 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支
- E. 会阴动脉为阴部内动脉的分支

参考答案:B

16. 关于子宫,下列哪项正确

- A. 表面 1/3 能发生周期性变化
- B. 靠近子宫肌层的内膜为功能层
- C. 子宫峡部黏膜组织与宫颈黏膜相同
- D. 基底层无周期性变化
- E. 功能层于月经期部分脱落

参考答案:D

17. 子宫体壁的组织结构中哪层最厚

- A. 内膜层
- B. 功能层
- C. 基层层
- D. 肌层
- E. 浆膜层

参考答案:D

18. 骶骨包括

- A. 3~4 块骶椎
- B. 4~5 块骶椎

C. 5~6 块骶椎

D. 6~7 块骶椎

E. 3~5 块骶椎

参考答案:C

19. 骨盆底的前方为

- A. 耻骨联合
- B. 耻骨联合上缘
- C. 耻骨联合下缘
- D. 阴阜
- E. 阴道前庭

参考答案:C

20. 关于阴蒂,下列哪项不正确

- A. 位于两侧小阴唇顶端的联合处
- B. 位于两侧大阴唇顶端的联合处
- C. 具有勃起性
- D. 分为阴蒂头、阴蒂体和两个阴蒂脚
- E. 敏感性极高

参考答案:B

21. 子宫圆韧带长

- A. 8~10 cm
- B. 10~12 cm
- C. 11~13 cm
- D. 12~13 cm
- E. 12~14 cm

参考答案:E

22. 关于骨盆底的分区,下列哪项不正确

- A. 分为尿生殖区与肛区
- B. 尿道通过尿生殖区
- C. 肛区有肛管通过
- D. 阴道通过尿生殖区
- E. 以上均不正确

参考答案:E

23. 关于骨盆底,下列哪项正确

- A. 骨盆底由筋膜组成
- B. 骨盆底由多层肌肉组成
- C. 骨盆底与分娩无直接关系
- D. 骨盆底的结构和功能与盆腔脏器的位置和功能密切相关
- E. 以上均不正确

参考答案:D

24. 关于女性生殖器解剖, 不正确的是

- A. 子宫颈管上皮为高柱状
- B. 阴道上皮为复层鳞状上皮
- C. 输卵管上皮细胞均为带纤毛的细胞
- D. 卵巢的表面由单层立方上皮覆盖称为生发上皮
- E. 宫颈管外口复层鳞状细胞和柱状细胞交界处是宫颈癌好发的部位

参考答案:C

25. 维持子宫正常位置的主要原因为

- A. 子宫的 4 对韧带
- B. 盆底肌肉及其上下筋膜的支撑
- C. 腹腔内器官的支撑
- D. 膀胱和直肠的支撑
- E. 子宫的 4 对韧带和盆底肌肉、筋膜的支托作用

参考答案:E

26. 判断中骨盆是否狭窄的重要指标是

- A. 髂棘间径
- B. 髂嵴间径
- C. 坐骨切迹宽度
- D. 骶耻外径
- E. 坐骨结节横径

参考答案:C

27. 关于阴道上段淋巴引流, 下列哪项不正确

- A. 大部分汇入闭孔淋巴结与髂内淋巴结
- B. 小部分汇入髂外淋巴结
- C. 与阴道下段引流基本相同
- D. 与宫颈引流基本相同
- E. 不注入腹股沟淋巴结

参考答案:C

28. 下列哪项不是组成骨盆的骨骼

- A. 骶骨
- B. 髂骨
- C. 耻骨

D. 腰椎

E. 尾骨

参考答案:D

29. 下述哪种脏器是由外胚层发生的

- A. 垂体前叶
- B. 心脏
- C. 消化系统
- D. 骨骼肌
- E. 上述各脏器皆非来自外胚层

参考答案:A

30. 骨盆腔是指

- A. 骨盆的入口平面和出口平面之间
- B. 大骨盆以下的腔
- C. 骨盆出口平面以上的腔
- D. 骨盆入口平面和中骨盆平面之间
- E. 中骨盆平面和出口平面之间

参考答案:A

31. 正常骨盆的坐骨棘间径为

- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 8.5 ~ 9.5 cm
- D. 9.5 ~ 10.5 cm
- E. 12 cm

参考答案:B

32. 关于女性生殖系统, 下列哪项不正确

- A. 内生殖器官位于盆腔腹膜内
- B. 骨盆的大小、形状对分娩有直接影响
- C. 骨盆底组织承托盆腔脏器
- D. 外生殖器不包括阴道
- E. 经产妇大阴唇受分娩的影响向两侧分开

参考答案:A

33. 关于子宫阔韧带, 下列哪项不正确

- A. 分为前后两叶
- B. 内 1/3 包围输卵管
- C. 外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带
- D. 富含血管、神经及淋巴管
- E. 两侧达盆壁

参考答案:B

34. 骨盆是由

- A. 髌骨、骶骨、尾骨组成
- B. 髌骨、坐骨、耻骨组成
- C. 髌骨、骶骨、尾骨组成
- D. 髌骨、耻骨、骶骨组成
- E. 耻骨、骶骨、尾骨组成

参考答案:A

35. 下列哪项无腹膜覆盖

- A. 子宫底部
- B. 圆韧带
- C. 子宫直肠陷凹
- D. 膀胱子宫陷凹
- E. 卵巢

参考答案:E

36. 阴道前庭包括

- A. 前庭球、前庭大腺及尿道口
- B. 前庭球、前庭大腺、尿道口、阴道口及处女膜
- C. 阴蒂、前庭球及前庭大腺
- D. 阴蒂、前庭球、前庭大腺及尿道口
- E. 前庭大腺、尿道口及阴道口

参考答案:B

37. 阴部内动脉的分支有

- A. 2支
- B. 3支
- C. 4支
- D. 5支
- E. 6支

参考答案:C

38. 卵巢门是指

- A. 卵巢固有韧带连接于卵巢的部位
- B. 卵巢系膜连接于输卵管的部位
- C. 卵巢系膜连接于阔韧带后叶的部位
- D. 卵巢连接于子宫的部位
- E. 卵巢系膜连接于阔韧带前叶的部位

参考答案:C

39. 宫体两侧淋巴结沿圆韧带汇入

- A. 腹股沟深淋巴结
- B. 腹股沟浅淋巴结
- C. 骶前淋巴结
- D. 闭孔淋巴结
- E. 髂内淋巴结

参考答案:B

40. 子宫的正常位置为

- A. 轻度前倾前屈位
- B. 轻度后倾后屈位
- C. 前倾前屈位
- D. 后倾后屈位
- E. 水平位

参考答案:A

41. 做子宫与附件切除时,切断哪条韧带容易损伤输尿管

- A. 主韧带
- B. 圆韧带
- C. 阔韧带
- D. 骶骨韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

参考答案:A

42. 子宫动脉下支供应

- A. 宫颈与阴道
- B. 宫颈与阴道上段
- C. 阴道
- D. 宫体、宫颈与阴道上段
- E. 子宫峡部、宫颈与阴道

参考答案:B

43. 阴道动脉来自

- A. 腹主动脉
- B. 髂总动脉
- C. 髂外动脉
- D. 髂内动脉
- E. 肾动脉

参考答案:D

44. 关于骶棘韧带,下列哪项正确

- A. 位于骶骨与坐骨棘之间
- B. 位于骶髂关节与坐骨棘之间

- C. 位于骶尾关节与坐骨棘之间
- D. 其宽度即为坐骨切迹宽度
- E. 以上均不正确

参考答案:D

45. 关于卵巢, 下列哪项正确

- A. 髓质中有数以万计的原始细胞
- B. 皮质含疏松结缔组织
- C. 髓质中含有平滑肌组织
- D. 髓质中含有致密结缔组织
- E. 以上均不正确

参考答案:C

46. 骨产道是指

- A. 大骨盆
- B. 小骨盆
- C. 大骨盆 + 小骨盆
- D. 骨盆入口平面以上
- E. 骨盆出口平面以上

参考答案:B

47. 子宫动脉上支又分为

- A. 宫底支、宫体支与宫颈支
- B. 宫体支、宫颈支与阴道支
- C. 宫底支、卵巢支与输卵管支
- D. 卵巢支与输卵管支
- E. 宫体支、卵巢支与输卵管支

参考答案:C

48. 骨盆底组织有

- A. 1 层
- B. 2 层
- C. 3 层
- D. 4 层
- E. 5 层

参考答案:C

49. 肛提肌位于骨盆底的

- A. 内层
- B. 中层
- C. 外层
- D. 浅层
- E. 深层

参考答案:A

50. 右侧卵巢静脉汇入

- A. 下腔静脉
- B. 右肾静脉
- C. 右髂内静脉
- D. 右髂总静脉
- E. 右髂外静脉

参考答案:A

51. 关于女型骨盆, 下列哪项正确

- A. 骨盆入口呈扁椭圆形, 坐骨棘间径 ≥ 10 cm
- B. 骨盆入口呈长椭圆形, 坐骨棘间径 ≤ 10 cm
- C. 骨盆入口呈横椭圆形, 坐骨棘间径 ≥ 10 cm
- D. 骨盆入口呈横椭圆形, 坐骨棘间径 ≤ 10 cm
- E. 骨盆入口呈圆形, 坐骨棘间径 ≤ 10 cm

参考答案:C

52. 关于女性内生殖器的神经支配, 下列哪项不正确

- A. 由交感神经与副交感神经支配
- B. 交感神经纤维由腹主动脉前神经丛分出
- C. 卵巢神经丛与骶前神经丛均支配内生殖器
- D. 卵巢神经丛分布于卵巢、输卵管和子宫
- E. 子宫平滑肌的收缩不受神经支配

参考答案:D

53. 子宫动脉是哪条动脉的分支

- A. 髂总动脉
- B. 髂内动脉
- C. 髂外动脉
- D. 腹主动脉
- E. 肾动脉

参考答案:B

54. 维持子宫前倾的韧带是

- A. 圆韧带

- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 骶骨韧带
- E. 圆韧带 + 骶骨韧带

参考答案:E

55. 关于子宫的解剖不正确的是

- A. 大小为 $7\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$
- B. 容积为 5 ml
- C. 重量约 50 g
- D. 成年女性的宫颈和宫体之比为 $1:2$
- E. 子宫峡部在非孕状态约为 $2 \sim 3\text{ cm}$

参考答案:E

56. 关于骨盆出口,错误的是

- A. 前三角的顶端为耻骨联合的下缘,两侧为耻骨降支
- B. 后三角的顶端为骶尾关节,两侧为骶棘韧带
- C. 坐骨结节间的距离为出口横径
- D. 耻骨联合下缘至骶尾关节间的距离为出口前后径
- E. 骶尾关节至坐骨结节间径中点的距离为出口后矢状径

参考答案:B

57. 关于阴道壁,下述哪项是错误的

- A. 阴道黏膜为复层鳞状上皮
- B. 阴道壁富有静脉丛,局部损伤易形成血肿
- C. 阴道黏膜受卵巢激素的影响有周期性变化
- D. 阴道上皮富有腺体,故妇女常有白带多的症状
- E. 阴道有很多横纹皱襞及外覆有弹力纤维,故有很大的伸展力

参考答案:D

58. 关于正常骨产道,下述哪项是正确的

- A. 骨盆入口前后径比横径大
- B. 中骨盆平面横径比前后径大
- C. 骨盆入口平面是骨盆的最宽平面
- D. 中骨盆平面是骨盆最窄平面

E. 站立时骨盆入口平面与地平面平行

参考答案:D

59. 骨盆出口横径是指

- A. 坐骨结节前端内侧缘之间的距离
- B. 坐骨结节中段外侧缘之间的距离
- C. 坐骨结节后端外侧缘之间的距离
- D. 坐骨结节后端内侧缘之间的距离
- E. 坐骨结节前端外侧缘之间的距离

参考答案:A

60. 正常骨盆骶耻内径(对角径)的值为

- A. 不小于 13 cm
- B. 不小于 12 cm
- C. 不小于 11 cm
- D. 不小于 10 cm
- E. 不小于 9 cm

参考答案:B

61. 骨盆外测量骶耻外径(E. C)的后据点是

- A. 第五腰椎棘突上
- B. 米氏菱形窝的上角
- C. 腰骶部菱形窝的中央
- D. 髂后上棘连线中点下 $2 \sim 2.5\text{ cm}$
- E. 髂嵴后连线中点上 1.5 cm

参考答案:B

62. 关于骨产道,下述哪项是正确的

- A. 骨盆是由骶骨、耻骨、尾骨组成
- B. 真骨盆两侧为髂骨翼,后面为第5腰椎
- C. 骨盆入口平面为骶岬、骶耻缘与耻骨联合上缘
- D. 骨盆出口平面是由骶尾关节、两侧坐骨棘、耻骨联合下缘围绕的骨盆腔最低平面
- E. 中骨盆平面横径为坐骨结节间径

参考答案:C

63. 关于骨盆下列哪项是正确的

- A. 入口前后径又称真结合径