

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

护理学(执业护士含护士) 标准化试题及解析

主编 王敏 李桂芬 高彩平 范晓炜



第二军医大学出版社

Second Military Medical University Press

· 全国卫生专业技术资格考试系列丛书 ·

护理学(执业护士含护士)

标准化试题及解析

主 编：王 敏 李桂芬 高彩平 范晓炜

副主编：王美荣 郭玉华 明坤秀 刘焕荣

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

护理学(执业护士含护士)标准化试题及解析/王敏,李桂芬,高彩平,范晓炜
主编. —上海:第二军医大学出版社,2009.1

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

ISBN 978-7-81060-886-2

I. 护… II. ①王…②李…③高…④范… III. 护理学-护士-资格考核-
解题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 153982 号

出 版 人 石进英

责任编辑 王 楠

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

护理学(执业护士含护士)标准化试题及解析

主 编:王 敏 李桂芬 高彩平 范晓炜

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

电话/传真:021-65493093

全国各地新华书店经销

青州市新希望彩印有限公司印制

开本:787×1092 1/16 印张:19.75 字数:480 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81060-886-2/R·692

定价:42.00 元

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自2001年开始全国卫生专业初、中级技术资格实行以考代评。考试取得的资格代表了被认可具备相应专业技术职务要求的水平与能力，被单位作为聘任相应技术职务的必要依据。为适应考试的新变化，针对考生临考备战进行综合性巩固，我们组织有关专业人员编写了《全国卫生专业技术资格考试系列丛书》。

本套丛书的特点：

1. **标准性**：试题难度、题型分布、题目数量均与正式试卷一致，附有答题卡及参考答案，并对部分题目进行详细解析。
2. **全面性**：五套标准试题全面涵盖大纲规定考查的知识及能力，并突出重点、难点、要点。
3. **预测性**：每套试题均根据历年试题对命题规律进行总结和预测后精选而成，命题率高。

本书难免存在不足和疏漏之处，敬请广大读者批评指正，以便我们进一步修改和完善。

编者

2009年1月

目 录

标准化试题（一）	(1)
基础知识	(1)
相关专业知识	(11)
专业知识	(21)
专业实践能力	(32)
答题卡	(43)
参考答案及解析	(51)
标准化试题（二）	(63)
基础知识	(63)
相关专业知识	(73)
专业知识	(83)
专业实践能力	(94)
答题卡	(105)
参考答案及解析	(113)
标准化试题（三）	(125)
基础知识	(125)
相关专业知识	(135)
专业知识	(145)
专业实践能力	(156)
答题卡	(167)
参考答案及解析	(175)
标准化试题（四）	(187)
基础知识	(187)
相关专业知识	(197)
专业知识	(207)
专业实践能力	(218)
答题卡	(229)
参考答案及解析	(237)

标准化试题（五） (249)
 基础知识 (249)
 相关专业知 识 (259)
 专业知识 (269)
 专业实践能力 (280)
 答题卡 (291)
 参考答案及解析 (299)

标准化试题(一)

基础知识

A1/A2 型选择题 (1~79 题)

答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 成人理想血压是指
 - A. 收缩压 < 100 mmHg, 舒张压 < 70 mmHg
 - B. 收缩压 < 110 mmHg, 舒张压 < 75 mmHg
 - C. 收缩压 < 120 mmHg, 舒张压 < 80 mmHg
 - D. 收缩压 < 130 mmHg, 舒张压 < 85 mmHg
 - E. 收缩压 < 140 mmHg, 舒张压 < 90 mmHg
2. 不会引起心力衰竭的疾病是
 - A. 风湿性心脏瓣膜病
 - B. 急性心肌梗死
 - C. 失血性休克
 - D. 急性心肌炎
 - E. 高血压
3. 心室的后负荷在无主动脉瓣狭窄时, 最重要的决定因素是
 - A. 主动脉反应性
 - B. 血液黏度
 - C. 动脉血容量
 - D. 外周血管阻力
 - E. 血液儿茶酚胺水平
4. 完全胃肠外营养 (TPN) 时每日氨基酸的一般供给量是
 - A. 1 ~ 1.5 g/kg
 - B. 1.5 ~ 2 g/kg
 - C. 2 ~ 3 g/kg
 - D. 3 ~ 5 g/kg
 - E. 4 ~ 6 g/kg
5. 由于主动脉瓣狭窄引起的心功能代偿反应, 最主要的是
 - A. 心率加快
 - B. 回心血量增加
 - C. 心室腔扩大
 - D. 心室肌肥厚
 - E. 外周血管扩张
6. 引起巨幼细胞贫血的原因是
 - A. 缺铁
 - B. 缺叶酸和 (或) 维生素 B₁₂
 - C. 红细胞膜异常
 - D. 红细胞酶异常
 - E. 珠蛋白合成异常
7. 慢性肾功能衰竭引起皮肤瘙痒的原因是
 - A. 尿素霜刺激
 - B. 皮肤感染
 - C. 高过敏状态
 - D. 代谢性酸中毒
 - E. 低钙高磷血症

8. 多器官功能障碍中最常见的发生障碍的器官是
- A. 心
 - B. 肺
 - C. 肝
 - D. 肾
 - E. 胃肠
9. 引起右室压力负荷过重的疾病是
- A. 严重贫血
 - B. 肺动脉高压
 - C. 肺动脉瓣关闭不全
 - D. 二尖瓣关闭不全
 - E. 高血压
10. 下列关于生理性黄疸的描述,错误的是
- A. 生后2~3天开始出现黄疸
 - B. 出现食欲下降,哭声低弱
 - C. 一般10~14天自然消退
 - D. 早产儿可延迟至3~4周消退
 - E. 足月儿血清胆红素浓度 $<205.2\ \mu\text{mol/L}$ (12 mg/dl)
11. 门静脉交通支中最重要的是
- A. 胃底、食管下端交通支
 - B. 直肠下端交通支
 - C. 腹壁交通支
 - D. 肠系膜血管交通支
 - E. 腹膜后交通支
12. 肾盂肾炎最常见的感染途径是
- A. 上行感染
 - B. 血行感染
 - C. 淋巴管感染
 - D. 直接感染
 - E. 体液感染
13. 下列动脉粥样硬化的病因,不可控制的是
- A. 年龄
 - B. 血脂异常
 - C. 糖尿病
 - D. 高血压
 - E. 肥胖
14. 二尖瓣狭窄患者痰中带血丝的可能原因是
- A. 支气管静脉曲张破裂
 - B. 急性肺水肿
 - C. 肺梗死
 - D. 支气管内膜毛细血管破裂
 - E. 支气管小动脉破裂
15. 一般情况下,心跳呼吸骤停患者大脑缺血缺氧的耐受时间是
- A. 2~3 min
 - B. 3~5 min
 - C. 2~5 min
 - D. 4~6 min
 - E. 5~10 min
16. 下列不属于生理性蛋白尿原因的是
- A. 运动
 - B. 体位改变
 - C. 寒冷
 - D. 肾炎
 - E. 发热
17. 慢性肾功能衰竭患者发生肾性骨病的主要原因是
- A. 尿钙排泄增多
 - B. 尿磷排泄减少
 - C. 营养不良和低蛋白血症
 - D. 继发性甲状旁腺功能亢进
 - E. 钙盐沉积造成骨过度钙化
18. 参与体液免疫的细胞是
- A. 红细胞

- B. 中性粒细胞
C. 单核细胞
D. T 淋巴细胞
E. B 淋巴细胞
19. 尿频是指
A. 一有尿意就急不可待要排尿
B. 排尿时有不尽感
C. 每日排尿达到 10 次以上
D. 每日排尿达到 12 次以上
E. 尿意频繁而尿量不多
20. 营养不良的病因不包括
A. 长期腹泻
B. 上呼吸道感染、发热
C. 多发性损伤
D. 肠痿
E. 溃疡性结肠炎
21. 引起急性上呼吸道感染的主要病原体是
A. 病毒
B. 细菌
C. 支原体
D. 衣原体
E. 真菌
22. 机体内合成血浆蛋白、纤维蛋白原、凝血酶原等凝血因子的主要场所是
A. 骨髓
B. 肝脏
C. 脾脏
D. 淋巴结
E. 胸腺
23. 肺癌中多发生于老年男性, 与吸烟的关系最密切的组织类型是
A. 鳞状上皮细胞癌
B. 小细胞未分化癌
C. 大细胞未分化癌
D. 腺癌
E. 肺泡癌
24. 贫血是指单位容积的外周血液中
A. 红细胞数或血红蛋白量低于正常
B. 红细胞数和血红蛋白量低于正常
C. 红细胞数和血细胞比容低于正常
D. 红细胞数和网织红细胞数低于正常
E. 红细胞数、血红蛋白浓度和 (或) 血细胞比容低于正常
25. 无脑神经障碍的四肢瘫痪, 其病变部位在
A. 脑桥
B. 延髓
C. 颈髓
D. 胸髓
E. 腰髓
26. 溃疡病最重要的发病因素是
A. 胃酸分泌过多
B. 幽门螺杆菌感染
C. 胃黏膜屏障损害
D. 遗传因素
E. 精神神经因素
27. 乳癌的易感因素, 不正确的是
A. 乳癌家族史
B. 月经初潮早于 12 岁、绝经期迟于 50 岁
C. 环境以及生活方式
D. 初次足月产迟于 30 岁
E. 高脂饮食
28. 缺铁性贫血的主要病因是
A. 铁の利用不良
B. 摄入铁不足
C. 铁吸收不良
D. 慢性失血

- E. 缺乏叶酸
29. 属于肾前性急性肾衰竭病因的是
- A. 大出血、休克
 - B. 前列腺增生
 - C. 肾小球肾炎
 - D. 双侧输尿管结石
 - E. 膀胱肿瘤
30. 吸气性呼吸困难的发生机制是
- A. 大气道狭窄梗阻
 - B. 广泛性肺部病变使呼吸面积减少
 - C. 血管床减少
 - D. 上呼吸道异物刺激
 - E. 肺组织弹性减弱及小支气管痉挛性狭窄
31. 机体在新陈代谢过程中, 物质氧化到最终生成 CO_2 和水约
- A. 100 ml
 - B. 200 ml
 - C. 300 ml
 - D. 400 ml
 - E. 500 ml
32. 胸骨左缘第2肋间是
- A. 主动脉瓣第一听诊区
 - B. 二尖瓣区听诊区
 - C. 肺动脉瓣区听诊区
 - D. 主动脉第二听诊区
 - E. 三尖瓣区听诊区
33. 机体维持体液酸碱平衡的途径是
- A. 肾素—血管紧张素—醛固酮系统
 - B. 下丘脑—垂体—肾上腺系统
 - C. 血液缓冲系统、肺和肾
 - D. 抗利尿激素和醛固酮
 - E. 呼吸系统
34. 接种活疫苗时, 局部皮肤消毒应用
- A. 0.5% 碘伏
 - B. 2% 碘伏
 - C. 2% 碘酊
 - D. 75% 乙醇
 - E. 2% 碘酊 + 75% 乙醇
35. 碱中毒时易发生手足抽搐的原因是
- A. 低钠
 - B. 低钾
 - C. 低钙
 - D. 高镁
 - E. 高磷
36. 各种类型休克的共同病理生理基础是
- A. 中心静脉压下降
 - B. 尿量减少
 - C. 有效循环血量锐减
 - D. 细胞脱水
 - E. 水、电解质失衡
37. 胃大部切除后, 最早易出现的并发症是
- A. 倾倒综合征
 - B. 吻合口瘘
 - C. 上消化道出血
 - D. 低血糖综合征
 - E. 胃十二指肠残端破裂
38. 代谢性碱中毒的常见病因是
- A. 幽门梗阻
 - B. 感染性休克
 - C. 瘵症
 - D. 结肠梗阻
 - E. 肠痿
39. 引起低钾血症的病因可以是
- A. 严重组织损伤
 - B. 输入大量库存血
 - C. 急性肾衰

- D. 碱中毒
E. 酸中毒
40. 手足搐搦症发作时, 血清钙离子浓度一般低于
A. 1.0 mmol/L
B. 1.75 mmol/L
C. 1.88 mmol/L
D. 2.25 mmol/L
E. 2.75 mmol/L
41. 胃癌血运转移的最常见部位是
A. 骨
B. 脑
C. 肺
D. 腹腔
E. 肝
42. 肝硬化患者出现全血细胞减少的最主要原因
A. 脾功能亢进
B. 骨髓造血功能下降
C. 营养状况差
D. 内分泌紊乱
E. 侧支循环的建立与开放
43. 引起休克患者死亡的主要因素是
A. 严重感染
B. 多系统器官功能衰竭
C. 严重营养不良
D. 水、电解质失衡
E. 酸碱平衡紊乱
44. 最常见的蛋白尿类型是
A. 肾小球性蛋白尿
B. 肾小管性蛋白尿
C. 分泌性蛋白尿
D. 溢出性蛋白尿
E. 组织性蛋白尿
45. 休克微循环收缩期的病理生理变化是
A. 细胞内容酶体膜破裂
B. 毛细血管通透性增加
C. 血液高凝状态
D. 无氧代谢增加
E. 动静脉短路开放
46. 典型的肛裂“三联症”是指
A. 肛裂、肥大乳头、肛瘘
B. 肛裂、肥大乳头、前哨痔
C. 肛裂、肛瘘、前哨痔
D. 内痔、肥大乳头、前哨痔
E. 内痔、前哨痔、肛瘘
47. 下列疾病中属于出血性脑血管病的是
A. 短暂性脑缺血发作
B. 蛛网膜下隙出血
C. 脑梗死
D. 脑血栓形成
E. 脑栓塞
48. 无尿是指 24 小时尿量少于
A. 100 ml
B. 200 ml
C. 400 ml
D. 500 ml
E. 800 ml
49. 关于瘢痕性幽门梗阻患者的术前准备最重要的是
A. 心理护理
B. 皮肤准备
C. 补碱性药
D. 每晚用温盐水洗胃
E. 备皮、皮试
50. 急性阑尾炎的重要病因是
A. 细菌侵入
B. 急性肠炎

- C. 肠道蛔虫
D. 急性腹膜炎
E. 阑尾管腔梗阻
51. 肝癌细胞脱落至盆腔转移, 属于
A. 直接转移
B. 淋巴转移
C. 直接蔓延
D. 血运转移
E. 种植转移
52. 与颅内压增高有关的叙述, 错误的是
A. 颅内压增高引起的头痛多在夜间加重
B. 颅内压增高引起的头痛多随体位变动而加重
C. 颅内压增高引起的头痛多伴有喷射性呕吐、视乳头水肿
D. 颅内压增高伴便秘时应尽快灌肠
E. 颅内压增高时应警惕脑疝
53. 病变侧脑神经麻痹和对侧肢体瘫痪为
A. 局限性瘫痪
B. 单瘫
C. 偏瘫
D. 交叉性瘫痪
E. 截瘫
54. 脑出血最常见的原因是
A. 外伤
B. 高血压动脉硬化
C. 血液病
D. 先天性脑动脉瘤
E. 脑血管畸形
55. 甲状腺大部切除术后最危急的并发症是
A. 呼吸困难
B. 甲状腺危象
C. 喉上神经损伤
D. 甲状旁腺损伤
E. 喉返神经损伤
56. 若卵子未受精, 排卵后多长时间黄体开始萎缩
A. 2~3 天
B. 4~5 天
C. 6~8 天
D. 9~10 天
E. 12~14 天
57. 使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜的主要激素是
A. 促卵泡素
B. 雌激素
C. 孕激素
D. 雄激素
E. 肾上腺素
58. 月经结束后子宫内膜增生来自
A. 黏膜层
B. 肌层
C. 浆膜层
D. 基底层
E. 功能层
59. 起自子宫角前面, 向前下方伸展达骨盆壁, 穿过腹股沟管, 终止于大阴唇前端的韧带是
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 宫骶韧带
E. 骨盆漏斗韧带
60. 受精是指
A. 精子进入阴道内
B. 精子获能

- C. 已获能的精子和卵子相遇
D. 已获能的精子和成熟的卵子相结合的过程
E. 精子和成熟的卵子结合后, 开始有丝分裂
61. 下列胎盘的构成正确的是
A. 羊膜、叶状绒毛膜、包蜕膜
B. 羊膜、平滑绒毛膜、底蜕膜
C. 羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜
D. 胎膜、平滑绒毛膜、包蜕膜
E. 胎膜、叶状绒毛膜、底蜕膜
62. 位于宫颈两侧和骨盆侧壁之间的韧带是
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 宫骶韧带
E. 骨盆漏斗韧带
63. 月经周期中雌激素出现第一次高峰的时间是
A. 月经期
B. 月经干净后 3~5 天
C. 排卵前
D. 排卵后 7~8 天
E. 月经前 1~2 天
64. 正常情况下精子和卵子结合形成受精卵的部位在
A. 阴道
B. 宫颈
C. 宫腔
D. 输卵管
E. 卵巢
65. 临产后的主要动力是
A. 膈肌收缩力
B. 腹肌收缩力
C. 肛提肌收缩力
D. 子宫肌收缩力
E. 腹压
66. 引起新生儿败血症的相关因素不包括
A. 免疫系统功能低下
B. 皮肤黏膜屏障功能差
C. 脐部有异常通道
D. 白细胞杀菌力下降
E. 补体含量高
67. 婴儿期是指
A. 从出生~28 天
B. 出生~12 个月
C. 生后 13 个月~2 岁
D. 出生~2 岁
E. 1~3 岁
68. 小儿不宜喂淀粉类食物的年龄是
A. <2 个月
B. <3 个月
C. <4 个月
D. <5 个月
E. <6 个月
69. 婴幼儿易患呼吸道和消化道感染的主要原因是
A. 生长发育迅速, 营养不能满足机体的需要
B. 消化功能差, 不能摄入充足的营养
C. 肝功能不成熟
D. 肾功能不成熟
E. 免疫功能不完善
70. 7 个月小儿的辅食可选择
A. 碎肉和菜汤
B. 肉末和鸡蛋
C. 面条和青菜汤
D. 带馅的食品

- E. 碎肉和饼干
71. 小儿发生营养性缺铁性贫血的主要原因因为
- A. 铁储存不足
 - B. 铁摄入不足
 - C. 生长发育快
 - D. 铁吸收障碍
 - E. 铁丢失过多
72. 新生儿硬肿症最主要的致病因素是
- A. 早产
 - B. 低体重
 - C. 感染
 - D. 窒息
 - E. 寒冷
73. 小儿原发型肺结核最常见的病理转归为
- A. 吸收好转
 - B. 进展为干酪性肺炎
 - C. 进展为结核性胸膜炎
 - D. 恶化为急性粟粒性肺结核
 - E. 全身性急性粟粒性结核病
74. 患者, 男性, 60 岁。因急性心肌梗死入院, 现心脏听诊出现心尖部收缩期喀喇音及收缩中期吹风样杂音。可能是由于
- A. 左室增大
 - B. 室间隔穿孔
 - C. 心脏破裂
 - D. 心力衰竭
 - E. 乳头肌功能失调或断裂
75. 患者, 男性, 56 岁。体检发现心尖部舒张期隆隆样杂音; 胸片提示左房、右室增大, 诊断为风心病二尖瓣狭窄。该患者属于
- A. 左房代偿期
 - B. 左房失代偿期
 - C. 左室代偿期
 - D. 肺动脉高压期
 - E. 右心受累期
76. 患者, 女性, 28 岁。平素月经规则, 月经周期为 36 天, 其排卵时间大约在月经周期的
- A. 第 10 天
 - B. 第 14 天
 - C. 第 18 天
 - D. 第 22 天
 - E. 第 28 天
77. 患者, 男性, 28 岁。阑尾切除术后第 5 天, 体温又上升至 38.5°C , 下腹胀痛, 排便次数增多, 并有尿频、尿急症状, 首先考虑的并发症是
- A. 泌尿系感染
 - B. 盆腔脓肿
 - C. 膈下脓肿
 - D. 肠间脓肿
 - E. 急性肠炎
78. 患者, 女性, 34 岁。肛周伤口反复破溃伴有少量溢液。在此种情况发生前, 患者最可能患有
- A. 内痔
 - B. 外痔
 - C. 肛裂
 - D. 直肠脱垂
 - E. 直肠肛管周围脓肿
79. 患儿, 女, 3 天。洗澡时, 母亲发现其两侧乳腺均有蚕豆大小肿块, 轻挤有白色液体流出。正确的处理方法是
- A. 用手挤压
 - B. 挑割肿块

- C. 手术切除
- D. 用抗生素抗感染

E. 无须处理

B1 型选择题 (80 ~ 100 题)

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(80 ~ 81 题共用备选答案)

- A. 肾小球滤过膜通透性增高
 - B. 肾小管内皮细胞通透性增高
 - C. 肾小管受刺激后产生的蛋白尿
 - D. 肾小管代谢产生的蛋白质渗入尿液
 - E. 肾小管对蛋白质重吸收能力下降
80. 肾盂肾炎可导致
81. 肾病综合征引起蛋白尿的主要原因是

(82 ~ 84 题共用备选答案)

- A. 白色念珠菌
 - B. 腺病毒
 - C. 柯萨奇病毒
 - D. 金黄色葡萄球菌
 - E. 单纯疱疹病毒
82. 鹅口疮的病原体是
83. 溃疡性口腔炎的病原体是
84. 疱疹性口腔炎的病原体是

(85 ~ 87 题共用备选答案)

- A. 冬春高发
 - B. 春夏高发
 - C. 夏秋高发
 - D. 秋冬高发
 - E. 无特定高发季节
85. 麻疹的高发季节为
86. 水痘的高发季节为
87. 中毒型细菌性痢疾的高发季节为

(88 ~ 90 题共用备选答案)

- A. 单纯性肠梗阻
 - B. 绞窄性肠梗阻
 - C. 机械性肠梗阻
 - D. 麻痹性肠梗阻
 - E. 血运性肠梗阻
88. 肠管扭转引起的肠梗阻属于
89. 腹部大手术引起的肠梗阻属于
90. 急性重症胰腺炎引起的肠梗阻属于

(91 ~ 93 题共用备选答案)

- A. 尿道挫伤
 - B. 尿道裂伤
 - C. 尿道断裂
 - D. 尿外渗
 - E. 尿潴留
91. 尿道壁部分全层断裂
92. 尿道完全离断, 断端退缩、分离
93. 尿道内层损伤, 阴茎筋膜完整

(94 ~ 95 题共用备选答案)

- A. 严重脱水血容量减少
 - B. 双侧输尿管结石
 - C. 药物中毒
 - D. 尿道外狭窄
 - E. 双肾结石
94. 属于肾前型急性肾衰竭的原因是
95. 属于肾性急性肾衰竭的原因是

(96~98 题共用备选答案)

- A. 促性腺激素释放激素
- B. 促卵泡刺激素
- C. 人胎盘生乳素
- D. 雌激素
- E. 人绒毛膜促性腺激素

- 96. 卵巢产生
- 97. 垂体产生
- 98. 下丘脑产生

(99~100 题共用备选答案)

- A. 月经周期规则, 但周期缩短
- B. 月经间隔时间正常, 经期长
- C. 停经超过 6 个月
- D. 月经周期不规律
- E. 突然阴道大量出血, 伴痛经

- 99. 黄体功能不足者表现为
- 100. 子宫内膜不规则脱落者表现为

相关专业知识

A1/A2 型选择题 (1 ~ 79 题)

答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 有干咳不良反应的降压药物是
 - A. 氨苯蝶啶
 - B. 卡托普利
 - C. 阿替洛尔
 - D. 硝苯地平
 - E. 呋塞米
2. 关于室性期前收缩的心电图表现，叙述正确的是
 - A. 有提前出现的宽大畸形的 QRS 波
 - B. T 波与 QRS 主波方向相同
 - C. QRS 波群前出现倒 P 波
 - D. 代偿间歇不完全
 - E. 室性融合波
3. 洋地黄作用引起的心电图改变是
 - A. ST 段压低
 - B. ST 段抬高
 - C. ST 段出现鱼钩样改变
 - D. T 波倒置
 - E. 出现 Q 波
4. 对心房扑动最有效的治疗是
 - A. 维拉帕米
 - B. 电复律
 - C. 普萘洛尔
 - D. 毛花苷丙
 - E. 普罗帕酮
5. 窦性心动过速的心率范围通常是
 - A. 60 ~ 80 次/分
 - B. 80 ~ 100 次/分
 - C. 100 ~ 160 次/分
 - D. 120 ~ 180 次/分
 - E. 150 ~ 250 次/分
6. 治疗癫痫持续状态首选
 - A. 静脉注射地西泮
 - B. 静脉注射氯丙嗪
 - C. 静脉注射苯巴比妥钠
 - D. 肌肉注射苯巴比妥钠
 - E. 肌肉注射苯妥英钠
7. 尿路感染女性发病率高于男性的主要原因是
 - A. 解剖结构差异
 - B. 生理差异
 - C. 卫生习惯差异
 - D. 女性易感性强
 - E. 女性抵抗力较低
8. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症的正确治疗步骤是
 - A. 维生素 D → 补钙 → 止痉
 - B. 补钙 → 止痉 → 维生素 D
 - C. 止痉 → 补钙 → 维生素 D
 - D. 维生素 D → 止痉 → 补钙
 - E. 止痉 → 维生素 D → 补钙