

精校外科大成

上海錦章書局
出版

外科大成
上海錦章書局
PDG

分治部

此條頭面小疵及眼耳口鼻喉舌等部位因其症治多歧不可紊亂於大毒之內故另立之以便檢閱

頭部

頭痛頭風

頭痛頭風由風火濕痰四氣所致或因梅毒上攻及婦人產後當風梳洗太早並宜天麻餅子新久悉效及魚鱉散無憂散俱可選用若

頭仰視深者危裏痛搖頭者重頭痛連腦手足冷者死脈則浮滑易愈短澀難醫再如頭痛發熱氣喘而左手脈大於右手者虛也連

用參芪歸木陳皮甘草加大附子佐以茯苓芍藥數劑大汗而愈若以右大為內傷左大為外感實不悞耶

天麻餅子 治頭痛頭風及頭目昏眩項背拘急肢體煩痛肌肉蠕動耳鳴鼻塞皮膚頑麻癢痒癰疹又治婦人頭風眉後骨痛牙齦腫

痛痰涎壅心等症○天麻 川芎 細辛 蒼朮 防風 白芷 薄荷 甘松 白附子 甘草 草烏

川芎二鳥湯泥去 全蝎三錢 食麪打糊為丸宛豆大捻作餅子每服二十三餅食後細嚼葱湯送下火熱痰痛茶清送下其

者日進二服忌諸般發物

魚鱉散 治八般頭風○魚鱉用醋帶者切碎用麻藤 為末每服三錢卧時葱酒調服 日輕夜重者血虛頭痛也用當歸一兩酒二

鍾煎一鍾調服梅毒頭痛目腫者用本門湯藥內調服

蠲痛無憂散 治偏頭痛立驗

油風

油風則毛髮成片脫落皮膚光亮痒如虫者是行也由風熱乘虛攻注血不能榮養所致宜神應養真丹服之以培其本海艾湯洗之以

治其標

神應養真丹 治風寒暑濕鬱於陽部位以致血脈不能榮養連肌膚虛痒眉髮脫落皮膚光亮脫落

海艾湯○海艾 菊花 薄荷 防風 藜蘆 荳蔻 荊芥穗 甘松 蔓荊子 用水五碗煎入盆內先薰後

洗

白屑風生髮內及面目耳項初起微痒久生白屑疊疊飛起脫之又生由肌熱當風風熱之所化也宜

祛風換肌丸 治白屑風紫白癩風頑風濕熱瘡疥一切痒瘡日久不絕愈而又發者

威靈仙 石菖蒲 大胡麻 何首烏 天花粉 苦參 蒼朮 牛膝等分 當歸 川芎 甘草減半 右為末用

新安酒跌丸 菟豆大每服二錢白滾湯送下忌發物火酒

玉肌散 洗白屑風及風濕雀斑酒○菟豆半升滑石 白芷 白附子各二錢 右為末每用三匙洗面時用之

潤肌膏 治白屑風油風及疥癩白班作痒○麻油四兩當歸五錢紫草一錢 白芷三錢 白附子三錢 右為末每用三匙洗面時用之

疥瘡

疥瘡生自加成箇而不相連若癢瘡則生黃痂成片有膿為異耳夫頭為諸陽之首而瘡亦屬火乃二陽相灼所致其治法必當解陳莖

之積熱導心經之煩燥故宜以防風通聖散俱用酒浸過焙為末每日三服量見大小食後白滾水調服至頭上有汗出為驗外兼

以殺虫散風等藥搽之若虫死則痒止風散則髮生血潮則斑潤隨用生薑煎潤肌膚膏擦之則髮生矣忌動風發物

麥錢散○治疥瘡白癩疊疊痒若虫行者先用艾葉鍋裏煎湯洗淨瘡如次用肥猪肉湯洗之良久其虫自出隨用躑躅花油調麥錢散

搽之○瘡戴之隨後作痛發腫忌之三日後其瘡漸落其髮日生矣戒諸發物

躑躅花油方 取根四兩搗爛用菜油一碗搗枯去渣入黃蠟少許冷調前藥或用青布蘸此蠟油每日上三五次三日可愈

麥錢方 用小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內和硫黃四兩白硫一兩為細末攪勻待冷取起加烟膠半觔川椒三兩生枯礬各二兩共

研細末用時以葱湯洗淨用麻油調搽油紙蓋三日一換三次即愈又治小兒瘰癧瘡甚効

華蓋散○用糯米煮爛飯揭如膏隨將疥瘡刺盡米膏厚薄之其虫盡入米膏中俟膏自脫髮自生矣一用白豌豆為末將水調糊頭上

一指厚布裹之帶束之俟豆蒸發則覺痛矣去藥亦效

鼠痔膏 治白禿及諸瘡疥癬起白痂者○鼠糞為末杵大蒜和成膏塗之

癩瘡由母受胎之日食鹹辣

烏雲膏 治頭癬并生板膿疥及下部寒濕等瘡 松香末為君硫黃末減半和勻香油拌和糊攤南青布條上少半指厚捲成條線扎

之再用油浸一日取出刮去餘油以火點看一頭下以粗碗接之其布皮陸續煎去取所滴藥油浸冷水內一宿出火毒搽用

連蛤散 治頭癬頭瘡○黃連 文蛤 白芷等分 為末用水調攤於碗內覆於磚上燒艾薰之以黑乾為度再研為

末清油調敷 一用生牛皮燒存性為末陳醋調敷 一生於面者用百藥煎五錢生白礬二錢為末香油調敷

蟻蝨瘡 蟻蝨即蟻拱頭其因有二胎中受者小而修遠生後受毒者大而易愈但其內有衣膜故愈而復發未潰時用紺珠膏貼之膿熟者針

之插三品一條鎗於孔內化盡內膜自不再發又有不腫而不收口者必風龍之也用敗銅散搭之兼戒口味一擇吉日須午時於止房門檻前側卧耳前有穴名螻蛄穴用麥粒大艾於穴上灸之只一壯即愈

敗銅散 螻蛄節已破而不收口者化銅舊罐子為細末用香油調敷

髮際瘡

髮際瘡為生於髮際間也其形如粟如艾實頭白肉赤痛痒相兼甚則狀如葡萄而更痛由風熱上壅所致宜紺珠丹發之或酒製防風通聖散解之生髮內頂平而痒結黃蠟痂者梅瘡也生腦後窩中發痒流汁浸淫者名燕窩瘡治同瘡瘡

紺珠丹

酒製防風通聖散

面部

面屬乎諸陽而統屬惟陽明胃也其或胃熱則面熱胃寒則面寒宜升麻湯熱加黃連寒加附子

胃有風熱則面浮腫胃有濕熱則面生瘡或面黃赤或風刺癢疹宜升麻消毒散及秦湯

黃水瘡

黃水瘡頭面耳項項生黃粟破流脂水頃刻沿開多生痛痒由外傷風熱內傷濕熱所致宜升麻消毒散清之盪湯洗之青蛤散搭之

升麻消毒散 治面腫生瘡

防風 升麻 白芷 桔梗 連翹 枝子 芍藥

金銀花 甘草

牛旁子

用水二鍾煎入分食連服

外用杏仁去皮尖杵如膏敷之

青蛤散 治黃水濕熱等瘡

○蛤粉

石膏 黃柏 生五 青黛 三錢

右為末先用香油調成塊次加涼水調稀將瘡洗淨薄塗患處

淨薄塗患處

二白散 治黃水瘡頭瘡眉瘡耳蝕羊鬍子燕窩瘡

呂粉

五七次以粉黃色為度

加輕粉一兩

為末用麻油煤槐枝稍枯去渣取油調敷患處

渣取油調敷患處

一黃散 治症同前

○黃連

山甲 一分

輕粉五

用槐枝煎油調敷或猪胆汁調敷

二合散 治症同前

○呂粉

槐花

老松香一兩 銀硃四錢

共為末紙捲成條麻油浸透火藥看一頭摘下油藥以

器接之用調前藥三次即愈

眉瘡 生兩眉間形如疥癬屬肝胆二經熱用柴胡枝子散因乳母食厚味醇酒者加味清胃飲由鬱熱者加味逍遙散母子同服

面瘡 煎湯浸濕花貼之洗之日五七次 一用鯽魚頭燒存性為末醬內清汁調敷

面浮腫及陰囊浮腫者 史君子肉一兩白蜜五錢炙乾為末每服一二錢米飲調服

摩風膏 治面遊風毒○麻黃五錢菴活一兩防風二錢升麻二錢歸身 白檀香 白芨一名白 香油五兩 浸五日文火燂藥黃

即去渣入黃蠟五錢溶化

肺風酒刺

肺風由肺經血熱鬱滯不行而生酒刺也宜枇杷清肺散或用荷葉煮糊為丸白滾水服外用白礬末酒化塗之

枇杷清肺散 治肺風酒刺○枇杷葉 桑白皮二錢 黃連 黃柏各一錢 甘草三錢 用水鍾半煎七分食遠服

黃連散

黃連散多生女子之面由血弱不華火燥結成癰瘡不決所致宜服腎氣丸以滋化源洗玉容散兼戒憂思方可一云風邪入皮膚癢飲

清肺臟則面黧又當隨其因而調之也 一用蜜陀僧為細末入乳調敷鹿角尖用酒磨塗之

腎氣丸見前 玉容散見前

雀班

雀班由水虧不能制火火滯結而成班也宜六味地黃丸服之周玉容散洗之久久可愈

玉容散 洗黎黑班雀班粉刺功能白面嫩肌○白芷 白朮 白芨 白茯苓 白扁豆 白細辛 白姜 白蓮蕊

白麝香 白銀 白錫黃 甘松 團粉 加白丁香 白附子 應條等分 防風 荊芥穗 羌活 獨活各半

○其末礬收日洗三次 一醋浸白木擦之半月驗

六味地黃丸見前

黑子

黑子悉名也由腎氣濁滯於陽分陽氣束結而成也古云面無善痣故宜去之用針挑撮搽四白散紙封之三四日自脫用貝葉膏或塗

硃膏生肌兼戒醬醋則愈後無根

四白散 點痣去班○糯米三石五 巴豆五兩 用夏布色之扎之取石灰鵝蛋大一塊沖滾水一碗泡化以水煮米包成飯取出乘熱加

硃砂末一錢杵勻加灰水研如糊礬收之聽用

鼻隱瘡

鼻隱瘡生小兒鼻下兩旁由風熱客於肺也流澤浸淫痒而不痛宜服澤瀉散搽青蛤散見前

澤瀉散 治鼻隱瘡○澤瀉 鬱金 枝子 甘草 等分為末用甘草湯調服

羊鬍子瘡生於下頰承漿治同黃水瘡

眼部

眼胞困毒

菌毒生於眼胞其形如菌頭大蒂小漸長並出甚者眼中流淚漸至昏朦由脾經濕熱凝結而成也法以軟綿紙蘸水磨肥上少頃用左手大指甲墊於患根右手以披針尖頭齊根切下血出不妨預用翠雲鏡子磨濃塗之其血自止內服涼膈清脾飲仍忌海味煎炒涼膈清脾飲○黃芩 枝子 連翹 薄荷 赤芍 石膏 生地 防風 荊芥 甘草 煎用水二鍾燈心二十根煎八分食後服

翠雲鏡 治菌毒割後塗之亦治爛弦風眼暴赤○杭粉五兩 銅絲一兩 輕粉一錢 共為細末用黃連一兩川米百粒水一碗煎半碗去米再煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨如墨令濃以雞翎蘸塗患處

治眼厚翳將前藥用黃連八兩煎膏加牛皮膠二錢鎔化和藥成錠用無根水磨厚敷眼內片時用水洗淨其翳自起以刀剪去之

眼丹

眼丹生於眼胞紅熱腫痛由脾胃二經風熱所致若風盛則浮腫易散熱盛則堅腫難消初起宜敗毒黃連丸清之甚者貴金丸下之外貼精豬肉片或透坎宮錠子俟膿成則針之自覺膏貼之收口

敗毒黃連丸 治上下眼丹○黃連 連翹 羌活 防風 甘草 右為末煉蜜為丸梧子大每服五十丸茶水下

單礬膏○粉草二兩 兒礬五錢 水煎濃汁濾淨渣再煎濃如冰片以雞翎蘸膏頻搽腫處 一用精豬肉切片水漂去血貼丹上不時易之

坎宮錠子 貴金丸 針眼

針眼 針眼土疳也小瘡生於眼胞間微者不膿而愈甚者成漏入風則頭面發腫目亦赤癢初起以針刺破即痊

黃耆散 治針眼○川芎 黃耆 黃連 為末每服二錢煎細茶菊湯調服 外以枯礬末雞子清調敷 腫者用南星末同生地黃搗膏貼太陽穴而腫自消

眼胞痰核

痰核生於眼胞在皮裏膜外其形如豆堅而不疼由痰因火滯也輕者自愈重者須金瘡漏諸疾初起時用生南星以醋磨濃頻塗患處皮

薄者微微撥損以手指甲擗出白粉即愈貼貝葉膏收口觀清

眼胞内生椒瘡粟瘡

椒瘡粟瘡生眼胞之內由脾胃血熱所致椒瘡則赤堅而難消粟瘡則黃軟而易散今人用燈草竹葉以治標孰若清脾涼血以治本宜

善提露洗之

脾胃症

脾瘵症乃眼胞耑如舌抵唇之狀由胃經氣滯血壅皮急絲吊所致宜瀉脾胃之積熱

漏睛

漏睛為睛內有乳時流濃汁也其名不一如正漏生於風輪初出白膏如黍尚可治久則出青黑膏損及瞳人者不治偏漏生於氣輪者輕流白水重則成膿久而膏枯者不治內漏生於口竅之傍外漏生於肉輪之外此由積熱痰火熏蒸所致陰漏則晝輕夜重宜養血清肝陽漏則夜輕晝重宜清金補氣又在大眇屬心經君火宜補北瀉南小眇屬心胞相火宜於北方中補而抑之也總之目者肝之竅路者肝之主治宜補腎宣肝為要

白微丸 治漏睛出膿○白微一兩 防風

解毒丸 治漏睛出膿○杏仁去皮二

大小眼皆出膿大眼皆出血

眼皆出膿者大腸熱也用桔梗連木通檳榔朱熹之類眼皆出血者小腸熱也用歸尾赤芍黃連

耳部

耳者心腎之竅肝胆之經宗脈之所聚也心腎工內如精血不足或聾聵或虛鳴稟賦弱也六味地黃丸加桑螵蛸或滋陰地黃丸肝胆主外如風熱有餘或脹痛或腫痒邪氣客也柴胡清肝散因血燥者柴胡枝子湯如未應佐以六味丸間服九味蘆薈丸因食積內熱者四味肥兒丸之類

柴胡清肝散 治瘡毒生於耳前後自身外側至足股內側至足或胸乳小腹下等處皆肝胆三焦經風熱○柴胡 黃芩炒 人參

各二枝子 川芎各五分 錢連各二錢 桔梗各二錢 甘草五分 水煎食遠服

滋陰地黃丸觀清 柴胡枝子湯觀清 九味蘆薈丸觀清 四味肥兒丸

耳底疼痛

升糖湯 治耳內腫痛三陽經風熱也再治面腫痛咽○升麻一錢 桔梗一錢五分 昆布二錢 連翹二錢 胆草一錢 射干一錢五分 用水鍾半煎

八分食遠服外以軍持露滴之

軍持露 治耳痛引腦項者○熊胆分許水片少許 涼水五七茶匙化開滴入耳內其冷如水其痛立止少時傾出二三次全愈內

或用鉄店石池內磨刀水滴之 垂盆草取汁尤佳

芍藥散 耳痛連頭流膿出血者風熱上壅也○赤芍 白芍 川芎 當歸 大黃 木剝子

甘草五分○水二鍾煎八分食遠服

加味涼膈散 耳濕腫痛屬少陽相火治宜辛寒○黃芩一錢枝子五分連翹二錢薄荷五分甘草一錢朴硝一錢大黃 防風各一錢

羌活一錢水二鍾竹葉二十片煎一鍾加蜂蜜少許食後服 氣閉者加菊花 蔓荊子 石菖蒲

黑疔

黑疔生於耳內一點疼如錐刺痛引腮腦破流血水用前升桔湯軍持露等法治之因效者疔也急服蟬酥丸汗之研蟬酥餅水調滴於

耳內立效

一灸後船穴七壯灸視

耳疳

耳疳者為耳內流出膿水臭穢也書有云出黃膿為傳耳紅膿為風耳白膿為蠟耳清膿為震耳名雖有五其源則一由足少陰虛熱者

四物湯加丹皮石菖蒲及地黃丸滋補之由手少陽風熱者蔓荊子散交感丹清之 若小兒胎熱或洗浴入水作痛生膿者在初生

月內者則不必搽藥如治之早則項下結腫任其毒盡自安至月外不瘥者用紅綿散搽之

蔓荊子散 治耳出膿水○蔓荊子 桑白皮 菊花 前胡 升麻 赤茯苓 赤芍藥 生地 木通 甘草煨等○用水二鍾煎

八分食遠服

滋陰地黃丸 治耳內虛鳴膿汁不乾者○熟地二兩茯苓八錢山萸一兩菊花八錢丹皮八錢黃柏八錢何首烏黑豆蒸 共為末煉

蜜為丸梧子大每服二三錢空心淡鹽湯送下

交感丹 治耳疳氣不宣通遂成聾瞶者○香附三錢黃連二錢茯苓二錢甘草一錢桂心一錢○共為末每服錢半燈心湯下

紅綿散 治耳內流膿腫痛已消膿尚不止者○枯白礬錢乾臘脂二射香二分 共為末確收先熨綿球絞盡耳內濕膿隨用綿球蘸

藥送入耳底自愈 一用臘日枯礬入猪胆內陰乾吹用 一用雞腩皮焙或文蛤末吹之 一用陳年醬如蒂梅汁滴於耳內

耳衄

耳聾者耳出鮮血也。由上焦血熱所致。若肝脉弦洪者。柴胡清肝湯。虛火妄動。腎脉數而弱者。六味地黃丸。生地麥冬散總以涼血清心為主。外以神塞丸塞之。

生地麥冬散 治耳出血及鼻衄。○生地一兩 麥冬一兩 水二鍾煎八分。食遠服。

神塞丸 治耳內出血及鼻衄。○射香一分 沉香三分 白礬一錢 糯米五升 共為末。糊丸梧子大。薄綿裹之。如左耳出血塞右鼻。右耳出血塞左鼻。如左鼻出血塞右耳。右鼻出血塞左耳。兩耳出血塞兩鼻。兩鼻出血塞兩耳。

六味地黃丸 治耳聾。○柴胡清肝湯。

耳痔

耳痔及耳挺。耳聾俱結於耳之竅內。不腫不潰。不痛塞久。令人重聽。宜枝子清肝湯。兼外搽藥。緣於縫內化盡自愈。

枝子清肝湯 ○牛旁子 柴胡 川芎 石膏 當歸 枝子 丹皮 歸一 黃芩 黃連 甘草各五分

用水二鍾煎八分。食遠服。

耳癰瘡

耳癰者。生耳後縫間。延及上下。如方絮之狀。隨月之盈虛。故名月蝕瘡。宜川粉散搽之。如初生。如黍次爛。如鴉喙之狀。名鴉喙瘡。用鴉喙散之。

川粉散 治耳癰及黃水等瘡。○川山甲炒 呂粉炒 輕粉燭 微細 ○為末。搽乳用麻油調敷。一用地骨皮煎湯洗淨。仍用地骨皮為末。換之。乳用香油調敷。

鴉喙散 治耳癰等瘡。○老鴉毛服反作性一錢 大紅絨燒灰存性一錢 白礬枯五分 珍珠五分 冰片二分 輕粉五分 黃丹一錢 射香少許

右為末。搽用。

耳痒

耳痒搔之。雖至血出而痒不止者。腎風也。宜服三因四生散。三服即瘥。

四生散 治耳聾。○風門。

耳聾

蠟蟬丸 治耳聾。由肺氣虛者。○山藥炒 三 白茯苓二 杏仁去皮尖炒 ○為末。用黃蠟一兩溶化。為丸。彈子大。鹽湯嚥下。少氣喘乾者。用生脉散煎湯嚥下。

生脉散煎湯嚥下。

東垣王提督方 治暴聾。重一二次。三五年者。重五七次。全愈。多年者不治。○靈磁石七錢 珍珠七錢 當門子射三粒 ○為細末。漸艾一

錢為粗末次用白綿紙一張鎮熱銅器上用黃蠟五錢遍擦紙上裁為五寸大方塊將前艾均分鋪紙上艾上將藥搗成筒仍以火烘蠟紙粘牢聽用再厚紙捲筒如喇叭樣以小口對耳次將藥筒點着吸吸側耳重之力能隔耳透咽其功甚捷重藥用艾菰塞耳以避風入

鳳珠丹 耳聾○鷄蛋一個開一孔入巴豆一粒去心膜用雙層紙封之與鷄抱之以雞為出度取蛋清滴耳內日二次

一用鼠胆汁確入耳內少時令人於耳內視之俟耳竅內有虫見即以捻子捻虫頭緩緩扯出其虫之大小隨年分之久近其虫一出患人發覺少時即點點即聽矣此法不問新久雙聲雙聲悉驗如兩耳則用二胆治之

虫入耳

虫入耳者以姜擦貓鼻貓尿自出取尿滴耳內其虫自出而愈諸方皆不及此若用麻油滴之則虫死而難出矣虫入耳久之食腦而腦痛者用桃葉為枕虫自鼻孔內出虫入耳用雄雞冠血滴之

凍耳成瘡

凍耳用生薑取汁熬膏塗之忌用火烘湯泡犯之則肉死宜與凍瘡門參攷

鼻部

鼻者肺之竅也五氣入鼻藏於心肺心肺有病三鼻為之不利

鼻淵

鼻淵者鼻流濁涕黃水腥穢是也又名腦崩腦漏久之令人頭眩虛暈不已經云胆移熱於腦則鼻淵淵遇寒而壅者火鬱之為也書

云胆與三焦同火治故先宜清上繼以鎮火補水兼理肺肝清上多取乎辛涼如荊芥薄荷甘菊連翹升麻牛旁子天麻子之類鎮

火補水如犀角二冬硃砂人參五味子茯苓山藥丹皮甘草之類理肺如桑皮桔梗二冬牛旁子天花粉竹瀝之類清肝胆如柴胡川

芎竹茹桑仁羚羊角之類余治腦漏於對症藥內加檀香片一大撮無不奏效

奇效霍香湯治鼻淵致虛虛暈不已○霍香連梗葉九錢水一碗煎七分加公猪胆汁一枚和勻食後服重者不過三服即愈或以霍

香為末猪胆汁熬膏和丸每服二錢食遠白湯送下久而虛者兼服補中益氣湯六味地黃丸以滋和

天蘿散治鼻淵而兼腦痛者名控腦砂有虫食腦絲本藤近根處三五尺燒存性為末每服二錢酒下

馬兜鈴散治鼻淵○馬兜鈴鉅麻黃三錢五味子一錢甘草一錢水二鍾煎一鍾加黑砂糖少許卧時溫服即愈

白芨丸白芨末酒糊丸每服三錢黃酒下半月愈

鼻淵鼻流濁涕也鼻數鼻流清涕也如老人流涕不乾者揭獨蒜數足心自不再發

鼻淵服約固效者惟灸上星穴五壯即愈仍服八味地黃丸以滋化源

鼻聾

鼻聾者為不聞香臭也宜神愈湯以生薑為引水煎服之立驗歌云細辛羌防半芎歸陳桔苓薄荷增三倍煎服氣調勻

鼻衄

鼻衄者鼻中出血也由肺經血熱妄行治宜涼血然涼血必先清氣氣清血自歸經矣如枳殼連翹排之薄荷玄參散之蒲黃白茅根止之再如羚羊清肺散生地麥冬飲加味生肺散皆對症藥也如夏月肺虛身熱大汗口渴者暑熱所逼也黃連香需飲清之外用青棉線扎兩手中指根再用毛邊紙指十餘層水濕透貼百會穴以壓斗殿之或再用好燒酒十數碗盛盆內踏兩足浸之或搗大蒜於兩足心塗之再以神塞丸塞之再以傾銀紫土新礮為末燒酒調敷顙門立止

羚羊清肺散 治衄血及吐血咳血○羚羊角 銀柴胡 黃連 玄參 石膏 地骨皮 枝子 歸身 白芍

川芎 生地 蒲黃 蘆薈 甘草 白茅根四兩搗爛入水一碗和絞去渣取茅根汁一碗入藥煎

七分加重便一鍾食後服

加味生肺散 治衄血○麥冬五錢 人參二錢 五味子一錢 姜炭二分 用水二鍾煎八分食後服亦可代茶

伏龍散 治血衄 并血崩○伏龍肝即非壯中心壯土也 為末每用二錢冷水調服即止

黃連香需飲○香需 厚朴 姜炒 白扁豆 炒 黃連 炒 汁 用水煎熟冷服

生地麥冬飲 神塞丸俱見耳師

鼻痔

鼻痔生於鼻內形如榴子漸大而下垂令人氣不通暢由肺經濕熱內蒸如朽木而生芝蘭也宜辛夷清肺飲外兼消痔散等藥點之化水而消仍即厚味氣怒省房勞庶不再發

辛夷清肺飲○辛夷六分 黃芩 枝子 麥冬 百合 知母 石膏 升麻 三分 甘草 五分 枇杷葉 三片 用水二鍾

煎八分食後服或加 連翹 薄荷 羌活 防風

消痔散 治鼻痔○礪砂一錢 輕粉 雄黃 各三片 五分 右為細末用草穗咬毛蘸藥點痔上日五七次漸化為水○一用白礪

三錢安新瓦上上蓋密陀僧末白礪末各二錢煨烟盡為度埋一宿去火毒配苦丁香末等分加麝香四分和勻或加礪砂少許每

用少許吹之即流黃水腫消則氣順矣 一方用水片點之稱驗

鼻疳

鼻疔生鼻內痛引腦門鼻竅鼻塞甚則唇腮俱腫宜蟾酥丸汗之鼻孔用蟾酥條研末吹之如鼻外發腫用搗宮散子塗之鼻腫如瓶者
逆一灸腕骨七壯壯如莖豈大眼

鼻瘡

鼻瘡為鼻孔孔燥發痛而有瘡也宜洗肺散清之外用油紙捻粘辰砂定痛散送入鼻孔內日三五次
洗肺散 治鼻內生瘡○黃芩 半夏錢二 天冬 麥冬 五味子各一錢 杏仁一錢 甘草五分 用水二鍾生薑三片煎八分

食遠服

辰砂定痛散○

酒釀鼻

酒釀鼻者先由肺經血熱內蒸次遇風寒外束血凝凝結而成故先紫而後黑也治須宣肺氣化滯血使榮衛流通以滋新血乃可得愈
麻黃宣肺散 治酒釀鼻○麻黃 麻黃根各二 頭生酒五壺重湯煮三炷香露一夜早晚各飲三五杯至三五日出膿成瘡十餘

日則膿盡膿盡則紅色退先黃後白而愈

調榮化滯湯○當歸 川芎 赤芍 生地 紅花 黃芩 陳皮 甘草 生薑 生薑 三片 用水二鍾煎八分加酒少

許調五靈脂末二錢食後服氣弱形肥者加酒炒黃耆立愈

黑參丸 治酒釀鼻○玄參為末用猪胆汁和丸每服錢許食後白滾湯送下外以玄參末仍用猪胆汁調敷鼻上

外治諸方○流黃為末以陳糟加汁調敷 一用象牙末或鑿院僧或杏仁搗爛俱用人乳調敷

唇部

經云脾之榮在唇其為病也燥則乾熱則裂風則皸寒則揭是也治宜隨其因而療之忌用追蝕等藥及藥線等法

反唇打鎖口疳

反唇打鎖口疳性於二疳初起如粟堅硬如鐵腫麻痺寒熱交作內外治法於疔瘡門參攷

唇疽

唇疽生於唇腫痛有頭甚則寒熱交作由腎經積熱所致宜神授衛生散壯者貴金丸外用萬宮錠子

神授衛生散 貴金丸

齒唇

齒唇者初生如莖漸大如齒或如菊花靈芝等樣腫硬疼痛破流血水久變消渴消中之症由胃中積熱火炎留注所致初起及已成無

內症者用麻子大艾炙三壯貼臍餅膏約差之日久漸消有內症作渴者早服如減地黃丸午服清涼甘露散以滋化源如日久流
血不止見形脈虛熱面黑頰紅口乾渴甚

清涼甘露散○犀角 銀柴胡 茵陳 石斛 枳殼 麥冬 生地黃 黃芩 知母 枇杷葉 甘草各一

淡竹葉 燈心各二 用水二鍾煎八分食遠服

唇風

唇風生下唇發鼻不痛腫裂流水由胃火上攻也宜滋陰地黃丸外以坎宮錠子一錢加銅青末五分水調塗

滋陰地黃丸 治陰虛火燥唇裂如爛○熟地 山藥 山萸 五味子 麥冬 當歸 菊花 枸杞 肉蓯蓉

巴戟 右等分為末煉蜜為丸如梧子大每服七八十九丸空心白滾湯送下

口部

脾氣通於口脾和則口能知味又心脈布於舌上脾脉布於舌下故心脾積熱則口舌生瘡蓋則腮舌赤腫此是火也治以苦寒如涼膈

散又膀胱移熱於小腸腸膈不便上為口糜如灶底燃薪籠中肉腐之象也宜柴胡地骨皮湯或五苓散導赤散合而用之如服寒涼

之藥不應者虛火也治以甘溫如發熱飲冷者上焦虛熱也補中益氣湯服冷腹痛便滑食少者中焦虛寒也附子理中湯八味地黃

丸補熱內熱唾痰便數口乾作渴者下焦虛火也加減地黃丸此從治之法也如小兒又當察面圖部位分臟腑虛實而藥之

升麻飲 治口內生瘡齒齦肉爛○升麻 玄參 黃連 羚羊角 黃芩 葛根 麥冬 羌活 防風

菊花 大黃 熟地 人參 炙甘草 知母 水二鍾煎八分食遠服

甘露飲 治口舌生瘡及牙宣齒齦腫爛時出膿血不任涼藥者○枇杷葉 石斛 黃芩 麥冬 生地 甘草 加

枳殼 茵陳 各等 水二鍾煎八分食遠服

辰砂定痛散 治口舌生瘡咽喉腫痛○軟石膏 胡黃連末 辰砂末 水片 共為末收罐內如口內則搽之喉內則吹

之日上五七次嚥之

蟾酥餅 治口內生瘡齒齦內爛○蟾酥 硃砂 麝香 為細末用溫水半盞化令勻盡入紅絲五分藥汁調

乾再浸候藥汁盡將餅子截每用一片貼患處有涎即吐之日三五次

抽薪散 治口舌生瘡並小兒火眼○大附子為末津調敷足心內油紙蓋之絹條扎之 一用草烏南星乳美等分為末醋調敷手足

心一用吳茱萸為末醋調敷脚心一用細辛為末醋調敷臍 一用白礬三四兩沖淡水一盆浸化

涼膈散 治上焦實熱口舌生瘡及咽喉腫痛

黃芩 枝子 連翹 薄荷 甘草 桔梗 朴硝 大黃○水二鍾竹葉二十片煎八分加蜂蜜三匙和服

附子理中湯 五苓散

導赤散清心下

生地

木通

甘草加竹葉水煎服

補中益氣湯

八味地黃丸

加減地黃丸

舌部

心開竅於舌而心脈又係於舌也再肝脈絡於舌本肺脈絡於舌傍是舌屬三經不必專主於心也

紫舌脹

紫舌脹者舌脹滿口堅硬疼痛由火盛血壅所致又云脾熱則腫滿用針扎筋頭上露鋒分許於舌上刺數十刺令其血出紅色者輕紫色者重以溫湯漱口搽冰硼散服涼膈散加牛蒡子荆芥枝子燭火之要約也或去硝黃 一用番木鱉刮去殼咀片含少許即消 一用算麻子仁研紙燃燒烟熏舌入口即消 一云舌長過寸研冰片敷之即消 一灸少冲穴

痰色

痰色生於舌下結腫如蟬光軟如綿甚則塞令滿口由火擊痰飲流結而成宜用拔針封包上燃之如鑼鑼破出稀涎如雞子清稠粘不

斷拭淨搽冰硼散服二陳湯加黃芩黃連薄荷之類仍忌煎炒火酒等物庶不再發

冰硼散 治舌脹痰色重舌不舌咽喉腫痛

冰片一分 硼砂辰砂一錢牙硝一錢 為末收用喉生毒加燈草燒灰更效

舌衄

舌衄為舌上有孔小如針簪本如筋頭甚或色黑出血如湧由心火炎上血熱所致宜升麻湯香參丸又云肝壅則血出如湧肝風則舌升麻湯 治舌衄血出如湧

升麻

小薊根 為根各兩 艾葉五分 寒水石三兩

為末每服三錢用水一鍾煎七分去渣入生地黄汁一合再煎一二沸溫服或加柏葉

香參丸 治症同前○人參 麥冬 當歸 生蒲黃各五生 生地二兩甘草五分

生蒲黃各五生

○右為末煉蜜為丸小彈子大每服一丸每

日三四服白滾水化下

重舌等症

痰氣

重膈

舌疔

舌下生小舌為重舌宜冰硼散搽之 舌上生核強硬作痛者為痰氣用針點破搽冰硼散服清火消痰之藥 舌上生瘡形如楊

梅外無寒熱內却煩者為重膈忌用針刺宜黃連解毒湯加桔梗甘草外兼吹藥 舌上生瘡其形如豆堅硬寒熱疼痛應心者疔也宜蟬酥丸含於舌下隨化隨下或再服三粒以解內毒甚者刺之或多少沖穴

弄舌舒舌

弄舌者微露即收也屬心脾經筋損宜溫脾散補之大病後者難醫

舒舌者舌舒長良久方收也由心脾積熱宜瀉黃散主之

涼膈散

黃連解毒湯

蟬酥丸

牙齒部

當門為齒上屬腎脈下屬任脈兩旁為牙上屬足陽明胃經下屬手陽明大腸經夫牙者骨之標而屬腎牙之生如木之栽於土也如腸胃素有濕熱上出於牙齦之間適被風寒或為飲冷所逼則濕熱不得外發而作痛乃陽明病非少陰病也是症以寒為標故外用擦漱之藥宜年溫取其散寒開鬱以熱為本故內服之藥宜年涼取其散熱清中如連翹湯之類再火勝則痛必牽扯顫顫如石膏風勝則腫加防風氣勝則長加枝子氣鬱則脹亦加枝子痰勝則木加貝母外以醋漱之去其痰涎瀉其風熱瘡惡則黑加史君子肉虫蝕則蛀加板榔外以五靈脂湯化漱之以殺其虫再血虛則齒痒腸胃虛則齒露過勞則齒浮腎虛則齒鬆惟精固則齒堅又當隨其症而用滋補也

牙痛

連翹湯 治一切牙痛隨前症加減○黃芩 黃連 當歸 赤芍各一錢五分 連翹一錢 天花粉 玄參各一錢 枳殼五分 ○用水

二鍾煎

治一切牙痛隨前症加減○黃芩 黃連 當歸 赤芍各一錢五分 連翹一錢 天花粉 玄參各一錢 枳殼五分 ○用水

加味涼膈散 治濕熱牙痛腮腫浮腫牽引太陽口熱便秘者依本方加減○石膏 升麻 淡竹葉○水煎加蜜調服 治牙痛

久不愈諸藥罔效者只用石膏一兩升麻五錢水煎服效

升麻四物湯

治血虛牙痛○當歸 川芎 赤芍 生地 白芷各一錢 黃芩一錢 升麻五錢 蒲公英五錢 ○用水一碗半煎

八分食遠服

貴金丸 治牙痛內外俱腫狀類傷寒發頤者為搜牙風先以紺珠丹汁之次以貴金丸下之再次用清痰降火之藥調理

羌活附子湯 治冬月大寒犯腦令人腦牙俱疼名曰腦風○麻黃 附子各一錢 羌活 蒼朮各一錢 黃耆一錢 防風 甘草 升麻 殭蠶 黃柏 白芷各一錢 佛耳草 用水鍾半煎八分熱服

定痛塞耳丹○細辛 盆硝各一錢 雄黃五分 牙皂二個 為末用大蒜一枚杵和為丸梧子大每用一丸綿裹之如左牙痛塞左耳右

牙痛要若日久不止一丸可治數人

固齒白玉膏

治一切牙痛及齒動搖而不堅固者。龍骨一兩、陽起石五錢、二味火煎通紅、鉛粉一兩、珍珠三錢、象牙末五錢、麝香三錢、

和味黃蠟

溶化濾淨再化俟溫方入前藥和勻乘熱攤紙上如冷燒熱熨斗仰放紙鋪斗上攤之用時先漱口淨剪小條貼齒

根上閉口勿語過宿如失

製龍骨陽起石藥汁方

殭蚕四兩

防風

當歸

川芎

牙皂

青鹽

升麻

白芷

骨皮

各五錢

細辛 華本各三錢

為粗末長流水於沙鍋內桑柴火熬汁去渣再煎汁一碗以浮爛藥末

蟬酥丸

綿裹一粒咬痛牙上其痛立止甚者用真蟬酥麥粒大咬之更驗然痛牙即爆落如手取

齒根腫痛出膿者名曰風齲及治虫蝕牙痛

乾蝦蟆

乾蝦蟆一個青魚一分蘆薈半分 共為末用生地黃煎膏和約塗之

補蚌丹

虫可痛者研新巴豆和乳香末為丸塞注孔內如虫已去而孔內空痛者只用乳香炙軟塞之

落齒方

老鼠一枚入礪砂一錢于肚內咬破蓋有爛生蛆取蛆炙乾為末用時以刀剔破牙根四圍而後塗之半刻自落

牙

牙血牙宣為牙縫中出血也若胃經實熱者則血出如湧口必臭而齒不動宜清胃湯甚者調胃承氣湯下之孰若用酒製大黃末三錢

以枳殼五錢煎湯少加重便調服下黑裏而愈是治脈洪有力乃陽明之熱盛也若胃經虛火者宜二參湯及補中益氣湯加黃連丹

皮腎經虛者血則滴點而出齒亦悠悠然而痛口不臭而齒動或齒落治宜安腎有火者六味地黃丸無火者八味地黃丸俱加猴姜

隨手而應肝氣盛者兼服蘆薈丸俱外兼姜湯玄胡散為沒擦之漱之

二參湯

治牙血屬虛火者

玄參

水煎服

猴姜湯

治牙血及牙痛根腫動搖者

水二鍾煎一鍾八食鹽一撮漱之

柴胡散

治牙宣 玄胡索生為末用前湯漱過以此敷之

荔枝湯

治

堅齒明目 荔枝一箇搗一孔入食鹽七分花椒三分以滿為度紙包泥固炭火煨存性為末早晚擦之

補中益氣湯

六味地黃丸

八味地黃丸

見

見

指齒疳

指齒疳者為牙根肉內攢出骨尖如刺而作痛也小兒多有之用拔針刺開好肉取出本牙如出血不止以濕紙換貼二次自止戒厚味

其牙復生如舊

牙疔

牙疔為牙縫中腫起一粒痛連頤頤項或兼麻痺或破流血水異於常症者打也用竹簽挑破以見鮮血為度搽拔疔散再以蟾酥丸噙之服之或灸神授穴二七壯

牙癰附多骨

牙癰為牙床上堅腫疼痛身發寒熱勢盛如常者癰也初宜貴金丸下之蟾酥丸噙之或灸外踝骨尖三壯或刺破將冰硼散如初時堅腫破流膿水久不收口者多骨也必候骨尖刺出搖動內動方可取出其口自愈

貴金丸

蟾酥丸

走馬牙疳

走馬牙疳者近連之為也故有鼻疳唇疳舌疳喉疳之稱其症牙根作爛隱變重腐臭穢難聞由肝胃二經虛火熱極上攻所致宜蘆薈消疳散三黃香露散以清府熱人參茯苓粥以養胃氣外用手法取去腐肉內見紅肉流血鮮者為吉如頑肉不脫腐黑復生牙落無血穿腮破唇喉腫外發身熱不退臭穢不止用藥固效者俱為不治

蘆薈消疳散

銀柴胡

胡黃連

黑玄參

牛蒡子

羚羊角

桔梗

枝子

石膏

升麻

薄荷

葉

甘草

用水二鍾淡竹葉十片煎六分食連服

三黃香露散

牛黃

黃連

大黃

酒蒸木香

青黛

右為末

用淡竹葉薄荷煎湯調服

人參茯苓粥

必先服此以養胃氣

人參

茯苓

為末

用一鍾同米二鍾煮粥食之先用鹽湯漱口

洗牙疳

先用麻油通口噙嗽覺無油氣吐之如式六七次以百沸湯入鹽醋漱吐三四次再次以綿胭脂拭乾然後上藥此秘法也

也

再生散 治走馬牙疳牙落鼻崩久不愈者

土靈

山豆根

人中白

辰砂

右為細末

先割淨腐肉用前法洗

一淨拭乾擦之七日內長肉如舊

大散

治走馬牙疳爛極者

象牙

枯骨

赤石脂

鉛粉

射香

為末

乾擦或用油調

一用烏鴉頭龍骨

枯塔

赤石脂

鉛粉

射香

為末

乾擦或用油調

牛黃生肌散

治牙疳臭爛穿腮者

牛黃

珍珠

琥珀

人中白

胡黃連

乳香

沒藥

右為末

擦用

兒茶

二錢

研砂五分

冰片

右為末

擦用

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook