

經驗積玉奇方

(京)新登字 027 号

责任编辑:徐岩春

图书在版编目(CIP)数据

经验积玉奇方/(明)艾应期辑. —影印本. —
北京:中医古籍出版社, 1994. 12

(中医古籍孤本大全/薛清录等选编)

ISBN 7-80013-602-7

I. 经… II. 艾… III. 方书—中国—明代 IV.
R289.348

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 01576 号

中医古籍孤本大全

经验积玉奇方

(明)艾应期撰

中医古籍出版社出版发行

韩营古籍印刷厂印刷

一九九五年十月出版

ISBN7-80013-602-7/R·598

定价:叁佰贰拾元

新刻經驗積玉單方卷之下

楚桃源潼溪艾應期著

撫金谿水壺汪萬鍾訂

金陵如山周文煒梓行

女科

安胎萬全神應散 秘傳累經試効不可加減百發

百中 係金陵李醫產祖傳方

治孕婦三月前後或經惱怒或行走失跌損傷
胎氣腹痛腰腫一服即安雖見血一二日未離

宮者加一劑自安倘先三四五月已經半產者
將及前月分畧覺腰骨酸脹忙服一劑安之過
此必定萬全

當歸酒浸壹錢

川芎陸分

白芍七分

熟地黄八分

姜汁浸白朮壹錢黃芩壹錢

黃芪七分

杜仲七分

砂仁五分

阿膠六七粒

茯苓七分

甘草三分

胸前作脹加紫蘇

陳皮六分

白帶或紅加地榆壹錢

艾葉七個阿膠多加

見紅加

川續斷壹錢

糯米百粒

石水一鍾酒一鍾煎八分空肚服如痛急將銅錫煎一鍾即時服

治孕婦胸前作熱不食嘔吐 此名噎阻

白朮

壹錢

黃芩

壹錢

茯苓

八分

陳皮

八分

甘草

三分

紫蘇

七分

砂仁

六分

山梔

姜汁炒六分

當歸

八分

白芍

八分

山楂

七分

藿香

六分

右水二鍾姜三片煎八分食遠服

芎歸益母丸

胎七八個月用

益母草

四兩

當歸

壹兩

川芎

五錢

忌鉄器

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心服

胎前加砂仁壹錢或溫酒或滾白湯下產後不

用砂仁用童便送下五六十九

保產無憂散治婦人難產橫生逆生甚至七八日

不下及血暈陰脫無乳皆治九個半月服

一貼臨產二三日之前預服一貼尤效只如前

症者一服即生

當歸壹錢五分酒洗川芎壹錢三分厚朴七分姜汁炒枳殼去穢炒

六分三草五分真艾葉七分羌活五分貝母一錢

荊芥蕙 八分

黃芪 八分

白芍 一錢二分

兔絲子 壹錢四分

右水二鍾生姜三片煎八分空腹服之如婦人生

育艱難產時一服即生矣

催生滑胎湯 臨產時用全孕婦易生累試神効

當歸 壹錢

川芎 六分

茯苓 七分

甘草 三分

枳壳 六分

紫蘇 六分

滑石 六分

木通 五分

益母草 三錢

砂仁 五分

右水一鍾煎八分不拘時服

開骨丹 催生 五月五日午時擇透明硃砂透明

滴乳等分先將砂飛過為塵末次將乳香入銅
鈔內鎔化就入砂末和勻乘熱為丸如芡實大
臨痛至不可忍時用井花水面東吞下一丸立
產

轉胎方 治橫生逆產 臨產時或見手見足用拓

樹葉不拘多少用水七八碗鍋內煮熟連飲二
碗少頃不動又進一碗少頃又進連進四五碗
其胎藥氣提上自然轉身順下矣先與產婦說

明有此方決無恙。兒致心慌神亂。

臨產法

至妙

凡孕婦將滿月。腹覺微痛。不可便

聲揚。每見人家不諳事。婦人走入不查時候。即

多人搦扶。苦令着力。不知時候未到。用力無濟。

甚至橫生逆產。次則見將出時。母無力送下。為

害不小。須要識候。人門腫滿。方是時候。一用力。

即生矣。如人門未腫。縱肚痛。須勉強起來行走。

使氣血流動。倘體弱倦怠。痛不能忍。即卧床無

妨。但用一大枕。放在兩腿之中。令其開而弗閉。

或坐在尿桶上尤妙

取胞衣法

要訣

產下後如胞衣不來先將嬰孩

抱定不可斷臍用一伶俐老成女眷將右手二
指緊跟臍帶而上帶盡處將指向上半寸餘摸
之覺有血便是胞衣逆轉盛血在內不得下即
以指連胞衣向下一捺其血覆其衣自隨而下
法甚簡明每見孕婦衣不下多服藥或用吐法
甚至以足拄腹者易至喪命小必至于成病不
知衣之不下正為嬰孩出臍帶一扯衣必逆轉

向上汚血淋下盡入衣中以致衣漸滿大不能
出夫豈藥力之所能與哉故特書之以免此患
產後解痛方

益母草一大撮入清童便一碗水一碗銅鍋內紙蓋
煎七分溫服能去惡穢不致停血作痛

產下即用清魂散 產後去血多暈用之

當歸 二錢

川芎 乙錢

澤蘭葉 八分

益母草 三錢

荊芥 七分

甘草 三分

如脈沉細加人參一錢童

便二三酒中身熱加麥門冬去心七分

右用水二中煎八分不拘時服

產後血暈 用新井花水一小盃灌入即甦如
不省人事用煎刀起牙灌之自甦

治乳癰 神効

夏枯草

二錢

當歸

乙錢五分

桔梗

乙錢

貝母

乙錢

荊芥穗

乙錢

甘草

五分

右為片用生酒一鍾水一鍾煎至一鍾食後服用

藥渣鋪乳上即消

調經煖宮方 治婦女經血不和久不受孕服之全

人脇姪累有奇効

秦艽

去芦 乙兩

精墨

醋煨 五錢

糯米

半合 炒

川芎

乙兩

熟地

二兩

茯苓

乙兩 五錢

人參

乙兩

石斛

去根 乙兩 浸

香附

炒去毛 一兩

當歸

二兩

桂枝

少許

山藥

四錢

澤蘭葉

乙兩 五錢

川椒

四錢

蚕布

燒灰 乙兩

牡丹皮

乙兩

大豆

四兩

右為細末煉蜜為丸梧桐子大空心好酒半盃或

一盃入滾湯送下

赤白帶

神効

棉花子

半斤燒存
性取一兩

栢子

乙兩燒存
性取三錢

右為末

空心淡酒調服三錢

白帶

驗過丹方神效

白果肉

四兩

硫黃末

乙錢

左二味同炒熟去黃不用將熟果肉空心鹽湯嚼
下服數料即止不見白即止也

小兒科

解胎毒方

小兒落地呱呱一聲口中血塊下腹便成胎毒約半
日用藥二味煎水將舊細青布洗淨纏食指展藥
水輕洗口內舌與唇藥水任嚥下能令毒氣從
裏出可免肚痛之症

黃連

夏多用

甘草

冬多用

約各一錢為准

小兒三朝洗浴後須用艾葉燒臍帶一生免臍風
肚痛等症

燒法用方

用方軟棉紙一塊約四五寸中取一孔放在洗兒者
手掌中紙孔對中指用人抱定懷內使弗動將脐
帶穿過紙孔兩指夾定手背粘兒腹毋令大緊帶
盤紙上加艾一層火燒令過包住外用舊絹片縛
在腹上借煖氣祛風除濕終身肚腹不痛

治小兒久瀉飲食少進身體羸瘦 神效累試

白朮土炒

白茯苓

冬等分用老米一撮煮粥

止服米飲其瀉自止

小兒久泄貼臍方

黃蠟

五分

銀硃

二分

蓖麻子

十四粒
去壳

射香

半分

右調勻用油紙作膏藥貼臍

治水泄方

用姜葱搗爛入黃丹為丸如豆大每用一丸填入臍

中外用膏藥貼之立止

小兒肚痛方

用好朋礬少許為極細末點左眼角立止出海上仙

方