


傷寒論章節

色氏叢書之一

吉卿署卷



民國四年九月初版

版權  
所有

1940

定價大洋四角

著  
者  
識  
生

印  
刷

藥  
書  
報  
社

總發行所

神  
州  
醫  
藥  
書  
報  
社

上海  
老  
拉  
坂  
橋  
延  
吉  
里

132523  
卷  
余每覽越人入虢之診。望齊候之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震慄。降至屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賚百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身以斃。神明消滅。變爲異物。幽潛重泉。徒爲啼泣。痛夫。舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人。知人。退不能愛身。知己。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。蠢若遊魂。哀乎。趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘驅狗物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒者。十居其七。感往昔之淪喪。傷橫天

之莫救。乃勤求古訓。博採衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脉辨證。爲傷寒雜病論。合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五帝。以有五臟。經絡府膈。陰陽會通。元冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農。黃帝。岐伯。伯高。雷公。少俞。少師。仲文。中世有長桑。扁鵲。漢有公乘陽慶。及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯湏。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎跌陽。三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知決診。九候曾無髣髴。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尙方術。請事斯語。

漢長沙太守南陽張機仲景撰。

仲景傷寒論原文目錄

第一篇

辨太陽病脉證篇

第二篇

辨陽明病脉證篇

第三篇

辨少陽病脉證篇

第四篇

辨太陰病脉證篇

第五篇

辨少陰病脉證篇

第六篇

辨厥陰病脉證篇

第七篇

辨霍亂病脉證篇

第八篇

辨陰陽易差後勞復脉證篇

傷寒論

漢醫聖張仲景先師著

神州醫藥書報社藏版  
後學包識生分例

家君桃初訓定

門人蕭退庵校字

閱者須知

論中除例

章法之外

一概是仲

聖原文未

更一字

寒水爲病法

中風爲病法

傷寒爲病法

表裏相傳法

▲辨太陽病脉證篇第一

●太陽病總論例第一

◎表病五規總論章第一

〔一〕太陽之爲病。脉浮。頭項強痛。而惡寒。

〔二〕太陽病。發熱。汗出。惡風。脉緩者。名爲中風。

〔三〕太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脉

陰陽俱緊者。名曰傷寒。

〔四〕傷寒一日。太陽受之。脉若靜者。爲不傳。頗欲吐。若

躁煩。脉數急者。爲傳也。

經氣相傳法

〔50〕傷寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。

三陽邪化法

〔10〕太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫爲病。脉陰陽俱浮。自汗出。身重。多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視。失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時瘈瘲。若火熏之。一逆尙引日。再逆促命期。

表裏傳治法

〔10〕病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者。七日愈。發於陰者。六日愈。以陽數七。陰數六故也。

經氣傳法

〔10〕太陽病。頭痛。至七日以上。自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。鍼足陽明。使經不傳則愈。

虛症從治法

〔10〕太陽病欲解時。從巳至未上。

實症反治法  
症有假真法

〔f〕風家。表解而不了了者。十二日愈。

〔-〕病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。

●表病風寒五規例第二

◎表虛陽病表裏傳章第二

〔=〕太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴。乾嘔者。桂枝湯主之。

經氣邪傷治法

〔≡〕太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝湯主之。

經傷邪治法

〔x〕太陽病。項背強几几。反汗出惡風者。桂枝加葛根

湯主之。

誤治未治法

〔8〕太陽病。下之後。其氣上衝者。可與桂枝湯方。用前

誤治已變治法

桂本扶虛法  
諸實當禁法

營實禁桂法

衛實禁桂法

營衛俱實禁桂法

汗傷陰瀉治法

法。若不上衝者。不可與之。

〔一〕太陽病。三日已發汗。若吐。若下。若溫針。仍不解者。

此為壞病。桂枝不中與也。觀其脉症。知犯何逆。隨

症治之。

〔二〕桂枝本為解肌。若其人脉浮緊。發熱。汗不出者。不

可與也。當須識此。勿令誤也。

〔三〕若酒客病。不可與桂枝湯。得湯則嘔。以酒客不喜

甘故也。

〔四〕喘家。作桂枝湯。加厚樸杏子佳。

〔五〕凡服桂枝湯吐者。其後必吐膿血也。

〔六〕太陽病。發汗遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微

急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。

下傷陽表治法

陰表裏傷治法

邪傷營治法

邪傷衛治法

〔一〕太陽病。下之後。脉促。胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者。桂枝去芍藥方中加附子湯主之。

〔二〕太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。圓便欲自可。一日二三度發。脉微緩者。爲欲愈也。脉微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。不能得小汗出。身必癢。宜桂枝麻黃各半湯。

◎表虛陰病表裏傳章第三

〔三〕太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。

〔四〕服桂枝湯。大汗出。脉洪大者。與桂枝湯如前法。若形如瘧。日再發者。汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。

邪傷營衛治法

〔一〕服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參湯主之。

表陽傷治法

〔二〕太陽病。發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯方。

裏陰傷治法

〔三〕服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗心下滿。微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。

陰裏傷治法

〔四〕傷寒。脉浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。脚攣急。反以桂枝湯。欲攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁。吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚卽伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒

鍼者。四逆湯主之。

◎表實陽病經氣傳章第四

〔十〕太陽病。項背強几几。無汗。惡風者。葛根湯主之。

〔十一〕太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。

〔十二〕太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。

〔十三〕太陽病。桂枝症。醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩黃連湯主之。

◎表實陰病經氣傳章第五

〔十四〕太陽病。頭痛。發熱。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗。而喘者。麻黃湯主之。

〔十五〕太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯

邪傷開陽治法

邪傳下利治法

邪傳上嘔治法

邪傳樞陽治法

邪傷開陽治法

邪傳開陽治法

邪傳 陽 治法

極風 似傷 寒衛 治風 法

極寒 似傷 風營 治寒 法

邪傷 在寒 裏水 治法

主之。

〔上〕太陽病十日已去。脉浮細。而嗜臥者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。

◎陰陽邪化反形章第六

〔上〕太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出。而煩躁者。大青龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者。不可服。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆也。

〔上〕傷寒。脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯發之。

〔文〕傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔。發熱而咳。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。

邪傷

寒水在表

治法

[X] 傷寒。心下有水氣。咳而微喘。發熱不渴。服湯已渴。

者。此寒氣欲解也。小青龍湯主之。

◎虛從實反章第七

桂枝扶陽

虛治法

[XI] 太陽病。外證未解。脉浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。

裏虛治法

[XII] 太陽病。下之。微喘者。表未解故也。桂枝加厚樸杏

仁湯主之。

表虛治法

[XIII] 太陽病。外證未解。不可下也。下之爲逆。欲解外者。

宜桂枝湯主之。

表裏俱虛治法

[XIV] 太陽病。先發汗不解。而復下之。脉浮者不愈。浮爲

在外。而反下之。故令不愈。今脉浮。故知在外。當須

解外則愈。宜桂枝湯主之。

[XV] 太陽病。脉浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表

麻黃實散治法

證仍在。此當發其汗。服藥已微除。其人發煩。目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。

[X1] 太陽病。脉浮緊。發熱。身無汗。自衄者愈。

[X2] 二陽併病。大陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之爲逆。如此。可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱不得越。當汗不汗。其人煩躁。不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得。其人短氣。但坐。以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹。以脉濇故知也。

◎脉證相似假真章第八

表實治法  
裏俱實治法

陽虛邪忌汗法

〔X〕脉浮數者。法當汗出而愈。若下之。身重。心悸者。不

可發汗。當自汗出乃解。所以然者。尺中脉微。此裏

虛。須表裏實。津液自和。便自汗出愈。

陰邪忌汗法

〔X〕脉浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲

者。不可發汗。何以知之。然以營氣不足血少故也

實衛似虛治法

〔X〕脉浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯。

實營似虛治法

〔X〕脉浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。

虛營似實治法

〔X〕病常自汗出者。此爲營氣和。營氣和者。外不諧。以

衛氣不共營氣和諧故爾。以營行脉中。衛行脉外。

復發其汗。營衛和則愈。宜桂枝湯。

虛衛似實治法

〔X〕病人。藏無他病。時發熱。自汗出。而不愈者。此衛氣

不和也。先其時。發汗則愈。宜桂枝湯主之。