



把少数民族地区 爱国卫生运动开展起来

四川民族出版社

把少数民族地区 爱国卫生运动开展起来！

四川省 爱国卫生运动委员会 合编
卫生防疫站

四川民族出版社

把少数民族地区
爱国卫生运动开展起来

四川省爱国卫生运动委员会合编

(汉文版)

长

四川民族出版社出版

成都人民中路

四川省新华书店发行 四川民族出版社印刷厂印刷

*

开本 787×1092毫米 1/16 · 印张 1 磅 · 字数 25,000

1960年5月第一版 1960年5月第一次印刷

印数：1—1,000 定价：一角

统一书号：M 14140 · 2

編者的話

過去少數民族人民，長期受着反動統治階級的壓迫和剝削，許多疾病如天花、回歸熱、性病等，不斷的在各處發生和流行，嚴重的危害着人民的身体健康。解放後，黨和人民政府关心人民的身体健康，領導人民開展了以除四害為中心的愛國衛生運動，大大地制止了疾病的發生和流行，保障了人民的身体健康，同時，也起到移風易俗的作用，改變了民族地區的衛生面貌。今后，我們還需要繼續鞏固和發展這些伟大的成績，進一步深入的開展愛國衛生運動，不斷提高各族人民的健康水平，使衛生工作更好地為社會主義經濟建設服務。這本小冊子，介紹了一些關於除四害的方法及怎樣搞好環境衛生、個人衛生以及消滅天花、性病等方面的知識，供少數民族地區工作人員和一般群眾閱讀參考。

由於編寫這本書的時間倉促，再加之我們的業務水平有限，又沒有很好地深入少數民族地區的實際工作，書中的缺點和錯誤一定很多，希望讀者多多提出意見和批評，以便改正。

1960.2.

目 錄

鼓足干勁，开展以除四害、講衛生為中心的	
愛國衛生運動.....	(1)
吸收經驗，積極採取措施，把運動堅持到底.....	(3)
消滅四害.....	(6)
怎樣消滅老鼠	
怎樣消滅蒼蠅	
怎樣消滅蚊子	
怎樣消滅臭蟲	
搞好環境衛生.....	(22)
搞好個人衛生.....	(27)
一定要消滅天花和梅毒.....	(31)

鼓足干勁，開展以除四害、講衛生 為中心的愛國衛生運動

平時我們說的除四害，就是指消滅老鼠、蒼蠅、蚊子、臭蟲。這是党中央向全國人民提出來的號召。這是四川省委向全省人民提出來的號召。總之，不管老鼠、蒼蠅、蚊子或是臭蟲，牠們都是些對人有嚴重危害的動物，我們必須消滅牠們！

常見的老鼠有家鼠和野鼠兩種。牠們到處都可以生存，危害性很大，尤其是家鼠盜食和糟蹋糧食的情況非常嚴重。據中華人民共和國糧食部統計，在全國沒有開展除四害的工作以前，每年有三億五千多萬斤的糧食被老鼠吃掉了。至於老鼠咬壞衣服，損壞家具的嚴重情況，那就不用說了，這是人人皆知的。野鼠也嚴重危害農作物。牠常在田埂、河堤上打洞，破壞農田水利。在內蒙古的遼河，1949年就因為野鼠在河堤上打洞，造成水災，淹沒農田一萬三千多畝。我們四川威遠縣，1957年開展除四害、講衛生運動中，在一個野鼠洞內，就挖出三百多斤糧食，並活捉老鼠一百多只。

老鼠、蒼蠅和蚊子還傳播多種急性傳染病，鼠疫、打谷黃、血吸虫病、流行性乙型腦炎、血絲虫病、瘧疾、痢疾、傷寒等。這些疾病，都是流行較廣，對人民健康的危害很大的疾病。

從前面所說的，我們可以清楚地了解到，除四害是保護農作物，減少糧食損耗，有效地制止某些傳染病的傳播，增進人

民健康的一項帶根本性的措施，也是一件具有重大政治意義和經濟意義的工作。如果不積極參加除四害的工作，而把除四害、講衛生看作是“小事情”，或者把它和生產對立起來的作法和想法都是錯誤的，應該改正和克服。

开展除四害、講衛生運動，對農業生產和廣大人民，起着防病保糧、增產增壽的作用。同時也是掃除舊習頹風，振奋民族精神，改變落后面貌，建立新的社會風氣的偉大文化革命運動。由於除四害、講衛生運動在全省範圍內廣泛開展，少數民族人民和漢族人民一樣在生活上都起了很大變化。從1951年起，我省少數民族地區的主要傳染病的發病率，年年下降，勞動效率普遍提高，對農業生產的發展起了積極的作用。在丹巴、瀘定、大金、小金等縣有許多藏、漢族人民已經改變了過去不洗臉，不洗頭，不洗衣，不洗腳的舊習慣，養成了天天洗臉、洗腳，當洗頭，當洗手的良好衛生習慣。涼山有部分地區，已經實現了睡覺床鋪化、吃飯碗筷化、環境衛生清潔美化、個人衛生清潔化。這些都說明少數民族地區愛清潔、講衛生的風氣，正在迅速成長。同時由於少數民族人民的衛生知識有所提高，他們越來越相信科學。瀘定縣斯闡鄉農民扎西澤仁，知道得病是由於細菌的傳染以後，家里有人患病也不再念經了。1958年他的兒子得了重病，就立即送到醫院里去治療，結果幾天功夫就治好了。扎西澤仁對別人說：“不拜天，不拜地，只有感謝共產黨”。正是因為開展除四害、講衛生運動，從生產上和健康上給人們帶來了好处，因此，獲得了廣大群眾的熱烈擁護。

從過去除四害、講衛生已經取得的成績和經驗來看，四害是能夠消滅的。以全國或四川省來說，都已經出現了大批基本消滅了四害的市、縣，這些已經基本消滅了四害的地區當中，

有平原，有山区，有汉族地区，也有少數民族地区。这些地区沒有花三年五年的时间，而是在几个月或者更短的时间內就把四害基本消滅了。在阿壩、甘孜和涼山三个自治州，1958年就有一些农业生产合作社基本消滅了四害或者接近基本消滅，为在民族地区深入开展除四害、講衛生运动樹立了良好榜样。只要我們繼續鼓起干勁，克服困难，全民动员，人人动手，爭取在短時間內消滅四害的任务，是一定能够完成的。

吸取經驗，积极采取措施， 把运动坚持到底

根据过去的經驗，搞好以除四害、講衛生为中心的爱国衛生运动，必須加强党的领导。同时，要結合生产，充分發动群众，做好衛生宣传教育工作，依靠積極分子，建立切实可行的制度，把开展衛生突击运动和經常性的衛生活动相結合，才能把除四害、講衛生运动开展起來并且坚持下去。

一、縣、区、鄉、社要層層建立爱国衛生运动委員會的組織，具体發動和組織群众开展工作。爱国衛生运动委員會，應該由党、政、軍、共青团、妇联、工会等有关部门聯合組成，縣一級爱国衛生运动委員會，应下設办公室，处理日常工作。区、鄉、社可不設办公室，但必須指定人員管理这一工作。委員会成立以后，要經常开会具体研究和布置工作，充分發揮組織作用，以免流于形式。爱国衛生运动委員會要由有关部门組成，目的是要通过这个組織，把除四害、講衛生的运动貫徹到各个部門的工作中去，从多方面把群众發动起來。只有健全了組織，党的指示才能很好的貫徹执行。过去已經有很多事實証

明，在一个地区或一个单位把除四害、講衛生搞好了，是与健全了組織有着密切的关系的。

二、除四害、講衛生运动，是一項群众性的工作，必須依靠广大群众才能做好。因为它涉及的面广，不是局限在某一个方面或某几个方面，而是与工人、农民、軍人、学生、老人、妇女、兒童的身体健康都有着直接的关系。如果忽略了講衛生，就容易生病，以至影响健康，影响生产。要使群众都能自觉地参加除四害、講衛生的运动中來，就必须深入地做好衛生宣傳工作。为了使宣傳工作收到良好的效果，这應該注意宣傳的方式和方法，一定要把衛生科学知識講得通俗易懂，使群众喜聞乐見。在工作中，除采用講演、大字报、黑板报等方式外，还可以采取回憶对比、算細帳、組織群众鳴放辯論等办法，使群众进行自我教育。同时，也可以結合扫盲把衛生知識編进識字課本，群众学后既增長了知識，也認識了字。少數民族地区的各种節日和集会，是宣傳的好机会，可以組織宣傳隊伍，采用多种多样的形式，向群众宣傳衛生知識，使他們受到衛生教育。

三、大量訓練衛生工作的積極分子，培养骨干。作好任何一项工作，都不能缺少積極分子。因为積極分子來自群众，最了解群众的生活习惯和思想情况。在工作中依靠了他們，就能把領導上的意圖帶到群从中去，同时，又能把群众的要求很快地反映上來；还由于積極分子的串連發動，不断擴大影响，就能把一些后进的群众也帶动起來。因此，在工作中，積極分子培养得越多，工作就更容易搞好。

四、过去开展以除四害、講衛生为中心的爱国衛生运动，能够在短時間內取得巨大的成績，其中有一条最基本的經驗就是結合了生产。因此，在今后开展工作中，也一定要結合生

产，服务于生产。但是除四害、講衛生与生产結合的关键是在于各级党组织的统一领导，统一安排，统一部署，统一检查。比如在农村中开展積肥运动，就完全可以把除四害、講衛生和積肥运动結合起來进行，这既不妨碍生产，又能除害。如在積肥时，要清除室內外的垃圾、挖除陰溝和粪坑周围 的肥泥土等；这就既積了肥，也把生長蒼蠅、蚊子的地方清扫了，可以收到一举两得的效果。又如消滅蛆和沙虫(孑孓)，可以發动学生在上学讀書和社員上山生产时，用“來去一把草”的办法，沿路采集打破碗花花、五朵云等殺滅蚊蠅的野生植物，放入粪坑，这就既不耽誤生产，又增加了綠肥。在栽种季節，还可以結合保种、保苗采用上工安放捕鼠工具，收工揀“战果”，或者收工安放工具，次日上工揀“战果”的办法，消滅野鼠和各种害鳥害獸，減少苗稼的損害。

以上事实都說明，除四害、講衛生完全可以和生产結合，它不但不会影响生产，而且会促进生产。只要根据当地的实际情況，和不同的生产季節，合理安排好工作，除四害、講衛生运动就能随着生产一齐跃进。

五、要及时交流經驗，普及技術，發动群众大鬧技術革新。在除四害、講衛生运动中，必然会涌現出大批的先进单位和个人，会創造出許許多除四害、講衛生的好办法。但是要使少數人的先进經驗，成为大多數人的經驗，應該通过召开現場會議、除四害能手經驗交流座談会，或者組織除四害的能手到各地巡迴表演，以及帶徒弟等办法傳授技術，在群众中掀起“人人學技術，个个找竅門”的热潮，不断革新技術。因为四害都是些活东西，很狡猾，所以对付牠們既要有干勁，还必須要有鑽勁，二者必須結合起來，才能收到良好的效果。

六、突击和經常相結合。除四害、講衛生要坚持不懈。我

們要針對四害生活习性的特点和不同的季節，以及民間逢年過節的固有衛生習慣，一年要安排几次大的突击运动；并且每次突击要有一个明确的中心，便于集中力量，發动群众，在短時間內做出成績。比如，冬季是蚊、蝇潛伏越冬的时候，那么这个时候就以消滅过冬蚊蝇和清除牠們的孳生場所为主；这个时候發动群众突击歼滅，可以收到事半功倍的效果。但是四害的生存适应力很强，繁殖快，分布广，如果只搞突击运动，而不經當进行除害工作，在突击之后，四害很快又会繁殖起來，影响到成績的巩固。因此，除了开展突击运动之外，还應該在群众中建立清潔衛生值日制度、扫除制度、檢查制度、評比制度和訂立衛生公約等，使消滅四害成为經常性的工作，以巩固和发展已經取得的成績。

消 灭 四 害

怎样消滅老鼠

一、老鼠有哪些害处

偷吃粮食：老鼠是我們常見的一种小动物。牠偷吃和糟蹋粮食很厉害。有人計算，一只老鼠每天要吃八錢粮食，一年就要吃18斤。如成都市郊区友誼社，就从鼠洞里挖出谷子150多斤。以全國來說，老鼠偷吃和糟蹋的粮食，更是難以計算。

傳播疾病：老鼠能傳播許多疾病，如打谷黃（鉤端螺旋体病）就是有鉤端螺旋体病源体的老鼠的尿，污染稻田、池塘等處的積水，健康人下水工作或洗澡，鉤端螺旋体就可以經皮膚侵入人体而發病。另外，老鼠还能傳播血吸虫病、鼠咬热、鼠

疫、和食物中毒等。所以要消滅這些疾病，首先就要消滅老鼠。

损坏东西：老鼠为了磨牙齒，对不能吃的东西，也要亂咬。家具、門檻、衣服、書籍等，都成了它的磨牙“工具”，使我們在經濟上遭受損失。

从上述情况可以看出：消滅老鼠不但能够保护粮食和衣物，而且能够預防某些疾病。

二、老鼠的生活習性

老鼠的种类很多，通常分为家鼠和野鼠两类。家鼠是指与人當接近的，生活在屋內、牆洞、天花板或房屋附近的陰溝、陽溝、廁所、猪圈、垃圾堆等处的老鼠。野鼠則生活在庄稼地里或山地、丘陵、草原地帶等处。

老鼠是雜食性动物，凡是人吃的，牠大都喜欢吃。垃圾、腐烂东西，甚至糞便也可以成为牠們的食料。

老鼠的門牙一年四季都在繼續長長，所以，有經常肯咬東西來磨門牙的习性，为的是使牙齒保持适当長度。

老鼠生性狡猾，嗅觉灵敏，假如我們的捕鼠工具捕到老鼠后沒有及时处理，粘有气味，它就知道避开。老鼠在室內，一般都是沿着牆根走，或走两旁很窄的夾道；也喜欢在洞邊、食物和水源之間走一条隱蔽的固定路線，这主要是避免被捕捉的危險。

老鼠是黑夜活动的动物，白天不易看見。天黑后，幼鼠先出洞活动，接着，大鼠也行动起來。家鼠出來得較晚，多在下半夜，天冷則很少出來。野鼠天黑就出來，在晚上七、八点钟活动最为頻繁，十二点钟以后就少了，天亮时又出來一次。在陰天、下雨、刮風的时候，活动尤为頻繁。

老鼠还有一种搬家的习惯，那里有粮就搬到那里，所以农民說：大春、小春成熟的时候，家里就沒得老鼠，等粮食收到家里，老鼠又从野外搬回居住。

老鼠的繁殖力很强，一年內可以繁殖好几次。幼鼠長到二、三个月，就能交配生殖。每胎幼仔數目，因年齡和健康情況的不同，多少各異，多則十余只，少則三、四只，平均為八——九只。

三、消滅老鼠的方法

消滅老鼠的方法有三大类：一是器械捕打，一是药物毒殺，一是动物滅鼠。第一第二类是主要的。第三是利用其它食肉动物如猫、猫头鷹等，对滅鼠也能起到一定的作用。

老鼠的繁殖力很强，如果分期去消滅它，势必成为“边滅边生”。也不能采取分散作战的办法，这样会“击东竄西，南來北往”。所以必須采取全民动员、全面圍歼、布下天罗地網、速战速决的办法，才能一战而獲全胜。重慶市就采取了这个办法，苦战八晝夜，取得很大成果。方法是先以三天時間做好断絕鼠糧工作，凡是老鼠能吃的东西，如粮食、瓜果、蔬菜以及垃圾、粪便都处理好，使老鼠吃不到一点东西，喝不到一点水。然后，在室內施放毒餌毒鼠，用各种办法、各种工具捕打，下水道用硫磺烟熏。同时，結合翻草堆，翻倉庫，搗鼠窩，挖鼠洞，双管齐下，日夜并进，讓老鼠处处受敌，走投無路。这种办法，在滅鼠工作中是行之有效的办法。

器 械 捕 鼠


(一) 伪装鼠夾法：

鼠夾是最當見的捕鼠工具，如用報紙、旧布、谷壳或草灰

等把它伪装起来，只留誘餌露在外面，老鼠就容易上鉤。

安放鼠夾時因誘餌鉤活動拍打手，往往把鼠夾支的很“牢”，以致捕不到老鼠。改良的方法是在木板鼠夾放食物的地方，按一個活動小木板，小木板上放鼠食，再在鼠夾上開一個洞，每次支鼠夾時，手放在鼠夾邊，由窟窿伸進手指，推動小板，就能按上鼠夾，這樣既安全，又容易打着老鼠。（圖一）


圖一



（二）碗扣法：

用食物支住小酒杯口，再用大碗罩在小酒杯邊沿上。老鼠吃食触动了小酒杯，大碗就把老鼠扣在碗里。（圖二）

圖二



（三）石板压法：

用一根小木棍支住石板或重木板，支棍上拴上食物。老鼠吃食扯动支棍，石板或木板正好把老鼠压死。（圖三）




圖三

（四）竹筒捕鼠法：

用約三尺長比茶杯略細的竹筒，最後一個節疤不打通，只

鑽一小孔。食餌放筒內，放置在老鼠常去的地方。老鼠進筒偷食，因筒小不便轉身，即被活捉。（圖四）



圖四

（五）滾玉米法：


用鐵絲穿過一根玉米，架在水桶的邊緣上，并用木板搭一个便橋。老鼠從便橋爬上玉米時，因玉米滾動，老鼠就落在水桶里被淹死。（圖五）



圖五

（六）木箱翻板法：

用較深的木箱一個，箱內橫隔一層木板，板中央挖一大圓孔。箱上也挖一長方形孔，孔內安裝十字翻板，板上放食物。老鼠上箱偷吃，踏上翻板，就会墜落箱中。這種捕鼠器很好，能連續捕捉很多老鼠。（圖六）




圖六

（七）矮人棍法：

削三塊竹片，第一片直立（尖端朝上），第二片扣住第一片

的上端，支住木板，再用第三片的缺口把第一、第二片扣住，尖端插食餌，老鼠吃誘餌時，木板壓下就將老鼠壓死。（圖七）

圖七




1、2、3——竹片 4、5——木塊或石塊 6——大木盆

(八) 滾筒捉鼠法：

用舊爛抽屜一個，在沿抽屜口一面斜釘兩根洋釘。找比抽屜略短的竹筒一節，斜放洋釘上，筒內放些食物。老鼠入筒偷吃食物，筒即滾進抽屜，老鼠就被活捉。（圖八）

圖八



藥 物 毒 鼠

能够毒殺老鼠的藥物和野生植物很多，現在最常用的是“安妥”和磷化鋅两种药物。在除“四害”、講衛生运动中，也有不少群众創造性地运用了有毒的野生植物毒鼠。今后，應該大力推广这方面的經驗。

(1) 安妥：是一种难溶于水，不怕加热，稍有苦味的淺灰色粉末。对鼠类毒性强，对猫、狗毒性也較强，但对人畜毒力較弱。因此，用安妥毒鼠比較安全，同时，安妥的价钱也很便宜。每小包安妥，配上一两半食物，就可使用。

安妥毒餌的配制，一般是將安妥混于适量的米、面、肉、蔬菜等食物里，安妥的用量一般不超过食物总量的十分之一。

(2) 磷化鋅：是一种毒力很强的灰色粉末，老鼠吃后，經3——10小时即可斃命，但它对人畜毒力也很强，使用时應特別注意安全。磷化鋅有近似大蒜的气味，为老鼠所喜好。但長期保存会逐漸減弱毒力，所以最好現配現用。

磷化鋅毒餌的配制，一般也是將磷化鋅混于适量的米飯、面、肉等食物里，其用量也以不超过食物总量的十分之一為宜。如用磷化鋅五分，再与九十五分米飯混合拌匀，布放老鼠當去的地方，收效很大。

使用安妥和磷化鋅毒鼠时应注意

(1) 作好斷糧工作：在开展毒鼠工作前，先要做好斷糧工作，把凡是老鼠能吃的食糧如食糧、糖果、菜蔬及大便都要处理好。老鼠餓極，自易上鉤。

(2) 毒餌放、收時間：放餌一般应在天黑，牛、羊已經进圈、小孩已睡后才放，天亮以前收回。