

『草药治百病』丛书

草药治肿瘤

吴丹红

吴将

福建科学技术出版社

编者的话

我国农村草药资源丰富，房前屋后，田边路旁，随处可见。由于传统习惯，群众信赖草药，民间亦流传着不少疗效确切的验方，草药治病有就地取材、简便实用、费用低廉等优势，在农村特别是缺医少药的贫困山区尤受青睐。有鉴于此，我们组织有关专家编写了这套“草药治百病”丛书。本丛书按科分册，先出版以下六种：

- 《草药治内科病》
- 《草药治外科病》
- 《草药治妇科病》
- 《草药治儿科病》
- 《草药治骨伤》
- 《草药治肿瘤》

就一般群众而言，草药的运用关键在于选药配方与形态识别两方面。本丛书力求做到以用为本、图文结合、有药有方，帮助读者由病选药，进而识别、采集、应用。为此，本丛书每一分册均以病为纲，以药为目，逐药介绍行之有效的单验偏方（包括用法），并在书的后半部分以图文对照的形式集中介绍草药的形态特

征等相关知识。书中病名以现代医学为主,但鉴于中西医的差异,部分病名仍采用中医名称。所载偏方既有内服,也有外用,大多组成简单(草药用量一般指成人量,《草药治儿科病》除外),使用方便。

需要特别提醒读者的是,选用草药治病之前,一定要明确诊断,切不可盲目使用。此外,草药有的有治疗作用,有的则只有辅助治疗作用或预防保健作用,因此不可排斥其他必要的治疗手段。

若有不足之处,恳请读者提出宝贵意见。

1999年4月

目录

鼻腔恶性肿瘤.....	(1)
鼻咽癌.....	(2)
喉癌.....	(5)
甲状腺癌.....	(6)
食管癌.....	(8)
肺癌	(12)
纵隔肿瘤	(15)
乳腺癌	(16)
胃癌	(22)
大肠癌	(26)
胰腺癌	(29)
原发性肝癌	(31)
肾癌	(35)
膀胱癌	(38)
前列腺癌	(41)
睾丸肿瘤	(43)
阴茎癌	(44)
卵巢癌	(45)
子宫体癌	(46)

子宫颈癌	(49)
绒毛膜癌和恶性葡萄胎	(52)
外阴癌	(54)
恶性淋巴瘤	(55)
白血病	(59)
多发性骨髓瘤	(62)
骨肉瘤	(64)
皮肤癌	(65)
恶性黑色素瘤	(68)
软组织肿瘤	(69)
颅内肿瘤	(70)
脊髓肿瘤	(72)
附图	(73)

鼻腔恶性肿瘤

鼻腔恶性肿瘤好发于鼻腔上部，以鳞状细胞癌多见，尚可见腺癌、恶性黑色素瘤等。属中医学的“颤疔”、“鼻渊”、“颤疽”、“鼻衄”等范畴。本病的病因尚未阐明，但发现在锯木工人中发病率呈上升趋势。早期症状为一侧鼻塞，初为间歇性，后为持续性，鼻涕脓样带血，或鼻出血，嗅觉减退，并有头痛、头胀。检查鼻腔可见赘生物，呈菌状、菜花状或息肉样，色红，触之易出血，或有糜烂、溃疡及坏死。较晚期的病人，肿瘤可侵入鼻窦和眼眶。本病宜选用下列草药治疗。

一、黄毛耳草（图 1）

偏方：鲜黄毛耳草 60g，捣烂取汁，每日 2 次。适用于鼻腔癌各期。

二、石见穿（图 2）

偏方：石见穿 30g（鲜品 60g），水煎，每日 1 剂，分 3 次服。鲜品可捣汁服。适用于鼻腔癌各期。

三、野荞麦（图 3）

偏方：鲜野荞麦、鲜汉防己、鲜土牛膝各 30g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。另用灯心草捣碎，口含；垂盆草捣烂，外敷。适用于鼻腔未分化癌。

四、半枝莲（图 4）

偏方：鲜半枝莲、鲜老鹳草各 60g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。适用于鼻腔癌各期。

五、胡荽（图 5）

偏方：鲜胡荽适量，捣烂，塞鼻。适用于鼻腔癌衄血者。

六、金银花

偏方：金银花适量，研成粉末，从患侧鼻孔吸入，每隔2小时1次。适用于鼻腔腺癌。

本病还可选用以下草药：夏枯草、蛇舌草、山豆根、板蓝根、蒲公英、凤尾草、败酱草、野菊花。

鼻咽癌

鼻咽癌是指发生于鼻咽部粘膜上皮的恶性肿瘤。属中医学的“鼻渊”、“真头痛”、“石上疽”、“失荣”等范畴。本病的病因一般认为与遗传因素、病毒感染、环境因素及维生素A缺乏有关。临床表现，早期除极少数偶有耳鸣或涕中带血外，一般无症状。患者往往以颈部淋巴结肿大、耳鼻症状、偏头痛，甚或远处转移为初发症状。随着病情的发展，可出现血涕或鼻衄；晚期侵及颅脑可出现耳鸣、耳聋、头痛、复视及颈淋巴结肿大等症状。本病宜选用下列草药治疗。

一、夏枯草（图6）

偏方1：夏枯草30g，牛黄0.3~0.5g。将夏枯草水煎去渣，冲服牛黄，每日1次。可长期服用。

偏方2：夏枯草45g，鲜石黄皮120g，十大功劳叶60g，甘草9g，水煎，每日1剂，日服2次。

偏方3：夏枯草75g，蔗糖少许，水煎，每日1剂，分2次服。

偏方4：夏枯草25g，金银花、蒲公英各25g，水酒各半煎，每日1剂，分2次服。

偏方5：夏枯草75g，川贝10g，红糖25g，水煎，每日

1剂，分2次服。

二、蛇舌草（图7）

偏方1：蛇舌草120g，猪瘦肉60g，久煎，每日1剂，分2次服。

偏方2：蛇舌草60g，半枝莲30g，金果榄9~12g，水煎，每日1剂，分2~3次服。

偏方3：蛇舌草20~30g，人参3g，金银花20~30g，水煎，每日1剂，分2次服。

偏方4：蛇舌草60g，半枝莲30g，土茯苓30g，菝葜30g，水煎，每日1剂，分3次服。

三、胡荽（见图5）

偏方1：鲜胡荽适量，捣烂，塞鼻。用于鼻衄不止。

偏方2：胡荽12g，白屈菜12g，川贝母12g，水煎，每日1剂，分2次服。

四、紫草（图8）

偏方1：紫草根30g，辛夷花10g，水煎，每日1剂，分2次服。

偏方2：紫草根30g，水煎，每日1剂，分2次服。

五、蒟蒻（图9）

偏方1：蒟蒻30g（先煎2小时），枸杞根30g，鸭跖草30g，蚤休15g，水煎，每日1剂，分2次服。

偏方2：蒟蒻30g（先煎2小时），地骨皮30g，鸭跖草30g，水煎，每日1剂，分2次服。

六、皂莢（图10）

偏方：皂莢树枝360g，水煎，每日3次，2日服完。

七、凉粉草（图11）

偏方：凉粉草60g，水煎，每日1剂，日服2次。

八、野荞麦（见图 3）

偏方：鲜野荞麦 30g，鲜汉防己 30g，鲜土牛膝 30g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

九、海芋（图 12）

偏方：鲜海芋去皮，切片后以布袋包裹，吊离锅底，加水 2 500~3 000ml，文火煎 2 小时以上，约成 400ml；或以蒸汽加热提制、浓缩成煎剂，每次 20ml，日服 2 次。适用于鼻咽癌放疗后反应。

十、神仙草

偏方：新鲜神仙草 60~120g，猪瘦肉 60g，加水文火煎 8 小时，每日 1 剂，只饮汤，不吃肉，可长期服用，无毒。

十一、石竹根（图 13）

偏方：石竹根 30~60g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

十二、半枝莲（见图 4）

偏方：半枝莲 50g，独角莲 50g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。适用于鼻咽癌毒盛者。

十三、蒲公英（图 14）

偏方：新鲜蒲公英 30g，侧柏叶 30g，生地 30g，捣烂与蜜调匀，外敷颈部肿块。适用于鼻咽癌颈部淋巴结转移者。

十四、石上柏（图 15）

偏方：石上柏 60g，猪瘦肉 60g，加清水 2 500~3 000ml，煎至 600ml，每日 1 剂，分 2 次服。

十五、菝葜（图 16）

偏方：菝葜根 500g，猪肥肉 60g，先将菝葜根用清水浸泡 1 小时，连同浸液以文火煎煮 3 小时，去渣后加入猪肥肉再煮 1 小时，得浓煎液约 500ml，每日 1 剂，一天内分多次服完。

十六、蚤休（图 17）

偏方：蚤休、菊花、鹅不食草各等份，共为末，加青茶适量备用。每日取药 6g，泡茶饮。

十七、仙鹤草（图 18）

偏方：仙鹤草 30g，白及 15g，冬虫夏草 5g，水煎，每日 1 剂，日服 2 次。

本病还可选用以下草药：山豆根、龙葵、木芙蓉、雪里青、野菊花、蒲葵、核桃枝。

喉癌

喉癌是头颈部常见的恶性肿瘤之一，属中医的“喉菌”、“喉百叶”、“喉疳”等范畴。一般认为与吸烟及有毒粉尘吸入有关。首发症状为音哑，呈进行性加重；其次可见咽喉部异物感、紧迫感或吞咽不适、干咳、痰中带血。肿瘤合并溃疡、炎症或软骨骨膜炎时，可引起迷走神经反射性疼痛，表现为同侧头痛、耳痛。中晚期肿瘤阻塞呼吸道可引起呼吸困难。本病宜选用下列草药治疗。

一、菝葜（见图 16）

偏方：菝葜 60g，猪苓 30g，苡米 30g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

二、冬凌草

偏方：冬凌草 120g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

三、佛甲草（图 19）

偏方：佛甲草 50g，捣汁，加陈京墨磨汁，和匀，漱喉，每日 4~5 次。

四、一枝黄花 (图 20)

偏方：一枝黄花 15g，加水 500ml，煮沸，日日漱口。

五、大青叶

偏方：大青叶、山豆根、玄参各 15g，开金锁 30g，水煎，每日 1 剂，日服 2 次。

六、雪里青 (图 21)

偏方：雪里青 120g，水煎，每日 1 剂，日服 2 次。

七、牛蒡根

偏方：牛蒡根 30g，粳米 30~50g。粳米先煮粥，再将牛蒡根煎汤掺至粥内，温饮、冷饮均可。

八、石上柏 (见图 15)

偏方：石上柏全草干品用 25~100g，加猪瘦肉 50~100g 或红枣数个，清水 1 500~2 000ml，煎 6 小时成 200ml 左右。内服，每天 1 剂，分 2 次服。

九、木蝴蝶

偏方：木蝴蝶 3g，加冰糖适量，放入瓷杯中，以沸水冲泡，温浸 10 分钟，代茶频频服用。

本病还可选用以下草药：金果榄、鬼针草、穿山莲。

甲状腺癌

甲状腺癌是生于甲状腺的恶性肿瘤。属中医学的“瘿瘤”范畴。本病的病因一般认为与低碘饮食、致甲状腺肿大物质或放射线外照射以及甲状腺部分切除等多种因素综合作用有关。临床表现为甲状腺肿物坚硬如石、凹凸不平、固定，不随吞咽上下移动，肿块迅速增大，外形不整，产生压迫症

状，或同时伴有颈中下部、胸锁乳突肌旁淋巴结肿大等症状。本病宜选用以下草药治疗。

一、黄药子（图 22）

偏方 1：黄药子、莪术各 30g，冰球子 9g，水煎，每日 1 剂，日服 2 次。

偏方 2：黄药子 500g，米酒 1 000ml。将黄药子浸于酒中，一个月后饮用，每日 30ml，分 3 次服完。

偏方 3：黄药子 200g，用生酒 1 500ml 煮 1.5 小时，置 7 天后，早晚任服，服完为度。

二、夏枯草（见图 6）

偏方 1：夏枯草 60g，猪瘦肉 100g，加水炖服，可加盐等佐料，每日 1 剂，分 2 次服。

偏方 2：夏枯草、猫爪草各等量，用水煮沸，茶饮，每日 3~6 次，每次 20ml。

三、紫草（见图 8）

偏方 1：紫草根 100g，切成段块，微火炒至近焦，粉碎研成细末，过 100 目筛，置容器内以 115℃ 30 分钟热压灭菌，冷后加入冰片细粉 2g 混匀。用时将肿瘤局部冲洗干净，取药粉适量温开水调糊外敷于创面，每日一换。

偏方 2：紫草根 30g，每日煎汤代茶饮用。

四、野菊花（图 23）

偏方：野菊花 30g，华南胡椒（全株）60g，生盐 2g，上药共捣烂，隔水蒸热，待温度降至适中时用，外敷患处，一剂可用多次饮服。

五、白茅根

偏方：白茅根、茜草根、生牡蛎各 30g，水煎，每日 1 剂，日服 2 次。

六、水红花子（图 24）

偏方：鲜水红花子 30g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。同时用鲜品适量，捣烂外敷患处。用于甲状腺癌未破溃者。

七、土茯苓（图 25）

偏方：土茯苓 20g，大米 100g。土茯苓切片，入大米同煮为粥，食用。

本病还可选用以下草药：山慈姑、黄毛耳草、海藻、昆布。

食管癌

食管癌是指发生于食管粘膜的恶性肿瘤，为消化道的常见恶性肿瘤之一。属中医学的“噎膈”范畴。一般认为本病的病因与饮食、营养、生活环境及遗传等因素有关。且已证明长期食用腌酸菜、霉变食物后，二级胺与硝酸盐等致癌物质含量均有所增高。本病最常见的症状为吞咽困难，早期症状多不明显，有时仅感吞咽食物时不适、食物停滞或梗塞感，病情进展到一定阶段，常吐沫状粘液，且量多，梗阻明显加重，前胸、后背持续隐痛，胸骨后有烧灼感。晚期癌肿溃烂可引起出血，侵犯喉返神经可致声音嘶哑；患者明显恶液质，如有肝、肺等处转移，可出现相应症状。本病可选用下列草药治疗。

一、蛇舌草（见图 7）

偏方 1：蛇舌草、半枝莲各 30g，煎水浓缩成膏，加白糖搅匀，每次 1 饭匙，每日 3 次。

偏方 2：蛇舌草、白茅根各 150g，水煎服，每日 1 剂，分

2 次服。或蛇舌草 170g，茅根 75g，冰糖 30g，水煎当茶饮。

偏方 3：蛇舌草、白茅根、半枝莲、铁树叶各 30g，煎汁去渣，加红糖 60g，制成糖浆，以上为一天量，分 3 次服完。

二、石竹根（见图 13）

偏方 1：石竹根 30g，半夏 10g，甘草 10g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

偏方 2：鲜石竹根 60g，菝葜 250~500g，加水 2 500ml，煎至 1 000ml 后与猪肥肉 50~100g 共煮，至肉熟。药液一日服完，肉可随意食用。厌油腻者可不用肉。

偏方 3：石竹根 100g，番杏、荸荠各 60g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

三、半枝莲（见图 4）

偏方 1：半枝莲、棉花根各 50g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

偏方 2：半枝莲、乌梅各 100g。半枝莲加水 1 000ml，煎成 750ml，过滤去渣。乌梅放入 1 500ml 水中浸泡 24 小时，然后煮沸半小时，去渣浓缩至 50ml，倾入半枝莲煎剂中即可。每天服 3 次，每次 5ml。

四、白毛藤（图 26）

偏方 1：白毛藤、蛇舌草、威灵仙、白茅根各 30g，水煎，每日 1 剂，分 3 次服。

偏方 2：白毛藤、地榆各等量，炒微黑色，共研末和匀，每日 15~24g，布包水煎，空腹分 2 次温服。

五、急性子（图 27）

偏方 1：急性子 300g，白酒 500ml，浸泡 7 日，滤渣酒备用。日服 3 次，每次 5~10ml。

偏方 2：急性子、石见穿各 30g，浓煎成汤，冲入硝砂 1~

2g，呷饮。胃溃疡、食管静脉曲张者禁用。

六、猫眼草（图 28）

偏方：猫眼草数棵或干品 15g，煮白壳鸭蛋 3 个，弃汤吃蛋，每日 1~2 个。

七、仙鹤草（见图 18）

偏方：仙鹤草，按月份取草头 1 个，如 3 月份取 3 个，4 月份取 4 个，捣汁，同人乳、羊乳汁搅匀服。化简本方，可取鲜仙鹤草 100g，压汁合羊奶等量饮服；或干品 50g 水煎服，每日 1 剂。

八、山慈姑（图 29）

偏方：山慈姑（整个研开）120g，洗净后清水浓煎，加入蜂蜜制膏，每次 9~15g，日服 2 次。

九、木芙蓉花（图 30）

偏方：木芙蓉花 120g，研为细末，每次 3g，日服 2 次。

十、桑白皮

偏方：鲜桑白皮 30g，米醋 90ml，共煎 2 小时，为一日量。开始每日 3 次，7 天后每日 2 次，可加糖。

十一、黄药子（见图 22）

偏方：黄药子 300g，白酒（65 度）1 500g，将黄药子打碎，放入 1 500g 白酒中，密封于陶瓷罐内，小火烧 24 小时，然后放入冷水中 7 昼夜，去渣即得。每次约 50ml，每日 1~2 次，以口中不离酒味、但又不醉为度。

十二、蒲葵（图 31）

偏方：蒲葵 50~100g，猪瘦肉 50g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

十三、冬虫夏草

偏方：冬虫夏草 5g，白梨 50g，水煎，每日 1 剂，分 2 次

服。

十四、一枝黃花（见图 20）

偏方：一枝黃花、大蘓根各 100g，鮮烏玄參 150g，鮮青風藤 100g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

十五、芦根（图 32）

偏方：鮮芦根 30g，紅米 50g，以水 1 500ml 煎芦根，取汁 1 000ml，納米于汁，煮粥食之。

十六、韭菜

偏方：鮮韭菜或韭菜根適量，牛乳半杯。將韭菜或根洗淨搗汁，每次以此汁 1 匙，沖入牛乳，溫熱時緩緩服之，每日可服數次。

十七、毛茛（图 33）

偏方：毛茛全草 15~30g，以水 300ml 煎沸 30 分鐘左右，加酒 30ml 煮沸 3 分鐘，去渣，分數次服，一日服完。適用於食管癌並梗阻者。

十八、菝葜（见图 16）

偏方：菝葜 1 000g，加水 2 500ml，熬成濃汁 400ml，加米酒 200ml，再煎半小時，每次 20ml，早晚各一次。

十九、核桃枝（图 34）

偏方：核桃枝梢 120g，雞蛋 4 個。將核桃枝梢剪碎，加水煎 20 分鐘，放雞蛋煮粥，去殼，用竹簽遍扎小孔，再入湯內煮 1 小時。早晨空腹一次吃（或分兩次吃），連服一個月，停一周後再服第二疗程。

二十、石黃皮

偏方：石黃皮全草研末 9g，酒沖服，每日 3 次。

本病還可選用以下草藥：月石、貓爪草、山豆根、夏枯草、蒲公英、野菊花、地柏樹、冬凌草、石打穿、皂刺、羊

蹄根、鬼针草、蚤休、猕猴桃根。

肺癌

肺癌（原发性支气管肺癌）系指原发于支气管粘膜和肺泡的癌肿。属中医学的“肺花疮”、“息贲”、“肺积”等范畴。现代医学认为本病病因尚未完全清楚，但根据现有资料，本病的发生与吸烟、大气污染、电离辐射及某些金属和非金属致癌物（如石棉、砷、铬、沥青等）有很大关系。肺癌常见症状为咳嗽、咯血和血痰、发热、胸痛、气急等，以咳嗽、咯血和血痰为首发症状。肺癌的全身症状多在晚期出现，常见全身乏力、消瘦、贫血、骨关节肥大、杵状指（趾）等。若肿瘤压迫或侵犯邻近组织，可出现声音嘶哑、头面部及上肢水肿、锁骨上窝淋巴结肿大。晚期常出现肝、脑、骨等转移。本病宜选用以下草药治疗。

一、石上柏（见图 15）

偏方 1：石上柏全草 15~60g，加猪瘦肉 30~60g（或红枣数枚），加清水 1 600~1 800ml 左右，煎至 200ml 左右，内服，每日 1 剂。

偏方 2：石上柏 30g，土牛膝 30g，马鞭草 30g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

二、铁树叶（图 35）

偏方 1：铁树叶 240g，红枣 10 个，水煎，每日 1 剂，日服 2 次。

偏方 2：铁树叶 100g，铁包金 60g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。