

中医正骨学

习题集

全国中医药高职高专配套教材


供 中 医 骨 伤 等 专 业 用

主 编 / 王 永 渝



人民卫生出版社

People's Medical Publishing House



» 中医学专业

1. 大学语文习题集
2. 中医基础理论习题集
3. 中医诊断学习题集
4. 中药学习题集
5. 方剂学习题集
6. 人体解剖学习题集
7. 生理学习题集
8. 免疫学与病原生物学学习题集
9. 药理学习题集
10. 病理学习题集
11. 诊断学基础习题集
12. 针灸学习题集
13. 推拿学习题集
14. 中医内科学习题集
15. 中医外科学习题集
16. 中医妇科学习题集
17. 中医儿科学习题集
18. 中医伤科学习题集
19. 中医五官科学习题集
20. 西医内科学习题集
21. 西医外科学习题集
22. 西医妇产科学习题集
23. 西医儿科学习题集
24. 中医经典选读习题集
25. 医学心理学习题集

» 中西医结合专业

1. 中西医结合外科学习题集
2. 中西医结合妇产科学学习题集
3. 中西医结合儿科学学习题集
4. 常见急症处理学习题集
5. 常用护理技术学习题集

» 针灸推拿专业

1. 经络腧穴学习题集
2. 针法灸法学习题集
3. 推拿手法学习题集
4. 针灸治疗学习题集
5. 推拿治疗学习题集
6. 小儿推拿学习题集

» 中医骨伤专业

1. 中医骨伤科基础习题集
2. 中医筋伤内伤学习题集
3. 中医正骨学习题集
4. 中医骨病学习题集
5. 创伤急救学习题集
6. 骨科手术学习题集

» 护理学专业

1. 护理学基础习题集
2. 中医护理基础习题集
3. 中医护理技术习题集
4. 生物化学习题集
5. 中西医内科护理学习题集
6. 中西医外科护理学习题集
7. 中西医妇科护理学习题集
8. 中西医儿科护理学习题集

» 中药专业

1. 中医学概要习题集
2. 中药方剂学习题集
3. 无机化学习题集
4. 有机化学习题集
5. 分析化学习题集
6. 中药化学习题集
7. 解剖生理学习题集
8. 药用植物学习题集
9. 中药药理学习题集
10. 中药鉴定学习题集
11. 中药药剂学习题集
12. 中药炮制学习题集
13. 常见疾病防治习题集

ISBN 7-117-07138-9



9 787117 071383 >

定价: 15.00 元

责任编辑/郝胜利

孙勇

封面设计/李蹊

版式设计/魏红波

责任校对/李华

全国中医药高职高专配套教材

供中医骨伤等专业用

中医正骨学习题集

主 编 王永渝

副主编 黄英如

编 者 (以姓氏笔画为序)

王永渝 (重庆医科大学中医药学院)

田殿兴 (山东中医药高等专科学校)

孙 权 (湖北中医药高等专科学校)

徐迎涛 (山东中医药高等专科学校)

黄英如 (重庆医科大学中医药学院)

黄 剑 (重庆医科大学中医药学院)

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中医正骨学习题集/王永渝主编. —北京:人民卫生出版社,2005.10
ISBN 7-117-07138-9

I. 中… II. 王… III. 中医伤科学-高等学校: 中等技术学校-习题 IV. R274-44


中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 118690 号

中医正骨学习题集

主 编: 王永渝
出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)
地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼
网 址: <http://www.pmph.com>
E-mail: pmph@pmph.com
邮购电话: 010-67605754
印 刷: 北京智力达印刷有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 850×1168 1/16 印张: 9.75
字 数: 245 千字
版 次: 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号: ISBN 7-117-07138-9/R·7139
定 价: 15.00 元

著作权所有,请勿擅自用本书制作各类出版物,违者必究
(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言



为配合中医药高职高专教育教学改革的需要,帮助学生复习、自习和自测,以期从广度和深度方面掌握《中医正骨学》教材教学大纲要求的知识点,加深对教材内容的理解;转变知识为分析问题、解决问题的能力,并熟练相关技术操作规程;同时,帮助学生熟悉考试技巧,指导学生适应和参加各类执业资格考试,特组织编写全国中医药高职高专配套教材《中医正骨学习题集》。

本习题集由重庆医科大学中医药学院、山东中医药高等专科学校、湖北中医药高等专科学校组织编写。试题类型由客观性试题和主观性试题两部分组成,其中客观性试题占总题量的60%~70%,主观性试题占总题量的30%~40%。客观性试题包括选择题、名词术语解释和填空题3种,其中选择题又分A型题、B型题及X型题,其比例设定,在总题量中,选择题约占45%,名词术语解释占15%,填空题占10%。主观性试题包括简答题和论述题,其中论述题除一般论述题外,还包含病案分析题,其比例设定,在总题量中:简答题、论述题各占15%~20%。

本习题集系首次编写,限于编写者水平、编写经验,其中可能存在不少问题,望各院校在使用中指正,并请广大读者提出宝贵意见,以便进一步修订、完善。

王永渝

2005年7月

题型简介和解题说明



题型简介

(一) 客观性试题

1. **选择题** 选择题主要用于测试记忆、理解和简单应用的学习结果。包括 A 型题、B 型题、X 型题三种。

【A 型题】 即最佳选择题,包括 A₁ 型题和 A₂ 型题。

A₁ 型题:由 1 个题干和 5 个备选答案组成。答题时,应根据题干要求从 5 个备选答案中选择最合适的答案即最佳答案。用于考核对知识的记忆、理解和简单应用能力。

A₂ 型题:由 1 个叙述性题干和 5 个备选答案组成,题干为一简单病例问题分析或问题情景,亦包括理论考试中的实践考核题。答题时要求从备选答案中选择 1 个符合题意要求的最佳答案主要考核对知识的分析、综合能力。

【B 型题】 即配伍选择题,由若干题共用 1 组(5 个)备选答案。每道考题只能选择其中最合适的 1 个答案。而每 1 个备选答案可被选用 1 次,也可被重复选用,或 1 次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

【X 型题】 即多项选择题,由 1 个题干和 5 个备选答案组成,备选答案可有 2 个、2 个以上或全部正确,答案的数目和组合均无规律性。答题时,应试者应选出所有正确的答案,多选或少选均为错误。X 型题要求掌握知识的深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. **名词解释** 要求简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解能力。

3. **填空题** 即提出一个不完整的陈述句,要求考生填写必须的相关(或重要)词、字、句。填空题要求对正确答案进行回忆,主要考核对知识的记忆、理解和简单应用能力。

4. **判断题** 判断题即提出 1 个错误、正确,或部分正确、部分错误的陈述句,要求就此句的正确与否给予判断。主要用于考核对知识的记忆、理解和判断能力。

(二) 主观性试题

1. **简答题** 即将学过的 1 个、2 个或 3 个知识点,围绕问题中心,用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的简单应用、分析和综合能力。

2. **论述题(含病案分析题)** 即将学过的多个知识点,综合运用到较复杂、较抽象的问题情

景中去。要求考生按照解答方向,结合问题或病例作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证,抓住有关要素融会贯通,论述深入确切。着重考核综合应用和创见能力。

解题说明

(一) 客观性试题

1. 选择题

(1)A 型题

要求从备选答案中选出 1 个最佳答案。

(2)B 型题

要求从备选答案中选配 1 个最合适的答案。

(3)X 型题

要求从备选答案中选出 2 个或 2 个以上正确答案。

2. 名词解释 要求解说简明、正确,对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现的先后顺序列出答案。

4. 判断题 要求在其题目后面的括号内将认为正确的打“√”,错误的打“×”。

(二) 主观性试题


1. 简答题 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. 论述题 要求按解答方向,理论结合实际作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。论述时应抓住有关要素融会贯通,深入确切,或将答案要点分解,逐一解题。

目 录



绪论	1
习题	1
参考答案	2
第一章 骨折总论	3
习题	3
参考答案	14
第二章 上肢骨折	26
习题	26
参考答案	50
第三章 下肢骨折	62
习题	62
参考答案	85
第四章 躯干骨折	92
习题	92
参考答案	103
第五章 脱位总论	110
习题	110
参考答案	113
第六章 脱位各论	116
习题	116
参考答案	130
附录 模拟试卷及答案	140



习 题

一、选择题

【A₁型题】

1. 公元前3世纪,《内经》较全面系统地阐述了人体解剖、生理、病理、诊断、治疗等基本理论,《内经》下列哪项学说(论述)不属于中医正骨学的理论基础
A. 形伤肿
B. 肝主筋
C. 心主血脉
D. 气伤痛
E. 肾主骨
2. “令人两手牵其颐已,暂推之,急出大指,或咋伤也。”这是世界上最早记载的颞颌关节脱位的整复方法,此方法记载于
A. 《五十二病方》
B. 《诸病源候论》
C. 《备急千金要方》
D. 《肘后救卒方》
E. 《世医得效方》
3. 世界上采用悬吊复位法治疗脊柱骨折的第一人是
A. 危亦林
B. 孙思邈
C. 薛己
D. 蔺道人
E. 葛洪
4. 首先记载使用竹片夹板固定骨折的医学著作是

作是

- A. 《仙授理伤续断秘方》
 - B. 《肘后救卒方》
 - C. 《普济方》
 - D. 《备急千金要方》
 - E. 《医说》
5. 下列哪项不是《中西医结合治疗骨折》书中提出的治疗骨折的基本原则
A. 筋骨并重
B. 医患合作
C. 病证合治
D. 动静结合
E. 内外兼治
- #### 【B型题】
- A. 《医宗金鉴·正骨心法要旨》
 - B. 《备急千金要方》
 - C. 《正体类要》
 - D. 《回回药方》
 - E. 《仙授理伤续断秘方》
6. “相度损处,拔伸,用力收入骨,捺正”的提法载于
 7. “知其体相,识其部位,一旦临证,机触于外,巧生于内”的提法来自
 8. “凡曲转,如手腕脚凹手指之类,要转动……时时为之方可”之论记载于
A. 《备急千金要方》

- B.《肘后救卒方》
C.《正体类要》
D.《仙授理伤续断秘方》
E.《普济方》
- 9.“凡伤损重者,大概要拔伸、捺正,或取开捺正”的提法见于
- 10.“肢体损于外,则气血伤于内,营卫有所不贯,脏腑由之不和”这一论点载于
- B. 伸直型桡骨下端骨折用超腕关节固定
C. 脊柱中段损伤用通木固定
D. 悬吊带快速牵引复位固定治疗颈椎骨折脱位
E. 腰背骨折处垫枕
12. 我国著名骨科专家方先之、尚天裕运用现代科学知识和方法,总结、形成一套治疗骨折的新疗法,内容主要有

【X型题】

- 11.《医宗金鉴·正骨心法要旨》在骨折的固定方面,主张“依形制器”,创造和改进了多种固定器具和方法,包括有
- A. 四肢长骨干骨折用竹帘、杉篱固定
A. 新的正骨八大手法
B. 传统的练功方法
C. 中药内服外治
D. 骨折复位固定器
E. 新的夹板固定器具

二、填空题

1. 中医骨外科鼻祖华佗使用_____进行全身麻醉,进行骨外科手术,还创造了_____,以功能锻炼治疗伤疾。
2. _____著_____是我国现存最早的一部骨伤科专著。
3. 1958年,先后成立了_____,_____,这标志着骨伤科不仅在临床医疗方面,而且在基础理论与_____都得到了很大的发展。

参 考 答 案

一、选择题

【A₁型题】

1. C 2. D 3. A 4. B 5. C

【B型题】

6. E 7. A 8. E 9. D 10. C

【X型题】

11. ACE 12. ABCE

二、填空题

1. 麻沸散 五禽戏
2. 蔺道人 仙授理伤续断秘方
3. 中医研究院骨伤科研究所 天津市中西医结合治疗骨折研究所 科学研究方面

第一章 骨折总论

习 题

一、选择题

【A₁型题】

1. 儿童因骨膜较厚,骨骼中的胶质较多,而易发生
A. 横断骨折
B. 粉碎骨折
C. 青枝骨折
D. 压缩骨折
E. 斜形骨折
2. 撕脱骨折多因下列哪项病因所致
A. 间接暴力
B. 肌肉牵拉暴力
C. 直接暴力
D. 骨疾病
E. 累积性力
3. 一般的单纯性骨折,全身症状不甚明显或不严重,只是由于局部积瘀化热,其体温一般不会超过
A. 37.5℃
B. 38℃
C. 38.5℃
D. 39℃
E. 39.5℃
4. 不属于骨折早期并发症的是
A. 骨化性肌炎
B. 神经干损伤
C. 感染
D. 血管损伤
E. 缺血性肌挛缩
5. 不属于骨折晚期并发症的是
A. 缺血性肌挛缩
B. 关节僵硬
C. 创伤性关节炎
D. 迟发性畸形
E. 缺血性骨坏死
6. 骨折的愈合过程中,修复期的第一阶段是血肿机化期,一般需要多长时间
A. 1周
B. 1~2周
C. 2周
D. 2~3周
E. 3周
7. 骨折愈合过程分期是
A. 炎症期、血肿机化期、塑形期
B. 炎症反应期、修复期、塑形期
C. 炎症期、血肿机化期、骨痂改造期
D. 炎症反应期、新生骨痂期、骨痂改造期
E. 炎症期、血肿机化期、修复期
8. 骨折的临床愈合标准中,上肢功能测定要求,在解除外固定情况下,能平举多重的重物达1分钟
A. 1kg
B. 1.5kg

- C. 2kg
D. 2.5kg
E. 3kg
9. 骨折的临床愈合标准中, 上肢功能测定要求, 在解除外固定情况下, 能平举 1kg 重物达多长时间
A. 1 分钟
B. 3 分钟
C. 5 分钟
D. 10 分钟
E. 15 分钟
10. 骨折的临床愈合标准中, 下肢功能测定要求, 在解除外固定情况下, 能连续徒手步行多少分钟
A. 2 分钟
B. 3 分钟
C. 5 分钟
D. 10 分钟
E. 15 分钟
11. 骨折的临床愈合标准中, 下肢功能测定要求, 在解除外固定情况下, 能连续徒手步行 3 分钟, 并不少于多少步
A. 200 步
B. 150 步
C. 100 步
D. 60 步
E. 30 步
12. 骨折的临床愈合标准中, 功能测定应连续观察多长时间骨折处不变形, 则观察的第一天即为临床愈合日期
A. 3 个月
B. 2 个月
C. 1 个月
D. 2 周
E. 10 天
13. 成人锁骨骨折临床愈合时间为
A. 3~4 周
B. 4~6 周
C. 5~6 周
D. 6~7 周
E. 6~8 周
14. 成人肱骨外科颈骨折临床愈合时间为
A. 7~10 周
B. 8~10 周
C. 8~12 周
D. 6~8 周
E. 4~6 周
15. 成人肱骨干骨折临床愈合时间为
A. 4~6 周
B. 4~8 周
C. 3~6 周
D. 7~10 周
E. 3~4 周
16. 成人桡骨远端骨折临床愈合时间为
A. 4~5 周
B. 5~6 周
C. 4~8 周
D. 3~6 周
E. 3~4 周
17. 成人髌骨骨折临床愈合时间为
A. 7~10 周
B. 8~12 周
C. 6~8 周
D. 4~6 周
E. 3~4 周
18. 当归、白芍、川芎、红花、骨碎补、续断、丹参、煅自然铜、乳香、没药, 此类药用于
A. 和营止痛法
B. 接骨续筋法
C. 行气消瘀法
D. 温经通络法
E. 舒筋活络法
19. 骨折畸形愈合, 受伤时间超过多久, 骨折处已达骨性愈合, 不可用手法折断者, 可通过手术方法, 将断端凿开, 再矫正畸形, 给予适当内外固定
A. 2 个月
B. 1 个月

- C. 4个月
D. 6个月
E. 3个月
20. 股骨颈骨折临床愈合时间为
A. 6~8周
B. 7~10周
C. 8~10周
D. 8~12周
E. 12~24周
21. X线发明于
A. 1879年
B. 1895年
C. 1904年
D. 1912年
E. 1936年
22. 骨折的外用药,早期可用
A. 行气活血药膏
B. 接骨续筋药膏
C. 消肿止痛药膏
D. 理气止痛药膏
E. 清热解毒药膏
23. 将安置好的夹板捆扎,依次为
A. 近端、中间、远端
B. 中间、远端、近端
C. 远端、中间、近端
D. 中间、近端、远端
E. 近端、远端、中间
24. 不属于洗药或熨药的适应证是
A. 局部仍肿痛
B. 肌腱粘连
C. 关节活动受限
D. 骨折已临床愈合
E. 肌肉僵硬
25. 不属夹板固定的优点是
A. 病人痛苦轻
B. 骨折愈合快
C. 价廉疗效佳
D. 并发症少
E. 功能恢复好
26. 扎带的松紧度,以捆扎后能提起扎带在夹板上下移动多少厘米为适宜
A. 2.5
B. 1.5
C. 1
D. 2
E. 0.5
27. 制作石膏绷带,将石膏卷或折叠好的石膏条平放在多少度左右的温水桶内为宜
A. 20℃
B. 60℃
C. 50℃
D. 30℃
E. 40℃
28. 下列哪项不是骨折迟缓愈合的成因
A. 骨折段血供不良
B. 去除固定过早
C. 周围软组织损伤严重或感染
D. 手术过度剥离损伤骨膜
E. 体质虚弱,营养不良
29. 伤后多长时间以内,彻底清创缝合后,开放骨折可按闭合骨折处理
A. 12小时
B. 6~8小时
C. 2小时
D. 3~4小时
E. 24小时
30. 伤后2周左右,创面感染基本控制,出现新生的肉芽组织,坏死组织界限分明,已渐分离,此时可剪除坏死组织……但裸露的骨质不宜接触祛腐药物,只宜用
A. 八二丹
B. 生肌散
C. 青黛散
D. 九一丹
E. 生肌玉红膏
31. 开放骨折的一般性处理中,要刷洗伤口周围及手术部位的皮肤2~3次,第一次刷洗不应少于多长时间

- A. 15分钟
B. 15~20分钟
C. 20~30分钟
D. 5~10分钟
E. 40分钟
32. 开放骨折,超过多长时间的创口,不宜作清创术
A. 24小时
B. 4小时
C. 12小时
D. 36小时
E. 8小时
33. 适用于骨折中期,瘀肿经久不散的外用药膏是
A. 舒筋活血膏
B. 消瘀止痛膏
C. 温经通络膏
D. 双柏膏
E. 接骨续筋膏
34. 可应用手法折骨,把陈旧骨折变成新鲜骨折,然后按新鲜骨折处理,这类骨折应是伤后多长时间内的
A. 半个月~1个月
B. 1~2个月
C. 2~3个月
D. 3~4个月
E. 6个月
35. 开放感染骨折,创缘皮肤由于脓液浸渍,起皮疹,瘙痒,破流黄水,除创面用药外,创缘可用
A. 金黄膏
B. 九一丹
C. 青黛散
D. 生肌玉红膏
E. 平胥丹
- 【A₂型题】**
36. 某学生在上体育课时,因投掷手榴弹用力过猛,而造成肱骨干骨折,此病因为
A. 间接暴力
B. 累积性力
C. 骨疾病
D. 肌肉牵拉暴力
E. 直接暴力
37. 某女士,35岁,做清洁后从桌上跳下,而突发腰痛不适,经摄X线片诊为第二腰椎椎体压缩性骨折,此病因为
A. 直接暴力
B. 间接暴力
C. 肌肉牵拉暴力
D. 累积性力
E. 骨疾病
38. 陈某,男,76岁,因滑倒跌伤致左股骨颈骨折,此患者最易发生的晚期局部并发症是
A. 关节僵硬
B. 骨化性肌炎
C. 创伤性关节炎
D. 褥疮
E. 缺血性骨坏死
39. 某小学生,因跌仆而致右伸直型肱骨髁上骨折,整复此骨折时,纠正成角畸形宜用
A. 折顶手法
B. 屈伸手法
C. 提按手法
D. 摇摆手法
E. 端挤手法
40. 某男士,42岁,2天前因跌伤,致右胫骨平台骨折伴膝前下方软组织挫伤、皮肤擦伤,现膝前下方红肿热痛,此局部宜外敷
A. 消瘀止痛膏
B. 双柏散膏
C. 金黄膏
D. 舒筋活血膏
E. 接骨续筋膏
41. 陈某,女,35岁,2天前不慎滑倒,致尾椎骨骨折脱位,经手法复位后予以活血化瘀、消肿止痛药内服、外用,现患者述伤处疼痛坠胀不适。检查发现尾椎及肛门部红肿,皮温较高,轻度压痛,中药内服宜用

- A. 复元活血汤
B. 桃仁承气汤
C. 黄连解毒汤
D. 柴胡疏肝散
E. 膈下逐瘀汤
42. 张某,男,31岁,建筑工人,3天前不慎从2米多高处坠下,致第一腰椎压缩性骨折,入院后除腰痛不能活动外,腹部胀满难忍,大便已3天未解,舌红苔黄,脉弦数,此宜内服
- A. 桃红四物汤
B. 膈下逐瘀汤
C. 复元通气散
D. 桃仁承气汤
E. 新伤续断汤
43. 周某,女,47岁,半月前因跌仆而致右桡骨远端骨折,现局部肿痛已减轻,内服药宜
- A. 续骨活血汤
B. 六味地黄汤
C. 舒筋活血汤
D. 补肾壮筋汤
E. 桃红四物汤
44. 刘某,女,73岁,2个月前因右肱骨外科颈骨折曾住院治疗,现骨折已基本愈合,但出现右肩部酸冷疼痛,右上肢乏力,此宜外用
- A. 正骨水外搽
B. 损伤风湿膏外贴
C. 舒筋活络膏外敷
D. 舒筋止痛水外搽
E. 接骨续筋膏外敷
45. 某男,52岁,3月前因伤致左胫骨中段骨折,经手术切开复位内固定治疗,现骨折处仍有疼痛、压痛,X线照片显示局部骨痂较少,骨折线未消失,诊断为骨折迟缓愈合,脉细,尺部脉弱,内服药宜
- A. 续骨活血汤
B. 壮筋续骨丹
C. 定痛和血汤
D. 八珍汤
E. 大活络丸
- 【B型题】**
- A. 病理因素
B. 直接暴力
C. 累积性力
D. 肌肉牵拉暴力
E. 间接暴力
46. 髌骨骨折、尺骨鹰嘴骨折、肱骨大结节骨折、髌前上棘骨折病因多为
47. 第二跖骨颈骨折、腓骨下端骨折病因多是
48. 前臂骨折,两骨骨折部位在同一平面,骨折线呈横断或粉碎,此骨折病因多属
- A. 病理因素
B. 直接暴力
C. 累积性力
D. 肌肉牵拉暴力
E. 间接暴力
49. 桡骨下端斜形骨折,桡尺骨骨折,两骨折部位多不在同一平面,此类骨折病因多为
50. 在轻微外力的作用下即导致的骨折,此类骨折病因多属
- A. 青枝骨折
B. 压缩骨折
C. 嵌插骨折
D. 裂纹骨折
E. 横形骨折
51. 儿童四肢常见
52. 颅骨骨折多为
- A. 复杂性骨折
B. 开放骨折
C. 不完全性骨折
D. 病理性骨折
E. 不稳定性骨折
53. 裂纹骨折属
54. 螺旋形骨折属
55. 骨盆骨折属
- A. 脊柱骨折
B. 锁骨骨折

- C. 胸骨骨折
D. 肋骨骨折
E. 骶骨骨折
56. 脊髓损伤并发于
57. 肝、脾破裂并发于
- A. 骨盆骨折
B. 颅骨骨折
C. 肋骨骨折
D. 肩胛颈骨折
E. 脊柱骨折
58. 肺损伤并发于
59. 膀胱、尿道、直肠损伤并发于
60. 脑损伤并发于
- A. 摇摆手法
B. 回绕手法
C. 提按手法
D. 拔伸牵引手法
E. 夹挤分骨手法
61. 重叠移位宜用
62. 前、后移位宜用
63. 重叠移位明显的横形骨折宜用
- A. 端挤手法
B. 夹挤分骨手法
C. 屈伸收展手法
D. 拔伸牵引手法
E. 回绕手法
64. 背向移位宜用
65. 两骨并列的骨折宜用
- A. 小木板或铝板固定
B. 夹板局部外固定
C. 超关节夹板固定
D. 超关节夹板固定结合骨牵引
E. 木板分骨垫固定
66. 肱骨干骨折宜选
67. 肱骨髁上骨折宜选
- A. 木板分骨垫固定
B. 夹板局部外固定
C. 超关节夹板固定
D. 超关节夹板固定结合骨牵引
E. 铝板固定
68. 掌骨骨折宜选
69. 踝部骨折宜选
70. 桡、尺骨干骨折宜选
- A. 合骨垫
B. 抱骨垫
C. 高低垫
D. 梯形垫
E. 分骨垫
71. 前臂桡尺骨折,掌、跖骨折宜用
72. 髌骨骨折宜选
73. 下桡尺关节分离宜用
- A. 塔形垫
B. 葫芦垫
C. 横垫
D. 分骨垫
E. 合骨垫
74. 踝部骨折宜选
75. 股骨干骨折宜选
- A. 接骨续筋法
B. 攻下逐瘀法
C. 舒筋活络法
D. 行气消瘀法
E. 和营止痛法
76. 复元活血汤、桃红四物汤用于
77. 定痛和血汤用于
78. 续骨活血汤、新伤续断汤用于
- A. 温经通络法
B. 攻下逐瘀法
C. 接骨续筋法
D. 舒筋活络法
E. 补益肝肾法
79. 壮筋续骨丹用于
80. 桃仁承气汤用于
- A. 坎离砂
B. 金黄膏、四黄膏
C. 狗皮膏
D. 七三丹
E. 消瘀止痛膏、双柏膏

81. 用于创面腐肉未去,脓水未尽者,有祛腐拔毒作用的是
82. 适用于骨折早期,伤处肿胀疼痛者,外用方剂是
83. 适用于骨折、筋伤的中后期,具有消肿止痛、通经活络作用,外用药为
- 接骨续筋法
 - 行气消瘀法
 - 补益肝肾法
 - 温经通络法
 - 舒筋活络法
84. 由桃仁、红花、当归、地龙、麻黄、桂枝、白芷、乳香、没药、川乌、草乌、细辛、赤芍等药物组成的方剂用于
85. 由当归、川芎、赤芍、天花粉、丹皮、穿山甲、木香、柴胡、桃仁、红花等药物组成的方剂用于
86. 由当归、川芎、白芍、红花、骨碎补、续断、丹参、煅自然铜、乳香、没药等药物组成的方剂用于
- 【X型题】**
87. 骨折移位的方式有
- 旋转移位
 - 分离移位
 - 缩短移位
 - 侧方移位
 - 成角移位
88. 下列骨折类型中,哪些属于不稳定骨折
- 斜形骨折
 - 横断骨折
 - 螺旋形骨折
 - 骨骺分离
 - 粉碎骨折
89. 裂纹骨折多见于
- 脊椎椎体
 - 颅骨骨折
 - 跟骨骨折
 - 肩胛骨骨折
 - 髌骨骨折
90. 骨折的特征有
- 异常活动
 - 疼痛和压痛
 - 局部肿胀、瘀斑
 - 骨擦音
 - 畸形
91. 诊断下列骨折时,除摄常规位的 X 线片外,还应拍斜位照片的骨折有
- 跟骨骨折
 - 第二颈椎齿状突骨折
 - 髌臼后上缘骨折
 - 腕舟骨骨折
 - 脊椎小关节骨折
92. 下列哪些骨折 X 线拍片当时可能显示不出骨折线,应于两周后再摄片复查
- 跖骨疲劳骨折
 - 腕舟骨骨折
 - 股骨颈无移位骨折
 - 尺骨鹰嘴骨折
 - 踝部骨折
93. 属于骨折晚期并发症的是
- 缺血性骨坏死
 - 泌尿系感染和结石
 - 坠积性肺炎
 - 脂肪栓塞
 - 缺血性肌挛缩
94. 骨折愈合过程分期有
- 炎症期
 - 血肿机化期
 - 修复期
 - 塑形期
 - 骨痂改造期
95. 下列哪些骨折愈合时间为 4~6 周
- 踝部骨折
 - 肱骨髁上骨折
 - 跖骨骨折
 - 桡骨远端骨折
 - 髌骨骨折
96. 下列骨折中,哪些常因断端血供不足而影