

包氏醫宗

第二集第五卷
雜病方講義

R2-51

29/2

包氏醫宗第二集目錄

▲內科學瘍科婦人科學附

卷之一

雜病論章節

一冊

卷之二

雜病方法

附歌括

一冊

卷之三

雜病表

附表式

一冊

卷之四

雜病論講義

二冊

卷之五

雜病方講義

一冊

(第二集售銀伍圓)

◀版權有所不准翻印▶

中華民國十九年一月出版

包氏醫宗第二集第五卷

雜病方講義一冊

著作者 閩杭包識生

出版者 包氏醫宗出版部

總發行 包氏醫宗出版部

上海北泥城橋新闢路
口鴻祥里二一四五號

代售處 各大書局

包氏醫宗第一集目錄

▲內科傳染病學

卷之一

傷寒論章節

一冊

卷之二

傷寒方法

附歌括

一冊

卷之三

傷寒表

附表式

一冊

卷之四

傷寒論講義

二冊

卷之五

傷寒方講義

一冊

(第一集售銀陸圓)

包氏醫宗第三集

診斷學

四冊

印刷中

包氏醫宗第四集

解剖學附圖

二冊

編輯中

包氏醫宗第五集

生理學

二冊

編輯中

包氏醫宗第六集

病理學

二冊

編輯中

包氏醫宗第七集

治療學

一冊

編輯中

包氏醫宗第八集

藥物學

二冊

編輯中

▲函索樣本附郵票二十分

雜病方講義目錄

第一章

總論

第一節

痙濕喝病方

第二節

百合狐惑陰陽毒病方

第三節

瘧病方

第四節

中風歷節病方

第五節

血痺虛勞病方

第六節

肺痿肺癰欬嗽上氣病方

第七節

奔豚病方

第八節

胸閉心痛短氣病方

第九節

腹滿寒疝宿食病方

第十節

五藏風寒積聚病方

第十一節

痰飲咳嗽病方

第十二節 消渴小便不利淋病方

第十三節 水氣病方

第十四節 黃疸病方

第十五節 驚悸吐衄下血胸滿瘀血病方

第十六節 嘔吐噦下利病方

第十七節 瘡癰腸癰浸淫病方

第十八節 跌蹶手指臂腫轉筋狐疝虵蟲病方

第十九節 婦人妊娠病方

第二十節 婦人產後病方

第廿一節 婦人雜病方

第二章 方義

方名不錄見章內

雜病方講義

閩杭包一虛識生氏著

男天白 孫應申校字

第一章

總論

傷寒論以六經立論。主以汗吐下和。故一百十二方。統攝於陰陽表裏寒熱虛實之主。云種種病論。則以五藏立論。主以溫清攻補。故一百四十三方。散見於軀殼藏府氣血內經。臣云篇各症各治。各有各能。不能與傷寒並論者。職是故也。細察經義。仲師是先作傷寒。後作雜病。所以雜病多引用傷寒之方。傷寒則不引用雜病之方也。按其製方之法。傷寒方中既詳且盡。雜病方中再不能胡盧依樣重演一遍。所以此編之著述。不能不別開生面也。今分總論方義爲二章。以盡其義。讀者仍當與傷寒方講義互相觀摩者也。

第一節 痙濕喝方

瘕方

(一) 括樓桂枝湯

括樓根 桂枝 生薑 甘草 大棗 白芍

(二) 葛根湯

葛根 桂枝 生薑 甘草 大棗 白芍 麻黃

(三)大承氣湯

大黃 川朴 枳實 芒硝

濕方

(四)麻黃加朮湯

白朮 麻黃 桂枝 甘草 杏仁

(五)麻杏薤甘湯

麻黃 杏仁 薤苳 甘草

(六)防已黃芪湯

防已 黃芪 白朮 甘草 生薑 大棗

(七)桂枝附子湯

附子 桂枝 生薑 甘草 大棗

(八)桂枝附子去桂加朮湯

附子 白朮 生薑 甘草 大棗

(九)甘草附子湯

附子 桂枝 白朮 甘草

喝方

(十)白虎湯

石膏 粳米 知母 甘草

(十一)一物瓜蒂湯

瓜蒂

此章凡十一方。除引用傷寒六方外。雜病正方祇五方。可別為三類。傷寒以桂枝湯為首方。雜病亦以桂枝湯為首方。是表明人體疾病總以營衛虛實為主。與麻黃加朮湯作營衛虛實之對偶者也。按桂枝加括樓根。是以辛溫扶陽之方。加苦寒清熱之藥。麻黃加朮湯。是以苦

溫攻陽之品。加甘溫培土之劑者也。此乃先師暗示製方之法。補傷寒未盡之義。吾人當體先師言外之意。溫清攻補。常用卽用。不必顧慮。更不可固執俗見。溫補之方。不可加寒攻之藥。總以見症加減爲宜。聖經可據。斷不欺人也。雖二方祇加一味。當知三味五味。亦何嘗不可加減耶。由是觀之。桂枝加減之義。面面俱到。如陽明之葛樓。少陽之龍牡。太陰之芍黃。少陰之參附。厥陰之歸。太陽之桂。在在予吾人以模範者也。桂枝如是。麻黃何獨不然。故雜病篇首。特以桂枝加樓根。麻黃加白朮。作諸方之榜樣也。

桂枝麻黃之加減。既如上述。此外更有桂麻之變方焉。卽麻杏薤甘湯。與防己黃芪湯。作營衛中濕虛實之對偶也。一從麻法。一師桂方。一治寒濕傷營。身疼發熱日晡劇。一治風濕傷衛。身重脈浮及惡風。一爲營血之不利。一爲衛氣之不宜。一以麻黃去桂枝加薤苳。一以桂枝去桂芍加已芪。並變更桂麻煎湯之重劑。而爲剉散之輕劑。以符治風濕。用微微似欲汗出之法也。

一物瓜蒂湯。解見方義。

按以上五方。雖分治痙濕喝三症。然而發汗攻邪之性。則五方又大同小異。故先師合爲一篇。使其皮膚肌肉筋骨之邪。或從外解。或從裏解。總以發汗利小便爲主。吾人能擇善用之。借治邪同症異之病。亦必捷於桴鼓也。

痙濕喝爲雜病首篇。先師引傷寒之寒熱病。而轉雜病之無寒熱病。是承上啓下之意。故是篇各症。或有

寒熱或無寒熱。不一定也。按治瘧之方。雖祇三種。在表者。虛則用括樓桂枝。實則用葛根。在裏者。實則用大承。虛則當用四逆矣。觀此立方。瘧厥之病。症同而經異。在陽經。則稱曰瘧。在陰經。則稱曰厥。然陰經之厥。傷寒已論其詳。此篇之瘧。卽陽經瘧病之症治也。故先師立方。皆陽經方劑之立法而已。吾人須知桂葛之外。仍有青龍真武。大承之外。仍有抵當四逆也。又按中醫之所謂瘧厥。卽西醫之所謂腦膜炎。及腦脊髓炎。寒熱症之極重者。皆能轉爲是症也。處方之法。總以表裏寒熱虛實爲斷。近年吾中醫之治瘧。有寒熱者。大都可治。其一種真正腦膜炎。及梅毒性腦脊髓炎。則獲效者百不一二也。

治濕之方。凡六種。本篇三方外。又引傷寒三方。觀其大意。卽用桂麻二方之變化而成。君以朮附。佐以防已。薏苡。更以朮爲必用之品。濕當表解者。用麻黃加朮。桂枝附子。濕當裏解者。用麻杏薏苡。白朮附子。甘草附子也。

治喝。祇有二方。卽白虎加參。及瓜蒂是也。白虎治暑。傷寒已論其詳。瓜蒂治暑。有宣通皮膚之義。或取吐得汗而解也。

第二節 百合狐惑陰陽毒方

百合病方

(一) 百合知母湯

百合

知母

(二)百合滑石代赭石湯

百合 滑石 代赭石

(三)百合雞子黃湯

百合 雞子黃

(四)百合地黃湯

百合 生地黃汁

(五)百合洗方

百合

(六)栝樓牡蠣散

栝樓根 牡蠣

(七)百合滑石散

百合 滑石

狐惑病方

(八)甘草瀉心湯

半夏 黃芩 黃連 甘草 乾薑 大棗 人參

(九)苦參湯

苦參

(十)雄黃熏法

雄黃

(十一)赤豆當歸散

赤小豆 當歸

陰陽毒方

(十二)升麻鼈甲湯

升麻 鼈甲 當歸 甘草 雄黃 蜀椒

(十三)升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯

升麻 鼈甲 當歸 甘草

以上十三方。分爲三類。百合病在藏府。狐惑病在九竅。陰陽毒病在皮膚。病雖不同。症有類似。神靈所作。百合病在陰不足。陽有餘。症現口苦便赤。諸藥不能治。得藥則劇而吐利。若藥味濃厚。胃不受納。故用甘平淡味以治之。此非百合莫屬。按百合猶五苓之能充饑。更與胃府相契合者也。其所加之藥。亦屬平淡之品。汗傷津液。加知母之生津。下傷胃陽。加滑石代赭之安土。吐傷胃液。加雞子黃之養液。病形如初。用地黃之養血。百合作外洗。可以治內熱。加滑石內清。可以治表熱也。去百合換以樓蠟。變甘平爲苦寒。可清少陽之相火。而潛歸厥陰。此又爲百合之變方。而藥力更雄猛者也。有一種病人。疑神疑鬼。似一身都是病。却實無甚病也。是神經作用。多所不可之氣性使然。恰與百合病類似。亦不可投以劇藥。以平淡爲宜。當仿百合治法。先師列此百合。承痙濕喝之後。大有深意存焉。合百種病症於一身。即雜病之義也。狐惑症屬蟲病。竄蝕空竅。先師作內服二方。外治二方。隨症施用可也。按甘草瀉心加參。是瀉肺經之氣。病因蟲蝕喉管。聲音變啞。用此湯以清肺氣之熱也。赤豆當歸散。是消肝經之血病。因蟲蝕眼目作膿。用此湯以消肝血之炎者也。至蟲蝕陰竅。洗以苦參。蟲蝕肛門。薰以雄黃。是因病制宜之法。其喉目之地。不能以毒藥薰洗。故用內服消散之藥也。然陰肛兩部。用薰洗外。亦可內服前方。以清內熱。而喉目雖不能用一切毒藥殺蟲。然以冰硼熊胆外治之。亦未嘗不可也。

陰陽毒。是感受外邪而發。偶受天地不正之氣也。症屬陽者。面赤斑斑如錦文。喉痛吐膿血。治以升麻鼈

甲。托裏散邪也。屬陰者。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。治以升麻鼈甲。去雄椒之溫燥。免傷陰血也。

第二節 瘡病方

(一) 鼈甲煎丸

鼈甲 蟻螂 蜚蟲 鼠婦 蜂窠 人參 阿膠 芍藥

柴胡 黃芩 大黃 桃仁 紫葳 丹皮 桂枝 乾薑

半夏 厚朴 葶藶 射干 瞿麥 石葦 赤硝 鍛鼈灰

(二) 白虎加桂枝湯

桂枝 石膏 粳米 甘草 知母

(三) 蜀漆散

蜀漆 雲母 龍骨

瘡病之方。雖僅三種。而總論治法。已列汗吐下溫清針灸。及飲食消息。皆治瘡成法。諺云。瘡無正方。此古人無藥治瘡之苦處也。然今中西醫法。皆有極驗之方。西用規甕。中用砒石。以及各種驗方。單方可用之。不盡。按此篇所立之方。但分新瘡。寒瘡。溫瘡。而已。鼈甲煎丸。治久瘡。結成癰瘕。名曰瘡母。實即脾藏腫脹。瘡菌之病。竈結成也。鼈甲煎丸。確有奇效。破氣破血之中。又合補氣補血之品。攻補並用之方也。白虎加桂枝湯。治溫瘡。但熱無寒。陰虛陽盛。瀉陽清熱之藥也。更加桂枝。清中帶溫。無寒但熱之瘡。白虎清之。骨節煩疼之寒。桂枝升之。於是外熱得潛。其瘡即止。內寒得達。骨痛可除。蜀漆散。治寒多熱少之瘡。屬陰盛陽衰。潛陽入陰之藥也。少陽之相火。得潛於厥陰。瘡即止也。

第四節 中風歷節病方

中風方

(一) 侯氏黑散

菊花 當歸 川芎 黃芩 礬石 乾薑 牡蠣

防風 桔梗 細辛 桂枝 人參 白朮 茯苓

(二) 風引湯

大黃 乾薑 龍骨 牡蠣 赤石脂 白石脂

桂枝 甘草 石膏 滑石 寒水石 紫石英

(三) 防已地黄湯

防已 桂枝 甘草 防風 生地黃汁

(四) 頭風摩散

大附子 鹽

歷節方

(五) 桂枝芍藥知母湯

桂枝 芍藥 生薑 白朮 附子

甘草 麻黃 防風 知母

(六) 烏頭湯

麻黃 芍藥 甘草 黃耆 烏頭 白蜜

(七) 礬石湯

礬石

中風病在衛氣太強。上衝頭腦。以致腦府出血。身體不遂。病源有外因內因之別。歷節病在衛氣不足。下

竭足股。以致足膝留津。筋骨作痛。病源亦有外內之因也。由是觀之。中風歷節。病皆在衛氣。一太過。一不及。一上衝。一下降而已。先師處方。亦兩相對偶。一有黑散之清頭止血。一有桂枝芍藥知母之溫足行氣。一有風引防已地黃之清。一有烏頭之溫。一有頭風摩散擦頭。一有礬石煎湯之浸足也。侯氏黑散。以驅風平氣止血之品。治外風寒症。四肢煩重。及身軀不遂諸症。按四肢煩重。卽中風初起之輕症。若重症。則四肢不遂矣。風引湯。治內風熱症之癱瘓。按癱瘓。亦手足不仁之意也。防已地黃湯。治內風熱症。獨語如狂。此亦神經變亂之病也。此三方。皆內服之品。更有外治之藥。卽頭風摩散。用生附子和鹽。以麻酔神經。清其頭熱。則頭痛止。頭風平也。

桂枝芍藥知母湯。以溫散發汗之功。治歷節外因之脚腫。肢節痛。頭眩。身體尪羸等症。服之。則衛氣宣。節痛止。病從外解者也。烏頭桂枝湯。治歷節內因。四肢歷節作痛。不可屈伸之症。以麻酔溫散之功。宣通衛氣。病從內解者也。以上二方。係內服之藥。以麻黃附子烏頭爲主藥。桂枝芍藥佐之。尤知防薑使之。與防已地黃風引湯之以清衛涼血者。適得其反。所謂在上升之。在下升之。散者收之。結者散之之法也。更有外治之法。用礬石煎湯以洗足。治脚氣衝心之症。此又與頭風摩散作對偶。一上一下。一頭一足者也。先師之法。在在含有深意存焉。

第五節

血痺虛勞方

血痺方

(一)黃芪桂枝五物湯

虛勞方

(二)桂枝加龍骨牡蠣湯

(三)天雄散

(四)小建中湯

(五)黃芪建中湯

(六)八味腎氣丸

(七)薯蕷丸

(八)酸棗仁湯

(九)大黃廔蟲丸

黃芪 桂枝 生薑 大棗 芍藥

龍骨 桂枝 生薑 甘草 大棗 芍藥 牡蠣

天雄 桂枝 白朮 龍骨

桂枝 生薑 甘草 大棗 芍藥 膠飴

黃芪 桂枝 生薑 甘草 大棗 芍藥 膠飴

地黃 薯蕷 萸肉 澤瀉 茯苓 肉桂 丹皮 附子

人參 阿膠 芍藥 芎藭 當歸 地黃 麥冬

薯蕷 白朮 茯苓 乾薑 甘艸 大棗 神糲

桂枝 豆卷 柴胡 防風 杏仁 桔梗 白蘇

酸棗仁 甘草 知母 茯苓 芎藭

大黃 廔蟲 蟲蟲 水蛭 蟬蟪 乾漆

黃芩 芍藥 桃仁 杏仁 甘草 地黃

血痺虛勞。皆血病也。血痺病在外之軀殼。富貴尊榮。骨弱肌盛。血有餘之病也。虛勞病在內之五藏。因煩勞過度。形消骨立。血不足之症也。先師分爲攻補二類以治之。九方之中。八方皆補。一方主攻。誠以虛勞諸症。虛多實少也。大約勞多虛補。傷多實攻。先師立一法門。在學者審證擇方爲上。故治勞傷。有極虛不能補者。先宜攻去其病。而後補之也。

黃芪桂枝五物湯。以桂枝去甘草。加黃芪。倍生薑。行血行氣。升陽之法也。桂枝龍骨牡蠣湯。調營衛而潛上越之虛陽。方宗桂枝之法。天雄散。固下元而潛下逃之命火。法師眞武之方。此虛陽外越內脫之症。必用異曲同工之方者也。按勞則傷陽。陽虛宜此藥。而陰虛之治。先師雖未明言。然不可不知。有對面之方藥在也。

夫虛勞之病。根本在五藏。五藏者。主藏精而不瀉也。久勞。則根本枯竭。勞病成。諸症蜂起矣。先師作五方。以爲治五藏之勞立法也。小建中湯。脾勞之主方也。黃芪建中湯。肺勞之主方也。八味腎氣丸。腎勞之主方也。薯蕷丸。肝勞之主方也。酸棗仁湯。心勞之主方也。然皆陰陽並虛之治法。其偏陰偏陽之症。又非用純陰純陽之藥不可。更有有餘治法。大黃廬蟲丸。尙已。所謂去舊生新。緩中補虛之法。治五勞虛極之後。加以七傷致病。徒補無益也。先師以血痺症起頭。乾血勞結尾。中間調營衛。補氣血。和陰陽。重用芍地。以血爲根本也。

第六節 肺痿肺癰欬嗽上氣病方

(一)甘草乾薑湯 甘草 乾薑

(二)射干麻黃湯 射干 麻黃 細辛 紫菀 半夏 生薑 大棗 欬冬花

五味子

(三)皂莢丸 皂莢

(四)厚樸麻黃湯 厚樸 麻黃 細辛 杏仁 半夏 乾薑 小麥 石膏

五味

(五)澤漆湯 澤漆 黃芩 紫參 人參 白前 半夏 桂枝 生薑

甘草

(六)麥門冬湯 麥冬 人參 半夏 粳米 甘草 大棗

(七)葶蘆大棗瀉肺湯 葶蘆 大棗

(八)桔梗湯 桔梗 甘草

(九)越婢加半夏湯 麻黃 生薑 甘草 大棗 石膏 半夏

(十)小青龍加石膏湯 麻黃 細辛 桂枝 乾薑 甘草 芍藥 半夏 五味 石膏