

〔校勘影印本〕

〔二十二丙〕

中國醫學大成續集

上海科學技術出版社

〔校勘影印本〕

中國醫學大成續集

〔三十二丙〕

上海科學技術出版社

醫學綱目

〔明〕樓英著

原編 曹炳章

出版說明

近代中醫學家，江南名醫曹炳章（一八七七—一九五六），字赤電，浙江四明人。醫名鼎盛，謙遜好學，診餘廣集醫書，名聞海內。自語「常蓄醫藥革校之決心」，為振興中醫，奔走呼號，不遺餘力。平生著述甚豐，僅撰述和評而歸宿于著作¹的醫學家之路。

正因為曹氏具有豐富的臨證經驗，又有廣博的學識，三十年代，上海大東書局（為上海科學技術出版社前身之一）特聘其主纂當時被譽為醫學淵府之《中國醫學大成》，實為國內中醫界一大盛事。

《中國醫學大成》分十三類，凡三百六十五種：醫經十五種，藥物十九種，診斷十六種，方劑十九種，通治六十種，外感病四十三種，內科二十七種，外科五十二種，婦科二十四種，兒科三十三種，鍼灸十六種，醫案十六種，醫論、醫話、醫史二十五種。因其搜羅至廣，版本選擇至精而稱譽醫壇。《中國醫學大辭典》主編謝利恆氏贊此書「吾道精華，咸集于此」；醫史學家宋大仁稱：「茲書一旦問世，人人皆有獲讀秘籍之機會，必不似從前為少數人私有物矣。不僅有沾溉學人之益，且維我國數千年醫學文獻于不墜也。」浙江中醫學院徐榮齋教授在紀念曹炳章先生誕生一百周年的專文中，歸納此書對中醫之發展具備八大價值：一、保存和流通古籍；二、有系統可循；三、打破保守；四、公開禁方；五、統一中醫學術；六、奠定習醫之參考書；七、造就中醫高深人才；八、便利圖書館之採貯。

中醫藥學歷數千年變化而長盛不衰，雖受西洋醫學之衝擊，又生存于現代科學技術突飛猛進之今日，但至今猶屹立于世界醫學之林，並日益受到各國人士歡迎，此不可不謂人類文明史上的一大奇跡。中醫藥學之發展，除因其獨特的理論體系和卓越之臨床療效外，亦賴于中醫文獻之流傳、保存、搜集、整理及刊行，才使其理論著述、臨床經驗、臨床資料、珍貴典籍得以存世，並不斷擴充完善。《中國醫學大成》之結集刊行，無疑大有益于振興中醫、發展中醫。

《中國醫學大成》雖因戰火蔓延，僅刊印一百三十六種而中止，且已刊行者，至今已散佚不全，但我社于前幾年重刊《中國醫學大成》之一百三十六種，結集成五十冊發行，震動了海內外，可見關心、支持、熱愛中醫藥事業者遍及亞洲，乃至世界。曹炳章先生未及刊行完成之《中國醫學大成》後續部分，被列入國家八五、九五重點出書項目，此亦可告慰于九泉之下的曹先生。

此次刊行之《中國醫學大成》續集，計一百一十八種，結集成四十九冊；大部分爲原刻本，部分爲木刻本。爲保持原書之風貌，一概未于原書上改字校注，遇錯訛、脫漏、缺字者，均于書後校注中另勘，以便爲讀者留出研究和斟酌之餘地。每種書後修有後記，介紹該書作者生平、簡歷、學術觀點，及是書版本概況、成書年代等，簡明扼要。

是書之校勘者和編輯，爲覓一原刻本，南下北上，不辭辛勞；爲一字之勘定，常殫精竭慮，如履薄冰。如此歷數載以成，奉獻于讀者，期能集有志者完成先輩未竟之事業，光大我中醫于世界。

醫學綱目卷之二十一

脾胃門

大法

內傷飲食

胎前傷食

百病皆生於痰

垣飲食傷論

陰陽應象論云。水穀之寒熱。感則害人六

腑。痺論云。陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。此乃混言之也。分之爲二。飲也。食也。飲者。水也。無形之氣也。因而大飲。則氣逆。形寒。飲冷。則傷肺。肺病。則爲喘咳。爲腫。爲水瀉。輕則當發汗。利小便。使上下分消。其濕解。醒湯。五苓散。生薑。半夏。枳實。白朮之類是也。如重而畜積。爲滿者。芫花。大戟。甘遂。牽牛之屬。利下之。此其治法也。食者。物也。有形之血也。如生氣通天論云。因而飽食。筋脈橫解。腸澼爲痔。又云。食傷太陰。厥陰。寸口大於人迎。兩倍三倍者。或嘔吐。或痞滿。或下痢。腸澼。當分寒熱輕重治之。輕則內消。重則除下。如傷寒物者。半夏。神麴。乾薑。三稜。廣茂。巴

豈之類主之。如傷熱物者。枳實白朮青皮陳皮麥蘖黃連
大黃之類主之。亦有宜吐者。陰陽應象論云。在上者因而
越之。瓜蒂散之屬主之。然而不可過劑。過則反傷腸胃。蓋
先因飲食自傷。又加以藥過。故腸胃復傷而氣不能化。
食愈難消矣。漸至羸困。故五常正大論云。大毒治病。十去
其六。小毒治病。十去其七。常毒治病。十去其八。無毒治病。
十去其九。不可過之。此聖人之深戒也。

輕者內消

丹傷食惡食者。胃中有物。導痰補脾。二陳湯加白朮。山查。

川芎。蒼朮。

傷飲

垣五苓散。治煩渴飲水過多。或水入即吐。心中淡淡。停濕
在內。小便不利。

肉桂

一兩

猪苓

茯苓

白朮

各一兩五錢

澤瀉

二兩五錢

右爲細末。每服二錢。熱湯調下。不拘時候。服訖多飲熱湯。取汗出愈。治傷冷飲者。煎五苓散送半夏枳朮丸。治傷飲不惡寒。胸中微覺忤悶。身重飲食不化者。或小便利不利者。五苓散去桂。依前斟酌服之。如瘵熱在裏。身發黃疸。食前濃煎茵陳湯。調服愈。

除濕散。治傷馬牛乳酪。及水水一切冷物。

半夏

湯泡一錢

車前子

炒五錢

甘草

炙二錢

紅花

二錢

茯苓

七錢

乾薑

三錢

澤瀉

兩半

右爲細末。每服三錢。食前白湯調下。

丹導飲丸。治水飲。

吳茱萸

三錢

白茯苓

兩一

黃連

五錢

蒼朮

兩一

獨活

七錢

右爲細末。神麴糊丸服。

傷酒

丹萊萸丸。治飲用六一散一料。加吳萊萸一兩。水丸服。

垣酒者大熱有毒。氣味俱陽。乃無形之物也。若傷之。止當發散。汗出則愈矣。其次莫如利小便。乃上下分消其濕。今之病酒者。往往服酒癥丸。大熱之藥下之。又有用牽牛。大黃下之者。是無形元氣受病。反下有形陰血。乖誤甚矣。酒怪大熱。已傷元氣。而復重瀉之。亦損腎水真陰。及有形血氣俱爲不足。如此則陰血愈虛。真水愈弱。陽毒之熱大旺。反增其陰火。是以元氣消燦。折人長命。不然則虛損之病成矣。酒疸下之。久則爲黑疸。慎不可犯。宜以葛花解酲湯主之。

海治酒病宜發汗。若利小便。炎醢不肯下行。故曰。火鬱則發之。以辛溫散之。是從其體性也。是知利小便則濕去熱不去。若動大便。尤爲踈陋。蓋大便者有形質之物。酒者無

形之水。從汗而發之。是為近理。濕熱俱去。故治以苦溫。發其火也。佐以苦寒。除其濕也。

垣葛花解醒湯。治飲酒太過。嘔吐痰逆。心神煩亂。胸膈痞塞。手足戰搖。飲食減少。小便利。

青皮三分

木香五分

橘紅五分

人參

猪苓

白茯苓各一錢

神麴炒

澤瀉

乾薑

白朮各二錢

白芷

葛花

砂仁各五錢

右為細末。每服三錢。白湯調下。但得微汗。則酒病去矣。

此蓋不得已而用之。豈可恃此酣飲成病。自損元氣。惟

病酒者宜之。

聖治酒醉不醒。用菰菜子二合。研細。井水調服。

丹烏梅丸。治酒毒。化癥消食。

烏梅斤

半夏

白礬兩八

生薑二兩

右搗爲細末。以新瓦兩片夾定。火焙三晝夜爲度。次入神麴麥芽。陳皮。青皮。蓬朮。枳殼。丁皮。大腹子各四兩。糊丸。每服四五十丸。薑湯下。

世烏梅丸治酒積神效。方見積塊門。

潔百杯丸治酒停胸中。膈氣痞滿。面色黃黑。將成癖疾。飲食不進。日漸羸瘦。如欲飲者。先服不醉。

生薑

一斤。去皮切片。以鹽橘紅兩

兩。淹一宿。焙乾。

廣茂

炮三

乾薑

兩三

益智仁

粒二十

丁香

枚五十

甘草

錢二

砂仁

粒三十

三稜

炮二錢

木香

茴香

炮各錢

白芷

粒三十

右爲末。煉蜜丸。每一兩作五丸。硃砂爲衣。生薑湯下。細嚼無時服。

傷食

丹解酒毒併熱毒。栢若。本草名枳枸。北人名曰爛瓜。杭州

貨賣名蜜屈。立春生秋熟。冬間經霜後取食。

垣枳木丸。治痞積。消食強胃。海藏云。本仲景枳木湯也。今

食不化。或臍肝軟弱者。易老改為丸。治老幼虛弱。飲

枳實去穰白木二兩

右為末。荷葉裹燒飯為丸。如桐子大。每服五十丸。白木

湯下。服白木者。本意不取其食速化。但久服令人胃氣

強實。不復傷也。

麴蘖枳木丸。治為人強食所致。心胸滿悶不快。

神麴炒麥蘖炒枳實炒白木二兩

右為末。荷葉燒飯為丸。每服五十丸。

木香枳木丸。破滯氣。消飲食。開胃進食。

木香枳實各一兩白木二兩

照前法爲丸服。

又方。開胃進食。

木香錢三

人參

乾薑

各一錢半

枳實

兩一

白朮

兩二

照前荷葉燒飯爲丸。食前白湯服三五十丸。忌飽食。

檳榔丸。消食破滯氣。

檳榔

錢三

木香

錢二

陳皮

錢五

甘草

錢一

人參

錢二

右爲末。蒸餅丸。每服二三十九。食前白湯下。

羅

木香檳榔丸。踈三焦。寬胸膈。破痰飲。快氣潤腸。

神麴

皂角

去皮酥炙

郁李仁

去皮各一兩

杏仁

去尖炒

木香

檳榔

青皮

白

枳殼

麴炒各一兩

右爲末。再用皂角四兩。水一碗。浸一日。搽膏入熟蜜少許。爲丸。桐子大。每服五十丸。淡薑湯下。

丹 保和丸。治食積。酒積。

山查肉 兩一

半夏 製薑

蘿蔔子 炒各

五錢 神麴 錢三

麥芽 錢炒三

黃連 兩炒半

陳皮 兩半

右爲末。酒糊丸服。或用神麴糊爲丸尤妙。

大安丸。脾經消導之劑。虛者宜斟酌用之。

山查 兩二

神麴 炒

半夏 製

茯苓 各一

陳皮 錢五

白朮 兩二

連翹 錢五

蘿蔔子 炒半

右爲末。神麴糊丸服。一方無白朮。

三黃枳木丸。治傷肉食濕麴辛辣厚味之物。填塞悶亂。胸

膈不快。

黃芩 兩二

黃連 炒酒

大黃 煨

神麴 炒

白朮

陳皮各一兩

右爲末。湯浸蒸餅爲丸。如菉荳大。每服五十丸。白湯下。

垣除濕益氣丸。治傷濕麪。心腹滿悶。肢體沉重。

枳實炒

白朮

黃芩生

神麴炒各一兩

紅花三分

蘿蔔子炒熟半兩

右爲末。荷葉飯丸。每服五十丸。白湯下。

上二黃丸。治傷熱食痞悶。兀兀欲吐。煩亂不安。

黃芩二兩

黃連酒洗一兩

升麻

柴胡各三錢

甘草二錢

枳實炒半兩

右爲末。湯浸蒸餅丸。每服六七十九。白湯下。

枳朮導滯丸。治傷濕熱之物。不得旋化而作痞滿。悶亂不

安。

黃芩

茯苓

白朮

黃連各三錢

澤瀉二錢

枳實炒

神麴炒各五錢

大黃煨二兩

右爲末。湯浸蒸餅爲丸。白湯下五七十丸。

白朮丸。治傷荳粉濕麴油膩之物。

白朮兩一

半夏製一兩

橘紅七錢

神麴炒

枳實炒各一兩

黃芩半兩

枯白礬三分

右爲末。湯浸蒸餅爲丸。量所傷多少。加減服之。如素食

多用乾薑。故以黃芩瀉之。

梅食狗肉不消。心下堅。或腹脹口乾。發熱妄語。煮廬根汁

飲之。

午食魚膾及生肉。在胸膈不化。必成癥瘕。搗馬鞭草汁飲

之。飲生薑水亦易消。

垣半夏枳朮丸。治因冷食內傷。一方有澤瀉一兩。有小便

淋故也。

半夏

薑製二兩

枳實

炒一兩

白朮

一兩

右爲末。荷葉飯爲丸。如傷食寒熱不調。每服加上二黃九十九。白湯下。

木香乾薑枳木丸。破滯氣。消寒飲食。

木香

錢三

乾薑

炮五錢

枳實

炒一兩

白朮

一兩半

右爲末。荷葉飯爲丸。食前白湯服四五十丸。

丁香爛飯丸。治食傷太陰。又治卒心胃痛。

丁香

錢一

丁香

錢三

甘草

炙一錢

甘松

淨

砂仁

錢五

益智仁

各三錢

三稜

炮一錢

廣茂

錢一

香附

錢五

木香

錢一

右爲末。湯浸蒸餅爲末。白湯服。或細嚼亦可。

丹 小胃丹

芫花

好醋拌勻。過一宿。於瓦器內。不住手攪。炒令黑。不令焦。

甘遂

濕麴裏水浸半

重者除傷飲