

夏秋季常見病中草藥便方



广西人民出版社

夏秋季常见病中草药便方
广西壮族自治区医药研究所编

广西人民出版社出版
李 龙 李 龙 发行
广西民族印刷厂印刷

1972年3月第1版 1972年3月第1次印刷
书号: 14113·4 定价: 0.04元

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

备战、备荒、为人民。

编 者 的 话

在伟大领袖毛主席无产阶级革命路线的指引下，我区各地开展了自采、自种、自制、自用中草药的群防群治运动，取得显著成绩。为了适应广大工农兵的迫切需要，我们将群众运动中涌现出来的，对于防治夏秋季常见病较好的便方编成小册子，供参考使用。

本书简明介绍几种夏秋季常见病的知识，选载中草药处方六十六条。处方的用药量，按市两为一斤计算；除注明者外均为成人量，如儿童服用，应酌情减量。药物未注明鲜用的，均为干品。

由于编者水平有限，实践经验不足，
不当之处，请批评指正。

广西壮族自治区医药研究所
一九七二年三月

目 录

痢 疾	1
急性胃肠炎	5
传染性肝炎	9
流行性乙型脑炎	14
钩端螺旋体病	17
中 暑	21

量少，呈脓血样大便。阿米巴痢疾腹痛较轻，多不发烧或仅低热，腹痛部位多在右下腹，排便较利，呈棕红色豆酱色样大便。

此外，还有一种中毒性痢疾，是本病的儿童较多。起病急，发烧达摄氏四十度

痢 疾

痢疾是夏秋季常见的一种肠道传染病。痢疾有两种：一种叫细菌性痢疾，是痢疾杆菌引起的；一种叫阿米巴痢疾，是阿米巴原虫引起的。这两种痢疾，都是吃了被痢疾杆菌或阿米巴原虫污染的食物、饮水而得病。细菌性痢疾发病急，多有发烧，腹痛和里急后重（肛门感觉坠痛，想屙又屙不出）较重，左下腹痛较利害，粪量少，呈脓血样大便。阿米巴痢疾发病较缓，多不发烧或仅低烧，腹痛和里急后重较轻，右下腹痛较利害，粪量多，恶臭，呈棕红色豆酱色样大便。

此外，还有一种中毒性痢疾。患本病的儿童较多。起病急，发烧达摄氏四十度

以上，呕吐、腹泻，有的甚至无明显腹痛及脓血样大便，但却出现高热、嗜睡、昏迷、抽筋、面色灰白，呼吸急促等中毒症状。

预防痢疾，要积极开展爱国卫生运动，搞好环境卫生，加强水源和粪便管理，灭蝇、防蝇；不喝生水，不吃不清洁食物；饭前便后要洗手。病人要及时隔离治疗。

细菌性痢疾

一方 鲜铁苋菜半斤（或干品二两）。

用法 水煎，每日分三次服；或晒干研粉，每次一钱，每日服三、四次。

二方 鲜大飞扬草一至二两。

用法 水煎，每日分三、四次服。

三方 鲜榄核莲三至五钱。

用法 水煎，每日一剂，分两次服。

四方 鲜雷公根半斤。
用法 捣烂取汁，冲蜜糖，一日分两次服。

五方 十大功劳（土黄连）一两。
用法 水煎，每日一剂，分三次服。

六方 鲜大叶桉树叶一两。
用法 水煎，每日分两、三次服。

急性细菌性痢疾

一方 鲜枫树叶一至二两。
用法 切碎，水煎，一日分两次服。

二方 鲜火炭母一至二两。
用法 切碎，水煎，一日分三、四次服。

三方 鲜凤尾草一至二两。
用法 水煎，加糖适量，一日分两、三次服。

四方 鲜大金花草叶五钱至一两。

用法 水煎，一日分两次服。

五方 鲜刺苋菜四两。

用法 水煎，一日分三次服。

六方 马齿苋半斤。

用法 浓煎，一日分三次服。

七方 绿茶（一般用市售花茶）三至五钱。

用法 加水三碗，煎至两碗，一日分四次服。

注：以上处方，急性肠炎也可以选用。

阿米巴痢疾

一方 鲜黑脚蕨、鲜半边旗、鲜铁扫把各一两。

用法 水煎，每日一剂，分两、三次服。

急性胃肠炎

急性胃肠炎是一种常见病。这种病多由于饮食不当，吃了过多生冷不易消化和刺激性食物；或吃了被细菌、细菌毒素所污染的，又未经煮透的食物引起的。发病前，病人多有暴饮暴食，或吃不洁和腐败食物病史。一个单位或一个家庭，进食同一种不洁食物的人，常常是同时发病。本病发病急，上吐下泻，腹痛，拉稀水样大便；严重的有发烧、脱水、抽筋、休克等现象。

预防急性胃肠炎，饮食部门和集体食堂要搞好环境卫生，消灭苍蝇、蟑螂和老鼠，加强饮食卫生管理。人人要养成良好的饮食卫生习惯，不暴饮暴食，不吃不洁

和腐败食物；隔餐饭菜要保管好，食前要加热煮透。

急性胃肠炎

一方 金古榄五分至一钱。

用法 取干品研细末，分两次温开水送服。

二方 古羊藤根二至三钱、火炭母一两。

用法 水煎，分两、三次服。

三方 鲜芭蕉花一至二两（或干品五钱）。

用法 水煎，每日一剂，分两、三次服。

四方 隔年红薯苗尖一至二两。

用法 水煎，分两次服。

五方 红花地桃花根一至二两。

用法 水煎，每日一剂，分两次服。

六方 大蒜头一个。

用法 生吃较好，或煨熟吃。

七方 茵陈、银花各三钱。

用法 加水两碗，煎取一碗，一日分两次服。

八方 柚子叶、茶叶各三两，甘草一两。

用法 焙干共研细末，每次五分至一钱，温开水送服，每日服三次。

九方 樟树根三两、古羊藤根五钱。

用法 水煎，每日一剂，分三次服。

十方 火炭母、爆牙郎各五钱至一两。

用法 水煎，每日一剂，分三次服。

十一方 十大功劳、凤尾草各五钱，桃金娘一两。

用法 水煎，每日一剂，分两次服。

十二方 金线风、红毛过江各一两，榄核莲五钱。

用法 共研细末，每次五分至一钱，温开水送服，每日服三、四次。

传染性肝炎

传染性肝炎是由肝炎病毒引起的急性传染病。肝炎病毒主要是通过消化道传染，如病人粪便污染了饮水、食物，或因接触了病人的用具、物品等而发病。本病起病有急有缓，开始象感冒，有些发烧，全身无力，胃口不好，怕吃油腻，恶心呕吐，上腹部不适或有轻微疼痛等。几天后，开始出现小便深黄如浓茶色，眼白先发黄，接着皮肤也发黄，这就是黄疸型传染性肝炎。但许多病人仅有上面讲到的症状而不出现黄疸，这就是无黄疸型传染性肝炎。此外，还有一种恶性型的黄疸型肝炎（急性黄色肝萎缩），这种病较少见。起病急，发高烧，黄疸迅速加深，有的伴有

鼻、齿、消化道等出血，或同时出现嗜睡、烦躁、昏迷、抽筋等症状。

预防传染性肝炎，要大力宣传卫生知识。人人爱清洁，个个讲卫生，饭前便后要洗手，注意饮食卫生和饮水消毒。病人要隔离治疗，粪便等排泄物，可用石灰撒在上面，加盖密闭。

急性传染性肝炎

一方 蓝花柴胡二两。

用法 加水三至四碗，煎取浓汁小半碗，冲蜜糖一两服，每日一剂。

二方 鲜赛葵（又叫黄花棉）三两。

用法 水煎，每日一剂，分两次服。

三方 稔子树根一两。

用法 水煎，每日服一剂。黄疸重者，加

田基黄、茵陈、白花蛇舌草各五钱，
鸡骨草一两；肝脾肿大者，加白花
蛇舌草、田基黄、半边莲各五钱，
白背叶根一两；肝区疼痛者，加筋
党、老鼠筋各一两，白背叶根一两半。

四方 田基黄一至二两。

用法 加水两碗，煎取一碗，分一、两次服。

五方 溪黄草、白糖各一两。

用法 水煎，每日一剂，分两次服，连服
二、三十天。

六方 鲜虎杖一两、鲜三叶人字草二两。

用法 水煎，每日一剂，分两次服，连服
十五天。

七方 豨莶草一两、黄枝子二至三钱、铁锈