

全国卫生专业技术资格考试丛书

北京大学护理学院 编写

护理学专业[执业护士含护士] 资格考试全真模拟及精解

2008年

- 紧扣全国卫生专业技术资格考试大纲
- 内容涵盖资格考试主要考点
- 专家解析，全真模拟

免费赠送20元
上网学习充值卡



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书

护理学专业 (执业护士含护士) 资格考试全真模拟及精解

北京大学护理学院 编写

护理学专业 (执业)

编辑：北京大学护理学院
出版发行：北京医科大学出版社（电话：010-83803380）
地址：（100083）北京市海淀区学院路38号 北京大学医学部院内
网址：<http://www.bumpress.com.cn>
E-mail: booksale@bjmu.edu.cn
印刷：莱芜市圣文印务有限责任公司
经销：新华书店
责任编辑：李立群 曹霞 曹霞 曹霞 曹霞 曹霞 曹霞 曹霞
文字编辑：张京燕 责任编辑：张京燕
开本：787mm×1092mm 1/16 印张：15.25 字数：384千字
版次：2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷
印数：1-13000册

北京大学医学出版社

定价：27.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (执业护士含护士) 资格考试全真模拟及精解/北京大学护理学院编写. —2 版. —北京: 北京大学医学出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-81116-274-5

I. 护… II. 北… III. 护理学—资格考核—解题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 203554 号

护理学专业 (执业护士含护士) 资格考试全真模拟及精解

编写: 北京大学护理学院

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经销: 新华书店

责任编辑: 许立药 蓉曹霞 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 15.25 字数: 384 千字

版次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1-15000 册

书号: ISBN 978-7-81116-274-5

定价: 27.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

为配合全国卫生专业技术护理学专业（执业护士含护士）资格考试，帮助考生在有限的时间内掌握考试要点，提高复习效率，北京大学护理学院组织相关学科专家，根据护理学专业（执业护士含护士）考试大纲，共同编写了这套考试辅导丛书。本套书共分三本：

《护理学专业（执业护士含护士）资格考试应试指导》

内容精练，重点突出，可以帮助考生在考前高效快速地掌握考试重点和难点。

《护理学专业（执业护士含护士）资格考试习题集》

题量大，内容丰富，涵盖资格考试主要考点，是考前强化训练的备用书。

《护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟及精解》

全方位模拟考试真题，题后由专家解析，是考前冲刺的最佳选择。

编 者

目 录

护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟试卷（一）	(1)
全真模拟试卷（一）答案及精解	(47)
护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟试卷（二）	(83)
全真模拟试卷（二）答案及精解	(129)
护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟试卷（三）	(161)
全真模拟试卷（三）答案及精解	(207)

护理学专业 (执业护士含护士) 资格考试全真模拟试卷 (一)

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 大量咯血是指
 - A. 一次咯血量小于 100ml
 - B. 一次咯血量大于 100ml
 - C. 一次咯血量大于 200ml
 - D. 一次咯血量大于 300ml
 - E. 24 小时内咯血量大于 300ml
2. 下列关于咳嗽的描述，不正确的是
 - A. 是呼吸系统疾病最常见的症状
 - B. 是一种保护性防御机制
 - C. 可排出呼吸道内的分泌物或异物
 - D. 剧烈咳嗽对机体无不良影响
 - E. 是一种反射动作
3. 下列血气分析结果符合 II 型呼衰的是
 - A. PaO_2 65mmHg, PaCO_2 35mmHg
 - B. PaO_2 55mmHg, PaCO_2 55mmHg
 - C. PaO_2 40mmHg, PaCO_2 35mmHg
 - D. PaO_2 70mmHg, PaCO_2 35mmHg
 - E. PaO_2 80mmHg, PaCO_2 35mmHg
4. 有关左心衰竭病理生理及临床表现的描述，下列哪项不正确
 - A. 病理生理改变为体循环淤血
 - B. 最早出现的是劳力性呼吸困难
 - C. 咳嗽、咳痰呈白色泡沫样
 - D. 如发生急性肺水肿则咳大量粉红色泡沫痰
 - E. 晚期出现端坐呼吸
5. 心肌梗死的发热一般不超过
 - A. 37.5°C
 - B. 38°C
 - C. 38.5°C
 - D. 39°C
 - E. 40°C
6. 按舒张压水平分级，重度高血压是指舒张压
 - A. $\geq 105\text{mmHg}$
 - B. $\geq 110\text{mmHg}$
 - C. $\geq 115\text{mmHg}$
 - D. $\geq 120\text{mmHg}$
 - E. $\geq 125\text{mmHg}$
7. 在心力衰竭治疗中可以同时减轻心脏前负荷和后负荷药物是
 - A. 氨苯蝶啶
 - B. 氢氯噻嗪
 - C. 呋塞米
 - D. 硝普钠
 - E. 硝酸甘油
8. 下列哪项不是胃肠黏膜的损害因素
 - A. 非甾体类药物
 - B. 吸烟
 - C. 过度精神紧张
 - D. 刺激性饮食
 - E. 前列腺素
9. 西咪替丁治疗消化性溃疡的机制是
 - A. 阻断 $\text{H}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶
 - B. 拮抗 H_2 受体
 - C. 中和胃酸
 - D. 加速胃排空
 - E. 延缓胃排空
10. 我国肝硬化的主要病因为
 - A. 酒精中毒
 - B. 胆汁淤积
 - C. 慢性充血性心力衰竭
 - D. 病毒性肝炎

- E. 血吸虫病
11. 肝硬化患者内分泌功能异常主要是
- 雄激素增多
 - 雌激素增多
 - 肾上腺皮质激素增多
 - 雌激素减少
 - 甲状腺激素减少
12. 肾炎性水肿发生的机制为
- 肾小球滤过率下降, 肾小管重吸收功能下降
 - 肾小球滤过率增加, 肾小管重吸收功能增加
 - 肾小球滤过率基本正常, 肾小管重吸收功能增加
 - 肾小球滤过率下降, 肾小管重吸收功能基本正常
 - 肾小球滤过率增加, 肾小管重吸收功能下降
13. 下列关于肾性高血压的描述不正确的是
- 肾性高血压绝大多数是容量依赖性
 - 限制水钠摄入可改善肾性高血压
 - 肾性高血压可加重肾功能损害
 - 肾性高血压具有原发性高血压的一般症状
 - 肾性高血压一般不会引起高血压脑病
14. 下列关于白血病的描述, 哪项不妥
- 白血病是一种病因不明的造血系统恶性疾病
 - 白血病细胞起源于造血干细胞
 - 骨髓象可见幼稚细胞, 外周血中不见幼稚细胞
 - 正常造血功能常受到抑制
 - 多数患者有肝、脾、淋巴结肿大
15. 同侧上肢和下肢出现运动功能减低或运动无力, 称为
- 单瘫
 - 截瘫
 - 偏瘫
 - 交叉性瘫痪
 - 局限性瘫痪
16. 下列属于深感觉的是
- 痛觉
 - 触觉
 - 热觉
 - 冷觉
 - 振动觉
17. 类风湿关节炎关节疼痛的特点为
- 固定于少数关节, 剧烈难忍
 - 呈游走性
 - 关节痛于活动后减轻
 - 多呈不对称性
 - 发作急骤
18. 类风湿关节炎关节病变的特点是
- 大关节受累
 - 多数不遗留关节畸形
 - 游走性疼痛
 - 主要为累及小关节的对称性多关节炎
 - 关节肿胀
19. 与静脉麻醉相比, 吸入麻醉的优点有
- 诱导迅速
 - 操作方便
 - 药物安全无爆炸性
 - 对呼吸道刺激小
 - 容易调节麻醉深度
20. 若将体内每日的代谢产物经肾脏排出, 至少需要的尿量为
- 100~200ml
 - 300~400ml
 - 500~600ml
 - 800~1000ml
 - 1000~1500ml
21. 细胞外液最主要的阳离子是
- K^+
 - Na^+
 - Mg^{2+}
 - H^+
 - Ca^{2+}
22. 各型休克的特点是
- 血压下降

- B. 中心静脉压下降
C. 脉压下降
D. 尿量减少
E. 微循环灌注不足
23. 全脊椎麻醉的主要危险是
A. 低血压
B. 剧烈头痛
C. 麻醉作用持久
D. 呼吸心跳骤停
E. 损伤脊髓导致截瘫
24. 以下属于治疗性手术的是
A. 淋巴结活检术
B. 阑尾切除术
C. 食管癌的胃造口术
D. 重睑手术
E. 直肠癌的结肠造口术
25. 面部“危险三角区”疖的危险性在于
A. 引起眼球后感染
B. 抗生素治疗无效
C. 可并发上颌窦感染
D. 容易形成痈
E. 引起海绵状静脉窦炎
26. 乳癌病人皮肤出现“酒窝征”的原因是
A. 粘连
B. 肿物压迫
C. 并发炎症
D. 癌肿侵及 Cooper 韧带
E. 癌细胞堵塞表浅淋巴管
27. 恶性肿瘤的 TNM 分期法中 N 表示
A. 预后情况
B. 淋巴结
C. 恶性程度
D. 原发肿瘤
E. 远处转移
28. 乳癌病变发展过程中最常见的转移部位是
A. 肺
B. 肝
C. 腋窝淋巴结
D. 锁骨下淋巴结
E. 胸骨旁淋巴结
29. 腹外疝的发病因素中最重要的是
A. 妊娠
B. 长期便秘
C. 慢性咳嗽
D. 排尿困难
E. 腹壁强度降低
30. 切口疝最主要的发病原因是
A. 营养不良
B. 切口感染
C. 放置引流物时间过长
D. 术后咳嗽、腹胀
E. 切口血肿
31. 继发性腹膜炎最常见的致病菌是
A. 溶血性链球菌
B. 肺炎链球菌
C. 变形杆菌
D. 大肠杆菌
E. 厌氧类杆菌
32. 急性腹膜炎病人发生休克的主要原因是
A. 发热
B. 大量呕吐
C. 剧烈疼痛
D. 血容量减少及毒素吸收
E. 细菌毒力强
33. 溃疡病最重要的发病因素是
A. 胃酸分泌过多
B. 幽门螺杆菌感染
C. 胃黏膜屏障损害
D. 遗传因素
E. 精神神经因素
34. 急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是
A. 阑尾开口小
B. 阑尾淋巴丰富
C. 阑尾蠕动慢而弱
D. 阑尾动脉为终末动脉
E. 阑尾系膜短
35. 关于肛门周围脓肿的叙述正确的是
A. 肛周疼痛不剧烈

- B. 是慢性化脓性感染
C. 常自行破溃, 形成低位肛瘘
D. 在直肠肛管周围脓肿中较少见
E. 多有高热、寒战、全身疲乏不适
36. 门静脉高压症形成后首先出现的病理改变是
A. 腹水
B. 脾肿大
C. 肝肿大
D. 交通支扩张
E. 呕血
37. 急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是
A. 胆道肿瘤
B. 胆管结石
C. 胆道蛔虫
D. 胆管扭转
E. 胆管狭窄
38. 胰腺癌好发的部位是
A. 胰体、尾部
B. 胰颈、体部
C. 全胰腺
D. 胰头、颈部
E. 胰尾部
39. 反常呼吸运动常见于
A. 多根多处肋骨骨折
B. 开放性气胸
C. 闭合性气胸
D. 张力性气胸
E. 血胸
40. 子宫肌瘤发病可能的相关因素是
A. 早婚早育, 性生活紊乱
B. 高血压, 糖尿病, 肥胖
C. 体内雌激素水平过高
D. 饮食因素
E. 环境因素
41. 原发性闭经是指
A. 年龄已满 14 岁, 第二性征已发育且无月经来潮者
B. 年龄已满 15 岁, 第二性征已发育且无月经来潮者
C. 年龄已满 16 岁, 第二性征已发育且无月经来潮者
D. 年龄已满 17 岁, 第二性征已发育且无月经来潮者
E. 年龄已满 18 岁, 第二性征已发育且无月经来潮者
42. 化疗前需要准确测量病人体重的理由是
A. 精确计算输入量
B. 精确计算药物剂量
C. 精确计算病人饮食需要量
D. 精确计算补液量
E. 确定化疗的疗效
43. 使用短效口服避孕药的妇女开始服第一片药的时间一般为
A. 月经来潮前第 5 天
B. 月经来潮的第 5 天
C. 月经来潮的第 10 天
D. 月经干净后第 5 天
E. 性生活前 8 小时
44. 正常足月妊娠时, 羊水量约为
A. 350ml
B. 500ml
C. 1000ml
D. 2000ml
E. 250ml
45. 临产观察先露下降程度的标志是
A. 耻骨弓
B. 骶尾关节
C. 坐骨结节水平
D. 坐骨棘水平
E. 骶骨岬
46. 新生儿期是指
A. 自出生脐带结扎到 1 周岁
B. 自受孕到出生脐带结扎时
C. 自出生脐带结扎开始到满 28 天
D. 自出生后第一天到生后第 30 天
E. 自出生后第一天到生后第 40 天
47. 20 公斤小儿体表面积为
A. 0.5m^2

- B. 0.6m^2
 C. 0.7m^2
 D. 0.8m^2
 E. 0.9m^2
48. 人体维生素 D 的主要来源是
 A. 乳类中的维生素 D
 B. 蛋黄中的维生素 D
 C. 猪肝中的维生素 D
 D. 植物中的维生素
 E. 皮肤中的 7-脱氢胆固醇
49. 婴儿手足搐搦症主要死亡原因是
 A. 无热惊厥
 B. 心力衰竭
 C. 喉痉挛
 D. 呼吸衰竭
 E. 手足搐搦
50. 急性肾小球肾炎前驱感染最常见病原体是
 A. 金黄色葡萄球菌
 B. 大肠杆菌
 C. 肺炎链球菌
 D. 柯萨奇病毒
 E. A 组 β -溶血性链球菌
51. 新生儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是
 A. 脑膜炎双球菌
 B. 肺炎链球菌
 C. 流感嗜血杆菌
 D. 大肠杆菌
 E. 乙型溶血性链球菌
52. 先天性心脏病最常见的类型是
 A. 房间隔缺损
 B. 室间隔缺损
 C. 动脉导管未闭
 D. 法洛四联症
 E. 肺动脉狭窄
53. 婴儿营养不良的主要原因是
 A. 喂养不当
 B. 患传染病
 C. 双胎早产
 D. 生长发育迅速
 E. 消化系统结构或功能异常
54. 秋季腹泻的病原体是
 A. 柯萨奇病毒
 B. 轮状病毒
 C. 白色念珠菌
 D. 致病性大肠杆菌
 E. 金黄色葡萄球菌
55. 新生儿易发生黄疸是由于
 A. 肝功能不成熟
 B. 体温调节功能差
 C. 免疫功能不成熟
 D. 红细胞寿命比成人长
 E. 肠肝循环减少
56. 惊厥持续状态是指
 A. 惊厥持续 >10 分钟
 B. 惊厥持续 >20 分钟
 C. 惊厥持续 >30 分钟
 D. 惊厥持续 >40 分钟
 E. 惊厥持续 >60 分钟
57. 容易造成营养性缺铁性贫血的原因是
 A. 足月儿 4 个月开始添加富含铁剂的食物
 B. 早产儿 2 个月开始添加富含铁剂的食物
 C. 长期单纯母乳喂养
 D. 过期产
 E. 便秘
58. 患者女性, 45 岁, 有哮喘史 5 年, 近来每当给爱犬洗澡后出现咳嗽、咳痰伴喘息, 护士为其宣教时应指出其最可能的过敏原是
 A. 花粉
 B. 尘螨
 C. 动物的毛屑
 D. 病毒感染
 E. 精神因素
59. 患者, 男, 67 岁, 冠心病心绞痛 7 年, 平日心绞痛发作时舌下含硝酸甘油 2~5 分钟缓解, 今晨饱餐后, 突感心前区剧烈疼痛, 服用硝酸甘油半小时未缓解,

急诊入院。心电图检查发现 $V_1 \sim V_5$ 导联 ST 段弓背上抬, 血压 85/55mmHg, 心率 98 次/分, 律齐。入监护室观察治疗, 经用药后疼痛缓解。2 小时后心电图监测示血压 80/50mmHg, 心率 120 次/分, 患者烦躁不安, 皮肤湿冷, 此时责任护士认为病人病情变化是

- A. 心力衰竭
- B. 心脏破裂
- C. 心源性休克
- D. 心律失常
- E. 脑出血

60. 患者, 男性, 34 岁, 因腹痛 1 小时急诊。1 小时前无明显诱因突然发作剧烈腹痛, 呈绞痛, 向下腹、大腿内侧及会阴部放射, 伴恶心、呕吐, 面色苍白, 大汗淋漓。尿常规示大量红细胞。该患者表现符合下列何种疾病

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎急性发作
- D. 尿路感染
- E. 输尿管结石

61. 男性, 34 岁, 计算机工程师, 近期感觉久坐后下肢沉重酸胀, 容易疲劳。护士指导其在工作期间定时站立, 活动下肢, 以促进下肢血液循环, 其原理是利用

- A. 小腿肌泵收缩功能
- B. 胸腔吸气期负压
- C. 心脏舒张期负压
- D. 静脉瓣膜向心单向开放
- E. 地心对血柱的吸引力

62. 男性, 45 岁, 左手被砸伤 2 小时, 左手肿胀, 皮肤青紫, 压痛明显, X 线检查未见骨折, 其受伤类型为

- A. 裂伤
- B. 擦伤
- C. 挤压伤
- D. 扭伤
- E. 挫伤

E. 挫伤

63. 某健康妇女, 28 岁, 已婚, 未孕, 其子宫峡部长度正常情况下约为

- A. 0.5cm
- B. 1.0cm
- C. 1.5cm
- D. 2.0cm
- E. 2.5cm

64. 某妇女, 50 岁, 6 个月前开始月经紊乱, 并且出现潮热潮红, 易激动, 推测她目前处在生命中的

- A. 青春期
- B. 生育期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

二、以下提供若干案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

(65~67 题共用题干)

患者女性, 48 岁, 慢性肾小球肾炎 8 年, 伴高血压 3 年, 近一个月来食欲下降, 精神萎靡, 疲乏, 且常出现鼻衄, 1 天前发现大便颜色黑亮似柏油样, 门诊检查, 肾功能检查示血肌酐 $790 \mu\text{mol/L}$, 血尿素氮 8.8 mmol/L 。

65. 该患者最可能的诊断是
- A. 肾病综合征
 - B. 肾功能不全代偿期
 - C. 肾功能衰竭期
 - D. 肾功能不全尿毒症期
 - E. 氮质血症期
66. 该患者常出现鼻衄, 且此次出现大便颜色改变最可能的原因是
- A. 进食了某些食物如血肠所致

- B. 血小板容易被破坏而导致消化道出血
C. 红细胞寿命缩短
D. 铁、叶酸缺乏
E. 某些代谢产物抑制骨髓造血功能
67. 下列治疗中可替代失去功能的肾脏排泄各种毒物的疗法是
- A. 治疗原发病
B. 饮食治疗
C. 必需氨基酸的应用
D. 利尿治疗
E. 透析治疗

(68~69 题共用题干)

某健康妇女, 进行查体, 其骨盆形态各径线均属于正常人的平均值。

68. 其骨盆入口平面前后径值为
- A. 11cm
B. 12cm
C. 13cm
D. 14cm
E. 15cm
69. 其中骨盆平面前后径为
- A. 11cm
B. 11.5cm
C. 12cm
D. 12.5cm
E. 13cm

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择

(70~73 题共用备选答案)

- A. 脓臭痰
B. 草绿色
C. 红棕色胶冻状

- D. 灰褐色
E. 黄色

70. 肺炎杆菌感染时病人的痰液常为
71. 肺脓肿病人的痰液常为
72. 金黄色葡萄球菌病人的痰液常为
73. 绿脓杆菌感染时病人的痰液常为

(74~75 题共用备选答案)

- A. 抑制血管紧张素 II 生成
B. 选择性扩张外周血管
C. 使心肌收缩力降低, 外周血管扩张
D. 抑制钠、水重吸收, 减少血容量, 降低心排血量
E. 减慢心率、降低心排血量, 抑制肾素释放

74. 钙离子阻滞剂降压的作用原理是
75. ACEI 降压的作用原理是

(76~77 题共用备选答案)

- A. 限制钠盐摄入
B. 限制蛋白质摄入
C. 低糖低脂饮食
D. 多吃肉汤、鸡汤
E. 禁食

76. 肝性脑病应
77. 肝硬化腹水应

(78~79 题共用备选答案)

- A. 100ml
B. 400ml
C. 750ml
D. 1000ml
E. 2000ml

78. 无尿是指 24 小时尿量少于
79. 夜尿增多是指夜尿持续大于

(80~81 题共用备选答案)

- A. 代谢性酸中毒
B. 代谢性碱中毒
C. 呼吸性酸中毒

D. 呼吸性碱中毒

E. 高钾血症

80. 手术后并发肺炎的病人可发生

81. 胰痿病人可发生

(82~83 题共用备选答案)

A. 中心静脉压低, 血压低

B. 中心静脉压高, 血压低

C. 中心静脉压高, 血压正常

D. 中心静脉压低, 血压正常

E. 中心静脉压正常, 血压低

82. 提示血容量相对不足

83. 说明血管过度收缩

(84~85 题共用备选答案)

A. 腹壁浅动脉外侧, 腹股沟韧带上方

B. 腹壁浅动脉内侧, 腹股沟韧带上方

C. 陷窝韧带外侧, 腹股沟韧带下方

D. 腹壁下动脉外侧, 腹股沟韧带上方

E. 腹壁下动脉内侧, 腹股沟韧带上方

84. 腹股沟斜疝的疝囊颈位于

85. 股疝的疝囊颈位于

(86~89 题共用备选答案)

A. 月经期

B. 增生期

C. 分泌期

D. 月经前期

E. 月经周期

86. 两次月经第一天的间隔时间为

87. 月经的第 1~4 天, 称为

88. 月经的第 5~14 天, 称为

89. 月经的第 15~24 天, 称为

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择所有正确答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

90. 缩唇呼气的作用是

A. 加强呼吸运动

B. 减少呼吸困难

C. 提高支气管内压

D. 延缓小气道的陷闭

E. 减少胸痛

91. 与蛛网膜下腔麻醉相比, 硬膜外麻醉的特点是

A. 并发症多

B. 更适用于上腹部手术

C. 更适用于长时间的手术

D. 更容易引起低压性头疼

E. 应严格掌握进针深度防止发生全脊麻醉

92. 门静脉高压症引起腹水的原因是

A. 门静脉系的毛细血管床滤过压增加

B. 血浆白蛋白降低

C. 肝内淋巴液容量增加, 回流不畅

D. 醛固酮和抗利尿激素增加

E. 醛固酮减少

93. 急性胰腺炎发病原因包括

A. 胆总管梗阻

B. 酒精中毒

C. 暴饮暴食

D. 低钙血症

E. 病毒感染

94. 引起下肢静脉曲张的主要原因有

A. 静脉壁软弱

B. 浅静脉内压力增高

C. 静脉瓣膜缺陷

D. 交通支不畅

E. 腿部受寒

95. 跌倒时手掌撑地可能造成的损伤有

A. 锁骨骨折

B. 桡骨髁上骨折

C. 肘关节后脱位

D. Colles 骨折

E. Smith 骨折

96. 可能导致骨筋膜室综合征的原因有

A. 石膏包扎过紧

B. 未进行患肢功能锻炼

- C. 石膏固定不确实
D. 患肢进行性肿胀
E. 骨折未达到解剖复位
97. 导致女性不孕的常见因素有
- A. 神经衰弱
B. 肾上腺功能异常
C. 甲状腺功能亢进
D. 宫颈狭窄
E. 月经周期延长
98. 母乳的特点是
- A. 矿物质较多
B. 消化酶较多
C. 乙型乳糖较多
D. 乳清蛋白较多
99. 造成营养性缺铁性贫血的原因包括
- A. 体内铁储备不足
B. 铁摄入不足
C. 铁需要量增加
D. 铁吸收障碍
E. 铁消耗增加
100. 法洛四联症由以下几种畸形组成
- A. 肺动脉狭窄
B. 室间隔缺损
C. 房间隔缺损
D. 主动脉骑跨
E. 右心室肥厚

- E. 不饱和脂肪酸较多
99. 造成营养性缺铁性贫血的原因包括
- A. 体内铁储备不足
B. 铁摄入不足
C. 铁需要量增加
D. 铁吸收障碍
E. 铁消耗增加
100. 法洛四联症由以下几种畸形组成
- A. 肺动脉狭窄
B. 室间隔缺损
C. 房间隔缺损
D. 主动脉骑跨
E. 右心室肥厚

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 扁桃体超过咽腭弓，但不超过咽后壁中线，应为
 - A. 扁桃体高度肿大
 - B. 扁桃体 I 度肿大
 - C. 扁桃体 II 度肿大
 - D. 扁桃体 III 度肿大
 - E. 扁桃体中度肿大
2. 左心室增大时，其心尖搏动的位置
 - A. 向左移位
 - B. 向右移位
 - C. 向左下移位
 - D. 向左上移位
 - E. 向下移位
3. 镜下血尿是指离心沉淀的尿沉渣中，每高倍视野的红细胞数超过
 - A. 1 个
 - B. 2 个
 - C. 3 个
 - D. 4 个
 - E. 5 个
4. 心电图 V₂ 导联检测电极放置的位置是
 - A. 胸骨右缘第 2 肋间
 - B. 胸骨右缘第 4 肋间
 - C. 胸骨左缘第 2 肋间
 - D. 胸骨左缘第 4 肋间
 - E. 胸骨左缘第 5 肋间
5. 支气管扩张及肺脓肿病人痰液的典型表现是
 - A. 只有少量黏液
 - B. 草绿色
 - C. 红棕色胶冻状
 - D. 灰黑色
 - E. 静置后痰液分层现象
6. 病人大咯血时最危险的并发症是
 - A. 出血性休克

- B. 贫血
 - C. 肺不张
 - D. 肺部感染
 - E. 窒息
7. 支气管扩张病人咳嗽、咳痰加重的时间是
 - A. 早晨起床时和晚上卧床时
 - B. 白天
 - C. 傍晚
 - D. 深夜
 - E. 进餐时
 8. 哮喘的典型症状是
 - A. 反复发作的吸气性呼吸困难
 - B. 反复发作的呼气性呼吸困难
 - C. 反复发作的混合性呼吸困难
 - D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰、呼吸困难
 - E. 一过性的混合性呼吸困难
 9. 预防外源性哮喘发作最关键的措施是
 - A. 监测病情
 - B. 避免接触过敏原
 - C. 避免感染
 - D. 应用支气管扩张剂
 - E. 坚持服药
 10. 下列药物中属于保钾利尿剂的是
 - A. 呋塞米
 - B. 依他尼酸 (利尿酸)
 - C. 氨苯蝶啶
 - D. 氢氯噻嗪
 - E. 环戊甲噻嗪
 11. 急性心肌梗死出现下列哪种心律失常时最需要紧急处理
 - A. 窦性心动过缓
 - B. II 度 I 型房室传导阻滞
 - C. 房性期前收缩
 - D. 心房颤动
 - E. 多源性室性早搏
 12. 急性心肌梗死患者血清心肌酶测定中出现最早、恢复最早的酶是
 - A. 肌酸磷酸激酶
 - B. 乳酸脱氢酶

- C. 缓激肽酶
D. 细胞色素氧化酶
E. 门冬氨酸转移酶
13. X线钡餐检查胃溃疡的主要诊断依据是
A. 龛影
B. 变形
C. 僵硬
D. 痉挛
E. 缺损
14. 肝硬化腹水患者的腹水性质是
A. 渗出液
B. 漏出液
C. 血性液
D. 脓性液
E. 乳糜液
15. 镜下血尿是指新鲜尿离心沉渣后每高倍镜视野中见到的红细胞为
A. 0~3个
B. 超过3个
C. 超过5个
D. 超过8个
E. 超过10个
16. 关于缺铁性贫血病人的有关检查,下列不妥的是
A. 血象见小细胞、低色素性贫血
B. 血象见白细胞、血小板均减少
C. 骨髓细胞外含铁血黄素消失
D. 骨髓幼红细胞内缺乏可染铁
E. 血清铁蛋白降低
17. 确诊急性胰腺炎,血清淀粉酶及尿淀粉酶的数值应分别超过
A. 256U 200U
B. 500U 200U
C. 320U 256U
D. 256U 500U
E. 500U 256U
18. 下列辅助检查中最有助于系统性红斑狼疮诊断的是
A. 肌电图
B. 血沉
C. 肾图
D. 抗Sm抗体
E. 关节X线片
19. 高钾血症病人出现心律失常时,首先应给予
A. 5%NaHCO₃溶液
B. 5%葡萄糖加胰岛素
C. 10%葡萄糖酸钙
D. 生理盐水
E. 透析疗法
20. 在无菌条件下配制的要素饮食冷藏的有效期时间为
A. 2小时
B. 4小时
C. 8小时
D. 12小时
E. 24小时
21. 病人,男性,42岁,因胃十二指肠溃疡出血行胃大部切除术,术后早期最适当的营养液输注途径是
A. 鼻胃管
B. 胃造瘘
C. 鼻肠管
D. 空肠造瘘
E. 周围静脉营养支持
22. 严重高渗性脱水病人首选的补液液体是
A. 生理盐水
B. 平衡盐溶液
C. 5%葡萄糖溶液
D. 5%NaHCO₃溶液
E. 5%葡萄糖盐水
23. 休克病人在补充足够液体后,血压偏低,中心静脉压正常,应给予
A. 强心药
B. 利尿剂
C. 血管扩张药
D. 血管收缩药
E. 大量皮质激素
24. 急性肾衰竭少尿期病人的饮食要求为
A. 高蛋白、高糖、多维生素

- B. 高脂、高糖、高蛋白
C. 低蛋白、高脂、低维生素
D. 低蛋白、低糖、多维生素
E. 低蛋白、高糖、多维生素
25. 麻醉前禁食水最主要的目的是
A. 便于术中操作
B. 防止术后便秘
C. 防止术后腹胀
D. 防止术后尿潴留
E. 预防术中呕吐误吸
26. 为了预防腰麻后头痛, 应采取的措施是
A. 保持环境安静
B. 减少术中输液量
C. 垫枕平卧 4 小时
D. 去枕平卧 6 小时
E. 做好麻醉前心理准备
27. 为心跳呼吸骤停的病人行心肺复苏时首先应
A. 心前区叩击
B. 心脏按压
C. 口对口人工呼吸
D. 清理呼吸道
E. 心内注射
28. 成人胸外心脏按压时, 应使胸骨下陷
A. 1~2cm
B. 2~3cm
C. 3~4cm
D. 5~6cm
E. 大于 6cm
29. 确诊菌血症的依据是
A. 起病急骤寒战高热
B. 全身中毒症状
C. 白细胞计数增加
D. 血细菌培养阳性
E. 有原发感染病灶
30. 甲沟炎若不及时处理可发生
A. 脓性指头炎
B. 慢性指骨骨髓炎
C. 急性化脓性腱鞘炎
D. 化脓性滑囊炎
E. 鱼际间隙脓肿
31. 需要床边隔离的软组织化脓性感染是
A. 丹毒
B. 疖
C. 疔
D. 急性蜂窝组织炎
E. 急性淋巴管炎
32. 破伤风最可靠的预防方法是
A. 注射破伤风抗毒素
B. 尽早处理伤口
C. 使用破伤风免疫球蛋白
D. 应用抗生素
E. 注射破伤风类毒素
33. 可作为肿瘤定性诊断的检查是
A. CT
B. B 超
C. X 线造影
D. MRI
E. 病理检查
34. 确诊胃癌最可靠的方法是
A. 胃液分析
B. 纤维胃镜
C. X 线钡餐
D. 大便隐血试验
E. 胃液脱落细胞检查
35. 急性胰腺炎的治疗过程中应禁用
A. 抗胆碱能药物
B. 吗啡
C. 生长抑素
D. 钙剂
E. 胃肠减压
36. 适用于食管癌普查的检查方法是
A. 钡餐 X 线检查
B. CT
C. 食管镜
D. 脱落细胞学检查
E. MRI
37. 葡萄胎患者刮宫前, 应准备好静脉通路并配血, 其理由是
A. 防止刮宫时大出血造成休克