

傷寒選錄

四

新安祁門朴野汪機立藁

同邑石野陳楠編藉

同邑和溪程鑄校證

煩躁第二十二 附火逆

口燥煩

成氏曰煩為煩擾之煩躁為憤躁之躁俗謂焦躁是也合而
言之煩躁為熱也折而分之煩陽也為熱之輕躁陰也為
熱之甚先煩而漸至躁者謂之煩躁先躁而後復煩者謂
之煩躁有不煩而躁者此為陰盛格陽也雖大躁欲于泥
中此躁欲于泥
不得入口者是也
活人用霹靂散
出而煩躁大有邪氣裏而煩躁者病人不大便六七日
就腹痛煩躁發作有

此有得
有因火劫而煩躁者太陽病所以火熏之不得汗

日反躁火熯其背脊下有陽虛而躁煩者陽微發汗躁

出大熱入胃躁煩者也之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表

証脉沉微身無大熱有陰盛而煩躁者少陰病吐利手足厥冷

不去煩躁者也苓四逆湯是也有陰盛而煩躁者煩躁欲死者吳茱萸湯

是此皆症之常也又有諸不治症詳附于後不可不知如

天道和暖病輕者以十味芍蘇散加麻黃石膏汗之或大

神通解散亦可

太陽煩躁治例

汗太陽中風脉浮緊發熱惡寒身痛無汗煩躁者大青龍湯

三十脉微汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此
為逆也或用真武湯一百

三陽併病太陽初得病時發其汗不因轉屬陽明續微汗出不惡寒若太陽症不罷者不可下可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之若發汗不徹其人躁煩不知痛處更發汗則愈或用葛根湯三十

太陽病大發汗後胃中乾煩燥不得眠欲飲者少與之若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散七十

傷寒一日太陽受之脉靜者爲不傳頗欲吐若躁煩脉數急者傳也

註曰太陽主表一日則太陽受邪至二日當傳陽明若脉氣微而不傳陽明胃經受邪則喜吐寒邪傳裏者則變熱如頗欲吐若煩躁脉急數者爲太陽寒邪變其熱

傳於陽明也。○或云麻黃湯二十表罷小柴胡湯二十

白虎湯六十

因下之心下痞與瀉心湯痞不解渴而口躁煩小便不利者

五苓散一百

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯十七

註曰先火爲逆復以下除之裏氣因虛又加燒針裏虛而爲火熱所損故生煩躁與桂枝甘草龍骨牡蠣湯以散火邪

太陽病以火熏之不得汗其人必躁耳到太陽不解必清血

名火逆或用栝皮湯八五犀角地黃湯五十

下太陽病脈浮動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未

小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯四十

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結于脇下邪正分

正往來寒熱休作有時藏府相連其痛必下邪交痛下故

嘔小柴胡湯四十

本太陽病不解轉入少陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒

熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯四十若吐下發汗溫

針譟語柴胡証罷此為壞病知犯何逆以法治之

傷寒五六日已汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不

嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為欲解也柴胡桂枝乾

薑湯七主之

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譟語一身盡重不可

轉側者柴胡加龍骨牡蛎湯四十主之

註曰傷寒八九日邪氣以成熱而復傳陽經之時下之
虛其裏而熱不除胸滿而煩者陽熱客于胸中也驚者
心惡熱而神不守也小便不利者裏虛津液不行也譫
語者胃熱也一身盡重不可轉側者陽氣內行于裏不
營于表也與柴胡湯以除胸滿而煩加龍骨牡蛎鉛丹
以鎮驚加茯苓以行津液利小便加大黃以
通下

語加桂枝以行陽氣而解身重錯雜之邪

痞硬乾噎食臭脇下有水氣腹

中雷鳴下利者生薑瀉心湯

二百四

溫傷寒吐下後發汗震煩脉甚微八九日心下痞硬脇痛氣
上冲咽喉眩冒經脉動惕者久則成痿或用直武湯一百
桂枝白朮茯苓甘草湯三十

隨病救逆太陽病過經十餘日心下溫_上欲吐而胸中痛大
便反溇腹微滿鬱_上微煩柴胡湯先此時自極吐下者與
調胃承氣湯若不愈者不可與但欲嘔胸中痛微溲者此
非柴胡証以嘔故知極吐下也

註曰心下溫溫欲吐鬱_上微煩胸中痛當責邪執客于
胸中大便反溇腹微滿則邪熱已下于胃也日數須多
若不經吐下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除上
中二焦之邪若會吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃

為實非柴胡所能去與調胃承氣湯下胃熱以嘔知胃氣先曾傷動也○吳茱萸半夏瀉心湯

太陽病十日已去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯四十脉但浮者與麻黃湯二十

註曰十日已去向解之時也脉浮細而嗜卧者表邪已罷也病須已和解之若脉但浮而不細者則邪氣但在表也與麻黃湯發散之

太陽病下後促胸滿者桂枝去芍藥湯若微惡寒者去芍藥方中加附子湯

太陽病下之脉促不結胸者為欲解脉浮必結胸脉繁必咽痛脉弦必兩脇拘急脉細數頭痛未止脉沉緊欲嘔脉

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時此有燥屎大承

氣湯

五十
七

少陰煩燥治例

溫少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯

五百

註曰吐利手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者陽氣內
爭與吳茱萸湯助陽散寒

不治少陰病吐利煩躁四逆者死

註曰吐利者寒甚於裏四逆者寒甚於表煩躁而陽氣
欲絕是知死矣

少陰病四逆惡寒身踈眊不至不煩而躁者死

少陰病脉微沉細但欲卧汗出不煩欲吐自利復煩躁不得寐者死

厥陰煩燥治例

和傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者熱除也欲得食其病爲愈若厥而嘔胸脇煩滿者必便血黃芩芍藥湯五十小柴胡湯四十抵當湯五十

不治傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者爲藏結死蛇厥錐厥而煩吐蛇已則靜非若藏厥躁無暫安時也○藏厥活人灸關元穴

傷寒六七日脉微手足厥冷煩燥灸厥陰厥不還者死

註曰傷寒六七日則正氣當復邪氣當罷脉浮身熱爲

欲解若反脉微而厥則陰勝陽也煩躁者陽虛而爭也
灸厥陰以復其陽厥不還而陽氣已絕不能復正而死
傷寒發熱下利厥逆躁不得卧者死

傷寒得病無熱但狂言煩躁不安者五苓散一百七十一二錢服之
當與新井水一升許則以指刺喉去之隨手愈

附餘無求子云昔人患傷寒身冷脉微手足厥而躁甚醫以
艾湯調硫黃末四錢服之即時安卧良久汗出而愈

活人云陰盛發躁名陰躁四逆湯九十一又曰傷寒六七

日陰盛格陽身冷脉細煩躁不飲水者霽露散一百二十六

煩躁惡風自汗不得卧防風白朮牡蠣湯小建中湯五十五

又曰少陰躁不得眠黃連雞子湯六十

傷寒論四卷
六
懊農第二十三

成氏曰心中鬱鬱然不舒憤憤然無柰比之煩悶而甚者懊
懷也俗謂之鶻突由下後表之陽邪乘虛內陷結伏于心
胸之間故如是也其治之法或吐之或下之苟或當下反
吐療熱以寒則更証而出矣可不慎歟

太陽懊懷治例

吐發汗吐下後虛煩不眠反復顛倒心中懊懷枝子豉湯此
太陽病脉浮動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解
也動數變胃中空胃客氣動膈短氣躁煩心中懊懷枝子
栝皮湯

八十

陽明懊農例

吐陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能

食但頭汗出者枝子豉湯

七十

陽明病無汗小便不利心中懊憹身必發黃或用茵陳湯

七枝子栢皮湯

十八

註曰陽明無汗而小便不利者熱蘊於內而不得越心中懊憹者熱氣鬱蒸欲發于外而爲黃也

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反

惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上

胎者枝子豉湯

七十

下陽明病下之心中懊憹而煩有燥屎者大承氣湯

五十

舌胎第二十四 附濕家舌胎

成氏曰心屬火開竅于舌本紅而澤舌胎者舌上有膜白滑如胎又有燥澁黃黑之異者熱氣有淺深也邪熱在表則舌無胎在表裏之間則舌生白胎而滑濕家舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒邪初傳入裏也陽明膈下硬滿舌上白胎者與小柴胡湯邪在半表半裏也太陽病若下之舌上胎者枝子豉湯邪客于胸中也藏結宜若可下舌上胎滑者不可下猶帶表邪故也及邪傳裏則舌胎不滑而澁經用白虎湯是也若熱聚于胃則舌爲黃要略曰舌黃未下者下之黃自去若舌黑者熱之極也吳氏曰有陰極水反刑火者亦生黑胎也但胎滑而不躁不澁不渴而脉沉微足冷者急宜四逆湯溫之針經曰熱病口乾舌黑者

死則相刑故也寒病則無舌胎之証

太陽舌胎例

和解藏結無陽症不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可
攻枝子乾薑湯三小陷胸湯九十

難治藏結者如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小
細沉緊舌上白胎滑者難治小陷胸湯九

陽明舌胎例

吐陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒
反惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心
中懊憹舌上胎者枝子豉湯九十

和陽明病脇下硬滿不大便而嘔舌上白胎小柴胡湯

附濕家但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦胸滿

舌上如胎以丹田有熱胸中有寒小陷胸湯執十

附餘陶氏云傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑用井水浸青布

片洗淨後用生薑片子時時浸水割之其胎自退凡見

黑胎如芒刺者必死此熱毒入深十有九死此腎水剋

心火也○吳氏云舌吐不收用冰片少許摻舌上即收

衄血第二十五

成氏曰衄者鼻中出血也雜病衄血在裏傷寒衄血在表病

源曰心主血肝藏血肺主氣開竅于鼻血得熱隨氣上從

鼻出爲衄是襍病衄者責其裏熱也經曰傷寒脉浮緊不

發汗因致衄者麻黃湯傷寒不大便六七日頭痛有熱者