

傷

寒

選

錄

五

新刊傷寒選錄卷之五

新安祁邑朴里汪機立藁

同邑石野陳楠編集

同邑和溪程鑄校正

曾孫邦聘校刻

畜血四十三

成氏曰血蓄下焦而瘀者畜血也大抵傷寒先看面目次觀口舌次觀心下至少腹以手揣之若少腹硬滿若小便不利者是津液蓄結可利小便若小便自利者是畜血症可下瘀血其陽明病有畜血而喜忘者症之甚也宜抵當湯太陽有熱結膀胱如狂者証之輕也宜桃仁承氣湯經云

病人無表裏証發熱七八日脉雖浮數可下之假令已下
脉數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者此有瘀
血抵當湯主之若脉數不解而下不正必協熱而便膿血
也此証當不大便六七日之際又無喜忘如狂并少腹硬
滿之候与承氣下者多矣何以知為畜血蓋脉浮而數浮
則熱傷氣數則熱傷血因下之後浮數俱去則已若下後
數去而脉俱浮者則榮血間熱去并于衛氣間熱心中則
飢也邪熱不殺穀則有潮熱發渴之証也及下之後渴去
而數不解者則衛氣間熱去合于榮血間之熱七氣合併
逼血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血
得以去世必便膿血也若不大便六七日則血不得出世

畜在下焦為瘀血須抵當湯下之此實症之奇異治法之玄微也

太陽蓄血倒下 太陽病六七日表症仍在脉微而沉其人發狂者熱在下焦少腹當硬滿小便自利者下血乃愈抵當湯五

太陽病身黃脉沉結小腹硬小便不利者為無血小便自利其人如狂血症也抵當湯五

太陽病不解熱怱膀胱其人如狂血自下者愈解不解當先解外外解但少腹急結者桃仁承氣湯六

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

陽明蓄血例

陽明症其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯

註曰內經云血并于下乱而喜忘此下本有久瘀血所以喜忘也津液少大便鞭以畜血在內屎雖鞭大便反易其色黑也宜抵當湯以下瘀血

病人無表裏症發熱七八日雖脉浮數可下之已下脉數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血抵當湯

五九

附餘吳氏曰凡畜血者瘀血留結于內蓋傷寒病在太陽當汗不汗則瘀血在裏必血結也大抵看傷病人心下兩

脇少腹但有硬滿處以手按則痛者便當問其小便何如若小便不利乃水與氣也若小便自利者為有血也保命集云又分三焦畜血上焦胸中手不可近犀角地黄湯中腕手不可近者桃仁承氣湯臍下少腹不可近者抵當湯

陶氏曰以手按之小腹若痛而小水自利大便黑無或身黃譫妄燥渴脉沉實者為蓄血桃仁承氣下盡黑物則愈若按之小腹脹滿不硬痛小水不利則溺澀也五苓散加咸利之不可大利恐耗竭津液也若按小腹連臍硬痛渴而小水短赤大便秘實者有燥屎也大承氣下之

傷寒論五卷
辨痛四十四

附四肢痛

陰痛

腰痛

成氏曰辨疼乃六經俱有之症有表有裏有寒有熱有風有溫如太陽傷寒榮血不利身疼者宜發汗后脉沉遲辨疼者又宜溫中腸易疼者白虎解之裏寒外熱身疼者先當救裏而後攻表寒在三陰則脉沉身疼風在三陽則肢節煩疼四逆柴胡之劑不可不審

活人云太陽身痛但拘急耳中濕身痛不可轉側陰毒身痛脉勢沉重宛如被杖以此別之

太陽辨痛治例 汗太陽病或已發熱或未發熱必惡寒身痛拒逆脉陰陽俱緊者名傷寒麻黃湯 二十一

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節痛惡風無汗而喘麻黃湯

太陽病脉浮緊無汗發熱身痛八九日表症仍在當發其汗
其人發煩目瞑劇者必衄乃解麻黃湯二十一

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼無汗而煩燥者大青龍三
十八

和解傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔必下支結柴
胡加桂枝四十五

發汗后身疼脉沉遲者桂枝加芍藥生姜各一兩人參三
兩新加湯主之

註曰汗后身痛邪氣未盡也脉沉遲榮血不足也經云
其脉沉者榮氣微也又云遲者榮氣不足血少故也與

桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生薑人參以益不足之血

張氏曰或云經言表邪盛脉浮而緊法當身疼痛宜以汗解之况身疼皆係表邪未盡此又加人參芍藥生薑以益血何也予曰表邪盛則身疼血虛則身亦痛其脉浮緊者邪盛也其脉沉微者血虛也盛者損之則安虛者益之則愈仲景凡言發汗后以外無表証裏无熱証止餘身疼一事而已若脉稍浮盛則為表邪未盡解今言脉沉遲此血虛而致然也故加人參生薑芍藥以益

血

瘡家身疼痛下可發汗發汗則瘡

註曰表里裏熱則生瘡瘡家身疼如傷寒不可發汗發汗則表氣愈虛熱愈甚生風故麥啞也桂枝加芍藥湯陰痛汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼禹餘糧丸甚至湯一百四逆湯九桂枝茯苓甘草湯十三二陽併病太陽初得病時發其汗不微因轉屬陽明續自微汗

刺陽明病下血讖語此熱入血室但頭汗者刺期門

少陰便血例

溫 少陰病至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者

桃花湯

少陰病八九日一身手足盡熱以熱在膀胱必便血也桃仁

承氣湯 抵當湯

少陰病下利便膿血者可刺

清熱傷寒光厥後發熱下利必自止若不止必便膿血黃芩湯 桃花湯 白頭翁湯

傷寒熱少厥微指頭寒默亡不欲食煩燥小便利色白者此熱除也欲得食為欲愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便膿血 黃芩芍藥湯 抵當湯

傷寒厥少熱多其病當愈四日至七日熱不除者必便膿血 黃芩湯 抵當湯

下利脈數而渴者今日愈設不差必清膿血 黃連湯 下利寸脈反浮數尺中自濡者必清膿血 黃連阿膠湯

黃芩湯

附餘吳氏曰凡下血便膿血有陰陽冷熱之不同要詳辨之
古人言見血無寒又言血得熱而行此大梁之言也大
抵屬熱者當八九屬寒者纔一二不可拘泥謂無寒也
要畧曰陽症內熱則下鮮血陰症內寒則下紫黑如豚
肝也且夫陽証脉數而有力者為實熱若寒之藥可投
若救而無力者虛熱當甘溫養血藥中少佐寒藥可也
若陰症則脉遲而有力者為有神可治無力者難治也
凡下利膿血身熱脉大者為難治身熱脉小者為易治
也

合併病六十二

合病兩經俱病併則一經症罷而併歸于一經也太陽與陽明合病有三症其邪湊有淺深之殊故用藥有汗下和解之異治見各條三陽合病有二症其一症用白虎湯其一症無治法後人用小柴胡白虎之類蓋此二症俱有三陽之候故不可汗下二陽併病有二症表未解者汗之表已解有裏症者下之太陽與少陽併病有三証其一由誤下以致心下硬成結胸其一項強如柔症伏心下硬如結胸刺肺俞肝俞慎勿發汗汗則譫語不止宜刺期門其一心下硬項強而眩者刺大椎肺俞不宜下也

太陽上明少陽合病例

汗 太陽與陽明合病胸滿而喘者不可下麻黃湯

解肌太陽與陽明合病自下利葛根湯不可利但嘔者葛根
加半夏或曰由太陽表未罷而陽明裡又至兩陽合病熱
甚于表乘虛漸攻于裏故下也其不下利而嘔者邪氣雖
攻裏未入于胃但氣逆而嘔故加半夏以止嘔逆

龐氏曰外証必頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾也脉浮大太
陽受病也長者陽明也頭腰太陽也肌目鼻陽明也

太陽与少陽合病自下利者與黃芩湯 若嘔者黃芩加半

夏湯

或曰此表實裏虛熱入攻裏故自下利若兼痰飲則嘔
也

下陽明少陽合病必下利脉長者為順脉弦者為負負者尅

賊也脉滑而數者有宿食大承氣湯

或曰陽明土少陽木其脉弦者木乘土也不弦者不負也負者必死若滑而數者有宿食非負也故宜下

二陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿不可汗下若自汗者白虎湯

三陽合病脉浮大上閤上脘欲眠目合則汗小柴胡白虎湯或曰此二症俱有三陽之繼此不可汗下

太陽少陽併病例

解肌二陽併病太陽初得時汗之杯微轉屬陽明續自微汗不惡寒大柴胡

若太陽症不罷不可下可小發汗設面色緣緣正赤陽氣拂

鬱在表汗之不徹其人煩燥短氣不知痛處在更發汗則愈葛根湯

下二陽併病太陽症罷潮熱手足汗大便難譫語者大承氣湯和脾太陽少陽併病及下之成結胸心下硬下利不止水漿不下心煩生薑瀉心湯 小陷胸湯

刺太陽與少陽併項強痛或眩冒時如結胸心下痞硬刺大椎第一間肺俞肝俞不可汗汗則譫語不止刺期門

太陽少陽併病心下硬項強而眩者刺大椎肺俞慎勿下

附餘趙氏曰愚常疑合病併病之難明也久矣姑釋之蓋合

病者二陽經或三經同受病病之不傳者也併病者一

陽經先受病又過一經病之傳者也且如太陽陽明併

病一症若併而未盡是傳未過尚有表症仲景所謂太陽症不罷面色赤陽氣拂鬱在表不得越煩燥氣短是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太陽症罷潮熱手足汗出大便硬而譫語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳則不入府所以仲景論太陽陽明合病止出三症如前太陽陽明併病則言其有傳變如此也又如陽經互相合病皆自下利仲景于太陽陽明合病則主以葛根湯太陽少陽合病主以黃芩湯少陽陽明合病主以承氣湯至于太陽少陽併病其症頭項強痛眩冒如結胸心下痞硬當刺大椎肺俞肝俞不可汗下太陽陽明併病已見上論但主