

外借

临床实用痔漏学

王芳林 著

陕西人民出版社

臨床實用痔漏學

王芳林著

*

陝西人民出版社出版（西安北大街一〇九號）

西安市書刊出版業營業許可証出字第〇〇一號

西安新华印刷厂印刷 市烈軍屬貧民裝訂二社裝訂
新华书店陝西分店发行

*

850×1168 1/32· $3\frac{3}{4}$ 印張·88,508字

一九五七年十二月第一版

一九五八年二月第一次印刷

印數：（精）1—4,000 定價：（9）（精）一元一角

統一書號：14094·9



臨床實用痔漏學

王芳林著



陝西人民出版社

一九五七年·西安



目 录

序	(7)
自 序	(9)
第一章 痔漏概 說	(11)
第 一 节 痔漏的定义和分类	(11)
第 二 节 痔漏发生的原因	(12)
第 三 节 痔漏的診斷	(15)
第 四 节 肛門、直腸的生理解剖	(19)
第 五 节 治疗痔漏应用的器械	(24)
第二章 痔漏的治疗方法	(30)
第 一 节 注射疗法	(30)
第 二 节 麻醉結紮疗法	(32)
第 三 节 結紮注射疗法	(35)
第 四 节 簡便手术疗法	(36)
第 五 节 手术結紮疗法	(39)
第 六 节 脫管錠疗法	(40)
第 七 节 枯痔散疗法	(40)
第 八 节 服药疗法	(42)
第 九 节 搽药疗法	(43)
第 十 节 燻洗疗法	(44)
第三章 各种外痔的疗法	(46)
第 一 节 松皮痔	(46)
第 二 节 瘀血球痔	(47)
第 三 节 裂口痔	(48)
第 四 节 漏口痔 (又名全痔漏)	(49)

第五節	刺瘡痔	(50)
第六節	破頭痔	(51)
第四章	各種內痔的療法	(53)
第一節	脫肛性內痔	(53)
第二節	單純性內痔	(54)
第三節	葡萄形內痔	(55)
第四節	懸珠形內痔	(56)
第五節	癌性內痔	(57)
第六節	內外鎖肛痔	(58)
第七節	內外混合痔	(59)
第五章	各種漏瘡的療法	(60)
第一節	淺層漏管	(60)
第二節	深層漏管	(62)
第三節	通腸漏	(64)
第四節	穿肛漏	(65)
第五節	絞弦漏	(66)
第六節	環肛漏	(67)
第七節	穿臀漏(附流胯漏和通背漏)	(67)
第八節	臀癰漏	(68)
第九節	陰漏	(69)
第十節	海底漏(又名騎馬漏)	(69)
第十一節	通脊漏	(70)
第十二節	坏疽漏	(71)
第十三節	蜂窩漏	(71)
第十四節	複雜性漏管	(72)
第六章	其他肛門病的療法	(73)
第一節	脫肛	(73)
第二節	便血	(74)
第三節	寸白虫症	(76)
第四節	肛門濕疹	(76)
第五節	肛門外痒症	(77)

第 六 节	肛門內痔症	(78)
第 七 节	肛門炎症 (包括內外痔漏炎症)	(79)
第七章	方 剂 (应用和配制)	(81)
第 一 节	內服湯药类十一	(81)
第 二 节	內服丸药类六	(84)
第 三 节	內服散药类二	(86)
第 四 节	外用腐蝕药类六	(87)
第 五 节	外用生肌药类五	(90)
第 六 节	外用散药类七	(92)
第 七 节	外用燻洗药类五	(94)
第 八 节	外搽药膏类四	(95)
第 九 节	灌腸类三	(97)
第 十 节	坐药类三	(97)
第十一节	药線方	(93)
第八章	病 例	(99)
第 一 节	內痔类十一	(99)
第 二 节	外痔类五	(105)
第 三 节	混合痔类二	(108)
第 四 节	漏瘡类九	(109)
第 五 节	其他肛門病类四	(114)
第九章	痔漏病的預防	(117)

(85)	 臺灣門門	廿六 第
(86)	 (金黃龍科門門) 臺灣門門	廿七 第
(87)	 (龍酒門門) 龍	廿八 第
(88)	 十美門門	廿九 第
(89)	 六美門門	三十 第
(90)	 二美門門	三十一 第
(91)	 六美門門	三十二 第
(92)	 五美門門	三十三 第
(93)	 四美門門	三十四 第
(94)	 三美門門	三十五 第
(95)	 二美門門	三十六 第
(96)	 一美門門	三十七 第
(97)	 十美門門	三十八 第
(98)	 五美門門	三十九 第
(99)	 二美門門	四十 第
(100)	 六美門門	四十一 第
(101)	 五美門門	四十二 第
(102)	 四美門門	四十三 第
(103)	 三美門門	四十四 第
(104)	 二美門門	四十五 第
(105)	 一美門門	四十六 第
(106)	 十美門門	四十七 第
(107)	 五美門門	四十八 第
(108)	 二美門門	四十九 第
(109)	 六美門門	五十 第
(110)	 五美門門	五十一 第
(111)	 四美門門	五十二 第
(112)	 三美門門	五十三 第
(113)	 二美門門	五十四 第
(114)	 一美門門	五十五 第
(115)	 十美門門	五十六 第
(116)	 五美門門	五十七 第
(117)	 二美門門	五十八 第
(118)	 六美門門	五十九 第
(119)	 五美門門	六十 第
(120)	 四美門門	六十一 第
(121)	 三美門門	六十二 第
(122)	 二美門門	六十三 第
(123)	 一美門門	六十四 第
(124)	 十美門門	六十五 第
(125)	 五美門門	六十六 第
(126)	 二美門門	六十七 第
(127)	 六美門門	六十八 第
(128)	 五美門門	六十九 第
(129)	 四美門門	七十 第
(130)	 三美門門	七十一 第
(131)	 二美門門	七十二 第
(132)	 一美門門	七十三 第
(133)	 十美門門	七十四 第
(134)	 五美門門	七十五 第
(135)	 二美門門	七十六 第
(136)	 六美門門	七十七 第
(137)	 五美門門	七十八 第
(138)	 四美門門	七十九 第
(139)	 三美門門	八十 第
(140)	 二美門門	八十一 第
(141)	 一美門門	八十二 第
(142)	 十美門門	八十三 第
(143)	 五美門門	八十四 第
(144)	 二美門門	八十五 第
(145)	 六美門門	八十六 第
(146)	 五美門門	八十七 第
(147)	 四美門門	八十八 第
(148)	 三美門門	八十九 第
(149)	 二美門門	九十 第
(150)	 一美門門	九十一 第
(151)	 十美門門	九十二 第
(152)	 五美門門	九十三 第
(153)	 二美門門	九十四 第
(154)	 六美門門	九十五 第
(155)	 五美門門	九十六 第
(156)	 四美門門	九十七 第
(157)	 三美門門	九十八 第
(158)	 二美門門	九十九 第
(159)	 一美門門	一百 第

序

「发揚祖国医学遗产」这是全国人民的热烈呼声，在党和政府的正确地领导下，正在澎湃地向前发展着。

痔漏疗法，是祖国医学遗产中很宝贵的一部分，它随着祖国医学遗产的发掘而发揚光大！这是若干年来痔漏疗效显著的客观事实所决定的，事实就是真理，誰能主觀的把它加以否定呢？

中医对于痔漏一科，無論在病源、症候、治疗各方面，都有其独特的理論根据和丰富的經驗积累。所以，历年以来，能够解除了无数患者的痔漏痛苦，保证了他們的健康，胜利的完成了医疗任务。

芳林医师，自幼承受家学，年方弱冠，就以痔漏專科悬壺桑梓。一九三六年迁居西安，仍以痔漏專科为业，二十余年来治愈的人数很多，有很好的治疗成績。

在旧社会，中医遭受摧殘，尤其痔漏外科更被輕視。芳林医师坚定的热爱自己的职业，全神貫注，苦心鑽研，在古人治疗痔漏的理論和經驗的基礎上，結合自己的临床心得，不断地提高医疗技术，無論手术藥物等方面，都有創造性的改进。解放后，芳林医师运用新的医疗方法，給許許多多的痔漏患者解除了痛苦，增强了社会主义建設的力量。

芳林医师，为了报答党和政府对中医的关怀，特將自己治疗痔漏的經驗和体会总结起来，于医疗之暇，寫成「临床实用痔漏学」一書。書內对于痔漏发生的原因，檢查的程序，以及治疗方法和手术操作技术等，都分門別类，加以系統地簡明扼要地叙述。切合实用。不特痔漏專家可資借鏡，并且可以作为一般初学

者的参考佳本。它實為發揚祖國醫學遺產中，關於痔漏科方面的一部較好的作品。

「發揚祖國醫學遺產」是一項光榮而艱鉅的任務。芳林醫師有堅定的意志，和刻苦鑽研的精神，才能取得如此卓越的成就。在這方面，他尽到了自己的一份力量，這是值得欽佩和讚揚的！

俗話說：「學無止境」！在此科學發展一日千里的時代，我們要于「百尺竿頭」更進一步。謹以此話，共相勉勉！

青島市立醫院 李棣如 1957年6月

自序

痔漏是一种最常见，最普通的外科病，俗话说：「十人九痔」，虽不免有所夸大，但却足以说明这种疾病的普遍性。仅就西安市一地而言，每日就診者不下数百人，而且，大多数是二十至四十岁的劳动人民，这就更显得严重了！

痔漏虽然是人們肛門的局部疾病，而其痛苦，往往是經年累月，不易解除。輕者，湿痒、疼痛、流血、流膿、下墜等，造成患者精神上和肉体上的損害；重者，大量流血，影响大便排洩，甚至因失血过多，貧血衰弱造成死亡。这种疾病普遍的原因：一方面在解放前，反动統治階級，对中医一貫地不加重視，因而，对祖国医学遺產，未能作一有系統的整理，就是对痔漏一科，許多行之有效的医疗經驗，也沒有很好的加以總結和推广；另一方面因为痔漏发生的原因很多，如飲食刺激，外感不潔，身心过劳，从业久坐，房事过度及先天性遺傳等，都会发生痔漏。也有因为肺臟、腸胃等病患，致使湿热下注，肛門过分受刺激而引起。由于以上种种原因，就造成了这种疾病的普遍性，影响人們健康甚鉅！

現在正值偉大的祖国进行社会主义建設时期，需要大量的劳动力，因而，根除病患，使人們能够身强力壯，精神愉快的为祖国建設服务，提前完成祖国經濟建設計劃，就成为我們医务工作者，当前最迫切和最光荣的任务！

我謬承家学，鑽研此道，初在洛陽悬壺，繼迁西安应診，屈指迄今，业已二十余年。一九五五年我参加了西安市中医門診部工作以后，就深深感覺到痔漏疗法在解除广大人民的肛門疾病痛

苦上，不管過去、現在和未來，都是起着一定作用的。況且值此偉大的毛澤東時代，作為一個醫務工作者，把個人家傳方技，公諸社會，是極其應該的。因而，我為了報答黨和政府對中醫的培養和關懷，為了打破傳統的保守思想起見，決定把我們的家傳秘方，和自己數十年來的臨床經驗作一總結，以便交流推廣。但由於時間和個人文化水平的限制，困難很多。而這些困難，終於在黨和政府的幫助下獲得解決。我們領導上，不但每日讓我抽出一些時間，撰擬初稿，而且，還派人幫助我整理材料，才使這本書在短時期內能與廣大讀者見面。

我懇切地希望在痔漏理論上有修養的同志們，給我這些治療經驗，找出更好的理論根據，使它在廣泛的實踐中獲得更豐富的內容，提高它的療效，為廣大的痔漏患者更好的服務。至於書中肛門、直腸的生理解剖部分，主要是根據「實用肛門直腸外科學」編寫而成，特此予以說明，并向原作者致以謝意。

本書倉卒脫稿，缺漏錯誤之處必多，希望海內賢達，痔漏專家，不吝金玉，切實指導，以便再版補正，不勝感荷。

王芳林

第一章 痔漏概說

第一节 痔漏的定义和分类

痔瘡是由于肛門部的痔叢靜脉瘀血，形成大小不同的肉核，引起腫脹疼痛，发痒下血，下墜等不同症狀的疾患。因它发生的部位不同，医学上，把它分为外痔、內痔、和混合痔三种。

外痔：凡是发生在肛門外圍的痔瘡，統称外痔。但由于各种外痔发生的原因和症狀不同，需用不同的治疗方法，始能收到效果。历代的医学家，为了对症下药，易于治疗，对不同的症狀，虽然也定出了不少的名称，但直至現在还没有統一的叫法。为使这种名称逐漸統一起見，根据个人多年临症观察和所施用的治疗方法，提出以下各种外痔的名称和大家商討。因外痔发生的原因不同，症狀不同，以及所用的治疗方法也不同，現在把它分为：松皮痔、瘀血球痔、裂口痔、漏口痔、刺瘤痔、破头痔等六种。

內痔：凡是生在肛門內壁和直腸下端的痔瘡，統称內痔。因为发生的原因症狀不同，我們把它又分为：脫肛性內痔、單純性內痔、葡萄形內痔、癌性內痔、悬珠形內痔、内外鎖肛痔等六种。

混合痔：凡是发生在肛門內部和外部的痔瘡，称为混合痔。

漏瘡发生在肛門外圍和直腸下端。这种病发生时、肛門周圍或局部发生腫脹，致局部肌肉組織坏死，形成膿腫，膿液成熟穿破表皮流出后，膿腫即漸消失，表皮收口。但由于內部病毒未清，以致短期内复发，仍穿破皮层，流出膿液。膿液流过后，腫脹复消。如此反复发作，久不收口，形成内外相通的小孔，这便叫漏瘡。这种症常形成漏管，兩头开口，有生在肛門外的漏管，还有生在肛門內的漏管；也有因痔瘡日久失治，发生潰瘍，变成

漏管。惟以与肛門內外相通的漏管为最多。按其发生的部位、症狀和治療方法的不同分为：淺层漏管、深层漏管、通腸漏、穿襠漏、絞弦漏、环肛漏、穿臀漏、臀癰漏、阴漏、海底漏、通脊漏、坏疽漏、蜂窩漏、复杂性漏管等十四种。

痔漏以外，还有其他常見的肛門病七种：如脱肛、大便下血、寸白虫症、肛門濕疹症、肛門外痒症、肛門內痒症、肛門炎症等。

第二节 痔漏发生的原因

痔漏虽为肛門內外的局部病患，但其发生的原因很多，且多与人体全部机能失調有关。在祖国医学文献上早有記載的，如「黄帝內經」生气通天論上說：「……因而飽食，筋脉橫解，腸僻为痔……」华佗「神醫秘方真傳」上載有：「牡痔、酒痔、腸痔、血痔、气痔」等之分。隋代巢元方「諸病源候論」載：「……諸痔皆由傷風、房室不慎、醉飽合陰陽、致勞扰血气、而經脉流溢滲漏腸間，冲发下部……」。宋代竇汗卿「瘡瘍全書」載：「……臟腑所发，多由飲食不节，醉飽无时，恣食肥膩，胡椒辛辣，炙博醞酒，禽兽異物，任情醉飽，耽色不避严寒酷暑，或久坐湿地，恣意耽看，久忍大便，遂致陰陽不合，关格壅塞，風湿下冲，乃生五痔。……」[医宗金鑑]載：「……斯症名因形起，其名虽有二十四种，总不外乎醉飽入房，筋脉橫解，精气脱泄，热毒乘虛下注；或憂思太过，蘊积热毒，憤鬱之气，致生風湿燥热，四气相合而成。如結腫脹悶成塊者，湿盛也；結腫痛如火燎，二便閉者，大腸小腸热盛也；結腫多痒者，風盛也；肛門圍遠，摺紋破裂，便結者火燥也。……」总之，古人对痔漏发生的原因，記載很多，大同小異，这里不再逐一列举。茲参酌古人理論，并結合本人多年臨床經驗，將痔漏发生的各种不同原因，分述于后：

一、腸胃性原因

1. **过量飲酒**：酒性熱，喝的過多，血液循環加速，易致肛門靜脈發生瘀血，而形成內痔。再者酒入胃腸後，刺激腸胃粘膜，增加分泌，發生濕熱，下注肛門，多引起大便下血；熱甚者能使肛門部發生潰瘍，形成漏管。

2. **飢飽不均**：古人云：「飢飽不均傷腸胃」，蓋過飢者必多食，多食必腹脹腸滿，壓迫直腸，致肛門靜脈瘀血，而發生內痔核；且腸胃容納有限，過于飽食，妨礙消化，易引起瀉痢，而形成脫肛或內痔。

3. **恣食肥膩**：肥膩物具有油滑性，恣食過量，易引起滑腸下瀉，氣血下行，壓迫肛門靜脈，以致瘀血，而生內痔。

4. **過食辛辣物**：辛辣物具有刺激性，過食能刺激腸胃粘膜，增加分泌，並刺激腸胃神經，使血液循環加速，發生濕熱，下注肛門，易形成裂口痔及引起大便下血症。

5. **貪食炙煇物**：炙煇物多屬熱性，入腸胃後，吸收大量分泌液，引起腸胃乾燥，大便秘結，壓迫肛門，易致大便下血及肛門裂口症。

6. **久瀉久痢**：久瀉者腸蠕動加速，肛門弛張，氣血必虧，易致脫肛；久痢者腸胃多有濕熱，濕熱下注直腸，肛門最易瘀血，引起內痔及下血等症，且久痢往往易成大腸潰瘍症及里鎖肛症。

7. **長期便秘**：大腸蓄熱者多便秘，糞便乾燥，壓迫肛門，即易引起瘀血，糞便干硬擦傷肛門，更易引起肛門裂口症及外痔，或肛門炎等症。

二、職業性原因

1. **從業久坐**：久坐者使肛門靜脈長期受壓迫，致血液週流不暢，易形成瘀血球痔。

2. **負重遠行**：負重遠行的人，氣力下壓，肛門緊縮，致肛門血液循環發生障礙，容易引起脫肛性內痔或便血等症。

3.身心过劳：身心过劳則气血虧損，腸蠕動減緩，排便困難，血液循環緩慢無力，肛門部靜脈週流不易，形成瘀血，發生漏瘡。

三、性慾的原因

1.房事过度：男女交媾時，肛門過度緊縮，妨礙腸部血液循環，而致瘀血。且肛門的收縮，能牽扯大腸下部使之蠕動，引起大便乾燥，發生內熱，形成漏瘡和便血等症。

2.交媾不潔：男女在交媾時，無論男子陽莖及女子陰道內所出精液或分泌物污染肛門部時，就容易發生肛門濕疹及刺瘤痔和破頭痔等。

3.忍精不洩：性交時為了延長時間，故意忍精不泄，肛門時時緊縮，內生大熱，容易發生急性肛門膿腫症而成漏瘡。

四、外部感染

1.久坐湿地：久坐湿地者，肛門部受濕熱熏蒸，易生肛門濕疹或肛門發癢等症。

2.感染不潔：感染不潔者，由於肛門接觸不潔之物，如洗澡用具或內衣、坐處、手指、手紙、廁所木橈等，感受穢濁之氣或細菌之侵襲，易發生肛門濕疹，或松皮痔核等症。

五、誘因

1.肺臟有病：肺與大腸相表裏，肺病多蓄熱，醫者多用清瀉之劑，致濕熱下注，流入大腸，易使肛門部發生腫脹膿瘍而成漏瘡。其他如患腰椎結核者，亦能引起漏瘡。

2.氣怒傷肝：諺云：「大怒之下易生惡瘡。」蓋以血隨氣行，氣不順者血不和，肛門部毛細血管最多，血液循環力量薄弱，盛怒之下，交感神經興奮，血流加速，內部機能失常，以致肛門瘀血，易生通腸漏和穿臀漏等症。

3.婦女妊娠：婦女懷孕後期，子宮膨大，壓迫肛門，易引起

肛門瘀血；在生产时，用力过甚，易发生脱肛及肛門裂口症。

4. 血液不清：血液內含有热毒，易生瘡瘍，引起肛門下墜及肛門炎症。患有梅毒者，易生刺瘤痔或肛門潰瘍症及破头痔等。

5. 久病虚弱：久病体弱，元陽不足，中气下陷，缺乏升提之力者，易引起大便不利，下墜脱肛等症。

6. 蹲跌創伤：如割治肛門病手术失当，能造成急性大出血、肛門失禁及外鎖肛等症。如蹲跌过甚，最易发生通脊漏症。

7. 虫痔影响：人体消化道內如傳染某种寄生虫，虫少者易引起肛門发痒及外痔，虫多者能使肛門疼痛，或引起潰爛及肛門湿疹等症。

六、先天性遗传

嬰兒痔漏：嬰兒患痔漏者，多由于父母血液不清，血內含有梅毒螺旋体毒素所致。

第三节 痔漏的診斷

一 望診：观察患者的年齡大小，身体强弱，有无貧血現象，是否咳嗽喘息，有无不正常的姿态。是否还有其他合併症。

二 問診：由患者主訴自觉的症狀后，医者应提出下列問題：肛門是否腫痛或发痒，是否流膿，有无脱肛、下血、里急后重等現象。每日大便次数，发病原因，患病時間長短，病狀的演变，是否患过其他疾病，如肺結核、心臟病、梅毒等。現在是否患有其他合併症。患者家庭有无痔漏患者，严重的結核病患者。随着根据患者的自訴，記入病历。

三 檢查：先檢查肛門外部有无外痔和脱出的內痔，观察其瘡型的大小、顏色和形狀。檢查有无漏管，漏管的部位，管口的大小，及周圍皮肤的顏色，再檢查肛門內部。檢查时用肛門鏡將肛門撐开，用手电筒照射，观察肛門內痔核的大小、部位、多少、