

全国卫生专业技术资格考试丛书

北京大学护理学院 编写

护理学专业[主管护师] 资格考试全真模拟及精解

2009年

- 紧扣全国卫生专业技术资格考试大纲
- 内容涵盖资格考试主要考点
- 专家解析，全真模拟
- 在线模考和网络课程增值服务，考前冲刺

免费赠送20元
网上学习费用



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书

护理学专业（主管护师） 资格考试全真模拟及精解

北京大学护理学院 编写

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (主管护师) 资格考试全真模拟及精解/
北京大学护理学院编写. —2 版. —北京: 北京大学医学
出版社, 2008. 2
ISBN 978-7-81116-308-7

I. 护… II. 北… III. 护理学—资格考核—解题
IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 197052 号

护理学专业 (主管护师) 资格考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学护理学院

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010—82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 许立 药蓉 责任校对: 何力 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 22.25 字数: 539 千字

版 次: 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷 印数: 1—10000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-308-7

定 价: 38.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

为配合全国卫生专业技术护理学专业（主管护师）资格考试，帮助考生在有限的时间内掌握考试要点，提高复习效率，北京大学护理学院组织相关学科专家，根据护理学专业（主管护师）考试大纲，共同编写了这套考试辅导丛书。本套书共分三本：

《护理学专业（主管护师）资格考试应试指导》

内容精练，重点突出，可以帮助考生在考前高效快速地掌握考试重点和难点。

《护理学专业（主管护师）资格考试习题集》

题量大，内容丰富，涵盖资格考试主要考点，是考前强化训练的必备用书。

《护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟及精解》

全方位模拟考试真题，题后由专家解析，是考前冲刺的最佳选择。

编 者

目 录

护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟试卷（一）	(1)
全真模拟试卷（一）答案及精解	(97)
护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟试卷（二）	(177)
全真模拟试卷（二）答案及精解	(273)

护理学专业 (主管护师) 资格考试全真模拟试卷 (一)

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 下列关于左、右主支气管的描述中错误的是
 - A. 气管在隆凸处分为左、右主支气管
 - B. 右主支气管较左主支气管粗、短、直
 - C. 进行气管插管时，若插入过深时易误插入右主支气管
 - D. 异物易吸入左主支气管
 - E. 肺脓肿好发于右肺与右主支气管的结构特点有关
2. 关于肺的功能的描述中错误的是
 - A. 肺的主要功能是进行肺通气和肺换气
 - B. 肺内气体交换主要在肺泡内通过气血屏障进行
 - C. 浅而快的呼吸效率优于深而慢的呼吸效率
 - D. 呼吸膜面积是影响肺换气的重要因素之一
 - E. 肺通气/血流比例是影响肺换气的重要因素之一
3. 结核病最主要的传播途径是
 - A. 飞沫
 - B. 尘埃
 - C. 食物和水
 - D. 皮肤接触
 - E. 毛巾或餐具
4. 慢性肺心病机制中，导致肺动脉高压形成的最主要因素是
 - A. 缺氧
 - B. 毛细血管网损毁或闭塞

- C. 水钠潴留，血容量增多
 - D. 继发性红细胞增多，血液黏稠度增加
 - E. 肺小动脉炎
5. 患者女性，40 岁，诊断哮喘 5 年，近来每当给爱犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作，护士为其进行健康教育时应指出其可能的过敏原是
 - A. 花粉
 - B. 尘螨
 - C. 狗毛
 - D. 病毒感染
 - E. 细菌感染
 6. 严重左心衰竭时，病人出现少尿的主要原因是
 - A. 肾小球滤过率下降
 - B. 血液进行再分配，肾血流量明显减少
 - C. 体循环淤血
 - D. 病人饮水量减少
 - E. 肾小管重吸收增多
 7. 关于心脏传导系统的说法，不正确的是
 - A. 心脏的传导系统由窦房结、结间束、房室结、左右束支和浦肯野纤维网组成
 - B. 传导系统的主要功能为产生并传导冲动，维持心脏的正常节律
 - C. 正常人由窦房结发放冲动
 - D. 心脏的正常起搏点是窦房结
 - E. 房室结具有自律性
 8. 患者女，61 岁，因头痛、心悸和心前区不适感，门诊查血压：160/95mmHg，据此可以推断该病人高血压分级属于
 - A. 正常高限
 - B. 轻度高血压
 - C. 中度高血压

- D. 重度高血压
E. 临界高血压
9. 引起病毒性心肌炎最常见的致病菌是
A. 轮状病毒
B. HBV
C. 疱疹病毒
D. HAV
E. 柯萨奇病毒 B
10. 剧烈频繁呕吐可引起
A. 呼吸性酸中毒
B. 呼吸性碱中毒
C. 代谢性酸中毒
D. 代谢性碱中毒
E. 混合性酸中毒
11. 下列药物中抑制胃酸分泌作用最强的是
A. 西咪替丁
B. 雷尼替丁
C. 奥美拉唑
D. 硫糖铝
E. 枸橼酸铋钾
12. 原发性肝癌早期诊断的重要检查是
A. 甲胎蛋白测定
B. 血清转氨酶测定
C. 碱性磷酸酶测定
D. 癌胚抗原测定
E. 异常凝血酶原测定
13. 肾结构和功能的基本单位是
A. 肾小球
B. 肾小管
C. 肾单位
D. 髓袢
E. 集合管
14. 急性肾小球肾炎多发生于下列哪种细菌所致的上呼吸道感染之后
A. 肺炎球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. β 溶血性链球菌
D. 大肠杆菌
E. 流感嗜血杆菌
15. 在我国引起慢性肾衰的第一位病因是
A. 糖尿病肾病
B. 高血压肾病
C. 慢性肾盂肾炎
D. 慢性肾小球肾炎
E. 急性肾小球肾炎
16. 最常见的引起再生障碍性贫血的药物是
A. 红霉素
B. 氯霉素
C. 螺旋霉素
D. 庆大霉素
E. 青霉素
17. 关于人体的铁代谢, 下列说法错误的是
A. 人体内的铁主要来源于食物
B. 人体能吸收的铁为三价铁
C. 女性铁的丢失形式主要为月经、粪便、哺乳、妊娠等
D. 合成红细胞的铁主要来源于衰老红细胞破坏释放铁的再利用
E. 人体铁的贮存形式主要为含铁血黄素和铁蛋白
18. 某急性淋巴细胞白血病患者, 通过化疗已进入缓解期。护士夜间巡视时, 发现患者突然出现烦躁不安、剧烈头痛、呕吐、颈项强直, 目前高度怀疑发生了中枢神经系统白血病。患者缓解期发生中枢神经系统白血病的主要原因是
A. 免疫功能低下
B. 多数化疗药不能通过血脑屏障
C. 疗程不够
D. 化疗药剂量不足
E. 对化疗药产生耐药性
19. 1型糖尿病的发生主要是由于
A. 老年人肾小球排糖少
B. 吃糖过多, 短期内无法排出
C. 胰岛素分泌绝对不足
D. 靶细胞对胰岛素敏感性降低
E. 老年人肾小管重吸收糖多
20. 系统性红斑狼疮(SLE)的发病与下列哪种因素无关
A. 遗传

- B. 雌激素
C. 败血症
D. 紫外线
E. 病毒感染
21. 毒物排泄的主要途径为
A. 肝
B. 肠道
C. 呼吸道
D. 胆道
E. 肾
22. 患者, 21 岁, 因失恋而服毒自杀, 家属在卧室发现患者时, 其表现为恶心、呕吐、腹痛、流涎、口鼻大量分泌物伴呼吸困难等症状。由急诊入院治疗, 体格检查发现呼吸有浓烈蒜味, 瞳孔缩小。最可能的诊断是
A. 煤气中毒
B. 有机磷酸酯类中毒
C. 安定类药物过量中毒
D. 亚硝酸盐中毒
E. CO 中毒
23. 对于大多数传染病来说, 最多见的表现是
A. 病原体被清除 (一过性感染)
B. 隐性感染
C. 显性感染
D. 病原携带状态
E. 潜伏性感染
24. 下列措施中, 属于被动免疫的是
A. 加强营养
B. 接种类毒素
C. 接种疫苗
D. 接种抗毒素
E. 预防服药
25. 流行性乙型脑炎 (乙脑) 的主要传染源是
A. 黑线姬鼠
B. 蚊子
C. 猪
D. 病人
E. 病人和隐性感染者
26. 狂犬病病毒的主要传播途径是
A. 飞沫传播
B. 粪-口传播
C. 虫媒传播
D. 直接接触传播
E. 血液传播
27. 下列各种细胞中 HIV 主要感染的是
A. 单核细胞
B. B 淋巴细胞
C. 神经胶质细胞
D. $CD4^+$ T 淋巴细胞
E. NK 细胞
28. 脑神经有运动纤维和感觉纤维, 下列属于运动神经的是
A. 三叉神经
B. 副神经
C. 位听神经
D. 面神经
E. 迷走神经
29. 以下关于代谢性中毒的叙述不正确的是
A. 呼吸加深、加快
B. 常伴发高钾血症
C. 幽门梗阻病人易发生
D. 外科临床最常见的酸碱失衡类型
E. 重症病人常用 5% 碳酸氢钠溶液纠正
30. 维持细胞外液渗透压的重要离子是
A. K^+
B. Na^+
C. Mg^{2+}
D. H^+
E. Ca^{2+}
31. 低渗性脱水时, 体液的容量变化特点为
A. 细胞外液正常, 细胞内液减少
B. 细胞外液减少, 细胞内液正常
C. 细胞外液显著减少, 细胞内液轻度减少
D. 细胞外液轻度减少, 细胞内液显著减少

- E. 细胞外液、内液按比例减少
32. 休克期相当于
- 微循环收缩期
 - 微循环痉挛期
 - 微循环扩张期
 - 微循环衰竭期
 - 休克代偿期
33. 属于特异性感染的是
- 疔
 - 丹毒
 - 菌血症
 - 破伤风
 - 阑尾炎
34. 浅表痛为锐痛, 其传入神经纤维是
- α 纤维
 - β 纤维
 - C 纤维
 - A γ 纤维
 - A δ 纤维
35. 心跳、呼吸停止后, 临床死亡期的时间大约持续
- 2~3 分钟
 - 4~5 分钟
 - 7~8 分钟
 - 8~9 分钟
 - 10 分钟
36. 复苏药物的最主要的给药途径是
- 心内注射
 - 肌肉注射
 - 静脉注射
 - 皮下注射
 - 气管内给药
37. 以下属于治疗性手术的是
- 淋巴结活检术
 - 乳癌改良根治术
 - 食管癌的胃造口术
 - 重睑手术
 - 直肠癌的结肠造口术
38. 肝破裂的病人需要进行的手术是
- 择期手术
 - 限期手术
 - 急症手术
 - 美容手术
 - 诊断手术
39. 烧伤低血容量性休克常发生在伤后
- 8 小时以内
 - 12 小时以内
 - 24 小时以内
 - 48 小时以内
 - 72 小时以内
40. 以下最容易引起急性肾衰竭的外伤是
- 挫伤
 - 扭伤
 - 贯通伤
 - 挤压伤
 - 切割伤
41. 急性乳腺炎常发生于
- 产前 3~4 周
 - 产前 1~2 周
 - 产后 1~2 周
 - 产后 3~4 周
 - 产后 5~6 周
42. 腹部空腔脏器中最容易损伤的是
- 胃
 - 胆囊
 - 小肠
 - 结肠
 - 大肠
43. 原发性腹膜炎和继发性腹膜炎的区别主要在于
- 腹痛性质
 - 腹胀程度
 - 病原菌种类
 - 体温升高程度
 - 有无腹腔原发病灶
44. 急性腹膜炎病人发生休克的主要原因是
- 剧烈腹痛
 - 大量呕吐失液
 - 呼吸循环功能不全
 - 胃肠道渗出液刺激

- E. 毒素吸收及血容量减少
45. 胃癌最常见的发生部位是
- 胃小弯
 - 贲门部
 - 胃窦部
 - 胃底部
 - 胃体部
46. 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹部的机制是
- 胃肠功能紊乱
 - 内脏神经反射
 - 躯体神经反射
 - 阑尾位置不固定
 - 阑尾管壁痉挛
47. 构成腹外疝疝囊的是
- 脏腹膜
 - 壁腹膜
 - 腹壁肌肉
 - 腹壁筋膜
 - 腹壁皮肤
48. 机械性肠梗阻的病因为
- 慢性铅中毒
 - 腹膜后血肿或感染
 - 肠管受压
 - 肠系膜血管栓塞
 - 肠功能紊乱致肠痉挛
49. 在我国, 与原发性肝癌的发生关系最密切的是
- 水土因素
 - 黄曲霉毒素
 - 肝炎后肝硬化
 - 酒精性肝硬化
 - 肝良性肿瘤恶变
50. 在我国, 急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是
- 胆道肿瘤
 - 胆管结石
 - 胆道蛔虫
 - 胆管扭转
 - 胆管狭窄
51. 急性化脓性骨髓炎的主要致病菌是
- 大肠杆菌
 - 厌氧菌
 - 白色葡萄球菌
 - 溶血性链球菌
 - 金黄色葡萄球菌
52. 男性, 21岁, 因跳水时头部着地造成环椎裂开骨折伴颈髓损伤, 其致伤原因是
- 屈曲型损伤
 - 过伸型损伤
 - 病理性损伤
 - 屈曲牵拉型损伤
 - 垂直压缩型损伤
53. 男性, 50岁, 饱餐后出现上腹持续性疼痛并向左肩、腰背部放射, 伴有恶心、呕吐, 诊断为急性胰腺炎。入院后收集的资料中与其疾病关系密切的是
- 父亲因冠心病去世
 - 平时喜食素食
 - 25年来每天饮酒半斤
 - 不喜欢活动
 - 有阑尾炎手术史
54. 某颅脑损伤病人, 唤之睁眼, 回答问题错误, 躲避刺痛, 其格拉斯哥昏迷计分为
- 15分
 - 12分
 - 11分
 - 8分
 - 5分
55. 有关卵巢的叙述, 正确的是
- 是一对空腔器官
 - 分为两部分, 内为皮质, 外为髓质
 - 卵巢的大小和形状与年龄无关
 - 是产生卵子、分泌激素的器官
 - 正常卵巢约重 50g
56. 有关月经, 下述错误的是
- 初潮是指第一次月经来潮
 - 经期是指每次月经持续的天数
 - 月经周期是指前次月经结束到下次月经开始的时间

- D. 经期一般为 3~7 天
E. 月经周期一般 28~30 天
57. 正常月经周期的妇女, 宫颈黏液开始出现羊齿植物叶状结晶, 相当于在其周期的
A. 第 6~7 天
B. 第 9~10 天
C. 第 13~14 天
D. 第 15~16 天
E. 第 17~20 天
58. 有关原发性痛经病因的陈述, 正确的是
A. 病人体内雌激素水平异常升高致痛经
B. 痛经者子宫内膜和月经血中 PG 含量较正常妇女明显升高
C. 病人的平滑肌敏感性增加致子宫过度收缩的结果
D. 支配子宫的神经敏感性增高、痛阈降低致痛经
E. 子宫内膜炎症致局部缺血、缺氧, 引起痛经
59. 功能失调性子宫出血是指
A. 生育期妇女子宫异常出血
B. 青春期妇女的异常出血
C. 生殖器官无器质性病变的异常子宫出血
D. 绝经后妇女的异常出血
E. 人流术后妇女的异常出血
60. 梅毒的潜伏期一般为
A. 24 小时
B. 1~2 天
C. 3~7 天
D. 2~4 周
E. 3~7 个月
61. 子宫肌瘤发病可能的相关因素是
A. 早婚、早育, 性生活紊乱
B. 高血压、糖尿病、肥胖
C. 体内雌激素水平过高
D. 饮食环境
E. 环境因素
62. 导致发生自然流产的最主要原因是
A. 宫颈松弛
B. 染色体异常
C. 母儿血型不合
D. 内分泌功能失调
E. 子宫畸形
63. 新生儿生理性黄疸出现的时间是
A. 出生后 24 小时内
B. 出生后 24~48 小时内
C. 出生后 48~72 小时内
D. 出生后 5 天内
E. 出生后 1 周内
64. 某孕妇现孕 30 周, 长时间仰卧后, 出现血压降低、心率加快、面色苍白等症状, 出现这种表现的主要原因是
A. 脉率增快
B. 脉压增大
C. 脉压减少
D. 回心血量增加
E. 回心血量减少
65. 赵女士在妇科检查中发现宫颈重度糜烂, 宫颈刮片细胞学检查为巴氏 II 级, 提示为
A. 正常
B. 炎症
C. 可疑癌症
D. 高度可疑癌症
E. 癌症
66. 围产期是指
A. 从孕期满 27 周至生后 7 天
B. 从孕期满 37 周至生后 7 天
C. 从孕期满 28 周至生后 7 天
D. 从孕期满 28 周至生后 1 个月
E. 从孕期满 37 周至生后 1 个月
67. 小儿上部量等于下部量的年龄是
A. 新生儿
B. 1 岁
C. 2 岁
D. 6 岁
E. 12 岁

68. 小儿颅骨骨缝闭合的时间为生后)
- A. 4~6 周
- B. 6~8 周
- C. 3~4 个月
- D. 4~6 个月
- E. 1~1.5 岁
69. 小儿出生时的头围是
- A. 34cm
- B. 44cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 50cm
70. 预防接种属于
- A. 非特异性免疫
- B. 自然主动免疫
- C. 自然被动免疫
- D. 人工主动免疫
- E. 人工被动免疫
71. 属于活菌苗的是
- A. 卡介苗
- B. 麻疹疫苗
- C. 脊髓灰质炎疫苗
- D. 霍乱菌苗
- E. 百日咳菌苗
72. 以下属于小儿特有的能量消耗的是
- A. 基础代谢所需
- B. 生长发育所需
- C. 食物特殊动力作用
- D. 活动所需
- E. 排泄损失能量
73. 婴儿期每日每公斤体重所需能量为
- A. 140kcal
- B. 130kcal
- C. 120kcal
- D. 110kcal
- E. 100kcal
74. 小儿认为生病与道德行为有关, 那么他正处于皮亚杰认知发展理论的
- A. 感觉运动期
- B. 运筹前期
- C. 具体运筹期
- D. 形式运筹期
- E. 抽象运筹期
75. 关于极低出生体重儿的叙述正确的是
- A. 出生体重不足 2500g
- B. 出生体重不足 1500g
- C. 出生体重不足 1000g
- D. 出生体重不足 750g
- E. 出生体重不足 500g
76. 2 岁以后至青春期前, 小儿身高稳步增长, 平均每年增长
- A. 1~2cm
- B. 2~3cm
- C. 3~5cm
- D. 5~7cm
- E. 7~9cm
77. 关于骨盆的组成, 下列说法正确的是
- A. 两块耻骨, 两块坐骨, 一块尾骨
- B. 两块坐骨, 一块尾骨, 一块骶骨
- C. 两块髌骨, 一块尾骨, 一块骶骨
- D. 两块髌骨, 一块尾骨, 一块骶骨
- E. 两块耻骨, 一块尾骨, 一块骶骨
- 二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑
- (78~80 题共用题干)
- 患者, 男, 48 岁, 乙型肝炎病史 10 年, 因乏力、低热、腹胀、少尿入院。查体: 巩膜黄染, 腹部膨隆, 呈蛙状腹, 肝肋下未及, 脾肋下 2 指, 移动性浊音阳性。
78. 下列指标中, 不能提示肝功能严重损害的是
- A. 白蛋白明显降低
- B. 球蛋白明显降低
- C. 转氨酶明显增高

D. 重度黄疸

E. 凝血酶原时间延长

79. 该患者出现腹水原因,与下列哪项无关

A. 门静脉压力增高

B. 肝淋巴液生成过多

C. 低白蛋白血症

D. 前列腺素增多

E. 继发性醛固酮增多

80. 为了利于腹水的消退,给患者抽取腹水的同时,应及时输注

A. 等渗盐水

B. 抗生素

C. 白蛋白

D. 高张葡萄糖溶液

E. 甘露醇

(81~83 题共用题干)

男性,73岁,下肢骨折术后一直卧床,术后第7天突然出现左小腿剧痛,肿胀且有深压痛,左足过度背屈时小腿肌肉疼痛剧烈。

81. 该病人最可能发生了

A. 动脉栓塞

B. 深静脉血栓

C. 下肢静脉曲张

D. 雷诺综合征

E. 血栓闭塞性脉管炎

82. 该病人非手术措施中正确的是

A. 按摩患肢

B. 患肢平放

C. 患肢膝下垫枕

D. 卧床 10~14 天

E. 每周测量一次患肢不同平面的周径

83. 若该病人准备接受手术治疗去除病因,手术最好是在发病后

A. 1 天内

B. 3 天内

C. 5 天内

D. 7 天内

E. 10 天内

(84~85 题共用题干)

某初产妇,35岁,对其进行B超测量骨盆结果是:入口平面前后径 11cm,横径 13cm;中骨盆横径 9.5cm,前后径 11.5cm;出口横径 8.3cm,后矢状径 8.5cm。

84. 根据检查结果,该产妇的骨盆形态是

A. 均小骨盆

B. 扁平骨盆

C. 漏斗骨盆

D. 畸形骨盆

E. 正常骨盆

85. 该产妇是否可以试产,及试产的时间是

A. 不可试产

B. 可试产 1 小时

C. 可试产 1.5 小时

D. 可试产 2 小时

E. 可试产 4 小时

(86~87 题共用题干)

患儿,女,11个月,牛乳喂养,未加辅食,近2个月来食欲差,面色苍白,皮肤弹性差,精神不振,体重 6.5kg,腹部皮下脂肪 0.2cm。

86. 判断该患儿的营养状况属于

A. 营养过剩

B. 正常

C. 轻度营养不良

D. 中度营养不良

E. 重度营养不良

87. 该患儿的护理措施哪项不妥

A. 口服胃蛋白酶助消化

B. 补充维生素和微量元素

C. 做好皮肤的清洁护理

D. 预防低血糖

E. 尽快给予营养丰富的饮食

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关

系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择

(88~90 题共用备选答案)

- A. 糖尿病
- B. 动脉粥样硬化
- C. 风湿性心瓣膜病
- D. 先天性脑动脉瘤
- E. 高脂血症

- 88. 脑血栓形成最常见的病因是
- 89. 脑栓塞最常见的病因是
- 90. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是

(91~93 题共用备选答案)

- A. 炎症性病变
- B. 穿孔性病变
- C. 出血性病变
- D. 梗阻性病变
- E. 绞窄性病变

- 91. 起病缓慢,持续性腹痛
- 92. 肝浊音界消失,X线检查见膈下游离气体
- 93. 腹腔穿刺抽出不凝固血液

(94~95 题共用备选答案)

- A. 1/2 张
- B. 1/3 张
- C. 1/4 张
- D. 2/3 张
- E. 等张

- 94. 2:3:1 溶液
- 95. 4:3:2 溶液

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

96. 骨髓穿刺术的禁忌证,主要包括

- A. 血友病
- B. 哺乳期妇女
- C. 局部皮肤感染者
- D. 多发性骨髓瘤
- E. 晚期妊娠妇女

97. 属于肿瘤发生的内在性因素是

- A. 电离辐射
- B. 免疫因素
- C. 病毒感染
- D. 内分泌因素
- E. 黄曲霉毒素

98. 膀胱癌的危险因素有

- A. 吸烟
- B. 食用糖精
- C. 长期服用镇痛药物
- D. 长期尿失禁
- E. 长期慢性膀胱炎症

99. 临床常用的免疫抑制剂有

- A. 泼尼松
- B. 环孢素 A
- C. 硫唑嘌呤
- D. 环磷酰胺
- E. 肾上腺素

100. 子宫内膜癌发病可能的相关因素有

- A. 性生活紊乱
- B. 糖尿病
- C. 雌激素持续刺激
- D. 绝经延迟
- E. 多育

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 以下选项中属于医院感染的是
 - A. 病人皮肤黏膜开放性伤口有细菌定植，但尚未有炎症表现
 - B. 新生儿在院内经产道感染链球菌
 - C. 新生儿在院内经胎盘感染单纯疱疹
 - D. 新生儿在分娩过程中误吸未被污染的羊水形成肺炎
 - E. 术后 3 日内病人体温升高，3 日后恢复正常
2. 以下有关内源性感染预防原则的叙述错误的是
 - A. 避免扰乱病人的正常防御机制
 - B. 仔细检查，明确病人的潜在性病灶
 - C. 明确机体带菌状态
 - D. 如有必要，可限制使用抗生素
 - E. 抵抗力下降的高危人群应采取保护性隔离和全部去污染
3. 下列关于原位菌群失调的叙述正确的是
 - A. 也称定位转移
 - B. 即正常菌群在外来菌的入侵下在原有部位发生了数量或种类结构上的变化
 - C. 失调因素被消除后，正常菌群均可自然恢复
 - D. 免疫力低下的病人仅发生原位菌群失调
 - E. 二度失调为菌群发生了病理波动
4. 下列关于医院感染常见病原体的叙述错误的是
 - A. 常为多重耐药菌株
 - B. 大部分为人体正常菌群的转移菌或条件致病菌
 - C. 常侵犯免疫功能低下的宿主
 - D. 大肠杆菌是泌尿道感染的主要病原菌
 - E. 同一种细菌，医院外分离出的病原体菌株的耐药性更强、更广
5. 下列关于医院感染监测的叙述错误的是
 - A. 包括综合性监测和目标监测
 - B. 需要监测医院感染各科室发病率
 - C. 漏报调查样本量不少于年监测病人数的 10%，漏报率应低于 10%
 - D. 500 张病床以上的医院医院感染发病率应低于 30%
 - E. 目标监测开展的期限不应少于 1 年
6. 某医院研究一种新型手消毒剂的效果，将医院手术科室系统随机抽取 200 例病人，随机分为对照组（传统洗手法）100 例和实验组（使用手消毒剂）100 例。结果对照组中发生医院感染 5 例，实验组为 4 例。下列选项正确的是
 - A. 可计算相对危险度，值为 0.8
 - B. 可计算相对危险度，值为 1.2
 - C. 可计算相对危险度，值为 0.5
 - D. 可计算比值比，值为 0.8
 - E. 可计算比值比，值为 1.2
7. 下列物品与所选用的消毒灭菌方法对应不妥的是
 - A. 耐热的玻璃器材：干热灭菌法
 - B. 不耐热的塑料制品：3% 过氧化氢
 - C. 不耐热的精密仪器：2% 戊二醛
 - D. 伤口清洗：5% 过氧化氢
 - E. 物品表面：0.4% 过氧乙酸
8. 使用季铵盐类消毒剂消毒物品时，下列叙述错误的是
 - A. 苯扎溴胺仅能杀灭部分细菌繁殖体和亲脂病毒
 - B. 双链季铵盐用作皮肤消毒时，浓度为 500mg/L，作用时间为 2~5 分钟
 - C. 苯扎溴胺用于黏膜消毒时，浓度为 500mg/L，作用时间为 3~5 分钟
 - D. 可用于环境表面消毒
 - E. 与肥皂、洗衣粉等合用时，有增强消毒效果的作用
9. 下列叙述错误的是
 - A. 进入和离开病房前都应认真洗手
 - B. 无菌导尿术操作完毕，脱去手套后，

- 必须认真洗手
- C. 一副手套只用于一位病人一个部位的护理操作
- D. 紧急情况下, 无法按规定要求洗手, 可用快速手消毒剂进行手消毒取代洗手
- E. 连续进行下一台手术时, 需更换无菌手术衣和无菌手套, 不需重新行外科手消毒
10. 下列情况下, 不需要洗手的是
- A. 在进行护理操作时, 可能接触了病人的血液、体液、分泌物、排泄物和污染的器械
- B. 护理两个病人之间
- C. 脱手套后
- D. 护理人员给病人测血压后, 进行导尿前
- E. 与病人交谈后
11. 下列预防清洁无菌手术切口感染的措施中, 不正确的是
- A. 加强营养
- B. 在可能条件下, 尽量缩短住院时间
- C. 术前 2 天开始使用抗生素进行预防
- D. 缩短手术时间
- E. 术前做好术区皮肤准备
12. 下列人群中, 念珠菌性阴道炎最常见易感人群为
- A. 老年妇女
- B. 幼女
- C. 长期应用广谱抗生素患者
- D. 月经期妇女
- E. 哺乳期妇女
13. 下列做法符合抗感染药物合理应用原则的是
- A. 首选广谱抗生素
- B. 氨基糖苷类抗生素与 β -内酰胺类药物同瓶滴注
- C. 尽可能选用多种抗生素, 联合用药
- D. 将红霉素用注射用水溶解后放入 500ml 生理盐水中静脉滴注
- E. 急性胆囊炎, 使用抗生素治疗后, 体温恢复正常, 继续用药 2 周, 以巩固疗效
14. 下列符合医院内下呼吸道感染的病原学诊断标准的是
- A. 痰细菌定量培养分离病原菌数 $\geq 10^8$ CFU/ml
- B. 痰细菌定量培养分离病原菌数 $\geq 10^7$ CFU/ml
- C. 痰细菌定量培养分离病原菌数 $\geq 10^6$ CFU/ml
- D. 痰细菌定量培养分离病原菌数 $\geq 10^5$ CFU/ml
- E. 痰细菌定量培养分离病原菌数 $\geq 10^4$ CFU/ml
15. 确诊血管相关性感染时, 导管尖端培养结果为阳性的是
- A. 细菌数 ≥ 3 CFU
- B. 细菌数 ≥ 5 CFU
- C. 细菌数 ≥ 10 CFU
- D. 细菌数 ≥ 12 CFU
- E. 细菌数 ≥ 15 CFU
16. 表浅手术切口感染是指发生在手术后
- A. 10 天内
- B. 30 天内
- C. 60 天内
- D. 120 天内
- E. 180 天内
17. 预防 ICU 医院感染的原则是
- A. 合理设计病室环境
- B. 加强工作人员的责任心
- C. 尽量减少介入性血流动力学监护的使用频率
- D. 制定防止感染的管理制度
- E. 合理使用抗生素
18. 下列预防医护人员发生医院感染的措施不正确的是
- A. 定期进行身体检查
- B. 养成良好的洗手习惯
- C. 接触被患者血液污染的器械时戴手套

- D. 为患者进行口腔治疗时,戴口罩和眼防护罩
- E. 被乙肝表面抗原阳性的器械刺破皮肤时,应及时进行疫苗接种
19. 下列关于乙型肝炎的叙述错误的是
- A. 被乙肝病毒污染的针头刺伤可感染乙肝
- B. 被乙肝病毒污染的血液透析装置也可传播乙肝
- C. 乙肝病毒可通过破损的皮肤或黏膜进行传播
- D. HBsAg 阳性者是传染源之一
- E. 患有乙肝的妇女的婴儿一定会得乙肝
20. 患者王某,男,45岁,术中输血400ml,6个月后因结膜黄染、食欲不振就诊,查为丙肝,由于接受了被污染的血制品。这种情况属于
- A. 环境感染
- B. 交叉感染
- C. 自身感染
- D. 医源性感染
- E. 不属于医院感染
21. 某医院2006年度住院病人中共200人发生医院感染,其中普通外科100人,妇产科50人,呼吸内科40人,其他科室合计10人。下列选项中正确的是
- A. 普通外科医院感染发生率为50%
- B. 妇产科医院感染发生率为25%
- C. 呼吸内科医院感染在全院的构成比是20%
- D. 普通外科医院感染在全院的构成比无法计算
- E. 妇产科医院感染在全院的构成比是10%
22. 患者李某,上消化道大出血,乙肝“大三阳”。急救过程中,护士小张的手部被大量血液污染,此时,小张应
- A. 反复洗手
- B. 用肥皂水浸泡双手
- C. 先洗手,再用手消毒剂搓洗2分钟
- D. 先用手消毒剂搓洗2分钟,再洗手
- E. 采用外科洗手消毒法
23. 张某,男,30岁,电工,三度烧伤,烧伤总面积70%,对该病人应采用
- A. 严密隔离
- B. 消化道隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 保护性隔离
- E. 接触隔离
24. 孙某,女,40岁,无明显诱因出现全身性水肿,血压155/95mmHg,尿蛋白(++++) ,24小时尿蛋白>3.5g,血清白蛋白<30g/L,诊断为原发性肾病综合征,对该病人使用糖皮质激素治疗后,病情缓解,下列对该病人的健康指导不妥的是
- A. 增强抵抗力,避免感染
- B. 定期随诊、复查,避免复发
- C. 不可擅自停药
- D. 经常服用抗生素预防感染
- E. 避免劳累
25. 某手术室长6米,宽5米,高3米,安装有循环风紫外线空气消毒器,所用循环风量必须
- A. <180m³/h
- B. <360m³/h
- C. >180m³/h
- D. >360m³/h
- E. >720m³/h
26. 管理的二重性是指
- A. 人为属性和环境属性
- B. 人际关系和社会属性
- C. 自然属性和社会属性
- D. 客观性和自然属性
- E. 经济基础和上层建筑
27. 管理的方法中,最基本、传统的管理方法是
- A. 思想教育方法
- B. 法律方法