

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

护理学（师）

标准化试题及解析

主编 明坤秀 徐春芳 王美荣



第二军医大学出版社

Second Military Medical University Press

· 全国卫生专业技术资格考试系列丛书 ·

护理学（师）

标准化试题及解析

主 编：明坤秀 徐春芳 王美荣

副主编：王丽霞 王 敏 刘美兰 鹿洪艳

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

护理学(师)标准化试题及解析/明坤秀,徐春芳,王美荣主编. —上海:第二军医大学出版社,2009.1

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

ISBN 978-7-81060-887-9

I. 护… II. ①明…②徐…③王… III. 护理学-护士-资格考核-解题
IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 153981 号

出 版 人 石进英

责任编辑 王 勇

全国卫生专业技术资格考试系列丛书

护理学(师)标准化试题及解析

主 编:明坤秀 徐春芳 王美荣

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

电话/传真:021-65493093

全国各地新华书店经销

青州市新希望彩印有限公司印制

开本:787×1092 1/16 印张:22 字数:540 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81060-887-9/R·693

定价:45.00 元

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年开始全国卫生专业初、中级技术资格实行以考代评。考试取得的资格代表了被认可具备相应专业技术职务要求的水平与能力，被单位作为聘任相应技术职务的必要依据。为适应考试的新变化，针对考生临考备战进行综合性巩固，我们组织有关专业人员编写了《全国卫生专业技术资格考试系列丛书》。

本套丛书的特点：

1. **标准性：**试题难度、题型分布、题目数量均与正式试卷一致，附有答题卡及参考答案，并对部分题目进行详细解析。
2. **全面性：**五套标准试题全面涵盖大纲规定考查的知识及能力，并突出重点、难点、要点。
3. **预测性：**每套试题均根据历年试题对命题规律进行总结和预测后精选而成，命题率高。

本书难免存在不足和疏漏之处，敬请广大读者批评指正，以便我们进一步修改和完善。

编者

2009 年 1 月

目 录

标准化试题（一）	(1)
基础知识	(1)
相关专业知识	(10)
专业知识	(20)
专业实践能力	(31)
答题卡	(43)
参考答案及解析	(51)
标准化试题（二）	(69)
基础知识	(69)
相关专业知识	(78)
专业知识	(88)
专业实践能力	(99)
答题卡	(111)
参考答案及解析	(119)
标准化试题（三）	(137)
基础知识	(137)
相关专业知识	(147)
专业知识	(157)
专业实践能力	(168)
答题卡	(181)
参考答案及解析	(189)
标准化试题（四）	(207)
基础知识	(207)
相关专业知识	(217)
专业知识	(227)
专业实践能力	(239)
答题卡	(251)
参考答案及解析	(259)

标准化试题（五） (277)

 基础知识 (277)

 相关专业知识 (286)

 专业知识 (296)

 专业实践能力 (308)

 答题卡 (319)

 参考答案及解析 (327)

标准化试题(一)

基础知识

A1/A2 型选择题 (1~69 题)

答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列自身抗体中，诊断系统性红斑狼疮的标志抗体是
 - A. 抗核抗体 (ANA)
 - B. 抗 SM 抗体
 - C. 抗双链 DNA 抗体
 - D. 抗 RNP 抗体
 - E. 抗 SSA 抗体
2. 痰液静置后出现分层现象的疾病是
 - A. 支气管哮喘
 - B. 慢性支气管炎
 - C. 慢性阻塞性肺气肿
 - D. 肺结核
 - E. 肺脓肿
3. 心室纤颤最常见的病因是
 - A. 休克
 - B. 急性心肌梗死
 - C. 心肌病
 - D. 心脏瓣膜病
 - E. 预激综合征
4. 引起肾炎性水肿的主要机制是
 - A. 全身毛细血管通透性增加
 - B. 肾小球滤过率下降
 - C. 大量蛋白尿导致低蛋白血症
 - D. 抗利尿激素分泌过多
 - E. 血压增高引起急性心衰
5. 参与体液免疫的细胞是
 - A. B 淋巴细胞
 - B. T 淋巴细胞
 - C. 中性粒细胞
 - D. 浆细胞
 - E. 单核细胞
6. 出生后唯一的造血场所是
 - A. 卵黄囊
 - B. 肝
 - C. 骨髓
 - D. 脾
 - E. 淋巴结
7. 中毒性痢疾的传播途径是
 - A. 呼吸道
 - B. 虫媒
 - C. 胃肠道
 - D. 土壤
 - E. 食物
8. 关于上呼吸道的描述错误的是
 - A. 由鼻、咽、喉组成上呼吸道

- B. 咽是呼吸系统和消化系统的共同通路
- C. 咽在咳嗽中起重要作用
- D. 鼻对吸入气体有过滤、保湿、加温作用
- E. 吞咽时,会厌覆盖喉口,防止食物进入下呼吸道
9. 肝硬化患者出现全血细胞减少的最主要原因是
- A. 脾功能亢进
- B. 骨髓造血功能下降
- C. 营养状况差
- D. 内分泌紊乱
- E. 侧支循环的建立与开放
10. 腺垂体功能亢进,在成年后发病的疾病是
- A. 垂体性侏儒症
- B. 席汉综合征
- C. 肢端肥大症
- D. 巨人症
- E. 黏液性水肿
11. 一氧化碳中毒病情严重的危重信号是
- A. 意识障碍
- B. 神志不清
- C. 浅昏迷
- D. 昏迷
- E. 持续昏迷
12. 已知与肺癌发生有关因素中最重要的危险因素是
- A. 饮食与营养
- B. 电离辐射
- C. 空气污染
- D. 吸烟
- E. 职业因素
13. 引起慢性胃炎的主要病因是
- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 自身免疫反应
- C. 机械因素影响
- D. 化学因素影响
- E. 黏膜退变
14. 诊断急性肾小球肾炎最重要的依据是
- A. 高血压
- B. 水肿
- C. 血尿
- D. 中等量以上的蛋白尿
- E. 尿比重下降
15. 膀胱癌组织类型最多见的是
- A. 单纯癌
- B. 移行细胞癌
- C. 鳞癌
- D. 腺癌
- E. 硬癌
16. 肺癌中多发生于老年男性,与吸烟的关系最密切的组织类型是
- A. 鳞状上皮细胞癌
- B. 小细胞未分化癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 腺癌
- E. 肺泡癌
17. 肉眼血尿反复发作,最常见于
- A. 急进性肾小球肾炎
- B. 过敏性紫癜肾炎
- C. IgA 肾病
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 狼疮性肾小球肾炎
18. 鉴别腹股沟斜疝与直疝最有意义的体征是
- A. 疝块的形状

- B. 疝块是否降入阴囊
C. 是否易嵌顿
D. 回纳疝块后压住内环, 增加腹内压是否脱出
E. 疝囊颈是否宽大
19. 急性肾功能衰竭少尿或无尿期常见的致死原因是
A. 高磷血症与低钙血症
B. 低钠血症
C. 低氯血症
D. 高镁血症
E. 高钾血症
20. 胆囊管阻塞导致急性胆囊炎多数是由于
A. 胆囊结石
B. 致病菌侵入
C. 创伤
D. 胆囊管畸形
E. 肝内感染
21. 脑血栓形成的最常见原因是
A. 高血压
B. 动脉粥样硬化
C. 各种脑动脉炎
D. 血压偏低
E. 红细胞增多症
22. 腹部闭合性损伤中最容易受损伤的内脏是
A. 肝
B. 脾
C. 小肠
D. 结肠
E. 胃
23. 长时间的低血压、低灌注量、酸中毒和大量游离的血红蛋白极易导致
A. 肝衰竭
B. 呼吸衰竭
C. 肾衰竭
D. 脑衰竭
E. 心力衰竭
24. 病人出现 Horner 综合征可能是由于肿大的甲状腺压迫了
A. 气管
B. 食管
C. 颈交感神经丛
D. 颈深部大静脉
E. 双侧喉返神经
25. 感染性休克常见于
A. 胆道蛔虫症
B. 急性水肿性胰腺炎
C. 肝脓肿
D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
E. 急性胆囊炎
26. 气管切开的病人, 每日呼吸道所蒸发的水分约为
A. 500 ml
B. 1 000 ml
C. 1 500 ml
D. 2 000 ml
E. 2 500 ml
27. 恶性肿瘤的淋巴道转移方式中最多见的是
A. 区域淋巴结转移
B. 穿过或绕过淋巴结的“跳跃式”转移
C. 经皮肤真皮层淋巴管的转移
D. 在毛细淋巴管内形成癌栓
E. 经皮肤淋巴管转移
28. 小脑幕切迹疝出现意识障碍, 其损害

部位是

- A. 延髓
- B. 中脑
- C. 脑桥
- D. 丘脑
- E. 大脑皮层

29. 中心静脉压 (CVP) 代表了右心房或者胸腔段腔静脉内压力的变化, 下列提示血容量不足的是

- A. $<5 \text{ cmH}_2\text{O}$
- B. $5 \sim 10 \text{ cmH}_2\text{O}$
- C. $11 \sim 15 \text{ cmH}_2\text{O}$
- D. $16 \sim 20 \text{ cmH}_2\text{O}$
- E. $>20 \text{ cmH}_2\text{O}$

30. 骨折愈合过程中第三期为

- A. 骨性愈合期
- B. 原始骨痂形成期
- C. 血肿机化演进期
- D. 临床愈合期
- E. 纤维愈合期

31. 急性化脓性腹膜炎病人出现早期呕吐的原因是

- A. 胃管刺激
- B. 肠麻痹
- C. 反射性呕吐
- D. 神经性呕吐
- E. 腹胀

32. 肾结核是

- A. 继发于肺结核, 经淋巴进入肾脏
- B. 继发于肺结核, 经血行进入肾脏
- C. 继发于肠结核, 经血流进入膀胱
- D. 膀胱结核逆行感染
- E. 继发于骨结核, 经血流进入膀胱

33. 骨痂改造塑形期的主要作用是

- A. 骨膜内骨化
- B. 形成永久骨痂
- C. 把骨折的两端连起来
- D. 内外骨痂和桥梁骨痂汇集融合
- E. 完成骨折临床愈合

34. 阿托品用于全麻前给药的目的是

- A. 增强麻醉效果
- B. 减少麻醉药用量
- C. 减少呼吸道腺体分泌
- D. 预防心动过缓
- E. 辅助骨骼肌松弛

35. 原位癌从病理形态上看

- A. 上皮细胞增生, 伴有不典型增生
- B. 仅限于上皮层内, 是未突破基膜的早期癌
- C. 突破基膜向周围组织浸润、发展, 破坏和侵蚀周围组织的正常结构
- D. 癌前期上皮增生不明显, 伴有不典型增生
- E. 限于上皮层内, 突破基膜的早期癌

36. 急性肠套叠多见于

- A. 2~10 岁的儿童
- B. 青壮年
- C. 2 岁以内的儿童
- D. 6 个月婴儿
- E. 老年人

37. 大肠癌 Dukcs 病理分期中 C1 期是指

- A. 癌肿仅限于肠壁, 无淋巴结转移
- B. 癌肿穿透肠壁, 淋巴结转移仅限于癌肿附近
- C. 癌肿穿透肠壁, 淋巴结转移到系膜和系膜根部
- D. 已有远处转移
- E. 癌肿穿透肠壁, 无淋巴结转移

38. 有关代谢性酸中毒, 以下不正确的是
- 代谢性酸中毒多发生在脱水、休克等情况下
 - 高渗脱水酸中毒, 纠正酸中毒应先给予 NaHCO_3
 - 代谢性酸中毒指血液中 HCO_3^- 原发性减少
 - 代谢性酸中毒常伴有高血钾
 - 代谢性酸中毒时 PaCO_2 可下降
39. 暴饮暴食或酗酒最易引起的急腹症是
- 肠扭转
 - 粘连性肠梗阻
 - 急性坏疽性阑尾炎
 - 急性胰腺炎
 - 胆石症
40. 关于宫内节育器的并发症的描述, 正确的是
- 感染
 - 阴道出血
 - 腰腹酸胀感
 - 月经量增多
 - 子宫穿孔
41. 关于纯母乳喂养的描述, 正确的是
- 在母婴分开时, 也要保持泌乳
 - 母乳也需定时
 - 两次哺乳之间可加喂糖水, 避免小儿缺水
 - 哺乳后可以给孩子使用安慰奶头
 - 母乳也需定时定量
42. 某些因素可影响白色假丝酵母菌的存活, 请指出
- 干燥
 - 紫外线
 - 化学制剂
 - 热
 - 日光
43. 宫内节育器放置时间正确的是
- 月经干净后 3~7 天
 - 产后 1 个月
 - 剖宫产术后 3 个月
 - 人工流产术后宫腔长度大于 10 cm 者
 - 哺乳期随时
44. 关于女性骨盆重要径线, 下列数值正确的是
- 入口平面前后径为 12.75 cm
 - 中骨盆平面横径为 13 cm
 - 出口前矢状径为 8.5 cm
 - 出口后矢状径为 15 cm
 - 出口平面横径为 9 cm
45. 输卵管妊娠流产多见于
- 壶腹部妊娠
 - 峡部妊娠
 - 腹腔妊娠
 - 卵巢妊娠
 - 阔韧带妊娠
46. 围绝经期综合征的原因主要是
- 性激素分泌减少
 - 性激素分泌增多
 - 精神紧张
 - 卵巢肿瘤
 - 环境改变
47. 晚期宫颈癌恶病质的症状是
- 阴道大出血
 - 大量米汤样阴道排液
 - 大量恶臭脓样阴道排液
 - 持续腰骶部疼痛
 - 贫血、感染、消瘦、发热

48. 产后子宫颈完全恢复正常状态的时间为
- 4 周
 - 6 周
 - 30 天
 - 28 天
 - 20 天
49. 引起闭经的部位不正确的是
- 子宫
 - 卵巢
 - 输卵管
 - 垂体
 - 下丘脑
50. 妊娠早期血中高浓度的雌激素和孕激素来自
- 肾上腺皮质
 - 卵泡
 - 妊娠黄体
 - 胎盘
 - 卵巢
51. 与胎盘早剥发生有关的可能因素是
- 前置胎盘
 - 脐带过长
 - 胎死宫内
 - 血管病变
 - 胎盘老化
52. 丈夫精液人工授精适应于
- 低精子计数
 - 精子活动力低下
 - 遗传性疾病
 - 免疫性不孕
 - 宫颈管狭窄
53. 子宫峡部的上端是
- 组织学外口
 - 组织学内口
 - 解剖学外口
 - 解剖学内口
 - 鳞柱状上皮交界处
54. 妊娠晚期腹部撞伤后出现腹痛及阴道出血、胎心消失, 应首先考虑
- 前置胎盘
 - 胎盘早期剥离
 - 先兆早产
 - 凝血功能障碍
 - 脐带脱垂
55. 外生型宫颈癌的正确描述是
- 宫颈肥大、质硬, 宫颈管膨大如桶状
 - 镜下早期宫颈浸润癌
 - 向外突出的赘生物, 触之易出血
 - 整个宫颈可被空洞替代
 - 外观类似一般宫颈糜烂
56. 新生儿排胎便的时间为
- 生后 1~2 天
 - 生后 6 小时内
 - 生后 24 小时内
 - 生后 2~3 天
 - 生后 12 小时内
57. 与肉眼血尿的颜色相关的是
- 尿蛋白量
 - 尿比重
 - 尿酸碱度
 - 尿量
 - 尿肌酐量
58. 传染病的流行形式有
- 散发
 - 播散
 - 虫媒传播

- D. 土壤传播
E. 胃肠传播
59. 对4个月的小儿感知发育的描述正确的是
- A. 开始认识母亲
B. 能区别父母的声音
C. 能区别好闻和难闻的气味
D. 能区分物体的冷、暖属性
E. 有空间和时间知觉的萌芽
60. 与小儿呼吸道感染易导致阻塞症状相关的解剖特点是
- A. 管腔相对狭长
B. 右支气管粗短
C. 管壁血管丰富
D. 管腔缺乏胶原组织
E. 纤毛逆行运动
61. 低出生体重儿是指
- A. 出生1小时内体重不足2 500 g
B. 出生1小时内体重不足2 000 g
C. 出生1小时内体重不足1 500 g
D. 出生1小时内体重不足1 300 g
E. 出生1小时内体重不足1 000 g
62. 一健康儿,体检时心率为120次/分,血压为11.5/7.6 kPa,他的年龄应是
- A. 1岁
B. 1.5岁
C. 3岁
D. 4岁
E. 5岁
63. 腮腺炎病毒属于
- A. 疱疹病毒属
B. 志贺菌属
C. 副黏液病毒属
D. 分枝杆菌属
E. 支原体
64. 1岁小儿胃内容量为
- A. 30~60 ml
B. 250~300 ml
C. 90~150 ml
D. 700~850 ml
E. 2 000 ml
65. 吸气性呼吸困难的发生机理是
- A. 大气道狭窄梗阻
B. 广泛性肺部病变使呼吸面积减少
C. 血管床减少
D. 上呼吸道异物刺激
E. 肺组织弹性减弱及小支气管痉挛性狭窄
66. 溃疡型口腔炎的病原体为
- A. 单纯疱疹病毒
B. 柯萨奇病毒
C. 链球菌
D. 白色念珠菌
E. 腺病毒
67. 冬季感染化脓性脑膜炎的主要病原菌为
- A. 脑膜炎双球菌
B. 流感嗜血杆菌
C. 肺炎链球菌
D. 大肠杆菌
E. 葡萄球菌
68. 患者女性,26岁。初孕妇,末次月经记不清,自觉3周前开始胎动,检查子宫长度为23 cm,比较符合实际的妊娠周数应是
- A. 14~16周
B. 17~19周
C. 20~22周

- D. 23 ~ 25 周
E. 26 ~ 28 周

69. 小儿能双脚跳, 可搭积木, 能用勺子吃饭, 能握杯喝水, 判断其年龄应为

- A. 1 岁
B. 2 岁
C. 3 岁
D. 4 岁
E. 5 岁

B1 型选择题 (70 ~ 100 题)

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(70 ~ 72 题共用备选答案)

- A. 50 ml
B. 100 ml
C. 200 ml
D. 300 ml
E. 400 ml

70. 少尿是指 24 小时尿量少于
71. 无尿是指 24 小时尿量少于
72. 急性肾衰多尿期是指 24 小时尿量超过

(73 ~ 74 题共用备选答案)

- A. 750 ~ 1 500 ml
B. 600 ~ 1 000 ml
C. 8 000 ml
D. 2 000 ~ 3 000 ml
E. 500 ~ 1 000 ml

73. 肝脏每天分泌胆汁量为
74. 胰腺每天分泌胰液量为

(75 ~ 77 题共用备选答案)

- A. 嵌顿性股疝
B. 肠蛔虫团堵塞
C. 乙状结肠扭转
D. 肠套叠
E. 急性肠炎

75. 属于单纯机械性不完全性肠梗阻的是
76. 属于动力性肠梗阻的是
77. 属于血运性肠梗阻且易发于婴儿的是

(78 ~ 80 题共用备选答案)

- A. 骨肉瘤
B. 骨肿瘤
C. 髌关节结核
D. 急性血源性骨髓炎
E. 化脓性关节炎

78. 儿童好发
79. 长骨干骺端好发
80. 髌关节和膝关节好发

(81 ~ 82 题共用备选答案)

- A. 膀胱
B. 肾脏
C. 前尿道
D. 输尿管
E. 膀胱三角区

81. 初始血尿提示出血部位在
82. 终末血尿提示出血部位在

(83 ~ 85 题共用备选答案)

- A. 腹膜炎

- B. 低血压
- C. 肾乳头坏死
- D. 肾功能不全
- E. 消化道出血

- 83. 急性肾盂肾炎的并发症是
- 84. 血液透析的并发症是
- 85. 腹膜透析并发症是

(86~90 题共用备选答案)

- A. 明显口渴
 - B. 脑水肿, 颅内压增高
 - C. Chvostek 征和 Trousseau 征阳性
 - D. 肌无力, 疲乏软弱
 - E. 呼吸深快
- 86. 高渗性缺水时出现
 - 87. 急性水中毒时出现
 - 88. 代谢性酸中毒时出现
 - 89. 低钙血症时出现
 - 90. 低钾血症时出现

(91~94 题共用备选答案)

- A. 96%~98%
- B. 98%
- C. 99%
- D. 99.7%
- E. 99.95%

- 91. 短效口服避孕药避孕率可达
- 92. 长效口服避孕药避孕率可达
- 93. 常效避孕针避孕率可达
- 94. 速效避孕药探亲 1 号避孕率可达

(95~97 题共用备选答案)

- A. $Hb < 145 \text{ g/L}$
 - B. $Hb < 120 \text{ g/L}$
 - C. $Hb < 110 \text{ g/L}$
 - D. $Hb < 100 \text{ g/L}$
 - E. $60 \text{ g/L} < Hb < 90 \text{ g/L}$
- 95. 6~14 岁小儿中度贫血的诊断标准是
 - 96. 6 个月~6 岁小儿贫血的诊断标准是
 - 97. 6~14 岁小儿贫血的诊断标准是

(98~100 题共用备选答案)

- A. INH + RFP + EMB 疗程 9 个月
 - B. INH + RFP + EMB 疗程 2~3 个月
 - C. INH + RFP 9~12 个月
 - D. INH + RFP 6 个月
 - E. INH + RFP + SM + PZA 3~4 个月
- 98. 原发型肺结核, 无明显症状时
 - 99. 结核巩固治疗
 - 100. 结核强化治疗

相关专业知识

A1/A2 型选择题 (1~74 题)

答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列属于应用洋地黄类药物禁忌证的疾病是
 - A. 充血性心力衰竭
 - B. 三度房室传导阻滞
 - C. 心房颤动
 - D. 室上性心动过速
 - E. 心房扑动
2. TRH 兴奋试验，如 TSH 有升高反应其意义为
 - A. 可排除甲亢
 - B. 支持甲亢的诊断
 - C. 见于 Graves 眼病
 - D. 见于 TSH 瘤
 - E. 见于自主性高功能腺瘤
3. 亚硝酸盐中毒，解毒剂选用
 - A. 二巯丙醇药
 - B. 贝美格
 - C. 亚甲蓝
 - D. 硫代硫酸钠
 - E. 阿托品、解磷定
4. 目前国内认为第一线抗结核药物是
 - A. 吡嗪酰胺
 - B. 卡那霉素
 - C. 对氨基水杨酸钠
 - D. 乙胺丁醇
 - E. 氨硫脲
5. 膝腱反射正常反应为
 - A. 股四头肌舒张
 - B. 股四头肌收缩，小腿伸展
 - C. 腓肠肌收缩，小腿伸展
 - D. 各趾向足面屈曲
 - E. 脚趾背伸
6. 肝癌的终末期死亡率极高的并发症是
 - A. 上消化道出血
 - B. 癌结节破裂出血
 - C. 肝性脑病
 - D. 继发感染
 - E. 腹水形成
7. 对 Graves 病有早期诊断意义的检查是
 - A. TSAb
 - B. TGAbs
 - C. TPOAb
 - D. TRAb
 - E. TBAbs
8. 先天性心脏病 X 线检查显示心脏外形呈轻~中度扩大，以右心房、右心室增大为主，肺动脉段突出，可见肺门“舞蹈”，肺野充血，主动脉影缩小。提示有
 - A. 室间隔缺损
 - B. 房间隔缺损
 - C. 动脉导管未闭

- D. 法洛四联症
E. 主动脉关闭不全
9. 下列关于胃肠钡餐检查前的准备描述错误的是
A. 检查前3天禁服影响胃肠道功能的药物
B. 检查前3天禁服含钾、镁、钙等重金属药物
C. 禁食10小时以上
D. 有幽门梗阻者检查前应先抽出胃内滞留物
E. 检查前1日晚需服用番泻叶导泻
10. 结核性腹膜炎可查出移动性浊音是当腹水量超过
A. 400 ml
B. 600 ml
C. 800 ml
D. 1000 ml
E. 1 200 ml
11. 治疗结核标准疗法的疗程为
A. 3个月
B. 5个月
C. 9~12个月
D. 6个月
E. 12个月
12. 风心病二尖瓣狭窄心电图表现正确的是
A. P波消失，代之以大小、形态不一的f波
B. P波消失，代之以锯齿状f波
C. P波变窄，P波宽度 <0.12 秒
D. 二尖瓣型P波，P波宽度 >0.12 秒
E. P波提早出现，形态与窦性不同
13. 重症中暑常用的降温药物是
A. 柴胡
B. 阿司匹林
C. 异丙嗪
D. 氯丙嗪
E. 安乃近
14. 结核性脑膜炎降颅压采取的措施中应除外
A. 应用脱水剂
B. 应用肾上腺皮质激素
C. 药物降颅压无效可行侧脑室引流
D. 腰穿放液
E. 疑有脑疝者可行侧脑室引流
15. 在病毒性脑炎的脑脊液检查结果中，一般不会出现的是
A. 外观混浊
B. 压力增高
C. 细胞数增多
D. 蛋白质增多
E. 糖和氯化物正常
16. 门静脉高压症手术治疗主要解决
A. 食管胃底静脉曲张破裂出血
B. 腹水
C. 脾肿大脾功能亢进
D. 肝功能损害
E. 肝性脑病
17. “三凹征”产生的主要原因为
A. 上呼吸道阻塞
B. 下呼吸道阻塞
C. 混合性呼吸道阻塞
D. 弥漫性肺部阻塞
E. 肺不张
18. 有高血压史者术中出现低血压，指血压下降超过术前血压的