

婦人良方



婦人良方卷之二十

臨川陳氏曉齋書

吳郡後學薛已校註

產後門

產後口乾痞悶方論第一

論曰產後口乾痞悶因食米麪乾飯太早脾胃不能消化熱鬱所致慎不可下但服見現丸則愈無擇云若內積憂煩外傷燥熱宜四物湯去地黃加人參烏梅可愈

愚按前症若宿食停滯用六君枳實神麪若

因肉食所致更加山查若因魚鱸之類再加

陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾

胃受傷用六君子湯或噓酸變腐加炮薑作

瀉更加升麻如不應佐以四神丸或間用補

中益氣湯

附治驗

婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不

去服消導等藥不應飲食日減飢體日瘦半

年矣余謂此食積為患用大酒麪炒為末溫

酒調服二錢俄聞腹鳴良久仍下粽而愈

酒調服二錢俄聞腹鳴良久仍下粽而愈

一婦人食魚鮮腹痛患痢諸藥不應用陳皮白朮等分為末以陳皮湯送下數服而愈

見現丸

葛黃

三稜

草澄茄

陳皮

良薑

人參

莪茂

酒炒各等分

右為末用蘿蔔汁糊丸桐子大每服三十丸

白湯下

產後心煩發渴宜清心蓮子飲

方見六卷

附方

六君子湯

婦人良方卷之二十

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

四神丸

方見八卷第八論

產後血渴方論第二

竊謂前症若出血過多虛火上炎用童子小

便或四物白朮麥門丹皮若胃氣虛而有熱

用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加麥門

五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃

氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散

附治驗

當歸補血湯 方見二十四卷第十一論

產後乍寒乍熱方論第三

產後乍寒乍熱由血氣虛損陰陽不和若陰勝則乍寒陽勝則乍熱宜用增損四物湯若因收血不散腹內作痛宜用奪命丹後用增損四物湯隨病加減無擇云敗血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱用大調經散五積散

愚按前症若因陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用補中益氣湯若因陰氣不足陽氣下陷於陰中而發熱者用六味地黃丸若氣血不足而惡寒發熱者用八珍湯若病後寒熱倦怠者用補中益氣湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯

附治驗

一產婦惡寒發熱余以為血氣虛寒用十全大補加炮薑而寒熱愈用補中益氣而肢體安又食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙面色青中隱黃此肝木侮脾土飲食停滯用六君子加木香一劑而安

一產婦惡寒發熱余以為氣血俱虛不信反

一產婦患前症朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

附方

七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致

人參

白朮

木香

白茯苓

甘草

薑香

乾葛

各一錢

婦人良方卷三

婦人良方卷三

二

右水煎服

竹葉歸蓆湯

治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲

食者

竹葉

一錢

當歸

黃芪

二錢

白朮

各一錢

麥門冬

去心

七分

甘草

炒五

右水煎服

四物湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

產後瘧疾方論第四

郭稽中云產後乍寒乍熱者多是敗血爲害或陰陽不和若藥作瘧疾治之誤矣陳無擇曰產後寒熱或一二日或二三日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或純寒純熱者皆是瘧疾最難治療可用草藥飲生熟飲四獸飲選用之

愚按前症當與第十四卷第九論參看用藥以補胃氣爲主佐以草藥飲之類若胃氣稍充以草藥飲爲主佐以補胃之劑大抵產後

婦人良方卷三

六

瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少飲食多用人參養胃湯勞役所傷用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑中氣虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子益氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百症但溫補脾胃其病自退若誤用清脾

用小柴胡湯致汗出譫語煩熱作渴肢體痠

摘余用十全大補二劑益甚脉洪大重按如無此藥力不能及乃加附子四劑稍緩數劑而安

增損四物湯

人參

常歸

芍藥

川芎

乾薑

甘草

右每服四錢水薑煎

大調經散 治產後惡露未消寒熱自汗或肚

腹作痛

婦人良方卷三

五

大豆

茯苓

真珀琥

右爲末每服二錢空心濃煎烏豆紫蘇湯調

下

附方

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

當歸補血湯 方見二十四卷第十一論

八珍湯

十全大補湯 二方見二十四卷第四論

六味地黃丸 方見二十四卷第十一論

截瘡之類多致不起

附治驗

一產婦患瘡發熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食咽酸愛氣此飲食傷脾不能消化用六君子加神麴山查四劑而酸止乃去神麴山查數劑而食進其大便不通計三十五日所進飲食計百餘碗腹始悶令用猪膽汁導而通之其壅亦不甚燥人用調補脾胃之劑而安

一產婦瘡久不愈虛症蜂起難以名狀予謂

婦人良方卷五

此脾胃虛弱用六君子加炮姜二十餘劑漸愈更用參朮煎膏佐以歸脾湯百餘劑而瘡一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣煎服百餘劑而安

附方

草菓飲 治產後瘡疾寒熱相兼

半夏炮

赤茯苓

甘草炙

草菓炮去皮

川芎

陳皮

白芷

青皮去白

良姜

紫蘇

各二錢

乾葛四錢

右每服五錢姜水煎服晨連進三服

生熟飲 治產後瘡疾多寒者

四豆冠

草菓仁

厚朴

生去粗皮

半夏

陳皮

甘草

大棗去核

生姜

右各等分和勻一半生用一半用濕紙包煨熟仍和之每服五錢水煎食前後各一服

附方

六君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

婦人良方卷五

藿香正氣散本卷第十論

人參養胃湯本卷第五論

十全大補湯二十四卷第四論

歸脾湯二十四卷第四論

產後尊勞方論第五

大產後尊勞由初產血氣虛弱將養失宜或風

寒所傷以致容顏憔悴倦怠咳嗽口乾頭眩腹

體作痛自汗盜汗寒熱往來肚腹疼痛月經不

調皮膚瘙癢

愚按前症若因脾胃虛弱而形體倦怠者用

六君子湯加當歸若脾肺氣虛而咳嗽口乾
用補中益氣加麥門五味若因中氣虛而口
乾頭暈用補中益氣加蔓荊子若肝經血虛
而肢體作痛用四物參朮若因肝腎虛弱而
自汗盜汗寒熱往來者用六味九加五味子
若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍
湯倍加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙癢用加
味逍遙散大抵此症多因脾胃虛弱飲食不
少以致諸經疲憊而作當補脾胃飲食一進
精氣生化諸臟有所倚賴其病自愈矣仍照
虛損發熱方論主治

增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱如瘧食少腹
脹

柴胡 人參 甘草 炒

半夏 炒 陳皮 川芎

白芍藥 炒各等分

右每服五錢水薑棗煎日二服

白茯苓散 治產後腰勞頭目四肢疼痛寒熱
如瘧

白茯苓 一兩 當歸 川芎

桂心 白芍藥 炒 黃芪 炒

人參 各半兩 熟地黃 半兩

右先以水三盞入豬腎一雙薑棗各三事煎

二盞去之入前藥半兩煎一盞服

豬腰子粥 治產後腰勞發熱用猪腰子一枚
去膜切片用鹽酒拌先用粳米一合入蔥椒

煮粥鹽醋和將腰子鋪碗底以熱粥蓋之如
作蠶生狀空心服

黃芪建中湯 治產後諸虛不足發熱或惡寒
腹痛

黃芪 炒 肉桂 各一兩 白芍藥 炒二兩

甘草 炒七錢

右每服五錢用薑棗水煎日三二服虛甚須
加附子

附方

六君子湯

補中益氣湯

四物湯 三方見二十四卷第六論

六味九 方見二十四卷第十一論

八珍湯

八珍湯

八珍湯

八珍湯

加味逍遙散 二九鼎二十四卷第四論

產後虛羸方論第六

產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產者毋論日期必須調養平復方可治事否則氣血復傷虛羸之症作矣

愚按前症產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若嘔氣覺有藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲

以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸症自愈矣

黃雌雞湯 治產後虛羸腹痛

小黃雌雞 一隻去頭足翅腸肚細切 當歸

白朮 炒 熟地黃 白製 桂心

黃芪 炒各半兩

右先以水七鍾煮雞至三鍾每用汁一鍾藥

四錢煎日三服

十全大補湯 治產後氣血未復形體虛弱

惡寒等症 方見二十四卷第四論

產後風虛令勞方論第七

產後氣血勞傷臟腑虛弱若風冷瘰之血氣愈虛形氣羸損風冷入臟令人無子謂之風虛令勞也

愚按前症若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒用十全大補湯胃氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱用六君子湯命門火衰用八味丸肝脾血虛用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯

產寶方治產後虛羸不生肌肉

黃芪 炒 當歸 芍藥 炒

人參 各三錢 桂心 甘草 炒

川芎 生薑 各四錢 大棗 十二枚

右水煎分三服

又方豬腎一雙煮入蔥豉作臠如常食之

產後腹脹嘔吐方論第八

產後腹脹滿悶嘔吐者因敗血散於脾胃不能運化而致宜用抵聖湯治之

愚按前症若敗血散於腸胃宜用前方若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於胃宜

用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為善

附治驗

一產婦患前症或用抵當湯敗血已下前症益甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而安

抵聖湯

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮

甘草炒各錢

婦人良方卷三

婦人良方卷三

三

右用生薑焙乾半兩水煎

愚按前方最宜用之

附方

六君子湯

補中益氣湯方見二十四卷第六論

產後嘔逆不食方論第九

經云胃為水穀之海以養臟腑因產後胃氣虛弱飲食所傷必致嘔逆故不食也

愚按前症若因飲食過時用四君子湯飲食過多過用六君子湯飲食過時而兼勞役用補

中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用益黃散肝木侮脾上用六君子麻柴胡命門火不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有生者

附治驗

一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味道遙散加味歸脾湯以大調補而痊

開胃散

治產後胃虛嘔吐胃滿不食

呵子肉

兩半

人參一兩

甘草炒半兩

右每服五錢薑水煎

治產後胃虛嘔逆

橘紅一兩

半夏

甘草炒各半兩

藿香三兩

右每服五錢薑水煎

治產嘔逆不食白朮五錢薑六錢水煎徐徐溫服

石蓮散 治產後胃寒咳逆嘔吐不食或腹作脹

石蓮肉 兩半 白茯苓 一兩 丁香 五錢

右為末每服二錢不拘時用薑湯或米飲調下日三服

附方

錢氏益黃散 治脾土虛寒水反鹹以致嘔吐

不食或肚腹作痛或大便不實手足逆冷等症

症

陳皮 一兩 青皮 一兩 呵子肉 一兩

甘草 炙 丁香 二錢

右為粗末每服四錢水煎服

人參養胃湯 治外感風寒內傷飲食寒熱頭

疼或作瘧疾

半夏 厚朴 製 橘紅 八分

藿香葉 草菓 茯苓 一錢

人參 五分 甘草 炙 三 蒼朮 一錢

右薑七片烏梅一箇水煎服

四君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

八味丸 方見二十四卷第十一論

附子理中湯 方見二十卷第八論

加味逍遙散

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

產後霍亂方論第十

產後霍亂因臟腑虛損飲食不消觸冒風冷所

致若熱而飲水者五苓散寒而不飲水者理中

丸虛冷者加附子來復丹尤妙

愚按此症當與後卷第十一論互相主治

附治驗

一產婦停食霍亂用藿香正氣散之類已愈

後胃腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作泄瀉余

謂此脾胃俱虛用六君子湯加木香治之漸

愈後因飲食失調兼患怒患霍亂胃腹大痛

手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母

而康設泥痛無補法而用辛散或用平補之

劑必致不起

一產婦吐瀉嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先

用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而嘔酸愈

又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

白朮散 治脾胃傷吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

大便不實

白朮

橘紅

麥門冬 去心

人參

乾薑 炮各

甘草 半兩

右每服四錢薑水煎

附子散 治脾胃虛寒吐瀉腹痛手足逆冷或

自汗口噤

附子 炮

白朮 炒

當歸

吳茱萸

丁香

橘紅

甘草 炒各

婦人食方卷三

右為末每服二錢粥飲調若脾胃虛用參苓

白朮散

附方

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食頭疼寒

熱或霍亂泄瀉或作瘧疾

藿香 一錢

桔梗 炒

大腹皮

紫蘇

茯苓

白芷

半夏 麩

陳皮

白朮 炒

厚朴 一錢

甘草 各五

右薑棗水煎熱服

五苓散

白朮 炒

猪苓 各一錢

桂 三分

澤瀉 二錢

茯苓 錢

右水煎服

理中丸 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚

腹膨脹

人參

白朮 炒

乾薑 炮

甘草 炙各

右為末米糊丸彈子大每服一丸爵細白湯

下

婦人食方卷三

來復丹 治伏暑泄瀉身熱脉弱其效如神倍

卒間須用此藥

硝石

一兩同礬黃火土礬炒用

太陰玄精石 研

舶上硫黃 各一

五靈脂 去土

青皮

陳皮 各二

右為末醋糊丸小豆大每服三十九空心米

飲下

易簡方云硝石性寒佐以陳皮其性疎快硫

黃性寒味澀若作煖藥以止瀉誤矣蓋山吹

食生冷或冒暑熱之氣中脘閉結揮霍變亂

非此藥不能通利三焦分理陰陽其功甚速

六君子湯方見二十四卷第六論

八味丸方見二十四卷第十一論

婦人良方卷之二十一

婦人良方卷之二十一

婦人良方卷之二十二

臨川陳自明良甫編

吳郡後學薛已校註

產後門

產後寒熱方論第一

產後發熱頭痛身疼雖如傷寒時氣雖當用麻黃亦不可輕易如早起勞動為寒所傷則漸漸惡寒翕翕發熱頭項肩背骨節皆痛至七八日乃差若大便堅作嘔不能食用小柴胡湯加生薑地黃主之

婦人良方卷之二十二

一

愚按病機要云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上中二焦為之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下之早證利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣

人參當歸散 治去血過多內熱短氣頭痛悶

亂骨節作痛或虛煩咽燥

人參

當歸

生地黃

桂心

麥門冬

去心各一兩

白芍藥

右梗米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去之入藥五錢棗二枚煎服虛甚用熟地黃

小柴胡湯 治傷風四肢煩熱頭疼若頭不疼

而作煩二物黃芩湯 方見二十四卷第二論

二物黃芩湯

黃芩 半兩

苦參 一兩

生地黃 二兩

右每服四錢水煎

增損柴胡湯 治虛弱寒熱少食腹脹等症方

勞

信法

婦人良方卷三

二

竹葉防風湯 治產後傷風發熱面赤氣喘頭

痛

淡竹葉 半把

防風

人參

桂枝

苦梗

甘草 各半兩

葛根 一兩

右每服五錢薑棗水煎汗出項強加附子嘔

加半夏

治惡露不盡晝則明了暮則譫語寒熱如見鬼

此熱入血室用柴胡地黃湯或四物加柴胡

方見六卷十五論

產後頭痛方論第二

夫頭者諸陽之會也產後胃氣虛弱飲食少思陽氣微弱不能上升故頭痛若因敗血中風者言之甚詳

愚按前症若中氣虛用補中益氣湯加寧劑子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

附治驗

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不效已三年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加

信法

婦人良方卷三

二

附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸

加五味子兩月而痊

芎附散 治氣虛頭痛用大附子一枚去皮晒

切四片拌醃醋一硃炙附蘆薑同川芎 兩

為末每服二錢清茶調服

治血虛頭疼當歸川芎每服五錢水煎

產後頭痛都梁丸亦可治 方見四卷第六論

附方

補中益氣湯

四物湯 二方見二十四卷第六論

八珍湯 方見二十四卷第四論

六味丸 方見二十四卷第十一論

產後咳嗽方論第三

夫肺主於氣產後肺氣虛故外邪感而咳嗽所
由作也若食鹽醃之類而致者難治若因麵積
滯而致者服黑神散五積散可愈

愚按前症若陰血虛四物湯加參朮陳皮桔
梗肺氣虛四君加芎歸桔梗陰火上升六味

地黃丸加參朮風寒所感補中益氣湯加桔

梗紫蘇若瘀血入肺發喘兼口鼻起黑或鼻
出血急用二味參蘇飲亦有得生者然而所

患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本胃氣
一虛五臟失所百病生焉經云肺屬辛金生

於巳土脾土既虛不能生金則腠理不密外
邪易感矣治當壯土金生腎水以制火為善

附治驗

一產婦朝吐痰夜發熱無寐泥用清痰降火
之藥肌體日瘦飲食日少余曰早間吐痰脾

氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血
耗也遂用六君子湯加味逍遙散加味歸脾
湯以次調補不月而痊

一產婦咳嗽見風則喘急惡寒頭痛自汗口
禁痰盛余為脾肺氣虛腠理不密用補中益

氣加肉桂數劑而安

一產婦咳嗽聲重鼻塞涕涕此風寒所感余
用參蘇飲一鍾頓愈與補中益氣加桔梗茯

苓半夏一劑將痊又與六君黃芪以實腠理
全愈

婦人良方卷三

一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱肺熱微作
無時此陰火上炎余用補中益氣湯六味地

黃丸而愈

一產婦咳而腹滿不食涕唾而腫氣逆此病
在胃而關於肺用異功散而愈

知母散 治惡露上攻咳嗽不已
知母 貝母 白茯苓
人參 各半兩 桃仁 杏仁 各一兩

右每服五錢水煎
治風寒咳嗽

甘草

桔梗 各六分 款冬花 四分

麥門冬

生地黃 各一錢 二分

葱白 一握

右水煎服

旋覆花湯

治咳嗽最良 方見下有汗者去麻黃

附方

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽

或腹滿不食面浮氣逆等症

人參

白朮 炒 甘草 炒

茯苓

陳皮 各一錢

夏

婦人良方卷五

六

右薑棗水煎服

六君子湯

四物湯

四君子湯

補中益氣湯

四方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

二味參蘇飲

方見後

參蘇飲

方見六卷第十一論

產後喉中氣急喘促方論第四

產後喉中氣急喘促因榮血暴竭衛氣無主獨

聚于肺名曰孤陽最為難治若因敗血停凝服奪命丹若因榮血暴絕服等癆湯若因風寒所傷服旋覆花湯若因氣鬱結服小調經散若因傷飲食服見現丸

愚按前症若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇若中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲

附治驗

一產婦喘促自汗手足俱冷以手護臍腹

夏

婦人良方卷五

七

此陽氣虛脫用參附湯四劑而愈

二味參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲

死者

人參 二兩

蘇木 二兩

右水煎頓服

旋覆花湯 治傷風寒暑濕喘嗽太盛坐卧不

寧

旋覆花

赤芍藥

前胡

半夏麴

荆芥穗

甘草

茯苓

五味子

杏仁

麻黃 各等分

右每服四錢薑棗水煎 有汗者莫服

五味子湯 治產後喘促脉伏而厥

五味子 料妙 人參 各二錢

麥門冬 去心 陳皮 各一錢

右薑三片棗二枚水煎服

芎藭湯 方見後

附方

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

參附湯 方見十八卷第六論

產後口鼻黑鼻衄方論第五

產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋陽明經脉之海

起於鼻交頤中還出頤口交人中左之右右之

左此產後氣虛榮血散亂胃絕肺敗之症也急

取緋線一條并產婦頂心髮兩條穿繫中指節

更無藥可療

愚按胃脉俠口繞承漿蓋鼻準屬脾土鼻孔

屬肺金誠胃虛肺損氣脫血死之症急用二

味參蘇飲加附子五錢亦有得生者 方見前

產後咳噫方論第六

夫肺主於氣而稟於胃蓋產後脾胃傷損風冷

所搏故咳噫也急灸期門三壯必愈此穴乃胃

之大絡 穴見六卷第十五論

愚按前症屬胃氣虛寒之惡候如用後方未

應急投參附湯亦有復生者 方見十八卷第六論

丁香散 治心煩咳噫

丁香 各半 白芷 各半 伏龍肝 一兩

右為末煎桃仁吳茱萸湯每服一錢調下

羌活散 治咳逆

羌活 各半 附子 炮 茵香 炒各半兩

木香 炮 白薑 炮

右為末每服二錢水一盞薑一拾煎服

一方用桂心五錢薑汁三合水煎服

產後血崩方論第七

產後血崩因經脉未復而勞傷或食酸鹹之味

若小腹滿痛肝經已傷最為難治急服固經丸

主之

愚按前症若血滯小腹脹滿用失笑散血少

小腹虛痞芎藭湯肝火血妄行加味逍遙散

小腹痛者芎藭湯肝火血妄行加味逍遙散

小腹痛者芎藭湯肝火血妄行加味逍遙散

脾鬱不統血加味歸脾湯脾氣虛不攝血補中益氣湯厚味積熱傷血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子防風枳殼

附治驗

一產婦血崩小腹脹痛用破氣行血之劑其崩如湧四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉余用六君炮黑薑四劑稍愈又十全大補三十餘劑而痊

一產婦血崩因怒其血如湧什地口禁銅手足抽搐此肝經血耗生風余用六味九料一

婦人良方卷五

劑諸症悉退但食少瞞熱佐以四君柴胡牡

丹皮而愈

固經丸

艾葉

赤石脂

補骨脂

木賊

附子

右為末飯丸桐子大每服二十九溫酒或米

飲下

芎藭湯

芎藭

當歸

芍藥

右每服五錢水煎

附方

失笑散 方見二十卷第五論

十全大補湯

加味逍遙散

加味歸脾湯 三方見二十四卷第四論

補中益氣湯

六君子湯

四君子湯 三方見二十四卷第六論

清胃散 方見二十四卷首論

六味丸 方見二十四卷第十二論

婦人良方卷五

產後月水不調方論第八

產後月水不調由血氣虛損風邪所客邪正相搏以致經候失期或多或少或不得其平也

愚按前症若過期而作痛者氣血俱虛也八

珍加柴胡丹皮不及期而來血熱也四物山

梔柴胡將來而作痛血實也四物加桃仁紅

花過期而來者血虛也四物加參朮紫黑成

塊者血熱也四物加炒梔炒連丹皮作癰而

色淡者痰多也四物合二陳治當臨症制宜

附治驗

一產婦月經不調內熱燥渴服寒涼之劑其血如崩腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈以加味逍遙散調理而安

琥珀散 治經脉不調飲食少思日漸消瘦

琥珀 牛膝 生地黃

當歸 桃仁 赤芍藥

右每服五錢水薑煎

附方

八珍湯

加味逍遙散 二方見二十四卷第四論

婦人良方卷三 三

四物湯

六君子湯 二方見二十四卷第六論

二陳湯 方見二十四卷第五論

產後月水不通方論第九

產後乳子周歲而經不行是其常也若半歲而經行此血有餘也若一二歲不行而無疾不必服藥若肢體倦怠食少內熱是血少也宜健脾胃若以藥通之則誤矣

愚按前症脾胃虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用歸脾湯加丹皮山梔若怒火傷血宜

用四物合小柴胡氣血俱虛用八珍牡丹皮仍參前論主之

附治驗方藥

一產婦月經年餘不通內熱瞋服分氣丸經行不止惡寒作渴食少倦怠胃滿氣壅朝用加味逍遙散夕用四君子湯月許諸症稍愈佐以八珍湯兼服兩月而愈

六君子湯

四物湯

四君子湯 三方見二十四卷第六論

婦人良方卷三 三

歸脾湯

加味逍遙散

八珍湯 三方見二十四卷第四論

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

產後四肢浮腫方論第十

產後四肢浮腫者乃敗血乘虛流注宜用小調經散陳無擇云若風邪所乘於氣分皮膚腫而浮虛乃氣也若皮膚腫如熟李乃水也蓋氣腫者宜發汗水腫者宜利小便

愚按前症若氣水傷土宜養脾肺若氣虛浮